



تصویر ڈاکٹر کیمبرن صاحب مرحوم سول سرجن فیض آباد







تصویر تلج الاطبا خلاصه الحکما سیادت پناه شفاء الدوله حکیم سید افضل علی خان بہاؤ مدبر جنگ  
مصنف کتاب ہذا



ed  
 el Hakim Shaffa-  
 ent and able co-ad-  
 casure to work.  
 merian M. D.  
 il Surgeon



For some time past I have been engaged with Nawab Hakim Shaffa-ud-doula Bahadur in the compilation of a Manual of the Practice of Medicine. The circumstances under which the work was begun and carried on are detailed in his introduction to the book. I believe it is his intention to publish it for the benefit and guidance of those of his professional brethren who may wish to adopt the treatment of disease as practiced by Europeans in modern times.

The Manual has been for the most part built on the lines of *Moja ki Shurra Sudeedi* (itself a compilation), a book in the hands of most Hakimis - the order & nomenclature of which has been followed as closely as has been found practicable -

A short account has been given of the structure and functions of the various organs and also of the changes of structure caused in them by disease in order that the Engineer maybe able to better to understand the plans & aims of the treatment recommended.

I need hardly to say I have found in the Nawab Hakim Shaffa-ud-doula a very earnest, assiduous, intelligent and able co-adjutor with whom it has been indeed a pleasure to work.

Yazabad  
19 December 1877

Edw. J. Cameron M. D.  
Civil Surgeon

## ترجمہ سارفلیٹ ڈاکٹر کمرن صاحب ہاربر کتاب جامع شفا فیہ

تھوڑے عرصہ سے میں نواب حکیم شفا الدولہ بہادر کے ساتھ ایک کتاب دستور علاج کی تالیف میں مشغول رہا ہوں۔ نواب صاحب موصوف کی کتاب کے دیباچہ میں کیفیت آغاز تصنیف کتاب ختم کی وجہ سے ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ نواب صاحب کا ارادہ اس کتاب کے شائع کرنے کا واسطے فائدہ و ہدایت اُن ہم پیشہ بھائیوں کے ہے جو کہ اُس طریقہ علاج امراض کو اختیار کرتا چاہتے ہیں جس کا زمانہ حال اہالیانِ یورپ میں رواج ہے۔ یہ کتاب نہ یادہ ترشہ موجز سیریدی کی ترتیب پر لکھی گئی ہے جو خود ایک نگاہ کتاب ستہ اور اکثر حکیموں کے ہاتھ میں رہا کرتی ہے تاکہ دریافت کنندہ کی سمجھ میں علاج مجوزہ کی تدابیر و نتائج آسانی سے آسکیں۔

مجھ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے نواب حکیم شفا الدولہ کو ایک نہایت مستعد و مہنتی شہیدہ اور لائق مددگار پایا جس کے ساتھ کام کرنا و حقیقت باعث خوشی کا تھا۔

اس کتاب میں تھوڑی تفصیل علم تشریح و بیان کار خاص اعضاء و امراض و نیز تدبیر تہذیبی مزاج جو سبب امراض ہو جاتا ہے لکھی گئی ہے۔

پیشہ گیرانہ ایم۔ ڈی۔ سولی سرجن

فیض آباد۔ ۱۹ دسمبر ۱۸۸۶ ع

فهرست اسماء انگریزی و عربی کتاب خاتمه جامع شفا

امراض اس		
اسماء امراض عربی فارسی	اسماء امراض انگریزی بخلافی	اسماء امراض لغت انگریزی و بخلاف انگریزی
صداع و درد سر	هیدرالیک	Headache
سرسام و درم دماغ	سیری بر فورمن انجیشن	Cerebro Meningitis
دوار و دوران سر	ورٹی گوی	Vertigo
شیات و خواب ثقیل	سائم نو لنس	Somnolence
سهر و بیداری	ویک لنس و نین پین تن وان نو نینیا	Wakefulness, sleeplessness, Insomnia
سپان و فراموشی	دنی متشیا	Dementia
مالخولیا	سیلن کو لیا	Melancholia
مانیا و جنون سببی	مینیا	Mania
مالخولیا ای مراقی	مالی پو کنت درانی آس	Hypochondriasis
کابوس	نیت میتر	Nightmare
هزیان و بچودی	در لیریم پیری نرس	Delirium Tremens
صع	اپی لپسی	Epilepsy
قطرب	*	Apoplexy
حمق	*	
عشق	*	
سکنه	آپوب لکسی	Apoplexy
فالج و استرخا هم معنی	پرال لاس	Paralysis
فالج نصف بدن	هی بل جیا	Hemiplegia
فالج اسری	لڈپالری	Lead Palsy
استرخانی و گشت ست که اکثر کتاب پیشود استکری و نرس پالزی	لکان و لسن	Convulsion
تشنج	هیستاپوب لکسی و کابی	Heat apoplexy or Sun-stroke
تشنج حاکم از اذیت گرمی آفتاب پیدا شود	سین لکس و لکس	

[illegible]

اسماء امراض بلغت عربی و فارسی	اسماء امراض بلغت انگریزی بخط فارسی	اسماء امراض بلغت انگریزی بخط انگریزی
خفیه و ناخنه	خفیه و ناخنه	<i>Pterygium</i>
شیمی سفید رنگ مثل شیم یا موم که بر یوس پخت و کیولا	شیمی سفید رنگ مثل شیم یا موم که بر یوس پخت و کیولا	<i>Pinguecula</i>
میمرن چشم پیدا میشود	میمرن چشم پیدا میشود	<i>Chemosus conjunctivitis</i>
طرقه	طرقه	<i>Chemois</i>
انتفاخ العین و او دیای عین	انتفاخ العین و او دیای عین	<i>Korneitis</i>
ورم قرنی	ورم قرنی	<i>Korneitis suppuration</i>
و تل قرنی	و تل قرنی	<i>Ulcer of cornea</i>
جراحت القرنیه و زخم قرنی	جراحت القرنیه و زخم قرنی	<i>Pannus</i>
بل	بل	<i>Leucama</i>
بیاض العین و سفیدی قرنی	بیاض العین و سفیدی قرنی	<i>Staphylococci cornea</i>
نقره القرنی	نقره القرنی	<i>Scleratitis</i>
ورم الملتحیه	ورم الملتحیه	<i>Choroiditis</i>
ورم غشای سیاه که زیر ملتحمه است	ورم غشای سیاه که زیر ملتحمه است	<i>Iritis</i>
ورم عنیبیه	ورم عنیبیه	<i>Neadarosis</i>
اتساع ثقبه عنیبیه	اتساع ثقبه عنیبیه	<i>Myosis</i>
ضیق ثقبه عنیبیه	ضیق ثقبه عنیبیه	<i>Hyperemia of Retina</i>
اجتماع الدم فی الطبقة القلیبیه	اجتماع الدم فی الطبقة القلیبیه	<i>Retinitis</i>
ورم صلبیه که غشای نوری است	ورم صلبیه که غشای نوری است	<i>Anomiasis</i>
صفت البصر و کدورت العین	صفت البصر و کدورت العین	<i>Glaucoma</i>
ورم چشم که در آن مردک چشم بنر مثل آب کلا و کلا	ورم چشم که در آن مردک چشم بنر مثل آب کلا و کلا	<i>Dropsy of aqueous humor</i>
بخر عظم پیدا میشود	بخر عظم پیدا میشود	<i>Dropsy of vitreous</i>
استسقای رطوبت بیضیه	استسقای رطوبت بیضیه	<i>Opacity of vitreous humour</i>
استسقای رطوبت زجاجیه	استسقای رطوبت زجاجیه	<i>Muscae Volitantes</i>
نکته زجاجیه	نکته زجاجیه	
طیران گس پیش چشم	طیران گس پیش چشم	





اسماء امراض ملت انگریزی	اسماء امراض ملت عربی و فارسی	اسماء امراض ملت فارسی
<i>Acumosis</i>	آکونیٹوزس	انفصال الجفن
<i>Adeuma</i>	ادوما	ورم مالی جفن
<i>ulceration eyelid</i>	الیریشن آئیڈ	قرح الجفن
<i>Tumour eyelid</i>	چومر آف آئیڈ	سلع الجفن
<i>Paralysis of eyelids</i>	پارالیز آف آئیڈ	استرخار الجفن
<i>Blepharospasmus</i>	بلیفرو اسپزم	تشنج عضلات جفن
<i>Ophthalmia Larvi</i>	آف ٹال میا ٹارسانی و میا ٹارسانی	ورم اہراب
<i>Hardcolum</i>	ہارڈنی اولس	شعیر
<i>Angular Blepharn</i>	انگلو بلیفرون	التصاق الجفین
<i>Meadarosis</i>	ماڈاروزس	انتثار الاہاب
<i>Triasis</i>	ٹرائیڈس	قلعہ الجفان
<i>Trichiasis</i>	ٹریکیائس	شعر منقلب وزائد
<i>Entropium</i>	ان ٹروپٹن	منقلب شدن کنارہ جفن بسوی داخل انقلاب الجفن الی الداخل
<i>Ectropium</i>	اک ٹروپٹن	انقلاب الجفن الی الخارج
<i>lacrimal system</i>	در امراض آلات تولد اشک کہ از آنک زنی کل سیستم گویند	
<i>Dacryo adinitis</i>	ڈاکری آڈائٹس	ورم غدہ مولد اشک
<i>Hypertrophy lacrimal gland</i>	ہائپر ٹروفی لاکریمل گلاند	زیادہ شدن مقدارہ غدہ مولد اشک
<i>Infra granacula lacry</i>	انفر گرانولہ لاکری	ورم موقع چشم کہ اول اجتماع آب چشم است
<i>Meccocle</i>	میوکل	ورم مزمن موقع چشم
<i>Epiphora</i>	اپیفورا	سیلان اشک
<i>Diseases of the ear</i>	در امراض آذن یعنی گوش	
<i>Otitis</i>	ایٹائٹس	وجع الاذن در گوش
<i>Deafness</i>	ڈیفنس	بطلان السمع و طریش
<i>Noises</i>	نایز	طنین و دوی

اسماء اراضی و معنی فارسی و عربی و انگریزی	اسماء اراضی و معنی فارسی و عربی و انگریزی	اسماء اراضی و معنی فارسی و عربی و انگریزی
Macromphage Rheumatic Inflammation (Otitis media) Intolerance of hearing Pressure behind the lobe of the ear	همسوج وزن کم و بیش از وزن عادی ان توالین آفت نیزگت	التهاب ارضیه من الاذن التهاب ارضیه من الاذن بیماری الاذن عدم تحمل الاذن من الاصوات شداع الاذن
Diseases of the nose Loss of smell Fetid smell Dryness of nasal mucous membrane Ulcer of nose Epistaxis Pustule	در اراضی الف یعنی بینی آن اوزن میا فشیذ اسفل السر آفت لوزا ايش ثمان سس پیشخوان	نقصان استم و بطلانها ادراک الروائح العفنه حفاظ الف قروح الانف رغاف بشره خاص که در اعلی و باطن بینی در ملک پیشخوان بیماری پیشخوان
Lepus Polypus Vermis trasi	لپ اوتا پالی لپس ورمس ترانی	بشره خاص که بر غشاء بینی و در بینی و بینی زیاده شدن گوشه بینی قریب اربنه بواسیر الف دیوان الف
Diseases of the gums, tooth Loose tooth Grinding of teeth Irritation in tooth Bleeding gum Spongy gum Tooth ache Loose tooth.	در اراضی لثه و اسنان و عقیق لثه و اسنان لثه و اسنان لثه و اسنان لثه و اسنان لثه و اسنان لثه و اسنان لثه و اسنان	ضعف الاسنان عمر الاسنان فقر الاسنان لثه و اسنان استرخای لثه وجع الاسنان لثه و اسنان

اسامی امراض انگلیزی	اسامی امراض فارسی	اسامی امراض عربی و فارسی
Bad smell from mouth	بوی بد دهان	بخر و بدبو دهان
Stomatitis	استوماتیت	نسارح اللسان
Roughness of the tongue	زبان زبر	زبابه و زبانه
Ptyalism	سجیان لعاب از دهان	سجیان لعاب از دهان
Fissure in the lip	شق لب	تشق الشفت
Inflammation of lip	التهاب لب	دم الشفت
Parotitis or Mumps	پاروتیت و مپس	ورم غده مولد صاب که پیش از ذوق
Diseases of tongue	در امراض لسان	
Ulcers tongue	آلر آن تنگ	شق لسان
Dryness of the tongue	خشکی لسان	خفاف لسان
Lonity of tongue	لکین آن تنگ	استرخا و اللسان
Meatiness of the tongue	و کین آن تنگ	التهبی اذا ابطی کلامه
Heaviness of the tongue	هیبوی لسان آن تنگ	ثقل لسان
Glossitis & Hypertrophy of tongue	گلانسیس و هایپرتروفی آن تنگ	عظم لسان
Kanikula	کانیکولا	نفوذ اللسان
Stoma	نیون	دخ سیاه زبان
Wart	وزرت	برآمدگی اگر مشابیه جسم بر زبان افتد
Gumma	گوما	مسکه بر زبان افتد
Cancer of the tongue	کانشر و اپانژیوما	سرطان اللسان
Diseases of the Throat	در امراض حلق	
Tonsillitis	تانیلایتس	خفا
Elongated of uvula	الانگزیس و امیونولا	استرخا و لسان
Gaiter	گایتر	ورم غده های حلق و گیت
Disgaiter	دیسگایتر	شکم گیت که در آن چنان در می آید

اسماء امراض انگریزی بخط فارسی	اسماء امراض بلغم فارسی	اسماء امراض بلغم عربی و فارسی
Diseases of the air tube & lungs	در امراض قصبه ریه و ریه	ضیق النفس
Difficulty in breathing	دفعه ای از برزیدن	ریه
Asthma	استمنا	سعال و درم قصبه ریه
Bronchitis	برنگامیش	ذات الریه و درم شش
Pneumonia	پنومونیا	ذات الجنب و درم پهلوی
Pleurisy Pleurisy	پلوریتیس	بند شدن هوا در بدن
Emphysema	ایم فی زیمیا	سل
Gothisis	گوتیس	مایه نعل فی القصبه من الاجسام الخارجیه
Foreign body in the air tube	افوریا	سجده الصوت
Aphonia	کاف	سرفه
Cough	کاف	تفت الدم
Hemoptysis	هیماتیزیس	فی العلق الناشب فی الحلق
Leeches in the throat	لیچیزان تهرؤت	فی اللقمه والشوکه التي تنبت بالحلق
Fish bones in the throat	فیش بون ان تهرؤت	فی تدیر من غرق فی المار
Treatment for drowning	جبر کل ان لنگس	بثور ریه
Tubercle in the lungs	اودنیا آت لنگس	اجتماع المار فی الریه
Edema of the lungs	انفل میشن وایبریشن لنگس	ورم و جراثیم قصبه ریه
Inflammation & ulceration of lungs	سپوریشن آت لنگس	قیح و مد که در ریه افتد
Suppuration of lungs	مایه زو نو کرس	جمع شدن آب در غشای پلورا
Hydrothorax	اینا زیمیا	پیدا شدن ریم در غشای آبدار پهلوی
Empyema	پنوماتورکس	داخل شدن هوا در فضا سه صدر
Pneumothorax	پلوریتیس	ذات القدر
Pleurisy	پلوریتیس	تیمور القدر
Pleurodynea	پلوریتیس	

اسامی امراض بلنت عربی و فارسی	اسامی امراض بلنت انگریزی و پنجاب	اسامی امراض بلنت فارسی و عربی و انگریزی
در امراض قلب		
درم غشای القلب	پیری کازومی شین	Diseases of the Heart
درم لم قلب	کازومی شین	Pericarditis
درم غشای داخلی قلب	اندو کازومی شین	Endocarditis
زیاده شدن گوشت قلب	بانی پری کازومی شین	Hypertrophy of the heart
وسیع شدن بطن ای قیق شدن بوار جی آن	رول ایندیشن	Dilatation
ضعف القلب که کم شدن مقدار دل است	آشتری	Atrophy
صلابة و غلظت غشای داخلی قلب	مارین ولف کاردس و در نیز آف	Thickening of Endocardium
تولید شحم کثیر در قلب		Fatty Degeneration of Heart
نیگلون شدن رنگ بدن بسبب زرد شدن مازوس ستر او لیس		Cyanosis
تفکیک در هر دو بطن طفل بود		
وجع القلب	ان جایی پاکپورین	Angina pectoris
تضعیف فعل قلب	تضعیف آف آژن ایندیشن	Yacture of heart's action
غشی	سنگینی	Syncope
در مرض شریان		
سنگافه شدن غشای اندرونی شریان و بیخ ایندیزه زمر		Diseases of blood vessels
شدن غشای بیرونی		Aneurysm
در امراض ثدی که آنرا بلنت انگریزی مای گویند		
وجع الثدی	توراجیا مای	Diseases of the chest
عقده الثدی	بومر مای	Neuralgia
درم طه ثدی	افضل منیشن بیل	Tumour Mammary
قلب کین		Inflammation Nipple
در امراض سده و مری		
درم مری سده	تافت ایندیشن و ایندیشن	Inefficient discharge of milk
زخم مری	آلتریشن ایندیشن	Diseases of Oesophagus
		Inflammation of oesophagus
		Ulceration of oesophagus

اسماء امراض انگریزی بلفظ انگریزی	اسماء امراض لغت عربی و فارسی	اسماء امراض لغت انگریزی بلفظ فارسی
Tumour of oesophagus	چومزانت ایسافانگس	زنگل مرے
Dysphagea	دیس فاجیا	ضیق مبل
Gastritis	گاسٹریٹس	ورم معدہ
Gastric ulcer.	گاسٹریک آلسر	جراثیم معدہ
Cancer gastric	کینسر گاسٹریک	سرطان معدہ
Gastro Enteritis	گاسٹرو انٹرایٹس	درم یکس میمرن معدہ تا کیسین بر اسما
Dyspepsia	دیس پیسیا	بیضی معدی
Gastralgia	گاسٹرالجیا	وجع المسدہ
Anorexia	آنورکسیا	نقصان شهوت طعام
Bad appetite	بیڈ اپیتیت	فساد شهوت طعام
Canine appetite	کانین اپیتیت	شهوت کلبد
Vanicious appetite	فنی ازانورکسیا	جوع البقری
Hiccups	هک کف و هک کف	فواق
Vometic	فوم انیک	قے
Haemoptysis	هیماتیزس	فی الدم
Gynpamitis	گینپامیتس	نفوذ شکم
Ptyosis	پتایوس	سوزش معدہ که آن پیلان لعاب دهن شد پانی روز روز
Diseases of the liver	درامراض کبد که از الیه گویند	
Hepatitis	هپاتایٹس	ورم جگر حاد
Septic abscess	سپتیک آبسس	ویله کبد
Hepatitis chronic	هپاتایٹس کرونیک	ورم مزمن کبد
Hypertrophy of liver	هایپرتروفی آف لایور	عظمت کبد
Serosis	سروزوز	مضر کبد
Hydatid	هایداتید	تولید دیدان و غیره پیر آب در کبد
Cancer of liver	کینسر آف لایور	سرطان کبد

اسمای امراض بخت عربی و فارسی	اسمای امراض انگریزی	اسمای امراض انگریزی بخت فارسی
ضعف کبد و کم پیدا کردن صفرا از خون		
زیاده شدن شکر کبد یعنی یا ده پیدا کردن صفرا		
یرقان و زرد شدن بدن	جان دین	
یرقان سندی یعنی سیاه شدن بدن	بلیک جان دین	
در امراض طحال که آنرا اسپلین گویند		
ورم طحال	اسپلین ایٹس	
در امراض لیلب و امعا		
ورم لیلب	انفل میشن آف پیکرکس	
شرطان لیلب	کنسرس آف پیکرکس	
ورم طبقه داخلی امعا	انفل میشن میوس میمرن امعا	
ورم نفس امعا که بعضی مواضع افتد	کنسرس آف باولس	
ورم قلوب که محل اتصال آن به صغیر است	پیری تیف لانسٹس	
اسهال	ڈائریا	
قبض شکم	کانسٹیپیشن	
قولنج	کالیک	
ویدان و گرم شکم	اسکرس کینبر کانڈرس	
هضمه و بانی	کالیک	
ورم غده های سنتری	تائین سنتری	
ورم غشای آبدار شکم	پیری تون ایٹس	
استسقا	اسکیٹس و اسیتس	
در امراض مقعد که آنرا اینس گویند		
شقاق میوس میمرن مقعد	فشر واکس	
دبيلة مقعد	ریکٹک ایٹس	
انوا میمرن	فن چولان اینس	
استروفا مقعد	ریکٹک آف اینس	
خسرج مقعد	پروکٹس اینس	
Want of secretion of Bile		
Excessive secretion of Bile		
Jaundice		
Black Jaundice		
Diseases of spleen		
Splenitis		
Diseases of Pancreas & Intestine		
Inflammation of Pancreas		
Cancer of Pancreas		
Enteritis		
Congestion of bowels		
Colitis		
Diarrhoea		
Constipation		
Colic		
Worms		
Cholera		
Tales Mesenterica		
Peritonitis		
Ascitis		
Disease of the anus		
Fissure & ulcer of the anus		
Petie abscess		
Fistula in ano		
Relaxation of anus		
Prolapsis ani		



اسامی امراض طبی فارسی و عربی و فارسی	اسامی امراض انگریزی و خط فارسی	اسامی امراض انگریزی و خط فارسی
حکمتہ المقعہ	راپچر آف اینس	Itches in anus's.
بولاسیر	ہیموئیدز	Haemorrhoids
زیمیر	ڈسینٹری	Dysentery
درامراض گروہ کہ آنرا کڈنی گویند		Diseases of kidney
درم ماد گروہ	نفریٹس	Nephritis
درم مزمن گروہ	کرائیک نفریٹس	Chronic Nephritis
آدن سفیدہ در بول	نیلو پوریا و برائٹ ڈرنیز	Albuminuria
حصاة الکلیہ	کال کولس و گراول	Calculus and Gravel
بول لبنی	کلیڈزیا	Glycuria
کم پائیدار شدن بول در گروہ	سب پریشن آف یورائن	Suppression of urine
بول الدم	ہیماچوریا	Haematuria
ڈیا بیلس	ڈیا بیلس	Diabetes
ناصر الکلیہ	نیکیل فسفس چلا	Renal Distula
جرب الکلیہ	رائچنگس آف کڈنی	Stings in kidney
وج الکلیہ	نفران پیا	Nephralgia
درم کلاہ گروہ	سوپر آرینل گائیسٹ	Diseases of Supra Renal Gaf
درامراض شانیہ کہ بانگریزی بلاد گویند		Diseases of bladder
درم شانیہ	سیٹائٹس	Cystitis
رگب و سنگ شانیہ	کال کولس و گراول سٹنٹ	Calculus & gravel cystitis
احتباس بول	ریتینشن آف یورائن	Retention of urine
سلس البول و البول فی الفراش	ان کال ٹنٹنٹ آف یورائن	Incontinence of urine
خرقہ البول	ڈس یوریا	Dysuria
وج المثانہ	رین ان بلاڈ	Pain in bladder
تفطیر البول	ڈس یوزیا	Dysuria
مجموعہ الدم فی المثانہ	کولاجن لیشن آف فیلڈ ان بلاڈ	Coagulation of blood in bladder

اسماء امراض بلغت انگریزی بظاہر	اسماء امراض بلغت انگریزی بظاہر فارسی	اسماء امراض بلغت عربی و فارسی
Displacement of Bladder.	وٹس پلازٹ آف بلاڈر	خلع المثانہ
Grind in Bladder	وایتز ان بلاڈر	یخ المثانہ
Prostate	پراسٹٹ ایٹس	ورم غدہ ہائے عتق مثانہ
Utricles	یوٹریٹ ایٹس	ورم میوکیس ہرن مجری بول
Gonorrhoea	گنوریا	فرج مجری بول و سوزاک
Diseases of male organ	دوامراض مخصوصہ رجال	
Semen	سپمن	بیان حقیقت منی
Advantage and disadvantage of connection		منافع و مضار جماع
Position of testes	مائن پزیشن آف ٹیسٹس	عدم نزول البیضہ فی الکلیہ
Neuralgia of testes	نورالجیا آف ٹیسٹس	رجع الانشیں
Orchitis	اورکیٹس	اورام الانشیں
Abscess of Testis	آبسس آف ٹیسٹس	دبیلہ انشیں
Atrophy of testes	آٹروفی آف ٹیسٹس	صغر البیضتین
Hypertrophy of testes	ہائپرٹروفی آف ٹیسٹس	عظم الانشیں
Hydrocele	ہائیڈروسیل	عظم انشیں کہ بسبب اجتماع آب در غشائے بیضہ باشد
Haematocoele	ہیماٹوسیل	مجموع شدن خون در بیضہ
Varicocoele	ویریگوٹوسیل	وسیع شدن ورید جیل الانشیں
Spermatorrhoea	اسپرماتوریا	سیلان و جریان منی
Impotence	ایمپوٹنس و اسٹرال اے	قلت شہوت باہ
Treatment of excessive intercourse	x	تدبیر مستکثر جماع
Phimosis	فی موزس	صغر غلفہ و ضیق ثقبہ آن
Paraphimosis	پارافیموزس	تنگ شدن غلفہ بعد از انقباض
Balanitis	بالان ایٹس	ورم میوکیس ہرن اندرون غلفہ بالاک آن
Weakness of sexual power	ویکنس آف	نقصان باہ

اسماء امراض انگریزی بخلاف فارسی	اسماء امراض طبی فارسی و عربی و انگریزی	اسماء امراض طبی فارسی و عربی و انگریزی
Nocturnal Emission Hoaty discharge of Semen Priapism Diseases of Women Menstruation Pruritis vulva Vaginitis Imperforate Vaginitis Leucorrhoea Uteris catarrh or Metritis Noctritis Ulcer of the uterus Ovaritis Ovarium Tumour Pulvic Peritonitis Amenorrhoea Dysmenorrhoea Haematocele Menorrhagia Discharges Rudent ulcer Itchings of uterus Erection of clitoris Inversion of uterus.	ناک ترکل نمی مشن و ونیٹ در نیم ہیٹینی ڈس چارج آف سمن پریاپیزم درامض خفصہ نسوان مشن رُو ایٹش پرورٹیس ولوا واگنٹیس ایمپرفورٹ واگنٹیس لوکورہا یوٹیرس کٹار نوکٹریٹس اکسر آف یوٹرس اوواریٹیس اووورین ٹیور پلوک پریٹوٹن ایٹش امنورہا ڈس منورہا ہماتوسیل مینورہا ڈس چارج روڈنٹ اکسر ایچکنگ آف یوٹرس اکرکشن آف انورکشن آف یوٹرس	کثرت احتلام سرعت انزال کثرت انطا بیان پریاٹن حک و خارش فوج درم حارسہ معدم شدن بقعہ فرج بسبب سختی پردہ بکارت درم میوکس تمبرن و جینہ سیلان رطوبت سفید از فرج درم میوکس تمبرن درم درم جرم درم جراحت و زخم درم درم بھیتین زن مجمع شدن آب در خفصہ زنان درم خشائے آبدار احتباس حیف عسر و در حیف سلع دموی عانہ افراط سیلان طمث بدویے رطوبات درم اکھ درم تیکہ الزخم فرسودن نالی استادہ شدن لطرہ انقلاب الرحم

اسماء امراض لغت عربی و فارسی	اسماء امراض لغت انگریزی و ترکی	اسماء امراض لغت انگریزی و ترکی
تقو و خروج رحم	پرو و کبسن	Polypsis of uterus
میلان و نگون شدن رحم	ریت و روت و رشن و دانت و رشن	Petroversion of uterus
اعوجاج رحم	ریت و روت و رشن	Petroflexion
سرطان الرحم	کینسر یوٹرس	Cancer of uterus
بواسیر الرحم	پاپیلر آف یوٹرس	Piles in uterus
نفخہ رحم	کینسرین دین و رشن آف یوٹرس	Gasous distention of uterus
ریاح الرحم	فان کم چومر	Fantum Tumour
اختناق الرحم	ہینسٹریا	Hysteria
سوزاک زنان	گنوریٹا	Gonorrhoea
در بیان کیفیت تکون جنین		
در علامات حمل	سمپٹمز آف پرگننسی	Physiology of Embryo
در بیان مدت حمل انسان	دو و رشن آف پرگننسی	Symptoms of Pregnancy
در بیان امراض و اعراض و احوال حاملہ		Duration of Pregnancy
در بیان ولادت جنین	لیبر	Diseases & treatment of Pregnancy
عقرو نہ باردار شدن زن	انسٹرال اینٹی	Labour
استقرار حمل ثانی بالاسے عمل اول	لووان پرگننسی	Sterility
علامت قرب وضع	سائین آف لیبر	Twin Pregnancy
در بیان وضع حمل و ولادت	پریژو رشن	Signs of Labour
عسر ولادت	دنی کلک لیبر	Purtrition
بیان اقسام ولادت غیر طبیعی	گر اس پنٹھ	Difficult Labour
در بیان اعراض و امراض بعد ولادت نفسا و اعضا	دیزیزین دین و رشن آف یوٹرس	Cross Birth
کیفیت آمدن دم نفاس	ہیموریج آف یوٹرس	Diseases of Puerperal state
درم کہ بعد ولادت برعل می لید می شود	فلکسیر یا د و کس	Hemorrhage of Purtrition
حتی کہ بعد ولادت زلف زائیدہ از دم رحم	پو آف ریل و رشن	Phlegmasia Dolnes
در بیان مقبوضات حمل و تبیر آن	ایریشن	Puerperal Metritis
		Abortion

اسماء امراض بلنت عربی و فارسی	اسماء امراض انگریزی بخط فارسی	اسماء امراض بلنت انگریزی بخط فارسی
در تدریس اسقاط حمل در بیان منع حیل	پرنیا چور لیبر x	Premature Labour To stop umbrine gestation
در بیان امراض طرفیه		Diseases of the extremities
فتق حدیه و ریاح الافرسه نرم شدن استخوان و شکستن آن دوالی دار الفیل	هرنیا ریکشن موشن آسینم واریس و واریکوس و تینس ایلیفان تالی ایندز و عویم	Hernia Lardosis Mollities osium Varicose veins Elephantiasis Pain in the extremities
در اوجاع اعضا طرفیه		
وجع مفصل نقرس وجع الورك وجع العقب عرق النسا بثور معروف به بطم دائس وجع الاطفا انتقال الاطفا عوض الطفرة فی اللحم	رؤما تیرم گوت کال سال جیا و بهت جت دیزیز پین ان جیل تور الجیا و سیانکا نیون اوتیکیا پین ان نیلیس هالی پرنی آن نیلیس ان گروانک آن نیلیس	Rheumatism Gout Coxalgia Pain in Heel Sciatica Noevus Onychia Pain in nails Hypertrophy of nails Ingrowing of nails
فهرست جلد امراض عامه		General Diseases
در بیان حیات و جمی را بلنت انگریزی فیور گویند		
بیان قسم جمی که از عفونت زهر خالی و بیونانی حیات یومیه گفت شوند		
تعریف جمی و اقسام آن جملاً تب لازم که در آن زهر در خون نباشد	سینل کینتو و فیور	Simple continued Fever

اسماء امراض بلغم فارسی	اسماء امراض بلغم انگریزی	اسماء امراض بلغم عربی و فارسی
<i>Andant Fever</i>	آندانت فیور	تب لازم که از بواسه حار یا بسبب اشتداد
<i>Sun Fever</i>	سرن فیور	آفتاب حمی که از گرمی آفتاب پیدا میشود
<i>Typhus Fever</i>	تایفوس فیور	برمان حیاتی که بسبب اغل شدن زهر در خون پیدا میشود و در یونانی به حیات عفوئیه نام کرده میشوند
<i>Typhoid Fever</i>	تایفایید فیور	حمی مطبقه و مراد از آن اینها حمی لازم بود که با ضعف و ملخ و بدن باشد و بان این حمی کم کند
<i>Cerebrospinal Fever</i>	سیرنی بروناسپینو فیور	حمی مطبقه ناقصه که باز حمی معاد با ضعف کثیر باشد
<i>Relapsing Fever</i>	ریمی لنسنگ فیور	حمی لازم زهر دار متعدد
<i>Yellow Fever</i>	یکلو فیور	حمی لازم زهر دار که بعد صحت اکثر عود میکند
<i>Intermittant Fever</i>	اینترمتنت فیور	حمی زهر دار لازم که قریب کثیر است و بسبب آن با حمی
<i>Remittant Fever</i>	ریمیٹنت فیور	حمی نامرودانه
<i>Varicella</i>	واریکلا	حمی لازم که در آن فتره و سکون هر یک باشد
<i>Chicken Pox</i>	واری سلا و چکن پکس	در بیان حیات که در آن زهر از خون بیرون می آید و از ارب یافت می شود
<i>Measles</i>	موزیکل و میزلز	هاری
<i>Scarlet Fever</i>	اسکارلت فیور	برخی خفیفه الاعراض با اعتبار یونانیست
<i>Dengue Fever</i>	دنگو فیور و دنگو	مصبه
<i>Encephalus</i>	انکفالوس	تب سرنخ و سیاه رنگ
<i>Plague</i>	پلاگ	تب سرنخ
<i>Influenza</i>	انفلانزا	حمی با سرنخ گلابی رنگ جلد و نرم آن عارض شود
<i>Inflammatory Fever</i>	انفلام تری فیور	حمی که با طاعون باشد
<i>Mectic Fever</i>	مکتیک فیور	حمی مشابهی طاعون که به ناری ساه می کنند
		حمی لازم که باز کام طاعون عارض شود
		حمی که با ورم عارض پیدا شود
		حمی که از بواسه شدن زهر در بدن کثیر است و فیور



اسماء امراض بلغت عربی و فارسی	اسماء امراض بلغت انگریزی و پنجاب	اسماء امراض بلغت انگریزی و پنجاب
سمن مفرط	اوٹونی سیمینج	Obesity
فہرست امراض عامہ جلد تہ - فصل اول و سرفی جلد کہ آنرا ایکس آن ٹیٹا	گویند و آن جنس اول است	
تھون کثیر در جاسے زیر جلد جمع گردد	کروزنی اول	Rosacea
پیداشدن سرفی بر مواضع مختلفہ	ایرینی سیما	Erythema
سرفی	آنزکات ایریا	Urticaria
در بیان امراض جنس ثانی در جلد نفاط و آبلہ است و آنرا ایکس کی گویند		
آبلہ خفیف الاعراض	ایکس سیما سیمپلکس	Eczema simplex
آبلہ کہ با سرفی زائد باشد	ایکس سیما روبرم	Eczema Rubrum
آبلہ کہ بر پستان زنان می افتد	ایکس سیما مینن یوآم	Eczema Mammary
بثرہ و آبلہ کہ بر موزات عصب نخاعی پدید شود	ہیرپس	Herpes
جرب و خارش	اسکینی بی این	Scabies
آبلہ کہ بر صورت حباب پدید میشود	پیم فگیس	Pomphigus
آبلہ کہ آنکثر عرق بر جلد پدید میشود	سودا مننا	Sodamena
در بیان افراد امراض جنس سوم جلد کہ آبلہ پریم است و آن را	پرس چوسلے گویند	
آبلہ کہ بر سخت از جلد پر از پریم بر آید	ایستائی گو	Impetigo
بثرہ کلان کہ بقدر شست آنی با پانی بود	پسچل ایکس ثیما	Ecthyma
بثرہ کہ از ورم خارجہ مولد شرم سر بلند	آگنی و آگنی	Achno
پدید میشود و پیر آن پریم بود		
ورم جلد کہ در جاہاے متعدد پدید آید	رؤپیا	Reopia
و از آن جلد چرک آلودہ میشود		
در بیان امراض جنس چهارم کہ ورم جلد است کہ با صلابت پدید آید		
آب و ورم نباشد و آنرا ایکس کی گویند و آن دو قسم است اول بنور صند		
که آنرا آلائی کرن گویند		



اسم امراض بلغت انگریزی بجا انگریزی	اسم امراض بلغت عربی و فارسی	اسم امراض بلغت فارسی
<i>Lichen simplex</i>	بثور صغیر خالص سهل که پررود و دستمال آن کنین نمیکند	بثور صغیر خالص سهل که پررود و دستمال آن کنین نمیکند
<i>Lichen Pilaris</i>	بثور صغیر که در تنخ موها جلد باشد	بثور صغیر که در تنخ موها جلد باشد
<i>Lichen Levidus</i>	بثور صغیر مائل سیاهی	بثور صغیر مائل سیاهی
<i>Lichen circumscriptus</i>	بثور صغیر که در استداره عیال پیرس باشد	بثور صغیر که در استداره عیال پیرس باشد
<i>Lichen urticatus</i>	بثور که بر صورت بثور شرع باشد	بثور که بر صورت بثور شرع باشد
<i>Lichen Tropicus, Prickly and heat</i>	بثور صغیر که در بلاد حاره و فصل گرما	بثور صغیر که در بلاد حاره و فصل گرما
<i>Lichen agrius</i>	بثور صغیر که باورم عار و سرخی جلد بوند	بثور صغیر که باورم عار و سرخی جلد بوند
	قسم دوم بثور خرد که در جلد هرنگ جلد میشوند و با سوزش بسیار باشد و آزار	قسم دوم بثور خرد که در جلد هرنگ جلد میشوند و با سوزش بسیار باشد و آزار
	میر و زای گو نامند و شاید در غری نامه همین بود باشد	میر و زای گو نامند و شاید در غری نامه همین بود باشد
	در بیان امراض جنس ششم جلد که آن قشر و قشمت که بر جلد پدید شود	در بیان امراض جنس ششم جلد که آن قشر و قشمت که بر جلد پدید شود
<i>Psoriasis</i>	درم جلد که بصورت آتار سفید رنگ پدید شود	درم جلد که بصورت آتار سفید رنگ پدید شود
<i>Pityriasis</i>	آرد و قشر که بصورت سبوسه بر جلد پدید آید	آرد و قشر که بصورت سبوسه بر جلد پدید آید
<i>Pityriasis versicolor</i>	بثور آردی که در جلد پدید آید	بثور آردی که در جلد پدید آید
<i>Ichthyosis</i>	بثور آردی که در جلد پدید آید	بثور آردی که در جلد پدید آید
<i>Lupus</i>	در بیان امراض جنس هفتم جلد که صلابت و سختی کو چاک است در اصل جلد	در بیان امراض جنس هفتم جلد که صلابت و سختی کو چاک است در اصل جلد
<i>Nidulcum simplex</i>	فلک جلد که باخسوت باشد	فلک جلد که باخسوت باشد
	معه ای که مثل سبوسه بر جلد پدید آید و در آن نمکها کم نمیکند	معه ای که مثل سبوسه بر جلد پدید آید و در آن نمکها کم نمیکند
	خاندان بسیارند	خاندان بسیارند
	در بیان امراض جنس هشتم امراض جلد که در جلد پدید آید و در آن نمکها کم نمیکند	در بیان امراض جنس هشتم امراض جلد که در جلد پدید آید و در آن نمکها کم نمیکند
	جلد است در جلد که مثل سبوسه بر جلد پدید آید و در آن نمکها کم نمیکند	جلد است در جلد که مثل سبوسه بر جلد پدید آید و در آن نمکها کم نمیکند

اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Liver Spot	نشان و دغ که از گرمی آفتاب جلد پیشو آفت آید	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Lentigo	دغ جلد که بر صورت نصف و اندک کرانه باشد	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Leioderma	برفص سفید شدن جلد	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Neeladerma Black Mark	برص سود و سیاه شدن رنگ جلد و دغ سیاه	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Nevus	خیلان و آثار سیاه کوچک جلد فطری و اندک	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Purpura	نمشی آثار صفرا جلد که از غوانی یا مال سر باشد	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
	در بیان افراد جنس نهم از امراض جلد که سبب حیوان یا تخم نهانست	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
	میشود و آنرا از این سبب گویند معنی مفت خور	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Acarus	آفتاد و پیدایش آن حیوان در جلد انسان	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Acarus Scabiei	حیوانیکه در جلد رطب پدید آید و در جلد انسان	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Dm. Galliculorum	حیوانیکه در غده شحمی جلد انسان میماند	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Pediculi	حیوان خرد که در بدن انسان از پای خود راه	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
	رود و آن قمل بود که انواع اند	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Pediculus corporis	اذیت که از قمل بدنی پدید آید	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
P. Vestimentorum	اذیت که از قمل جامه پدید آید	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
P. Capitis	اذیت که از قمل موی سر آید	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Pubis	اذیت که از قمل موی زنی پدید آید	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Porrigo Favosa	سقفه و مثانه و غلیظه و شکریه در شکل	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Acrotragma	قشور و شکریه ها که اکثر محل زخم پدید آید	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Vicia Panacaram	بالجوز و حالت مشابه ترشیدن موی زنی	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
V. Circinata	توباداد	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
V. C.	ورم جلد راس که بصورت خانه آگین بود	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
V. Versicolor	بقی این	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
Hyperostheidia	در بیان افراد جنس نهم از امراض جلد که سبب حیوان یا تخم نهانست	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز
	میشود و آنرا از این سبب گویند معنی مفت خور	اسماء امراض بلذات و امراض و انگلیز

اسماء امراض بلغت انگریزی به خط انگریزی	اسماء امراض بلغت انگریزی به خط فارسی	اسماء امراض بلغت عربی و فارسی
Anaesthesia	آن استینزییا	بی حس شدن جلد
Pruritis	پروریٹیس	حک و خارش جلد
	در بیان افراد جنس مذکر هم امراض جلدیه که زیادتی در مقدار رجا عارض میشود و آنرا بائی پروریٹیس گویند	
Warts	وارتن	تولول
Caruncles	کارنشن	محل و تجاوه و بنده گی که در کوه و
Soft Caruncles	سفت کارنشن	غلظتین که در میان انگشتان پا که میشود
Cheloid	کلی لایڈ	غلظت جلد که مشابه پاپ سرطان باشد
Cheloderma	اِسکلی رُودرُما	غلظت جلد که با سختی باشد
Fibroma	فائی بروما	صلابت در جلد که از اسلحه و چرم گویند
Diseases of Hairs	در بیان افراد جنس مذکر هم امراض که متعلق بشعر اند	
Hirsuties	هیرسوتی ایش	زیادتی موهاے بدن در سبب طبیعی
Nevi Pilosi, Moles	نیوش پیلوزی یا مول	زیادتی موها که بجا یک موزوینشن جلد و گوش
Alopecia	آلوپیشیا	دور شدن موها در سبب خود
Conities	آن کان ایشی اس	بیاض شدن موها و سفیدی موهاے بدن
	سائی کونیز	پیداشدن بخور صفا و ریخ موهای سر و پیشانی
Diseases of Nails	در بیان افراد جنس سیر هم امراض که متعلق باظفار است طفره رانها میگویند	
Omychea Simple	اومیکیا سیمپل	ورم حار که در اصل با بر کناره و زیر ناخن میشود
Omychea Aculegma	اومیکیا اکلگما	ورم حار زیر ناخن که تا غشای استخوان نفوذ میکند
Favus unguum	فایو انگوئم	تشک و غلیظ و کثیف و بوسیده شدن ناخن
	سینیا انگوئم	بسیب داخل شدن تخم نباتی در آن
Psoriasis of nails	پسوری ایز انگوئم	سفید و غلیظ و خشن و بوسیده شدن ناخن
Atrophy of nails	آتروفی انگوئم	زیاده شدن مقدار ناخن
Atrophy of the nails	آتروفی انگوئم	کم شدن مقدار ناخن
Diseases of Skin &c	در بیان امراض جلدیه دیگر	

اسامی امراض بلنت عربی و فارسی	اسامی امراض انگریزی	اسامی امراض انگریزی به خط انگریزی
جذام و دارالاسد	لپروسی و لیکن تائز و زگرکیان اورم	Leprosy
نار فارسی و آتشک	سفلیس	Syphilis
خنازیز	اسکرافلا	Serofula
قسمی از خنازیر که در آن جسم سفید مثل آبک	چوبز و کل	Tubercle
در کدام عضو میریزد		
بثور صغیر سفید که اکثر عرق پیداشوند	سودا مننا	Psodamema
و آنرا بر لبی بثور لبنیه گویند		
بدشواری خارج شدن عرق از جلد	دش سید روزنه	
انشقاق جلد بدن	ایری نینا کرانیک	Erythema chronic
زخمی که از زیاد ماندن بر لبانک پیداشوند	بیش سور	Bad sore.
منق را که عرق و جلد	سویٹ فیل	Sweet Felid
در بیان سلع که آنرا بلنت انگریزی به خط انگریزی گویند		
سلع که اندرون خریطه پیداشود	سینک چومر	Tumours
سلع خریطه دار که بر لب پیداشوند	کین گلی یا	Cystic Tumour
سلع خریطه دار که قریب رگ پیداشود	هوش میٹن فی	Ganglia
سلع خریطه دار که از اجتماع آب گرافین لسیکل	سینک چومر اوور	Simple cystic tumour of ovary
در اوور پیداشود		
بیان اقسام سلع خریطه دار که خریطه آن کدام عضو طبیعی نبود		
سلع خریطه دار مشابه بکلیه بود و اکثر ترشیمق	وز نایند سینٹ	Dermoid cyst.
صغیر چشم یافته شود		
سلع خریطه دار که در غشای خانه دار پیداشود	سیرین سینٹ	Serous cyst.
سلع خریطه دار که از سلعهای متعدد و منفرد پیداشود	لایو لایو سینٹ	Multilocular cyst.
سلع خریطه دار پر از خون بود	نیمائو	Hamatoma
سلع خریطه دار که از اجتماع بعضی	ایڈ سینٹ	Agdated cyst.
بانی پیداشود		

اسم امراض باغت عربی و فارسی	اسم امراض باغت انگریزی
در بیان افراد و اقسام سلع غیر خریطه دار که مشابه یکدیگر عضو مفرد باشد	<i>Fatty Tumour Lipoma</i>
سلع غیر خریطه دار که از زیادتی لحم و عشا سفت چو مژ و لیونما	<i>Fibroma</i>
خانه دار پیدا شود	<i>Wens</i>
سلع غیر خریطه دار که در غشای غده در پید شود	<i>Cartilaginous tumour</i>
سلع فانی بر روی که اکثر بر سر یافته شود	<i>Osteoma Exostosis</i>
سلع خفیه و فی که در غشای ریشه در پید شود	
سلع غلظتی که در آن اخوان یافته شود	
در بیان افراد سلع غیر خریطه دار که مشابه باعضای مرکبه باشد	
سلع که مشابه بعضی بود	<i>Myoma</i>
سلع عضلی که در رحم پیدا شود	<i>Uterine Fibroid</i>
سلع که بر ریشه عصب بر عصب یافته شود چو مژ و لیونما	<i>Neuroma</i>
سلع که از مجاری هم مثل اورده و شریان گشته اند آن می آید	<i>Angioma</i>
سلع که از جسم کاربش گزیده و زخم مرکب بود	<i>Novus</i>
سلع که از جسم کاربش را سپنجی مرکب باشد	<i>Erectile Tumour</i>
سلع که از مجاری ملت مرکب باشد	<i>Lymphangioma</i>
سلع که از اجزای غده های ملت مرکب باشد	<i>Lymphadenoma</i>
سلعی که جسم آن مشابه جلد باشد	<i>Papilloma</i>
سلعی که در آن اجزای غده مدب و بویافته آید	<i>Adenoma</i>
بیان افراد سلع که پیدا میشود از اجزای که آنها به نسبت اجزای بدن خفیس الزم اند	
سلع نمی	<i>Sarcoma</i>
بیان افراد سلع غیر خریطه دار که از سل مشابه جلد و از ریشه است	
مشابه بر ریشه غشای ریشه در پید شود و آنرا انوشا گویند	
سرطان	<i>Cancer</i>
سرطان سخت	<i>Sirrhous cancer</i>

اسماهای امراض باخنت عربی و فارسی	اسماهای امراض باخنت انگریزی و فرانسیسی	اسماهای امراض باخنت انگریزی و فرانسیسی
سرطان حاد سرطان الجلد سرطان خستہ	ان کفٹ الایڈ و اکیڈ کنسیر ای پی سیل کمال و ای پی سیل اوتونا آڈن آئیڈ	encephaloid cancer or acute cancer epithelial cancer Adenoid
فهرست کتاب چهارم از امراض عظامه و تفرق اتصال	نقصان تفرق که زیر جلد آن شود با لایه کان چوشتن تفرق اتصال معنوی که با جراحت جلد است و تفرق جراحت که از آن تفرق در رطوبت و خشکی و تفرق	Contusion Growth Bleed wound
چراحت که برکنارده های اسراف و زیادتی و کمی باشد چنانکه در زخم گزیدن موش و سگ میباشد	لا سیر ایڈ و تفرق کان چوشتن و تفرق چراحت که با جراحت جلد است و تفرق	Lacerated wound contused wound
جراحت که طول عرض آن معین و عمیق زیاده بود مثل زخم شان جراحت که با جراحت جلد است و تفرق	چراحت که با جراحت جلد است و تفرق جراحت که با جراحت جلد است و تفرق	Punctured wound
خواه از شش رطب بود مثل زخم اگریم و سلفیورک ایڈ یا یا بشل آتش و برق پیدا میشود	جراحت که با جراحت جلد است و تفرق جراحت که با جراحت جلد است و تفرق	Poison wound Burns & scald
جراحت که از رسیدن برف و هوای سرد پیر بدن حادث میشود	جراحت که با جراحت جلد است و تفرق جراحت که با جراحت جلد است و تفرق	Frost bite
در بیان نقصان و تفرق اتصال انفاز عصب یعنی تفرق اتصال که با لایه کان چوشتن مسلک بدن باشد	جراحت که با جراحت جلد است و تفرق جراحت که با جراحت جلد است و تفرق	Injury of nerves Contusion
تفتیب عصب و سوراخ پیدا شدن در عصب بشر و جدا شدن عصب در عرض	جراحت که با جراحت جلد است و تفرق جراحت که با جراحت جلد است و تفرق	Peneture Division

اسماء امراض مبتدیان فارسی	اسماء امراض مبتدیان انگلیزی و بطفارسی	اسماء امراض مبتدیان انگلیزی و بطفارسی
در بیان نقصان اوتار و عضلات و جراحات آنها	نقصان عضله که آزار بهندی چاک آنگریند	انژیورن
نقصان اوتار و عضلات	نقصان اوتار و عضلات	نقصان اوتار و عضلات
در بیان نقصان استخوان مفصل که آزار بخورسے آف بون گویند	رشدن استخوان	رشدن استخوان
رشدن استخوان	رشدن استخوان	رشدن استخوان
رشدن استخوان در یکجا و بهر جهت	رشدن استخوان در یکجا و بهر جهت	رشدن استخوان در یکجا و بهر جهت
رشدن استخوان در موضع متعدد بخوبی از آن کامین یونند	رشدن استخوان در موضع متعدد بخوبی از آن کامین یونند	رشدن استخوان در موضع متعدد بخوبی از آن کامین یونند
نقصان استخوان با جراحت لحم و جلد	نقصان استخوان با جراحت لحم و جلد	نقصان استخوان با جراحت لحم و جلد
نقصان استخوان رخسار فک علیا	نقصان استخوان رخسار فک علیا	نقصان استخوان رخسار فک علیا
نقصان استخوان فک اسفل	نقصان استخوان فک اسفل	نقصان استخوان فک اسفل
نقصان استخوان بالاسه خنجره	نقصان استخوان بالاسه خنجره	نقصان استخوان بالاسه خنجره
نقصان استخوانها سه پہلو	نقصان استخوانها سه پہلو	نقصان استخوانها سه پہلو
نقصان استخوان صدر	نقصان استخوان صدر	نقصان استخوان صدر
نقصان استخوان که در میان استخوان سینہ	نقصان استخوان که در میان استخوان سینہ	نقصان استخوان که در میان استخوان سینہ
نقصان استخوان واقع اند	نقصان استخوان واقع اند	نقصان استخوان واقع اند
نقصان استخوان ترقوه	نقصان استخوان ترقوه	نقصان استخوان ترقوه
نقصان استخوان کتف	نقصان استخوان کتف	نقصان استخوان کتف
نقصان استخوان عضد	نقصان استخوان عضد	نقصان استخوان عضد
نقصان استخوان ساعد	نقصان استخوان ساعد	نقصان استخوان ساعد
نقصان استخوانهای مشط و اصابع	نقصان استخوانهای مشط و اصابع	نقصان استخوانهای مشط و اصابع
نقصان استخوان عانہ	نقصان استخوان عانہ	نقصان استخوان عانہ
نقصان استخوان حق الزوک	نقصان استخوان حق الزوک	نقصان استخوان حق الزوک
نقصان استخوان خصص	نقصان استخوان خصص	نقصان استخوان خصص

اسامی امراض مختلف فارسی و عربی و انگریزی	اسامی امراض مختلف انگریزی و فارسی	اسامی امراض مختلف فارسی و عربی و انگریزی
Fracture of Femur	فرکچر آف فیمور	انگسار استخوان ران
" of Patella	فرکچر آف پتلا	انگسار استخوان رضعه
" of leg	فرکچر آف لیگ	انگسار استخوان ساق
" of Os calcanei	فرکچر آف اوس کالکانس	انگسار استخوان عقب
" of Astragalus bone	فرکچر آف استراگالوس بون	انگسار استخوان کعب
" of Meta tarsal bone	فرکچر آف میٹا تارسال بون	انگسار استخوانهای شط قدم
" of Phalanges	فرکچر آف فمالانگس	انگسار استخوان های اصابع
" of Skull	فرکچر آف اسکال	انگسار استخوان راس
" of Spine	فرکچر آف اسپاین	انگسار فقرات عقی و ظر
Dislocation	در بیان انحراف استخوان که آنرا دس لوکیشن گویند	
Dislocation complete	انحراف که در آن استخوان مفصل را تمام از مقابل دس لوکیشن کام پلٹ	استخوان دیگر مقابل خود دور گردد
Dislocation incomplete	دس لوکیشن آن کام پلٹ یا پارشل	انحراف که در آن دس لوکیشن مفصل قدری مقابل باقی ماند
Simple Dislocation	سینپل دس لوکیشن	انحراف که همراه آن در خارج نباشد
Dislocation compound	دس لوکیشن کمپوند	انحراف که همراه آن در لحم و جلد زخم هم بود
Spontaneous	اسپانینس	انحراف که محض از حرکت عضلات بدن پیدا شود
Congenital	کنان جنطان	انحراف که فطری و از بدین مادر باشد
Pathological Dislocation	پاتولوژیکل	انحراف که بسبب کدام مرض پیدا شود
Dislocation Lower jaw	دس لوکیشن لورر جابه	انحراف استخوان فک سفلی
" of Clavicle	کلویک	انحراف ترقوه
" Scapula Shoulder	سکاپولا شولدر	انحراف منکب
" of Elbow joint	آف الیو جوائنٹ	انحراف مرفق
" of Radius	آف ریڈیوس	انحراف عانہ



اسماء امراض لغت انگریزی به خط انگریزی	اسماء امراض لغت انگریزی به خط فارسی	اسماء امراض لغت عربی و فارسی
Dislocation of Scapula	دیس لوکیشن اسکپولم	اشخلاق عصب
" of Hip joint	هپ جانت	اشخلاق مفصل ورك
" of Patella	پتیله	اشخلاق مفصل رفته
" of Knee joint	نی جانت	اشخلاق مفصل ركب
" of Tibia	آف تائی بیا	اشخلاق مفصل ركب
" of Fibula	فیولا	اشخلاق قصبه كبرى ساق
" of Ankle joint	آنگل جانت	اشخلاق رشت قدم
" of other joints	"	اشخلاق استخوان كعب
" of neck & spine	آف نیک آند اسپاین	اشخلاق قصبه عظام قدم
Poisons	در بیان انواع سموم و سم رایانتر و شکر گونی	فهرست جلد پنجم از امراض عامه در بیان سموم و سم رایانتر و شکر گونی
Irritants	سم مودی و زیاد کننده که از زیر هر گونه اتری می منت	سم مودی و زیاد کننده حس
Narcotics & Irritants	نارکوتیک	سم مودی و کم کننده حس
Narcotic & Irritant	نارکوتیک اوری می منت	سم مودی و کم کننده حس
Irritants	در بیان اقسام اری می منت	
Local irritant & erosive	قسم سم مودی که موثر بر محل خاص می شود و گوشت اتری می منت و کروزوف	قسم سم مودی که موثر بر محل خاص می شود و گوشت اتری می منت و کروزوف
Simple irritant	قسم سم مودی که در دم در محل ورود خود فقط سبیل اتری می منت	قسم سم مودی که در عضو خاص فیت اکیند
Acids	در بیان افراد سم مودی که از قسم تراب معدنی اند که آنرا اسید گویند	تیزاب كبریت
Sulphuric acid	سلفوریک اسید	تیزاب كبریت
Muriatic acid	موریاتیک اسید	تیزاب كبریت
Nitric acid	نایتریک اسید	تیزاب اتر پخته شوره

اسامی امراض لغت انگریزی بخط انگریزی	اسامی امراض لغت انگریزی بخط فارسی	اسامی امراض لغت عربی و فارسی
<i>Alkalies</i>	در بیان افراد سم موزی که از قسم کهار اند و آنرا آلیکالی گویند	
<i>Caustic Potash</i>	کائستیک پتاش	*
<i>Potash Carbonas</i>	پتاش کازربناس	*
<i>Caustic Soda</i>	کائستیک سوڈا	*
<i>Soda Carbonas</i>	سوڈا کازربناس	*
<i>Caustic ammonia</i>	کائستیک آمونیومیا	*
<i>Ammonia carbonas</i>	آمونیا کازربناس	*
<i>Vegetable Poisons</i>	در بیان اقسام سمیل از درختی	
<i>Vegetable Acid</i>	ترش نباتی	
<i>Alkaline Salt</i>	چیزیکه از آمینج کهار با ترشی پیدا نشود مثل الکالین سالت	
<i>Cathartics</i>	آهک و شب یمانی	
<i>Emmenagogues &amp; Diurhetics</i>	ادویه مسهل نباتیه مثل قهوه چای سلاطین کافور کائین	
<i>Fuscal oil, volatile oil</i>	ادویه مدره حیض و بول مثل ساجنا و درونین آمین اکسیر و دانی پوزیک	
<i>Ergot</i>	آچہ اجسام از تقطیر وقت کشیدن عرق فیتوژن اولیل	
<i>Cantharidis</i>	میدرا میشو مثل روغن شراب کابولکالی	
<i>Carbonic acid</i>	تخم نباتی که بسبب مض خود فاسد نشود مثل ازگت آف رائے	
	جوش فاسد	
	موزی حیوانی مثل زرارح	
	هواس موزی مثل هواس که از گاز بانگ ایست	
	سومتن زغال پیدا میشود	
	بیان افراد قسم اول ازین اقسام هشکانه	
<i>Tartaric acid</i>	ترش ترسندی که بطور تیز آب گرفته شود	
<i>Bitric acid</i>	ترشی لیمو	
<i>Malic acid</i>	ترشی که از شیر ترش گرفته شود	
<i>Oxalic acid</i>	ترشی که از بعضی تره ها گرفته شود	

اسماء امراض بلذہ فارسی و عربی و انگریزی	اسماء امراض بلذہ انگریزی و بلذہ فارسی	اسماء امراض بلذہ انگریزی و بلذہ فارسی
Alkaline Salt	بیان اقسام الکالین سالت	
Sulphate of alumina	سلفیٹ آلمینا	شب بانی و زاج
Bromine salt	برائیڈ سالت	طین کوئل آہک است و رنگسازان آہرا
Chloride of Lime	کلورائیڈ آف لائم	درصناعت غذا استعمال میکنند
Sulphate of Potash	سلفیٹ آف پتاش	آہچرا مرکبات کلورین آہک ساخته شود
Sulphurate Potassium	سلفیورٹ پتاشم	مسل معدنی مشہور و مرکب از سلفیورٹ پتاش
Chloride Sodium	کلورائیڈ سڈیم	و پتاش سٹراس -
Purgative Medicines	بیان افراد قسم ثالث کہ مسهل قوی است و از اگنیفیت بیش گزید	مسل مرکب از سلفو پتاش
Aloes	ایلوہ	نکاح عام
Colocynthis	کالوکنٹس	
Jalap	جیلپ	
Scammony	سکامنہ	
Caster	کاسٹر	
Caster oil	کاسٹر آیل	
Crotonis	کروٹون	
Croton oil	کروٹون آیل	
Sabina	سبائنا	
Meyercom	میزنیم	
Calcheum	کالچیم	
Hele bone.	ہیل بون	
	بیان افراد قسم چہم	
	فیوڈل آکیل	
		روغن کہ ہمراہ شراب کشی پیدا میشود

اسامی اراضی مختلف فارسی	اسامی اراضی مختلف انگلیسی
	بیان افراد ششم
<i>Ergot of Rye</i>	بزرگ که در درخت خود فاسد شود
<i>Animals Irritants</i>	بیان افراد ششم غنیمت که این عمل از ریشه متن است
<i>Cantharidis</i>	رزانج
x	نمای موسوم به صدف
x	گاهی موسوم به بام که مثل مار می باشد
x	و در آن روغن زیاد بود
x	که متعفن خصوصاً مسک متعفن
x	بیان افراد ششم که هوای عسرت
<i>Nitrogen</i>	هوا یکی از عناصر ترکیب شده یی رنگ و بوی شیرین
<i>Sulphurated Hydrogen</i>	کثرت آن خارج میشود
	هوا به سلفید پتاسیم است که وقت خنثی شدن سلفید پتاسیم آن را در خود جذب
<i>Hydrogen</i>	کبریت پیدا میشود
<i>Chlorine</i>	هوا یکی از عناصر ترکیب شده یی که در هوا وجود دارد
<i>Ammonia</i>	هوا به کلورین
<i>Specific Irritant</i>	هوا به آمونیا یعنی نوساد
	بیان افراد ششم موسوم به که عضو خاص موثر میشود و آنرا اسپریت می گویند
<i>Iodine &amp; Iodide Potassium</i>	فانفورس و مرکبات آن
<i>Arsenic</i>	آیوژین و آیوژید پتاسیم
<i>Antimony preparation</i>	آرسنیک
<i>Lead</i>	آنتیمن و مرکبات آن
<i>Copper</i>	سرب
<i>Zinc</i>	مس کوبه
<i>Iron</i>	جست
	ریش

اسماء امراض لغت عربی و فارسی	اسماء امراض لغت انگریزی	اسماء امراض لغت انگریزی
فضه	ارغیم	Argentum
صند	فیرم	Ferrum
*	بسمه	Bismuth
یساب	ایندراج ارم	Hydrargyrum
*	گروم	Cream
در بیان افراد نوع دوم از انواع ملته سم که مخدرو موسوم به		
اکاز کاکات اند		
افیون	اوپیوم	Opium
*	هایدروسیانک ایسد و پروسیان ایسد	Hydrocyanic Acid
باده شراب	الکولین	Alcohol
*	ایسر	Essence
*	کلار فام	Chloroform
کاهو	لاک پچکا	Lactuca
در بیان افراد نوع دوم اشیا فی فصله ذیل اند که دران اجزای الی		
از سوختن زغال پیدا شده باشند		
اول چیزیکه دران هوا با اکسیجن کاربانک اکساید	Carbonic oxide	
مثل کاسبانک ایسد کاربانک اکساید	Sulphuretted Hydrogen	
دوم آنچه دران اجزای هوا کبریت	Sulphuretted Hydrogen	
همراه با سیدروجن باشند مثل	Sulphuretted Hydrogen	
هایدرو سلفیدیک ایسد	Sulphuretted Hydrogen	
سوم چیزیکه دران هوا خالص با سیدروجن	Sulphuretted Hydrogen	
در بیان افراد نوع ثالث سم که جامع ادیت رسانی و تحذیر است	Sulphuretted Hydrogen	
و آنرا نار کاکانگ او اوری ثنت گویند	Sulphuretted Hydrogen	
اوارتی و کچله	نار کاکانگ	Narcotic
چهره اوارتی	سیدروجن	Stychnia

اسمکے امراض بنت عربی و فارسی سے	اسمے امراض بنت انگریزی و فارسی سے	اسمے امراض بنت انگریزی سے
بزرگ بینی و اجوائن خراسانی	لاڈوٹا	<i>Belladonna</i>
جوز مارٹل و دھتورہ	بانی سانس	<i>Hyoscyamus</i>
کافور	اشتر امونیم	<i>Stramonium</i>
مرگ مہی	کمفر	<i>Camphora</i>
مغز خستہ بیلہ	کاکیلو بس انڈکس	<i>Nyrobalanes</i>
فطر و کاکا	زینر بلون	
قبت	کنس انڈیکا	<i>Cannabis Indica</i>
چرس	کنس	<i>Cannabis</i>
کاجہ	انڈین منٹپ	<i>Hemp Indian</i>
بنیش	ایکونائٹ	<i>Aconite</i>
تباکو	ڈجی ٹائیس	<i>Digitalis</i>
شکران	تباکو	<i>Tabacco</i>
منہ الی کو دو دو جو عن درمن خود	ہلک	<i>Hemlock</i>
عن الثلب غدر	لیمینم	<i>Solanum</i>
روغن تارمین	ٹوین ٹارمین	<i>Purpermine</i>
روغن قطران	کر یا سوٹ	<i>Creasote</i>
در بیان طریقہ طرد ہوا امی گریز ایندینا دیوات سیمہ		
طرد زہابیر	+	
طرد براحت	+	
طرد بقی ویشہ	+	
طرد گتان بنی کھل	+	
طرد زہاب بنی گس	+	
طرد زہاب بنی دیک	+	



## نقل جازة نزيان عرنى

صورة ما كتب كيف العلماء أكمل الفضلاء معلم ثالث طباً بت مركز دائرة الحدا  
الخطاب من جانب السلطان بتاج الأطباء خلاصة الحكماء سيادت بناء شفاء الله  
ذكاء الملك حكيم سيد افضل عليان بمادر مدي جنك ما دامت شموين  
افاداته بانزغة مجمل الحكيم السيد ابوابراهيم باجانرتين في اللسانين احدا

في العرنى والاخر في الفارسي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الحكيم العليم والصلوة على رسوله الكريم وعلى آله الذين هم ذو الفضل العظيم وبعد فإني السيد  
الاحقر لا يجد ولا ورج لا وحده العلامة اللوزي والفيما فمة الا المعنى الشرف المشايخ الا فيل والفضل الباذخ الاصيل  
المال الحكيم السيد ابوابراهيم بن المرحوم مولود السيد محمد محمد بن عضب الدين الهيا  
وكركة الشغفاني العالم الرباني السيد السند جناب المرحوم السيد محمد طاب ثراه وجعل الجنة  
مثواه قد اجتهد أولاً في تحصيل العلوم العربية وقرأ كتب الفقهية ثم توجهت بهمة الى تحصيل  
علم الطب فقرأ على اكثر الكتب العربية الطبية المتداولة وايضاً استكمل الصناعة بقرعة كتبنا  
المصنفة في الطب على مذاق اطباء المتأخرين من اهل يرب حتى استكمل من الفنون العقلية  
والطبية والنقلية قسطه واعتلى معارج التحقيق ببلغ ذروة السنام من التدقيق ثم انه ايد الله تعالى  
قصد اليقين لا تضال بطنطنة شيوخ اجازة الرواية والحذاقة وروى ما بالبركة الدرجة في سلسلة  
عنقته رجال ملل الذراية والصدافة استبان في فوجده اهلاً ومجلاً لذلك فاجزته ان يري عنى



ما اودعته في المصنفات وما افدته حين المذاكرات مما رويت عن مشايخي واساتذتي خاصة  
 المرحوم ميرزا محمد باقر خان بهادر و ذاك شريفي صاحب بهادر و عن غيرهما من  
 الكتب المعتمدة من الطب وان يعالج المرضى بعد التشخيص التام بآداب اليونانية ولا انجليزية  
 حيث شاء مستعينا بالعلوم الحديثة فائدة الله وبارك في امره

وانا اضل على رضوي الخاطب بشفاء الداء عني

نقل اجازة بزبان فارسي

بسم الله الرحمن الرحيم

عمدة الاحباب وسلاية الاطياب عفاقت آية الكرم ابن الكرم الحكيم سيد ابوالفتح صاحب كنجية علم و تقوى  
 اراسته و بصغات حسنة پیرسته اندازد و دراز طبع شریف شان بسوی تحصیل علم طب مانگ گشت چنانچه اکثر کتب متداوله  
 طبیه عربیه را درهم کتاب جامع تحقیقات شفایه را تمام و کمال بر حقیر خواندند و در این کتاب جامع الاصول طبق الحاکم و شیش  
 بجمع نمودند و در شرکت طب و ملاحظه و مهارت مرضی جهد تمام کردند و حقیر هم در تعلیم بسبب شوق و استعداد جناب شان تا کن  
 قاصر نشده حتی که اشارت الی یاقوت علمی و علی در طب چنان حاصل ساختند که قابل اجازة شدند پس راجعا الی الله حکیم صاحب  
 موصوف اجازت داد و هم که سائل علمیه از کتب مذکوره و دیگر کتب معتدله طبیه و انچه از حقیر شنیده اند تا ملاحظه بر محل مناسب  
 نقل کنند تفلا صیحا و علاج مرضی کمال احتیاط و بعد تشخیص کامل از ادویه یونانیة و انگلیزیة نمایند و در علاج از ادویه هر دو  
 مشهوره مجرب اعتماد نمایند و همیشه و همیشه ضرورت در علاج مرضی برین بکتاب مبنی باشند و بر حال مرضی تحقیق باشند و استوار  
 همواره از واجب انصاف نمایند فایده الله بارک فی امره و بطنی کلمه

وانا اضل على الرضوي عني

Certificate granted by A. G. Grant Surgeon  
Major to Hakim Syed Aboo Abraham of  
Fyzabad

I have known Hakim Syed Aboo  
Abraham of Fyzabad (nephew of the Peshu Namany  
since beginning of 1884 as asst. to Nawab Hakim  
Sheff-ud-doulah in his Extensur) practice amongst  
the native population of this city. I believe he has a  
very fair knowledge of English Materia Medica  
and Medicine and deserves encouragement

Fyzabad

9 September 1884

(Sd.) A. G. Grant

Surgeon Major

ترجمہ سارٹیفکیٹ انگریزی

۱۸۸۴ء کے قبل سے مین حکیم سید ابوبراہیم صاحب کو جو پیش نماز کے جتیمین — جانشاہوں یہ صاحب  
نواب حکیم شفا الدولہ بہادر کے جو کہ اس شہر میں بہت شہور و لیب ہیں نائب ہیں — شخص میٹر یا ملکیا اور انگریزی ادویات  
نام سے بخوبی واقف ہیں۔ انکی ترقی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔

دستخط — ای۔ جی۔ گرنٹ صاحب

سرجن میجر رتبت نمبر ۱۶ فیض آباد

مورخہ — ۹ ستمبر ۱۸۸۴ء




بمحرور کتب و کتب سالیان طبع خرم کتب کا غلام طربانی

از مصنفات کتب العلماء اکمل الفضل معلقات طبابت مرکز دارالترتیب و خدایت الخاطب من جانب سلطان تاج الاطباء  
خلاصہ احکام سیاست بناد شفاء الدولہ حکیم سید فضل علی خان بہادر در بدر جنگ مادہ متشتموس اقادہ باز غمہ موسوم بہ



بمحرور کتب و کتب سالیان طبع خرم کتب کا غلام طربانی  
خلاصہ احکام سیاست بناد شفاء الدولہ حکیم سید فضل علی خان بہادر در بدر جنگ مادہ متشتموس اقادہ باز غمہ موسوم بہ

در مطبعہ منشوری نول کشوری پست خانہ مجلی گریز



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

M.A. LIBRARY, A.M.U.



PE2798

الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله أجمعين  
 اما بعد اذ ضاع بذكره سبب این اوراق افصل علی الرضوی بن سید اکبر علی النضیر آبادی عالمها المذنبه الخفی و اهل الخفا  
 شفا الدوله از ابتدای سال هجری از خود بسوی تحصیل علوم اعنف شده و بعد از آن چند کتب فارسیه طبع تحصیل علوم که در زبان عربی اند  
 مائل گشت و بکثیر خود را بفرانگ از کتب درسیه متداوله در تحصیل تحقیق اکثر علوم علمیه و نقلیه از علما و مجتهدین عصر و المباحث  
 کاملین در صورت کرد و بجهت تحصیل و تکمیل در تالیف تعلیم و تدریس کتب علوم عموم و خصوص کتب طبیه و تصنیف و تالیف کتب در سائنس  
 علوم متعدد و معالجات مرضی اشتغال داشت و همیشه در مطالب و مسائل علمی خود و تامل کرده از علما و سباحت و استفادات  
 می نمود تا اینکه یقین حاصل کرد و با اینکه آنچه علم طلب در کتب و پیوسته است علمی و علمی آن اکثر شتمن غلط است مثل تصنیف کتب طب  
 قدیم در تعدید اسباب اکثر امراض بخار و ریح را ذکر میکنند و میگویند که بخارات از رطوبات بدن و از غذیه مشکون می شوند و عموما  
 در امر این مانع شکر که مشارکت را بسبب بخار قرار میدهند و میگویند که طریق وصول بخار از معدنه بسوی دماغ طریق دوس است و  
 بعد از آن بر تشریح بدن و غور کردن ثابت می شود که این قول از قبیل موهوم صادر شده است زیرا که اکثر کتب از خون سرخ و او در دهان  
 خون سپاه ملومی باشند بخار در آن چگونه راه می یابد و اعصاب و عصمت اند پس ازین هر دو بخار را نفوذ کردن ممکن نیست و علاوه برین  
 دماغ محبوب با غشیه و مخون و عصبانیت و کدام راه کشاده بسوی دماغ نیست که از آن بخار نفوذ کرده به دماغ رسد زیرا که تقسیم  
 که در قاعده دماغ است آن از خلج مخلو و مشحون است و ثقبه های کوچکی که در عظام دماغ بعد موت در تشریح عظام یافته میشوند از آنها در حال  
 حیات علوانا اعصاب حس و حرکت می باشند ممکن نیست که از آن سو هوا یا بخار در دماغ رسد یا چیزی از فضول دماغیه توسط این ثقب  
 خارج شود و چگونه می شود که خالق حکیم سلطان بدن را که دماغ است در قاعده عظام متکی از یک سلطنت بدن فرموده و از نواح و قعر

اعصاب را بر عکسش سپرده باز ابواب طاهره آنرا چنان کشاده بی صاحب و دربان گذار و که با غیان سرکش بی بنیاد و مانع داخل  
 شده انتظام سلطنتش را خراب و بر باد میگرداند باینکه از مقصور علم تشریح و اختیار کردن اوله سمیه غیر حقیقیه و اعتماد کردن بر سخن اقوال  
 سابقین این اغلاط عاقلات پیدا شدند و از همین قبیل است آنچه در وجه زکام و زله میگویند که ماده هرگاه از دماغ بسوی انف ریخته  
 زکام و هرگاه بسوی طن نصب شود زله است زیرا که هرگاه ثابت شد که راهی کشوف از دماغ بسوی بدن نیست پس چگونه ماده از دماغ  
 منصب خواهد شد و سبب وقوع در غلط اول این است که چون اکثر امراض و اوجاع را در بدن که تیغ امراض دیگر پیدا می شود  
 و باعتبار زیانی و کمی اصل مرض زیاده و کم میشوند و گاهی بعضی امراض را یافته که بطور نوبه حادث میشوند و از اهل نشینندگان اند  
 که مشکوک بسبب و معمول بخار ماده از عضو بسوی شری است و از عدم ثبات ثانی و ظهور شدت و خفت در آن در زمان بیشتر بخار  
 نقل گمان کردند که اینچنین اختصاص صفات ماده خیمه زنی و تمام است که آن را در ریل می باشد و همین سبب مرض فوراً پیدا می شود و  
 شدت میکند و باز فوراً ساکن میگردد و از این مواعیل بی خبر بودند و حقیقت امر آنست که ذی لوب بدون اکثر امراض مشترک  
 بعضی اعضا و در بعضی دیگر بسبب ریشهای اعصاب پیدا می شود که از اذیت عصب یک عضو عضو دیگر که در آن ریشه  
 عصب در کورفته اند مرض میشود و چون تا ذی عصب در کور کم میشود سکون ظاهری گردد و همچنین در تدریج عارضه بطور استقامت  
 از طبیعتی قول به چهار بودن آن نقل میکنند حال آنکه تا حال که سنده و از ده صد و نود و پنج هجری است عدد آن تا شصت  
 و هشت ثابت شده و همچنین اختلاف را چهار میدهند و سود را هم خطی میگویند و منفرد آن طحال را با اعتقاد خود قرار داده  
 و میگویند که طحال سود را از خود در سده می ریزد و از آن اشتیهای طعام پیدا می شود و حقیقت سود را در بدن بر لیمه کمیها  
 غیر ثابت است همچنین در تشریح که ام حوری از طحال بسوی سده نیاده که از آن انسباب سودا بسوی سده تسلیم کرده شود  
 و بعد صفرا در عروق همراه خون غیر ثابت است بلکه صفرا از خون بجزایب میشود و یا خون در عروق نمی ماند که در بعضی ارض خلق کان  
 و گاه بلغم هم در خون نمی باشد بلکه هر جا که میسر می آید بلغم پیدا میکند و در بیان اعضای منفرد میگویند  
 که شریان از دل رسته اند و نبض آورده که است و اینهم غیر ثابت است بلکه نبض در عروق مطلقاً قلب است از این مطلب شریان  
 رسته اند و چون شریان انتهایی اعضا میسرند و رید شده باز گشت می نمایند و از جانب این قلب رسیده از آن متصل میشوند  
 که نبض کدام درینیت گنگ در بیان کحران و تعیین ایام بیماری چه قدر طول داده اند و فی الحقیقت آن بنای  
 فاسد بر فاسد است چه آن فرع تاثیر کوکب است و در تجربه غیر ثابت و در بیان نبض چه قدر بسط کلام نموده اند باز تا حال  
 در آن کتب حقیقت نبض هیچ نیست چه اتفاق کرده اند بر اینکه دل یک حرکت میکند برای جذب بنیم بار و حرکت ثانی میکند  
 برای دفع فصول محترقه هوائیه حال آنکه در آن هوای رود و آنجا کاری با هواست بلکه آن مولد و شهم دم است و تفصیل این سلسله در  
 امراض قلب نوشته خواهد شد انشاء الله تعالی سبب وقوع در اغلاط زیاده این است که متاخرین تا پیش ناهین اقوال  
 و کتب سابقین را مثل صحیفه سمانیه پداشته دست از تحقیق دیگر برداشته بر تنی و تقلید اکتفا کردند و کمال علم طبایع را از آن بی

بر مبنای کتب عربیه و شرح کلام قدما و تصنیف کتب خصوصاً قانون ناید و علاج و تشخیص مرض افق نوشته قانون بوعلی کند و اولاً کمال افتاد  
دانستند و این قدر در پی اصلاح و تاویل اقوال سابقین شدند که در انداختن تحقیق جدید مسدود شدند و این بخاطر نیاوردند که این علوم  
تقلیدیه و نیستند که در آن کلام غیر نبی مستند باشد بلکه از علوم عقلیه انسانی است و درین وقت پابندی بقراط و بوعلی چه معنی هم رجال  
و سخن رجال آنچه سابقین را ممکن و میسر شد آنها از جدید و جدید خود ثابت و پیدا کردند و آنچه پستی و کوشش مایان را ثابت و محقق خواندند  
آن عمل خواهیم کرد و توسط طب تحقیق سابقین و سابقین خود که اکتفا کردند که با تحقیق یک دو فرد انسان سابق خود اکتفا  
بقراط خلایق قدما در امر علاج بر قاعده العلاج بانفسد سلوک بر قیاس مینمایند و فلاطون تجربه قیاس هر دو در اخلاف بقراط جمع میکند  
شیخ بوعلی در قانون اقوال وسط و جالینوس را رد میکند و هر چه ضروری که اصرار بر نطاکتم و دست از تحقیق جدید صادق نافع کشیده  
بر تحقیق مرده ناقص ضار کاذب اکتفا و تسک کرده حلقه تقلید و گردن اندام و برای خود رئیس پیدا کرد که بعد تحقیق ممکن است  
که از ان زیاد در صناعت طب دانسته باشم باین اسباب اکثر بنواستم که آنچه در ولایت انگلستان به نسبت طب علمائے  
کاملین متاخرین بدرجه علم بدن و عمل کیمیائی کمال تجربه تحقیق کرده اند بر آن اطلاع حاصل سازم تا اینکه علم مبدا تولد اخلاط حاصل شد  
و از ان زیاد ظاهر گشت که آنچه علم طب در کتب عربیه قدیمه است و آن اخلاط زیاده اند و از ان آفات کثیره خصوصاً وقتش  
مرض و فتن سبب پیدا میشوند و بهین سبب در صحت مرضی تاخیر و مسدود و مرض اکثر بطور محض نمیشود و چون که علوم همیشه  
متعلق فکر و نظر و مزید تحقیق اند و بهین سبب متاخر از تقدم اعلم میباشد و لهذا گفته اند که ترک الاول و اکل اللاد و آخرتس باین وجه  
خوایم که خود را مقلد محض سازم و مقولات سابقین را راجحی الکی نپذیریم بلکه تحقیق متاخرین انگلستان را که اکثر مخالف سابقین  
و یقینی بود و تحقیق آنچه برای این حضرات حاصل شده و محققین یونانین را که ای میسر نشده بود بدانم و آنچه بعد مقابله علوم و حائنه  
خود ثابت شود و از اختیار کنم و اتباع حق و صدق نمایم تا بری از من پیش خدا باشم زیرا که علاج مرضی امریت عظیم الخطر و  
در ان اولی غفلت بودی و قتل نفس و الهاک علیل میشود و اصرار بر غلط و اختیار مرض موت خسران دارین است اعادنا الله عنه پس  
در صد تحصیل علم جدید و رفع اخلاط کتب عربیه طبیعیه سابقه بودم لیکن بدون دانستن علم جدید از زبان و ان کمال افراجه نشدیم  
و عمل باشد انیسی ممکن نبود زیرا که مسود و اوراق عالم زبان انگریزی بوده که از کتب انگریزی علم حاصل کنند و اهل ان بان گفتار کمال اند  
ایشان را در زبان اردو فهمیدن مطالب کتب عربیه و اصطلاحات آن بی دشواری و کمال است که کار خود گذارشته باین امر که برآ  
شان زیاد نافع نیست مشغول شوند و بعد از انستن بمقابل تحقیق قدیم تحقیق جدید را بیان کنند و باین همیشه برای حصول علم  
خود از جناب ملک علامت میگردانایک بیا من حمایت راف جناب حشمت آب جلالت انتساب محقق علوم عقلیه تحقیق  
رموز طبیعیه بقراط زان او حد نکتته دانان جناب و اکثر جهان کران صاحب بهاد و دام اقبال که ذات والا صفات  
جناب ایشان مجمع حسنات و منبع خیرات است حصول این مرام صورت نیست که جناب محترم الیه این زحمت را براس  
اشاعت علم بر نفس خود پسند فرمودند و مقابل علم اکثر باین گونه میشد که اول حقیقه مضمون کتاب طب عربی را بزبان اردو



عرض میکرد و بعد جناب محترم الیه مقابل آن آنچه تحقیق متاخرین انگلستان تحقیق فرموده اند از افاده میفرمودند و بعد قبل  
قال آنچه از ویل و تاجر ثابت و متفق علیه تحقیقین بوده بر آن در بیان اعتماد کرده میشد و اقوال شاذه را چون جناب معظم الیه تردید  
میفرمودند و بعد متفق آنچه لائق اعتبار و قابل اعتدالت میشد از احقر می نوشت لیکن ترتیب امراض برین کتاب خصوصاً در بیان  
امراض خاصه اکثر موافق ترتیب کتب عربیه است و مطالب موافق تحقیق متاخرین انگلستان برین آنچه سو ترتیب امراض در  
بعض مقام یافته شود بسبب التزام ترتیب کتب عربیه دانند و احتیاج کردن ترتیب مسطور بهر آنکه آن بسبب شهرت و  
هر و مدت معتاد و مالوف اطباء یونانین گشته و درین کتاب از امراض راس تا امراض اذن موافق ترتیب کتاب  
شرح اسباب است و از امراض الف تا آخر امراض خاصه اکثر موافق ترتیب شرح موجز کتاب بلا سدید گازرونی و  
کتاب قانون علاج بوعلی است و چونکه ترتیب این کتاب اکثر موافق مالوف اطباء یونانین است و فی الجمله  
مذاق طب قدیم باقی است پس از ائیین و اثنی عشر که جمله کاطین و طایین بهر علت ازین بهره ور شوند و بسبب آن که در  
انظمت حمل سابق بر آورده نور علم حاصل فرمایند و بدین ترتیب آن شخص مرض و تجربه علاج بطور صحیح عمل آرند و از آن مرضی که مبتلا به  
امراض مشککه میباشد برودی تحت یابند و مدتها را برین تعلیم بدهند و روزگار مثل فصول بقراطیه و حاوی کبیر و قانون بوعلی و غیره که  
سابقه باقی ماند و چونکه حصول جمع این فوائد بسیار من عطف و عنایت جناب معظم الیه شده پس از این کتاب را به  
جامع شفا فی افادات کاتبیه موسوم ساختم و در جواز ناظر برین رساله آنست که هرگاه ازین فوائد منتفع شوند چنانست  
و کمال علم منظم الیه را بخاطر آرند و چه بعد جامع ادراک را بخیاال آورده بدعای شفقت یا فرمایند و ما نطقه الا بالله العلی  
العظیم و هو حسبی و نعم الوکیل تنبییه مخفی نماند که غرض مسود این ادراک از تحریر این کتاب ابطال و اعطای  
علم سابق نیست بلکه اصل مقصود آنست که آنچه غلط در اسباب امراض و تشخیص اند بر طرف شوند و آنچه امراض چیز نیکو  
از کتب قدیمه یافته شده اند بر آن اطلاع حاصل شود و تدابیر جدیده برای ازاله اسباب محذوفه امراض و علم صحیح از امراض  
و اعراض برادران ضایعی پیدا کنند و بسبب آن پیش خدا معذور و ماجر و در نظر علما لائق مدح و تحسین شوند پس بجزئیات  
که خواه معالجین عالمین و عاقلین کتب عربیه سابقه علاج از ادویه جدیده و لایقی که فی الواقع قوی و عمده اند فرمایند یا از  
ادویه قدیمه خود که مشارک فعل این ادویه باشند علاج کنند لیکن برین امر و شواست زیرا که بمقابل افعال بعض ادویه  
جدیده اگر نریزه جود و ادویه قدیمه غیر ثابت است یا از هر دو ادویه حسب مناسب مقام کار گیرند چنانکه طریقه  
علاج را هم رساله اکنون همین است و ازین در علاج دست زیاده حاصل میشود و از ترکیب هر دو علاج حقیر منافع  
لا تخصی دیده که بسبب آن زیاست که طب بمعنی محرکفته شود لیکن از هر طریق که علاج کنند موافق علم صحیح صادق  
فرمایند زیرا که اصل علاج مرض ازاله سبب است و مادام که سبب بطور صحیح نه دانسته شود مقابل و ازاله آن چگونه کرده شود  
تا مرضی از بلاکت محفوظ مانند از ادویت نجات یابند و پیش خدا ابرای معالجین جوابی کافی موجود باشد فقط لیکن چونکه مسود





باز زیر آن غشائی بطوریکه است که آن از استخوان راس جداست و بر استخوان حرکت میکند و از حرکت آن جلد راس بجز حرکت است  
 حرکت میکند باز زیر غشائی شبکیه غشائی است که با استخوان راس متصل است و از آن غذا بجانب خارجی استخوان راس  
 میرسد زیرا که در استخوان باعتبار صلابت و لیت اختلاف است پس آنچه از استخوان راس جانب آن خارج دماغ است  
 صلب است و آنچه از آن در جانب داخل دماغ یعنی قریب دماغ است آن نرم است و آنچه از آن در وسط هر دو  
 جانب واقع است آن نرم و لین است و بطور این اختلاف در استخوان سر جوانان بخوبی وقت تشنج میشود و در  
 صبیان همه نرم اند و در پیران همه سخت میباشد و در آن غشای غذا ای استخوان می ماند و یک شریان از قلب برآمده از راه گلو  
 تا صدغین از خارج دماغ رسیده بدو شعبه منشعب شده یک شعبه آن بسوی پیشانی و یک شعبه آن بسوی خلف راس  
 رفته و آن هر دو در جلد راس بذریعہ غشائی ریشہ دار منشعب و منتشر شده اند و همچنین یک شریان از اندرون دماغ  
 بذریعہ نقبه که قریب فوق اکبر در جانب انسی اندرون استخوان های چشم واقع است بیرون آمده در جلد راس منشعب و  
 منتشر شده و بواسطه همین شریان راه از اندرون دماغ تا بیرون آن جاری شده و از آن خون در جلد میرسد و  
 چون بشریان عظیم که از بیرون دماغ در جلد راس آمده نقصان و آفتی میرسد شریانی که از اندرون دماغ بر آید  
 چشم در جلد آمده خون در جلد میرساند و این شریان که شریانی در جلد راس رسیده  
 اند و او هم به آن قسم و حال طریق در جلد راس رسیده و منتشر شده اند و چنانکه شریان خون را از دل بیرون در جلد رسانده و در جلد خون را از دل  
 میرسانند و در یک از اندرون دماغ بیرون آمده است آن از وریدیکه از شریان خارج دماغ پیدا شده و عظیم گشته  
 بر پیشانی آمده است قریب گوشه چشم که در جانب انسی است بالای فوق اکبر متصل شده و لذا اگر فتنه فصد و تخلیق  
 علی درین موضع خون کثیر از اندرون دماغ بیرون می آید و سرسام و غیره امراض راس را مفید میشود و عصبیکه  
 قوت حس را در اعضای وجه می آرد و عضله پیشانی را قوت حرکت میدهد از نقبه که در استخوان پیشانی و بر و بر کناره هر دو  
 ابرو واقع است از هر نقبه ابرو یک فرد خارج شده یکی از جانب یکین و دوم از جانب بسیار در جلد سر رسیده و منتشر میشود  
 و سبب اختصاص او جلد در یک شق راس آفت همین عصب بود و استخوان های کالنه سرشت تا سینه چهار از آن  
 بزرگ اند که یکی از آن مقدم راس و دو از آن بالای آن بطور سقف و این هر دو زیاده از همه طویل و عریض اند  
 و یکی از آن در موخر راس و همین قاعده دماغ است و درین استخوان زیر دماغ نقبه کلان است که از آن نخاع بیرون  
 آمده و در فقرات و در فرو آمده و بجای که اینها با هم متصل شده اند و از آن فصل ظاهر گشته اند و از آن گویید چنانچه فصل  
 استخوان مقدم راس را که با استخوانهای یا فوج متصل شده است و از آن گویید نامند و فصل هر دو عظام یا فوج را در زخمی  
 گویید فصل استخوان و در اتصال آن با هر دو استخوان یا فوج حاصل شده و زلالی گوید چنانچه است و در شقی  
 خود بالاسیکه در رسم خطیونانی نوشته میشود و صلابت عظیم موخر راس زیاده است و چهار استخوان از آن که در جلد راس

بطور جدان زیر هر دو استخوان یافتند که در آن هر دو گوش یافته شده اند و آنرا جگرین گویند و آنهم بسیار سخت اند لهذا به جگرین نام کرده شده اند و از آن در آنف اند که از آن نخرین پیدا شده اند و یکی ازین هر دو بصورت بشپره و آن از طرف عریض خود متصل است به عظم قاعده دماغ و از طرف دقیق که مشابه بشپره است متصل است به عظم شاشی و دومی عظم شاشی است که در آن ثقبه های کوچک مثل غزال موجود بود و این قضی انف است و هم باید دانست که در جانب داخلی هر دو استخوان فنج که مثل سقف بالای استخوان های دیگر آمده اند نشان مکان شریانین که در میان ام غلیظ و استخوان راس میماند یافته میشوند و این نشانها جایگزین استخوانها برآمدگی در جانب یمن و بسیار راس یافته میشوند و زیاده میباشد پس اگر مقتضای ضرورتی بسو کشف دماغ محتاج شوند باید که این مقامات را از قطع محفوظ دارند تا شریانین که بار که اینجا موجود بود از قطع محفوظ مانند چون ذکر عظام شد لهذا ذکر ترتیب آن ضرورت تا در تعلیم و تفهیم سولت شود پس باید دانست که از استخوان های راس اول و از همه بیشتر استخوانی است که در آن پیشانی چشمان یافته می شوند و در وسط این استخوان بزرگ زیر آن استخوان نحر که موسوم به عظم شاشی است میباشد و پس این استخوان کوچک مشابه بشپره بود و بعد آن از یمن و بسیار آن هر دو استخوان جگرین که در هر یک اذن یک یک واقع است و بعد پس این هر دو عظم قاعده دماغ بود و بالای استخوان پیشانی و موخر راس دو عظم که مثل سقف در طول عرض برآمده اند که در آن یافتند میشود و اینها اساس بنیاد راس اند اکنون باید دانست که ازین استخوانهای راس در کدام ثقبه یافته میشود و هر قدر ثقبه که در سر یافته میشوند هم مملو و مسدود میباشد یا خالی و مفتوح پس بدانکه عظم شاشی بیشتر ثقبه های باریک اند و در آن نظایای عصب حس ششم که از دماغ رسته آمده اند و آن ثقب ازین عصب مملو و مسدود میباشد یمن بعد عظم مشابه بشپره هم ثقبه است و از اتصال آن عظم پیشانی و عظم شاشی و استخوان موسوم به قاعده دماغ و عظام اذن هم سوراخ های متحد پیدا شده اند لیکن دو ثقبه که از اتصال آن استخوان مشابه بشپره و عظام اذن و عظم قاعده دماغ پیدا شده اند از آن شریانین در دماغ میروند و آنچه از اتصال عظام اذن یا عظم قاعده دماغ دو ثقبه پیدا شده اند از آن دو درید بزرگ از اندرون دماغ بیرون می آیند یکی از یمن و دومی از یسار و ثقبه که بزرگتر عظم قاعده دماغ است از آن نخاع از دماغ با ام غلیظ و ام دقیق برآمده آن از نخاع و امین مسدود است و آنچه سوامی اینها ثقبه ها و عظام دماغ یافته میشوند از آنها اعصاب دماغیه بر می آیند و آنها از اعصاب مملو و مسدود میباشد و که امی ثقبه در حال حیات مفتوح و خالی نمیشد و ممکن نیست که از راه این ثقب که ام چیز از قسم بخار و ریح یا امیت بدماغ رسد و تذکره هم باید دانست که سطح داخلی استخوان دماغ در اکثر مواضع گویا صغیر قلیل اللحم خمدار بر اشکال مختلفه موجود بود و فاعلش آنست که دماغ اندرون آنها جاسیکه و پذیرای آنها استقرارش حکم بود و از حد مات قلیله در آن تر عروق و تحرک راه نیابد و هم پوشیده نماند که ام غلیظ هر جا که با عظام راس متصل شده است آنجا در عظام زیادتی بصورت غموضیه میباشد که بسبب آن اتصال و تعلق غشای استخوان محکم و قوی میباشد **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** و زیر استخوان راس اول غشای سخت است

که متعلق به نظام راس است که آنرا بعرنی اتم الدماغ اقلی نامند و لمعت لاشن جو را میگویند یعنی مادرخت چه او مثل او در پیر و پیش عظام میکنند  
یعنی از آن غذا با تخوان از جانب داخل که قریب به دماغ است میرسد و این غشاء و تمام راس متشکل و عظام راس از آن درون  
متعلق شده است چنانچه غشای بیرونی بر تمام مشتمل است بعده همراه نخاع از سر بیرون آمده و چنانکه در سر متعلق به نظام راس  
و محیط به دماغ است همچنین در قاع راس متعلق به نظام فقار و محیط بر نخاع است و هم این غشاء بعد از تقصاق از عظام بمقابل در وسطی مشب  
شده یکشان آن بصورت داس در وسط دماغ فرو رفته و از آن دماغ کبیر و حوضه شدگی حصه در جانب یمن و کبیر در جانب سیم  
ستقر شده و ازین تقسیم اکثر اوقات که دماغ عارض میشود مخصوص تشنق و واحد میباشد و دماغ تشنق سلیم کار خود را انجام میدهد  
و از آن حیات باقی میماند و یکشان ازین غشاء صلب از وسط عظم قاعده دماغ رسته زیر دماغ کبیر و بالای دماغ صغیر آمده است  
و قائمه اش آنست که ثقل دماغ کبیر بر غشاء افتد و دماغ صغیر از انفاز خود زیر ثقل دماغ کبیر محفوظ ماند پس بعد از تشنق  
دیگر ازین شعبه ام الدماغ که زیر دماغ کبیر و بالای دماغ صغیر است در وسط دماغ صغیر فرو رفته مثل دماغ کبیر از آن هم خوش  
ساخته ایضا بر آنکه چون ام غلیظ در وسط دماغ از جانب یمن و بسیار داخل میشود پس در جاییکه هر دو شعبه آن  
در دماغ با هم متصل شده بر صورت داس میشوند آنجا بر کناره های صورت داس مذکور زیر و بالای آن مجری  
پیدا می شود که آنرا لغت انگیزی سائنس بفتح سین جمله و سکون الف و کسر یای ثنائه تحتانی فتح نون و سکون  
سین جمله یعنی راه پوشیده می نامند و این مجاری در دماغ در چند جایاقه میشوند و از آن در وسط هر دو حصه دماغ کبیر  
زیر و زیر می یکی بالای صورت داس جاییکه صورت لپشت داس است و دیگر زیر صورت داس جاییکه کناره آنرا ازین  
آنست و این هر دو در جو را میتر یافته شده اند سوم جاییکه جو را میتر یعنی ام غلیظ در دماغ صغیر فرو رفته از آن هم حصه  
ساخته آنجا هم ازین غشای این مجرا پیدا میشود چهارم جاییکه غشای جو را میتر قاعده دماغ کبیر و صغیر محیط شده و هر سه  
سائنس ام لاشن که در آنما از دهن را و کبار دماغ میریزد و در سائنس چهارم که در قاعده دماغ است میریزند و سائنس که از آنجا یمن بسیار  
خود تشنق تشنق میخیزد و در ورید کبیر کردن که در جانب یمن آنست و از تشنق بسیار خود در ورید کبیر که در جانب سیم کردن  
است خون مذکور را میریزد و خود را خالی میکند و ازین او را کبار تشنق خون دماغ در دل می آید و این او را خود دماغ  
نمیرسند اما اینکه خون دماغ در مجاری موسوم به سائنس چگونه می آید پس بدانکه او را کبار دماغ که از او را صغار  
آن مرکب شده بالای دماغ و بر سر چین های آن هستند خون سیاه را از دهن های خود که در جو را میتر هستند و در  
سائنس میریزد و خود را خالی میسازند تا از انفاز و تشنق محفوظ ماند زیرا که چون در دماغ بسبب احاطه عظم  
هوای خارجی نمیرسد تا از ثقل خون در او در حرکت کرده پیش رود و در دل در آید چنانکه در اعضای ظاهره  
دیگر همین ثقل هوا خون متفر شده در داخل حرکت میکند و قلب بسبب است میرسد و در ظاهر منبسط نمیشود مگر  
و چنانکه هوای محیط بدن قریب و لطیف بود آن زمان البته بسوی ظاهر آمده خون ازین و دهن و سائنس خارج میشود

انداختن در دماغ زیاد و بدو سبب از ان بزرگی آید و در قلب میرود و کثرت از نقل خود هرگاه زیاده میشود و دوم از جذب کردن قلب چون آن منبسط میگردد پس با این حالت او را دماغ را که بسیار رقیق و نازک اند اگر بر حال آنها گذاشته میشود پس در اوقالی که انسان نفس می کشد چنانکه وقت غوطه خوری و غیره است در پیونت انبساط قلب نمیشود و درین حالت از زیادهای خون عروق دماغ منفر میشدند و انسان بزودی هلاک میشود لکن اذخالق حکیم برای حفظ او را دماغ را با اجزای سانسینس پیدا فرمود که سبب مصلحت غشای ام غلیظ تحمل برداشتن نقل خون غلیظ به نسبت عروق ثابته دراز میشود و منفر نمیکرد و سبب آن باز خون برای مجاری می افتد و عروق خالی مانده از انجا محفوظ میمانند پس بعد هرگاه خون درین مجاری زیاده میشود از نقل ذاتی خود بزرگی آید و در قلب داخل میگردد و کلام آفت با واد میسرسد اما اینکه سانسینس غیر ویدست پس دلیل بر آن نیست که در ورید غشای عضلات هر دو اند و درین مجری بخور غشای وجود عضلات یافته نمیشود و زیرا که او را ام غلیظ پیدا شده و نیز اینها ضرورت عضلات نیست چه اینها خون بدو سبب مذکورین سابق می باشد نه باعانت عضلات و بواسطه همین غشای صلب که با ام دماغ موسومست شریان واورده خرد و مجاری لعاب آورنده و شطای یا عصب سمپتی شنگ تا استخوان راس میرسند و از رسیدن شطای با این عصب در دوسر شاکت معدود و دیگر اعضا پیدا میشود و چون وقت تشریح این غشای از استخوان راس جدا میکنند پس جانی که اندین غشای متعلق به استخوان راس است از آن جانب خون کثیر خارج میشود زیرا که از همین جانب با استخوان خون میسرانند و وقت تشریح هرگاه جدا کرده میشود خون در آن موجود بود و شاکت دیگر دو هرگاه که امی ضرب در حال حیات بر سر چنان میرسد که این غشای از استخوان راس جدا می شود استخوان راس مده یکد و زیرا که رساننده غذای آن از ان جدا شده و او مثل صانع که از پشت مرضع جدا شده حشاک گشته میسیرد و مده میشود و خون ازین غشای رفته رفته خارج شده در دماغ چنان زیاده میگردد که از ان دماغ منفر میشود و از ان بیار هلاک میگردد و دو جانب داخلی این غشای که بسوی دماغ مستوی و انلسست و زیر این غشای تحت غشای دیگر رقیق مثل بیت شکبوت است و آن بر دماغ منبسط است و آنرا ام رقیق میگویند و بلغت گریک اگر کنایه گوئد یعنی مشابه به نسج عنکبوت و فی الواقع آن واسطه ملاقات جسم لمن به است و دیگر فائده آن اینست که این غشای قدری آب پیدا میکند که از ان در دماغ نیست و علامت همیشه باقی ماند و مصلحت و خوشنوبت و در آن راه نیاید و آبیکه در بطون دماغ در تعاریج آن میاشد آن ازین غشای پیدا شده مجتمع میماند و این غشای هم همراه غشای سخت که ام غلیظ است از اندرون دماغ همراه نخاع بیرون آمده و در فقار عنق و ظهر فرو میرود و در ان هم نهایت برای حفظ نیست نخاع پدای می کند و در این غشای نهایت است که از بلغت لاشن یا قیر میچسبند غذا رساننده به مغز و این می نامند و این غشای بسیار نازک و رقیق است و بدینجه آن غذا بدماغ میسرسد و این غشای از شریان واورده که کوچک پیدا شده و این غشای خاص بر جمیع اجزای دماغ محیط است و همراه آنها نیز و بالذات

رفته و تغذیه جسم اسود که همراه جسم ابيض در دماغ موجود است مخصوص باین غشاست و همین جسم اسود ماده قوت حس حرکت بدن است و هر قدر که این سیاهی در دماغ اندرون چین دماغ زیاده بود صاحب آن قوی الحس و قوی الحركة و صاحب عقل بود و چون این جسم سیاه کم شود قوت بدن کم می گردد و اگر این جسم سیاه محفوظ بود و در جسم ابيض آفتی رسد قوت بحال خود می باشد لیکن در بدن جاری نمی شود و جسم ابيض فی الواقع عصب است و آن رساننده قوت است و مرکب است از ریشته ها و تارهای عصبیه و آنرا بلبغ انگاشش مؤنث سب استنش میگویند و جسم اسود خود محل قوت و ماده قوت است و جسم اسود مرکب است از سلهای کثیره که هر یک از آن مخزن قوت است و از هر سل قوی حسیه و حرکتی بیرون آمده بذریعہ ریشته های اعصاب در اعضای بدن میروند و این جسم اسود را بلبغ الاذن کار پس نیز برای نامند و بلبغ انگاشش کار چنگل سب استنش نامند و بنابرین جالینوس گفته که هر که در دماغ چین زیاده بود صاحب عقل بود و کسیکه دماغش خالی از چین باشد ابله و بی عقل بود زیرا غشیه مذکوره دماغ مخی مخ است و آن از روی علل و بوندی کیبیر و دوم صغیر پس هرگاه به تشریح استخوان را جدا کنند اول دماغ کیبیر محسوس میشود و آن مستدیر مثل بهیئت بیضاوی یعنی قاعده آن فی الجمله غلیظ و راس آن از آن قدری دقیق تر آن را خارج و دو حصه محسوس میشود و در آنها چین های کثیره واقع اند لیکن چین هر دو حصه در صورت و بهیئت مختلف میباشند و چون بوند بر چین ریشته جسم سیاه باریک یافته میشود و اندرون آن جسم سفید مدور غلیظ محسوس میشود و در میان هر دو حصه جسمی متطیل مثل عمود سیاه محسوس میشود لیکن هرگاه هر دو حصه را جدا کنند این جسم متوسط مثل بیخ نباتات ریشته ریشته شده قدری بسوی حصه جانب امین و قدری بسوی حصه جانب الیسر شریک میشود و چون کالنه سر را کشاده در جانب اندرون دیده میشود ظاهر میگردد که دماغ کیبیر از جانب مقدم خود در استخوانی که در مقدم دماغ است و در آن چشمان و پیشانی اند میماند و از وسط خود در میان دو گوی که در استخوان گوش یافته میشوند مستقر بود و از موخر خود در عظم قاعده دماغ که در آن قصبه کیبیر خرنج نخاع است بالای اتم غلیظ میماند و زیر اتم غلیظ بانها دماغ صغیر هم در همین استخوان موخر راس که قاعده دماغ است میماند و چون دماغ کیبیر را در جهت عمق آن ببرند بهین پس آنچه چین دماغ بر ظاهر آن محسوس میشود در داخل آن معلوم نمیشود فقط بطراف دماغ نشان کنگره های چین سابق دیده میشوند و در وسط آن سطح مستوی سفید بود و در آن سفیدی خطوط صغیره و نقطه های سیاه محسوس شوند و آن فوهات عروق و شرائین مقطوعه میباشند و چون جسم متوسط را که مثل عمود در بیخ است تمام بیرون آرند بطون دماغ ظاهر میشوند و شکل بطون دماغ کیبیر بهیئت هر یک که اول آن زیاده بود میباشند و آنجا موخر از مقدم زیاده عریض است و ساقهای آن مقوس و تقوس آنها بسوی داخل بود و خط عرضی در جانب قاعده بطون دماغ مثل نصف دایره متصل بسره و ساقین بنحویکه از اتصال آن زاویه حاده حادث میشود

در بیان جسم اسود و ابيض و دماغ

و ازان نصف دایره که متصل به قوسین است بجانب قاعده بطون صورت بالای پیدای شود و بسوسه راس بطون  
خط عرضی سقیم هر سه خط سابقین آید و از تلاقی آن بر سر قوسین دو زاویه متفرجه حادث میشوند و بالای این هر دو  
زاویه صورت قرن خود یافته میشود و در وسط آن در طول جسمی مثل خط مستقیم بطور عمود و فاصل است که ازان  
بطرفین بین و بسیار این جسم متوسط و بطون خط هر میشود و آن هر دو بزرگترین بطون و دماغ اند و این جسم  
متوسط هم خود بطون ثالث است که ازان هر دو ضیق است و در زیر این بطون متوسط صغیر دیگر بطون صغیر است  
که بذریعہ آن آب که در بطون دماغ است با آب نخاع متصل میشود ہیئت بطون رابع بصورت قطع الماس  
است هر گاه آن بر صورت اصلی خود باشد و آن قریب بصورت ایلیلی میباشد و این بطون عمیق نیست و از زیر  
آن راه بسوی بطون ثالث رفته است چنانکه اگر شعری در آن اندازند تا بطون ثالث میرسد و ازین بیان واضح  
شده باشد که بطون دماغ چهار اند **فصل ثانی** و گفتند همیشه درین بطون قدری آب میباشد  
تا محال خالی نشود و بسبب آن دماغ تا استخوان ماس ماند و چون خون در دماغ زیاده می آید این آب بطون کم میشود  
و چون خون از دماغ کم میشود آب زیاده میگردد و تا مقدار دماغ کم نشود و در سن پیری این آب زیاده میشود و  
از همین قاعده عارض میگردد و در هر دو بطون کبیر دماغ و جسم سفید مثل سفید میباشد و در آن هر دو سیاهی بران  
نیست که چون دماغ کبیر بود و ازان هر دو جسم نخاع پیدا میشود و چنانکه در دماغ کبیر سیاه بر چین دماغ است  
و سفیدی اندرون آنست بر عکس آن در دماغ صغیر سفیدی بر چین آنست و سیاهی اندرون چین است  
و این دماغ صغیر بالای نخاع است چنانکه ام غلیظ بالای این دماغ صغیر است و این دماغ صغیر هم مثل  
بروز حصه است چنانکه گفته شده و لیکن در وسط آن کدام بطون نیست اما ازان ریشیه بارسته و در ترکیب نخاع  
از طرف پشت نخاع آمده شریک شده اند و تا اثر آنها در اعصاب محرکه نخاعیه که در عضلات رفته اند ظاهر  
نمیشود چه ازان حرکت از هر دو جانب جسم انسان برابر صادر می شود و چون کلامی نماید دماغ صغیر در قعر دماغ هر جانبی  
فساد عارض شود از انسان ممکن نبود که ازان جانب برابر حرکت کند و وزن دماغ بحساب اوسط چهل و هفت اونس بود  
و ازان کم و زیاده هم میباشد بالجه که یک زیاده عقیل بود و غشاش تا شصت و چهار اونس میباشد و کسی که بی عقل بود  
و غشاش تا بیست اونس بود و این بنا بر قاعده مشهور است که هر قدر دماغ کبیر بود عقل زیاده خواهد بود و لیکن ممکن  
است که دماغ صغیر بود و قلیل الوزن باشد و لیکن در آن چین زیاده و عمیق بود پس صاحب آن کثیر العقل خواهد بود  
و آنچه در کتب عربیه طبیه نوشته اند که در دماغ قوتی مد که میباشد که آن مد کات فی الباطن اند مثل حس مشترک که در  
مقدم بطون مقدم میباشد و مثل خیال که آنرا صورته هم نامند و موضع آن موخر بطون مقدم است و و هفتم  
آن بطون اوسط است و خزانه آن خیال است و موضع آن بطون موخر است و تعیین مواضع این قوت ها بر بنیاد ظهور

بینه و از غشاش



ابطالان نقصان افعال این قوی میکنند از اوقات این مواضع پس این غلط است و در تشريح و تفسیر ثابت نشده که از آفت  
خلان محل فلان قوت باطل میگرد و بلکه بل قوت در جسم سیاه مذکور است و از آفت هر موضع این افعال مذکور  
باطل و ناقص میشوند و از زیر دماغ کبیر که زوج اعصاب رسته اند که از آن یک فرو بجانب یمن و یک فرو بجانب  
و وجه و اعضای آن می آیند زوج اول که از مقدمه دماغ رسته عصبین شپشین بکلیتی اشدی هستند که قوت ثلثه  
رامی آرند و آن بالای عظم مشاشی میباشند هر دو جانب الف که از آن ادراک جمله مشعومات کرده می شود چون  
و آن فساد واقع شود این قوت فاسد میگردد و در ادراک مشعوم نقصان یا بطلان ظاهر میشود و زوج دوم  
که بعد آن رسته عصبین جوفتین اند که قوت باصره را در چشم می آرند و یک فرو از آن از جانب یمن رسته  
و بجانب بسیار آمده و یک فرو از جانب بسیار رسته و بجانب یمن رسیده و قدری قدری ریشهای خود را در  
جانب مبدی خود بهم منتهی ساخته اند و این هر دو عصب و چشم بذریع سوراخهای که در عظم مشابہ خفاش  
یافته میشوند می آیند و همچنین زوج ثالث و رابع و کحیثه زوج خامس بذریع ثقبه که از اتصال عظم حیثانی  
با عظم مشابہ خفاش پیدا شده و آن بیست و شش طولی است و چشم داخل میشوند و کارشان و چشم نیست که زوج  
ثالث و عضله جنب علی آمده چون راس می فوق بر می دارد و چون درین فاجع واقع میشود یک سوراخ منقبض و منقبض  
ماند و بیمار را ممکن نبود که یک را بر دارد و دیگر اعضا چشم که از آن و چشم حرکات صادر میشوند مثل عضله که چشم را بسوی  
اعلی و اسفل حرکت میدهد و هم عضله که چشم را بجانب الی حرکت میدهد و عضله که چشم را بجانب و حتی حرکت دوری میدهد  
و در آن هم شطایب اعصاب همین زوج ثالث می آیند و قوت حرکت می آرند و همین بر تحریک چشم میشوند و کار  
زوج رابع اینست که در عضله محرکه چشم آمده بذریع آن عضله چشم را حرکت دوری بسوی داخل میدهد و خصه زوج  
خامس و حسن اندرون بیرون چشم می آرند و همراه شریان صغیر که از اندرون دماغ برآید چشم بیرون آمده بر خارج استخوان  
راس منتشر شده این عصب هم برمی آید و بر پیشانی منبسط میشود و از ماوت شدن همین عصب ریه عصاب پیدا میگردد  
و پوشیده نمائند که زوج عصب خامس رسته حصه منقسم شده است این بیان یک حصه آن بوده و حصه دوم  
و سوم آنهم از ثقبه که با اتصال عظم مشابہ خفاش و عظم حجری که در آن گوشه واقع اند پیدا شده برمی آیند و کار آن اینست  
که بردند انهای بال و زیرین و بر زبان می آیند و قوت حس باین اعضا میرسانند و بسبب آن ذائقه تلخ و شیرین  
جدا جدا محسوس میگردد و زوج عصب ششم هم از همین ثقبه که حصه دوم و سوم زوج خامس از آن بیرون می آید  
برمی آید و بذریع عضله که بیرون چشم است چشم را بجانب و حتی حرکت میدهد و زوج سابع و این عصب هر قدر آن و  
شاخ و یک اصل است گویا هر دو یک زوج است و از آن یک شاخ آن از ثقبه که در عظم حجری که در آن گوشه است  
یافته شده و فرو رفته و از آن قریب نمانده که پس گوش است خارج شده از بالای گوش و ملتقای یکین بصورت پنجه بای بالاطراف



و پنج ریشه ریشه شده در مجاری عضلات و هر رفته چون درین فلج میگردد و کجی در وجه و دهن ظاهر میشود که آن عبارت از لقوه  
 است و چشم این طرف کشاده میماند چون مریض خواهد که چرخ را بچ کند از دهن هوا برابر خارج نمیشود و در خنجر جانب  
 علی بن سید میگردد که از آن تشنق نشود و این عصب قوت حرکت را می آورد در آن قوت حس نمیشود و تشنق دیگر  
 آنهم ازین ثقبه عظم مجری برآمده در گوش رفته است و آن قوت ساعده را از دماغ می آورد و همراه عشا می آید و ازین ثقبه آذن  
 منبسط شده و ریشه ریشه گشته در حیاضیکه در گوش ملو بآب اند منبسط میشود و در آن مثل شناور می باشد و بذریعہ تنوع  
 آبی که در آن است اصوات خارجی را در اک می کند تا ششم زون موسوم نیواکاسک است و آن از ثقبه که از اتصال  
 عظم موخو دماغ و عظم مجری پیدا شده و در آن در یک کبیر از دماغ فرو آمده خارج میشود و فی الحقیقت این عصب سه شاخ است  
 و یک اصل آنست چنانچه یک شاخ آن در زبان آمده و تشنق دیگر آن همراه و یک کبیر در سینه رفته و آنجا اول و دل  
 تشنق منبسط شده بعد در جمیع احشای شعب و منشعب گشته با سیمپی شیک متصل شده و تشنق ثالث آن در عضله  
 عنق که بواسطه آذن واقع است داخل شده تا عضله سیر و در آن در عضلات عنق و پشت منبسط میشود و این  
 عضلات را قوت تحریک میدهد که بسبب آن عنق بهر سو میگردد و تقصیر هم از آن مدو حاصل میشود و فقط در زون هم  
 از ثقبه که کوچک استخوان موخو راس که قاعده دماغ است و در پهلوی ثقبه کبیر که مخزن نخاع است واقع شده بر می آید  
 و کارش اینست که زبان را حرکت میدهد و واضح باشد که زون هفتم و ششم و نهم از ابتدای نخاع بظاهر سرانند  
 لیکن پنج آنها تا دماغ رسیده است ازین جهت آنها را با اعصاب و اغیه میمانند که بظاهر از اعصاب نخاعی بوده  
 باشند و تشنق که در نخاع از زیر دماغ کبیر شروع شده از ثقبه کبیر که در عظم قاعده دماغ است همراه اعظم غلیظ  
 و بزم رقیق خارج شده در فشار عنق و ظهر فرو میرود و چنانکه دماغ در استخوان راس میماند بهر حال پنج نخاع در غلظت فقرات آذن  
 اغشیه مذکوره میماند و چون تشنق کرده نخاع را می بیند آنهم مثل دماغ بر دو حصه منقسم می باشد یکی در جانب یمن و دیگری  
 در جانب یسار و صورت نخاع در فقره مثل آنه مغز اخروث می باشد و در نخاع هم جسم اسود مثل دماغ یافته میشود  
 لیکن صورت آن در هر حصه بصورت حرف میم که در خط غریبی نوشته میشود در می باشد و پشت هر دو قسم در وسط آن  
 با هم متصل بود و سریم بسوی کنار نخاع بود و هر حصه آن در طول خود هم از وسط منقسم بود و حصه بود بالا و پایین  
 حصه بالا عصب حرکت و از حصه پایین عصب حس می آید از هر دو طرف و عصب حرکت و عصب حس بهر دو با هم شده  
 در بدن منبسط میشوند و عصب حس از جسم اسود نخاعی و عصب حرکت از جسم بیض آن متصل می باشد و هر قدر که  
 نخاع در فقرات زیرین که منطبق اند میرود ضعیف میشود تا اینکه آخر خود مثل عصب کوچک در صورت میشود و اعصاب نخاعیه  
 هم که حس آورنده جمیع اعضای بدن را در اول اعضا راس قوت حس و حرکت میدهد و چون آفت و نقصان به  
 کدام فقره از فقرات نخاع آن میرسد پس در اعضای که ازین فقره و از فقرات دیگر که بعد فقره ما و فیه واقع باشند نیز

فالج و مسترخا پیدا میشود و در کلام عضو که این اعصاب مسترخیه رفته باشند آن عضو هم مغلوج و مسترخ می شود مثلاً هرگاه زیر  
کمر بر قنار عصعص ضرب یا آفت دیگر رسد از ان این فقرات و نخاع اندرون آن ماؤن شود پس هر دو پا و مثانه  
مسترخ می و بیکار شود و از ضرب مثانه حبس بول و گاهی سلسل البول عارض شود و چون ضرب یا آفت دیگر بر عرق رسد  
پس هر قدر نخاع که در فقرات زیرین بعد فقره ماؤنه است جمله اعصاب آن خواهر محکمه باشند یا حس آرند و بوند  
بیکار میشوند چنانچه هرگاه برگردن آفت میرسد دستها و پائنها و پهلوها و مثانه همه مسترخ می و بیکار میگردد و فاج عالم  
عارض شود که موسوم به **توبلق** است زیرا که از فاسد و بیکار شدن ریشه نخاع که در قنار عرق است راه آمدن قوت  
حسن حرکت از دماغ بند و خراب می شود لیکن در صورت هم حرکت دل و حرکت تنفس که بذریعیه پوده شکم حاصل میشود  
باقی میماند زیرا که محرک آن عصب دماغی است نه نخاعی تعمیم چونکه فعل اعصاب دماغیه و نخاعیه مذکور شد و در بیان  
عصب نیو ماگاستک که زوج هشتم است نوشته شده که آن در بطن رسیده با عصب سیمی ثنیک متصل میشود و مانند  
بیان عصب مذکور هم ضرورت تا در تسلیم نقصان نماند پس باید دانست که این عصب از پس زمره گوش فلج  
شده اصل آن بسیار باز یک است که در تشریح محسوس نمیشود لیکن یقین است که از دماغ آمده باشد و اغلب آنست که  
با جسم اسود دماغ که ماده قوت است متصل باشد زیرا که او جمله افعال اعضای صدر و بطن را می دهد و جمیع اعضا  
مذکوره را در افعال آنها اعانت میکند و در رسیدن این عصب جایی که ظاهر شده از انجا اول بر پهلوئی استخوان عرق  
متصل شده فرو می آید و چون قریب قنار طریه رسید در میان اضلاع و قنار بر کناره های اضلاع ملتصق شده  
بزیر می آید تا که بر کمر میرسد از انجا از کمر فرو رفته بمقابل قنار بزرگی آید و از انجا همراه شریان عظیم در رحم و مثانه و هر دو پا وارد  
و در رحم زیاده رفته است این بیان اصل آن عصب و شاخهای آن از هر دو جانب همین بسیار در راه ازان خارج شده  
در همه اعضای صدر مثل دل و ریه و کک و در اعضای بطن مثل معده و جگر و طحال و امعاء و رحم و کرده و مثانه منتشر شده اند  
و چون که از هر دو طرف شاخهای آن آمده با خود با متصل شده اند لهذا این عصب بر جمیع اعضا از هر دو مثل محیط است  
و کارش اینست که آنچه از این اعضا فعل صادر می شود بکام آن صادر میشود مثلاً حرکت قلب بکام و تحریک آن است و چون  
در کلامی عضو ضرورت آفت عارض میشود بذریعیه عصب مذکور اثرش بر عضو دیگر رسد مثلاً هرگاه گروه متفرق میشود از ازان  
به دل ضرر میرسد و چون در معده آفتی باشد از ازان هم ضرر به دل و دماغ میرسد لهذا آنرا به سیمی ثنیک که  
بمعنی بند دست موسوم ساختند و زیاده ظهور این کار در رحم پیدا شد و چون مدت حمل تمام میشود آن زمان همین  
عصب رحم را حرکت میدهد که طفل را از خود بیرون کند و چون بول در مثانه جمع میشود بذریعیه همین عصب در آن  
حرکت برای دفع کردن آن پیدا میشود پس این عصب معین بر حرکت است و محرک اعضاست تعلق بحس ندارد و  
و هم پوشیده نماند که تحریک عضلات بدن بر وجهی است یکی ارادی مثل برداشتن و نهادن دست و کشیدن پا و

بیان عصب سیمی ثنیک

آن بذریعہ اعصاب و ماغیہ و نخاعیہ حاصل میشود و درم غیر ارادی مثل حرکت قلب و آن با عانت و قوت این عصب  
 سپس تشنج حاصل میشود فاعلاً مخفی تا آنکه فائده اعصاب آنست که دماغ را از همه امور مطلع و آگاه میسازند  
 تا بذریعہ آن انسان وفاق را اختیار کند و از منافعی و مضرات اجتناب در زند پس اندر آن موافق و ملائم لذت است و اندر آن  
 منافی و مخالف المرغوب بود لیکن گاهی جاییکه منافی یافته شود الم نمیداشد بلکه جای دیگر محسوس شود مثل آنکه هرگاه که  
 درم یا انفلیشین بود بچکل کرد و محسوس نگردد بلکه بالائی شایع و عضد الم محسوس میشود و گاهی درم و مرض در کت و در مفصل کبره در  
 محسوس میشود خصوصاً اطفال این صورت همیشه کایت در کبره میکنند و گاهی بعضی معده بود و در سرد محسوس میشود چایکه در محسوس  
 میشود یا بطور تند و یا تفرق اتصال بسبیل انقطاع مییاشد با بجمه در و با نخاع محسوس میشود که در آنجا عصب باشد و در آنجا  
 در و نمیداشد چنانکه در عضلات این ناخنما و شعرا این معنی بخوبی مشاهد است چه درین اعضا عصب نمیداشد گاهی نیز مییاشد و در  
 فصل دوم در صدراع و آن در و سرت و از ابغث انگش پدید آید این گویند و هیئت معنی سرو ایک معنی است  
 و ابغث لاین کیفال انجی نامند و کیفال هم معنی ستر ایچیا معنی در و سرت بد آنکه در و سرت و مرض نیست بلکه از علامات است  
 که در بعض امراض یافته میشود لیکن چونکه این بودی است و زیادتی آن خود مورت امراض است لهذا اعتنا بعلاج آن  
 زیاده کرده میشود و آن بر دو قسم است اصلی و شرکی اصل است که سبب خاص آن دماغی بود یعنی آن مرض که در آن  
 این علامات یافته میشود خاص دماغ بود مثل صدراع که با سر سام یافته میشود و شرکی آنست که سبب آن خاص دماغ  
 نبود بلکه در اعضای که غیر دماغ اند یافته شود و سبب آن در و سرت عارض شود مثل صدراعیکه از بعضی طعام معده  
 عارض میشود و اصلی هم بر دو قسم است یکی آنکه پیش در دماغ بود لیکن سرت از دال نباشد مثل سر سام و دوم آنکه پیش  
 در دماغ بود اما سرت از دال باشد مثل آنکه خون در دماغ زیاده بود و از حرارت شمس گرم شده و در و سرت پدید آید  
 و ظاهر است که این خونست اگر خفیف باشد از ادنی تشکین و سرت بر ذائل میشود و اقسام در و سرت اعتبار مدارج سبب خود  
 در زیادتی و کمی مختلف میباشند قسمی شدید و مبرح و حاد بود و قسمی خفیف و ملین و مزمن میباشند و گاهی در و سرت راس  
 محسوس شود و گاهی زیر استخوان راس و در آن کرده شود و گاهی تشنج یک مقام از راس باشد مثل یا فوخ و پیشانی  
 و موخر راس و زمانی مشتمل بر جمیع سر میباشند و گاهی در کویک ترین مقام از راس در محسوس میشود مثل محل تقبه ای  
 که از ان اعصاب دماغی از اندرون بیرون آمده اند و گاهی بر محل زاید از راس احساس و جمع کرده می شود و این حکام  
 اقسام صدراع عام بوده خواه اصلی بودند یا شرکی و گاهی با در و سرت خواب زیاده بود و گاهی بیداری مفراط بود و گاهی  
 آواز طنین و دوی در گوش سموع میشود و این علامات هم در اصلی و شرکی هر دو یافته میشوند و از اینجا اول بیان  
 احکام اقسام شرکی کرده میشود پس باید دانست که صدراع شرکی عورات را اکثر مبتلایان است و در جم عارض میشود و عورتا  
 و مردان هر دو را مبتلایان است معده عارض میگردد و کسانیکه نشسته کار میکنند مثل نقالان و عورات خانه نشین و

کتاب



علامتش آنست که این در میرون استخوان راس در جلد سر محسوس میشود لیکن طبیب را ضرورتست که در وقت علاج  
 اقسام شکریه را از اصلیه جدا کند و برای آن قانون تشخیص مقرر سازد و آن اینست که اصلی همیشه دائمی ماند  
 و شکرکی چند روز مانده زایل میگردد و اکثر بطور نوبه می شود و دوران زیادتی و کمی ضرور میباشد و گاه گاه از  
 دانستن سبب یقین حاصل میشود که شکرکی است مثلاً کسی در آفتاب تیز حرکت کند و بعد آن مبتلا بصدرع شود یا گرم  
 او پیونجور دیار حمام گرم یا از آبهای گرم مثل آب نظرون و کبریت غسل کند و یا صاحب صدرع مخمور بود یا عورت  
 قریب زمان در وحیض خود شکایت صدرع کند از آن دانسته میشود که صدرع شکرکی است و افرض اصلی  
 دماغ مثل سرسام نیست و چون درد سر زیاده از دوسه روز بشتد ماند و از علاج زایل نشود و جمعی شروع  
 شود و غشیان و تهوع عارض گردد و با وجود اینکه صفرا در تی خارج شود لیکن خفت در دوسه عارض نگردد  
 آن زمان باید دانست که اصلی است و بسبب ورم خاص دماغ یا غشیای دماغ است فستکست  
 علاج اول سبب مرض را تفحص و تلاش کنند من بعد بدفع آن متوجه شوند پس اگر خون زیاده بود و تدبیر مصلح من بعد  
 آرند پس اول چون از گرفتن قصد یا تعلیق علق میرون آورده از بدن و سر کم کنند و بهترین قصد در اینجا آنست که  
 در یکباره کردن زیر جلد نمایان است آنرا از ریگوش بقدر چهار انگشت مضموم بکشانند که از آن خون بدن و دماغ  
 بخوبی خارج میشود و افضل موضع تعلیق علق آنست که بروق کبر جانیکه درید خارج استخوان راس باورید  
 داخل استخوان دماغ متصل شده است و در تشریح دماغ همین شده زو چسپانند و یا بصدغین نهند و اگر  
 خود ر عاف جاری شود از همه بهتر است بعد آن سهل قوی دهند تا از آن آب از خون کم شود و بسبب آن  
 هم مقدار خون کم گردد و میگنیشا سلفاس و تار ژامیک یا کولم یا سفوف جیلپ یا روغن حب السلاطین و  
 امثال آن بخوراند تا اسهال مانده تسبیق نماید و مایت اخراج کند که اصل غرض اینست و اگر حاجت قلیل باشد  
 یا پای ریک سلاطین یا هر قسم سلاطین یعنی دو اینکه از قسم کهار باشد مثل سڈلیر پوژ و غیره نوشانند و غذا کم دهند  
 و اگر رشتها زیاد بود چنان غذا دهند که از آن خون کم پیدا شود مثل کچرمای دال مونگ و امثال آن و اگر درین  
 صدرع حرکت قلب قوی و سریع باشد و از آن خوف زیاده رسیدن خون بدماغ باشد و جمعی ثلیس سفوف  
 یا مطبوخا بنوشانند تا حرکت قلب بطبی شود و اگر کم نشاند آب سرد بر سر ریختن درین مرض مفید بود و آنچه بسبب عصاب  
 و کمزوری خون باشد در آن کینین با قیری کار نباشد که آنرا پر او کساید آن ایرن هم میگویند سفوف آن آهن شمع رنگ  
 است بخوراند یا آب آهن کینین بنوشانند و غذای مقوی بخوراند پوژ دین که قسمی از شراب است بنوشانند  
 و گاه از نوشانیدن مطبوخ چای یا کانی هم این قسم صدرع بر طرف میگردد و همچنین بنوشانیدن نو و خوراندن  
 و پو یا نیدن ایمونیا درین مرض مفید بود و اگر از خرابی معده و اجتماع صفرا در معده پاکب بود و در آن اولاد و

در وقت علاج  
 اقسام شکریه را از اصلیه جدا کند  
 و برای آن قانون تشخیص مقرر سازد  
 و آن اینست که اصلی همیشه دائمی ماند  
 و شکرکی چند روز مانده زایل میگردد  
 و اکثر بطور نوبه می شود  
 و دوران زیادتی و کمی ضرور میباشد  
 و گاه گاه از دانستن سبب یقین حاصل میشود  
 که شکرکی است مثلاً کسی در آفتاب تیز حرکت کند  
 و بعد آن مبتلا بصدرع شود یا گرم او پیونجور دیار حمام گرم  
 یا از آبهای گرم مثل آب نظرون و کبریت غسل کند  
 و یا صاحب صدرع مخمور بود یا عورت قریب زمان در وحیض خود شکایت صدرع کند  
 از آن دانسته میشود که صدرع شکرکی است و افرض اصلی دماغ مثل سرسام نیست  
 و چون درد سر زیاده از دوسه روز بشتد ماند و از علاج زایل نشود و جمعی شروع  
 شود و غشیان و تهوع عارض گردد و با وجود اینکه صفرا در تی خارج شود لیکن خفت در دوسه عارض نگردد  
 آن زمان باید دانست که اصلی است و بسبب ورم خاص دماغ یا غشیای دماغ است فستکست  
 علاج اول سبب مرض را تفحص و تلاش کنند من بعد بدفع آن متوجه شوند پس اگر خون زیاده بود و تدبیر مصلح من بعد  
 آرند پس اول چون از گرفتن قصد یا تعلیق علق میرون آورده از بدن و سر کم کنند و بهترین قصد در اینجا آنست که در یکباره کردن زیر جلد نمایان است آنرا از ریگوش بقدر چهار انگشت مضموم بکشانند که از آن خون بدن و دماغ بخوبی خارج میشود و افضل موضع تعلیق علق آنست که بروق کبر جانیکه درید خارج استخوان راس باورید داخل استخوان دماغ متصل شده است و در تشریح دماغ همین شده زو چسپانند و یا بصدغین نهند و اگر خود ر عاف جاری شود از همه بهتر است بعد آن سهل قوی دهند تا از آن آب از خون کم شود و بسبب آن هم مقدار خون کم گردد و میگنیشا سلفاس و تار ژامیک یا کولم یا سفوف جیلپ یا روغن حب السلاطین و امثال آن بخوراند تا اسهال مانده تسبیق نماید و مایت اخراج کند که اصل غرض اینست و اگر حاجت قلیل باشد یا پای ریک سلاطین یا هر قسم سلاطین یعنی دو اینکه از قسم کهار باشد مثل سڈلیر پوژ و غیره نوشانند و غذا کم دهند و اگر رشتها زیاد بود چنان غذا دهند که از آن خون کم پیدا شود مثل کچرمای دال مونگ و امثال آن و اگر درین صدرع حرکت قلب قوی و سریع باشد و از آن خوف زیاده رسیدن خون بدماغ باشد و جمعی ثلیس سفوف یا مطبوخا بنوشانند تا حرکت قلب بطبی شود و اگر کم نشاند آب سرد بر سر ریختن درین مرض مفید بود و آنچه بسبب عصاب و کمزوری خون باشد در آن کینین با قیری کار نباشد که آنرا پر او کساید آن ایرن هم میگویند سفوف آن آهن شمع رنگ است بخوراند یا آب آهن کینین بنوشانند و غذای مقوی بخوراند پوژ دین که قسمی از شراب است بنوشانند و گاه از نوشانیدن مطبوخ چای یا کانی هم این قسم صدرع بر طرف میگردد و همچنین بنوشانیدن نو و خوراندن و پو یا نیدن ایمونیا درین مرض مفید بود و اگر از خرابی معده و اجتماع صفرا در معده پاکب بود و در آن اولاد و

مقی بنوشانند تا ماده رقیق صفراوی در قی دفع شود و قوی ترین ادویه مقویه تشنه را در آب گسست و بعد آن آب پیکا کو انماست  
هرگاه بیمار قوی باشد و اگر ضعیف بود نمک یا زنگ سلفاس با آب گرم حل کرده قی کنند و بعد فراغ از قی سهل  
صفرا بنوشانند هر آنچه مناسب دانند و اگر بلبل یک گرین پود و فلفل چهارم حصه گرین با هم آمیخته حب بسته بخورند  
کافی بود و اگر میگنیشیا سلفاس چهار درام و طار را میثیک چهارم حصه گرین با آب کثیر آمیخته بنوشانند بهتر است که ازین  
دوائی واسهال هر دو عارض شده بزودی نقا حاصل خواهد شد لیکن مقدار آب با میگنیشیا سلفاس باید که زیاده  
بود و کم از شش اونس برای جوان معتدل نباشد چون از او ردن قی واسهال فرصت شود و هر دو موقوف  
شوند باید که بتصفیه حکم متوجه شوند تا جگر صاف شده کار خود را بخوبی نماید و برای آن میو ریت آف ایونیا  
پنج گرین و نایتر میو پالک ایستد و ایلوٹ از پانزده قطره تا بست قطره با هم آمیخته بنوشانند و غذای سبک  
بخوراند بنحوی که کم از دقت معده از غذا خالی نباشد لیکن باید دانست خماری معده منحصر در زیادتی صفراست  
بلکه گاهی زخم معده هم در سر پدید آید و اینهم یکی از خرابیهای معده است و درین وقت صفرا در معده نبود لیکن  
حموضت زیاده میباشد و این صداع بعد خوردن طعام زیاده میشود و علامتش آنست که چون بشکم  
بمقابل معده غمگیند و در معده در محسوس شود و علامتش آنست که اصل کل شک نقره را بقدر چهارم حصه گرین گرفته در مغزبان  
که بی نمک بود نهاده حب بسته وقت خلای معده از غذا بخوراند و همراه آن نمک نه دهند و الا فعل کل شک  
باطل خواهد شد و کاک لبسته با صمغ عربی سفوف را همراه آب ساده بخوراند که ادمال زخم معده میکند و چون  
سطح زخم چسبیده شود از ترشی معده بزخم معده آسیدنی میرسد و در علاج آن غذای ملائم مثل اراروٹ و ساگودانه  
و شور بای لحم و شیر ماده گاؤ خام بخوراند و اگر درد زیاده محسوس شود پلاستر از نیش گس بقدر یک روپیه  
بر معده نهند و چون آب لافند از آن قطع کرده آبش بر آوده مار یا چهارم حصه گرین بزخم کالند و هم از خرابی معده آنست که بسبب  
بعضی یاح زیاده پیدا شوند و از آن بزرگ عصب پهنی شک در سر عارض شود و علامتش آنست که اول سلفورک ایستد  
و ایلوٹ ده پانزده قطره همراه دو اونس آب ساده آمیخته یک یک آدنس بقاصه نصف نصف ساعت بنوشانند  
و اگر ازین نفیع ظاهر نشود پیل یای کیونند بخوراند یا یک درام سفوف رو رب مرکب بخوراند و اگر از نیم صداع دفع  
نه شود قی کنند و سهل دهند و ادویه سمله با ادویه کاسر و ریاح ضم کرده احتیاطا تنقیه کنند فقط و هم از جمله خرابی حد  
آنست که شراب صرف زیاده نوشیده شود و از آن بیوس برن معده متافذی شود و در معده متور واقع گردد و از آن در معده کرا  
و افیت بهم رسد و از آن در سر عارض شود و علامت آن علامات خمارانده و در سر بوشیدن شراب عارض شود و  
علامتش آنست که قی کنند و لا اگر ایونیا اسپیشس دو درام همراه آب سرد بنوشانند و ایضا هیپریکال ایستد و ایلوٹ سه قطره  
آب حل کرده بنوشانند و قدری شراب نوشانیدن برای تحلیل بقیه شراب سابق هم مفید است و نوشانیدن

پای رنگ سلطان یا هر سلطان ضعیف که میسر شود نوشتن این بسیار نافع است که لطایف غیر منضمه را بر وی از معده با سهال دفع خواهد کرد و تشکین حرارت هم از آن بشود فقط آنچه از رگت از فرسیدن هوای سرد و دوران تپاس بود آلوده گرین تپاس سیاه که گرین تپاس و تپاس کار بناس از ده گرین تا پانزده گرین تنها یا همه را یکجا کرده همراه آب بنوشانند و مجموع بلبست مفرد قوی بود با جمله موافق ضعف و قوت سبب دوا با استعمال آن رند بعد اگر در باقی ماند و اگر مسوق و منهدل بود ویری یعنی سفوف و ویری صاحب بود و یا تشکینی سفوف و تشکینی و ویری سفوف و تشکینی صاحب از ده گرین تا پانزده و بست گرین مجموعا یا مفردا همراه آب بنوشانند پس بعد از ویکه آرام سید بند مثل از فیا بنوشانند لیکن شرط است که قبض نباشد والا اول مسهل داده بعد این و آنچه را بنوشند آنجا که از رسیدن هوای سرد بلغم زیاده متولد شده باشد در آن بعد مسهل در آب گرم بنوشانند و بعد سه ساعت یا چهار ساعت است ایونیا نوشتن فید بود و همچنین اگر یکا وانا نوشتن نافع باشد و علاج عام برای درد سر است که هر که از اشتیای بارده با فعل احتیاج بد بر سر آن بار و فعل مثل پنب یا آب سرد و سر که ننهد یا ایسر در آب حل کرده بر سر مالند و برای تشکین درد سر هرگاه شدت کند کار نام نصف درام بر چوبه پاشند قدری در راز بینی درشته پذیریم و بویانند و مریض اگر کند که آهسته آهسته از آن استنشاق کند و اگر در آن خواب نیاید و از آن حرارت و کرب زیاده شود و بر و مایه تپاس بست گرین و همچنین بست گرین کلورل های و ریث همراه آب حل کرده بعد چهار ساعت این مقدار و او بنوشانند تا که خواب آید و کسیکه از حرارت راحت یافته باشد بر سر آن مالش کنند و پارچه بر سر بندند و کافور در آب حل کرده و همچنین ایسر در آب حل کرده بر سر مالش کنند ایضا سلفیورک ایتر میگردانم و یکچهار پیای یکدرام با هم آمیزند از قلم موئین بر سر طلا سازند و هرگاه در سردر بطور نوبه آید درین وقت که گرین موافق حال مریض همراه سم الفار که به هم حقه یکین بود در یک و آن آب حل کرده قبل وقت از پیوچار نوشتن تا نوبه نکند و سم الفار را بر زبان مریضی سنگی یا بنامند و وای حکمی است و سم قوی است لهذا وقت استنشاق در اختیار وزن بسیار احتیاط بکار بند و این وزن که نوشته شده برای معتدل اخلاقت قوی است و در علاج شخص ضعیف ازین کم وزن اختیار کنند بد آنکه بعضی از اقسام صلی اصلی صداع موسوم با حتراتی است که بلبه رفتن زیر آفتاب در هوای گرم و از قرب نار حادث میشود و سبب آن جوش خون است لا غیر زیرا که سبب تاثیر حرارت شمس غیر خون در جوش آمده و در داغ زیاده شده بذریعہ انضغاط عصب در و سر پاشند علامت آن تقه سبب است آثار حرارت مزاج ظاهر بوند و درین قسم اول امتحان حرارت بذریعہ آنکه تهرما میگردانند باین طوری که اگر در دهن مریض ننهد و بعد پنج شش دقیقه از دهن بیرون آید و پیند که اگر سیاه باشد و درجه نود و هشت رسیده باشد دلیل آن است و اگر از آن تجاوز کند دلیل زیاد و علامت خواهد بود پس اگر از صد و چه هم تری کند و تا چهار درجه بر صد زیاده آید دلیل مالک است و شدت حرارت است علاج اول تنقیه سبب مرض ضرورت است مثلاً اگر از گرمی آفتاب باشد در سایه و مکان سرد یا در انقل کنند و اگر از قرب نار باشد در مکانی که قریب آب جاری یا سرد و تر باشد مریض را



دارند و از آب سرد غسل نمایند و پاویه به آب سرد و تر کرده بر سر نهند و کدو ام شیء حاصل مثل افشرد آلودی بخار یا تر سندی یا نارنج  
 بنوشانند و اگر این تدبیر کافی نباشد سهیل دهند و برای تسکین جوش خون کینین تا ده گرین به بیمار خوراند و بای ریشک سلائق  
 یکدام سهیل خفیف از قسم او یکبار به آب حل کرده بنوشانند تا گاهی از راه رفتن در آفتاب گرم صفرا زیاد پیدا میشود و بعد از سهیل  
 برای دفع شدن در قی جمع میشود و از آن در در سید میگرد و این وقت باید که قی کنند و سهیل دهند تا صفرا دفع شود لیکن  
 درین وقت باید که سهیل بعد قی دهند و قبل آن چنانکه مجرب قی کافی شود حاجت سهیل نیافتد فقط و گاهی درین صداع اترقی  
 و قتیکه هواز یاده گرم بود مریض دفعه بیوش شده می افتد و نفس آن غلیظ می باشد مثل نفس صاحب سر سگ و  
 آن جوش خون بود که دفعه عارض میشود و بسبب آن در داغ خون زیاد جمع میگردد و از آن درم قلیل در نفس داغ  
 و اغشیه آن پیدای شود و حرکت نبض در اول مرض قوی و بطی پیدا میشود و در آخر مرض سریع و ضعیف بود زیرا که درین مرض  
 چون در خون جوش عارض میشود لند از بر نفوذ گوش راست قلب و در هر دو شریان که از آن خون بریده و بدن میسر خون بسبب  
 کثرت خود بنجد میگردد و پس قلب میخواهد که بزودی خود را از خون خالی کند لند از و در حرکت میکند پس نبض سریع میگردد و تا اینکه  
 ازین تحریک قلب مانده می شود و ضعیف گشته از حرکت باز ماند و مریض هلاک می شود و علاجهش آنست که فوراً بیمار را از زیر  
 آفتاب در سایه آزند و مشک های آب سرد بر سر آن ریزند و بذریعه مر و حر که دانی هوای سرد و برابر به بیمار رسانیده باشند تا بهوش  
 آید و اگر بهر دست آید بر سر بیارند و چون بیمار بهوش است لند باید که بذریعه سون بر جلد باز و یاران از جانب دخی  
 بدن سلائق کینین در بدن رسانند تا جوش خون کم کند و بر ساقین پاشند از پیش کس نمند تا بسبب افیت آن خون بسوی  
 ساقین زیاد آید و بسوی داغ کم رود و اگر ازین تدبیر هم بهوشی باقی ماند بر صغین غلق چنانکه خون حسب مناسب از  
 داغ کم کند و سهیل قوی مثل روغن حسب السلاطین بخوراند زیرا که او قوی ترین مسهل است اگر چه در صده بسبب  
 بیوشی فرو رود و لیکن بسبب بالیدن بر زبان هم بذریعه سیوکس مبرن دمان که متصل به صده است اثر آن تا صده خواهد رسید  
 و اسهال رقیق که درین وقت مطلوب است خواهد کرد و احتیاطاً تا تنقیه سازند و بهتر آنست که موافق نسخه های احمقان حاده که در کتب  
 عربیه اند و اطباء کمالین وقت بیوشی آنها را با استعمال می آرند تنقیه احتیاطاً فرمایند تا نهایت از خون جدا شود و از آن جوش  
 خون کم گردد و اگر صغین قلب ریه نبض ظاهر شود و از آن دانسته شود که قلب ضعیف شده قریب است که از کار خود باز ماند  
 و بیمار هلاک گردد آن زمان شراب برانندی با ایمنی کار بنارس آینهخته بنوشانند و اگر مریض مجتنب از شراب باشد یا میوینا  
 کار بنارس پنج گرین تنها با آب ساده حل کرده بنوشانند و چون در عالم بیوشی اکثر بول در شان جمع میشود و از آن چار و ازیت پاشند  
 خصوصاً در ابدان عبله استلای شان از بول کمتر ظاهر میشود یا آنکه بول در شان پیدا شد لند باید که درین وقت ضرورتاً قی  
 در شان اندازند تا اگر بول باشد خارج شود و اگر نباشد هیچ ضرر از او خال تا تا طیر تصویب نیست و هم از قی صدام صدام علی  
 صداعی است که از ضعف داغ عارض میشود و علاقهش آنست که بعد از استفراغات کثیره و امراض شکم قوت و دیگر بسبب

در این وقت باید که سهیل بعد قی دهند و قبل آن چنانکه مجرب قی کافی شود حاجت سهیل نیافتد فقط و گاهی درین صداع اترقی و قتیکه هواز یاده گرم بود مریض دفعه بیوش شده می افتد و نفس آن غلیظ می باشد مثل نفس صاحب سر سگ و آن جوش خون بود که دفعه عارض میشود و بسبب آن در داغ خون زیاد جمع میگردد و از آن درم قلیل در نفس داغ و اغشیه آن پیدای شود و حرکت نبض در اول مرض قوی و بطی پیدا میشود و در آخر مرض سریع و ضعیف بود زیرا که درین مرض چون در خون جوش عارض میشود لند از بر نفوذ گوش راست قلب و در هر دو شریان که از آن خون بریده و بدن میسر خون بسبب کثرت خود بنجد میگردد و پس قلب میخواهد که بزودی خود را از خون خالی کند لند از و در حرکت میکند پس نبض سریع میگردد و تا اینکه ازین تحریک قلب مانده می شود و ضعیف گشته از حرکت باز ماند و مریض هلاک می شود و علاجهش آنست که فوراً بیمار را از زیر آفتاب در سایه آزند و مشک های آب سرد بر سر آن ریزند و بذریعه مر و حر که دانی هوای سرد و برابر به بیمار رسانیده باشند تا بهوش آید و اگر بهر دست آید بر سر بیارند و چون بیمار بهوش است لند باید که بذریعه سون بر جلد باز و یاران از جانب دخی بدن سلائق کینین در بدن رسانند تا جوش خون کم کند و بر ساقین پاشند از پیش کس نمند تا بسبب افیت آن خون بسوی ساقین زیاد آید و بسوی داغ کم رود و اگر ازین تدبیر هم بهوشی باقی ماند بر صغین غلق چنانکه خون حسب مناسب از داغ کم کند و سهیل قوی مثل روغن حسب السلاطین بخوراند زیرا که او قوی ترین مسهل است اگر چه در صده بسبب بیوشی فرو رود و لیکن بسبب بالیدن بر زبان هم بذریعه سیوکس مبرن دمان که متصل به صده است اثر آن تا صده خواهد رسید و اسهال رقیق که درین وقت مطلوب است خواهد کرد و احتیاطاً تا تنقیه سازند و بهتر آنست که موافق نسخه های احمقان حاده که در کتب عربیه اند و اطباء کمالین وقت بیوشی آنها را با استعمال می آرند تنقیه احتیاطاً فرمایند تا نهایت از خون جدا شود و از آن جوش خون کم گردد و اگر صغین قلب ریه نبض ظاهر شود و از آن دانسته شود که قلب ضعیف شده قریب است که از کار خود باز ماند و بیمار هلاک گردد آن زمان شراب برانندی با ایمنی کار بنارس آینهخته بنوشانند و اگر مریض مجتنب از شراب باشد یا میوینا کار بنارس پنج گرین تنها با آب ساده حل کرده بنوشانند و چون در عالم بیوشی اکثر بول در شان جمع میشود و از آن چار و ازیت پاشند خصوصاً در ابدان عبله استلای شان از بول کمتر ظاهر میشود یا آنکه بول در شان پیدا شد لند باید که درین وقت ضرورتاً قی در شان اندازند تا اگر بول باشد خارج شود و اگر نباشد هیچ ضرر از او خال تا تا طیر تصویب نیست و هم از قی صدام صدام علی صداعی است که از ضعف داغ عارض میشود و علاقهش آنست که بعد از استفراغات کثیره و امراض شکم قوت و دیگر بسبب



منصفه عارض میشود از ادنی سبب صداع عارض گردد و علاجش آنست که اول سبب ضعف دریا قوت بر رفع سبب کوشند پس بعد  
تدبیر مقوی بعمل آرند مثل اینکه آب آهین و کینین با هم اینقدر بنوشانند و بر نوشانیدن روغن جگرابی همراه شیر ماده گاومد و مست  
نمایند و اغذیه جیده مقویه و آنچه مقوی بدن باشد از قسم دو و غذا بخوراند و صداعیکه از قوت حس و داغ افتد علائمش  
آنست که تبخیر ناپذیر بخوراندن اغذیه غلیظه و نوشانیدن ادویه محذره مثل اکثر اکثرا کث باسی سائمس پنگه گین و مارشادیکه  
حصه گرین و کلورل باشد ریث از بست گرین تا چهل گرین پس ازین ادویه بتفریق یکیک دو و بنوشانند و بر نوشانیدن دو و  
اکتفا نمایند و هم ازین است صداعیکه سبب وقوع سده در شرا این جوهر داغ عارض میشود و آن قریب اقسام سرسام است  
و لا علاج است و ازین است صداعیکه از ترغزع داغ می افتد و این بر رسیدن صدمه ضرب و سقوط حاصل میشود و آن بدو  
وجه بدماغ میرسد یکی آنکه صدمه ضرب بواسطه از پیش و پس بدماغ رسد مثل آنیکه کسی از پشت دست یا چوب دستی و غیره بر سر  
صدمه ضرب رسانند یا انسان از طرف راس از آسیب یا گد ام بلندی بزیاده افتد دوم آنکه از بلندی از طرف اعضای دیگر بر  
افتد و بواسطه اعضای متقلبه بشارکت عصب صدمه سقوط بسر رسد و از آن در راس ترغزع واقع شود با کجمله مراتب  
صدمات در زیادتی و کمی مختلف می باشد یعنی صدمه در هر مرتبه خود صورت آفتی میشود مثلاً اول آنست که بدن صدمه فیل سیر  
از آن پیش چشمان تیرگی و بدحواسی و دوران سر حادث می شود لیکن بعد مدت سیسریا بحالت صحت اصلی خودعود میکنند دوم آنیکه  
بعد رسیدن صدمه ضرب یا سقوط حواس درست باشند لیکن ممکن نبود که بزحمت راه رود و اگر بر پیچیدگی افتد با بعد از آن قایل  
صحیح می شود و این هر دو محتاج علاج نکشاند و سوم آنیکه بعد رسیدن صدمه می افتد بیهوش شده در عالم بیهوشی میماند  
و جلد بدن سرد می شود و نبض ضعیف میگردد و مردک چشم ضعیف می شود و گاهی بول و برابری اختیار خارج میگردد و چون با آواز  
بلند کلام کنند آن وقت قدری متنبه شود و باز بیهوش گردد و این اول حالت ترغزع قوی است که بعد رسیدن صدمه یا زخم  
بدماغ عارض میشود و بعد این حالت آنچه عارض شود آنست که بدن گرم شود و نبض قوی و سریع میگردد و در دوسر شدید عارض  
میشود و یقینی قی می آید زیرا که بزرگوه عصبه کاکشاک عصبه سیسی طیک چون اثر صدمه بجهه میرسد محدوده کمزور میشود و از  
کمزوری خود آنچه در آنست آنرا بقوی دفع میکنند و بعد آمدن قی اگر کدام ضرب بدماغ نرسیده و داغ منصفه نشده باشد  
صحت می شود و اگر در داغ انصراف واقع شده باشد انجام آن بر بود زیرا که کدام حاسه از حواس ظاهره که شامه و  
سامه و باصره و ذایقه و لامسه اند باطل می شود و چون ترغزع از صدمه افتاد که از بالا بر آمده باشد رسیده باشد  
و از آن خاصه صورت راست و قوت در حسیه پیدا می شود که لایق مباشرت از زیادتی ضعف که خود نمی ماند و ایضا از بد انجامی آن  
آنست که بعد صحت هم حس و داغ زیاد می شود و بدانی سبب بشارکت صدمه و دیگر اعضای بدن در دوسر عارض میشود و هم  
از بد انجامی این انصراف آنست که بعد بیهوش آمدن باز علیل بیهوش می شود و در آن اکثر اکثرا یک میگردد و سبب آن  
آنست که چون بر رسیدن صدمه عروق و شرا این متصدع میشوند پس تا وقتیکه بیهوش است خواب در داغ کم میرسد

انصداع زیاد نمی شود و دهن زخم کشاده میگرد و چون در عالم بیهوشی خون در دماغ رفته رفته می آید تا اینکه گرمی پیدا شود و از آن بیهوش آید و حرکت کند از آن زخم شرايين و عروق کشاده می شود و خون از آنها جاری شده و در دماغ مجتمع گردد و از آن دماغ منقبض می شود و مرض دیگر از آن که سکت است پیدا شود و باز بیمار بیهوش میگردد و علاجه اش آنست که اول امر که بیهوش است و سر و بدن سرد بوندانش بر بدن و سر کنند و لباس گرم بپوشانند و اگر ممکن بود که چیزی بنوشند مطبوع جای گرم بنوشانند و اگر نوشاندن ممکن نبود ایونیا و ایسور آب حل کرده بذریعه زراقه بلور اشقان در شکم رسانند و که ای تیراب بپوشانند و اگر از این هم بیهوش نیاید بمقابل تسکیم یا متقابل قلب یا استر از خردل نهند و مالیت دقیقه نماده دارند و در مرتبه ثانیه هرگاه گرمی بر بدن و سر ظاهر شود و بیهوش آید سهیل قوی بنوشانند زیرا که درین وقت خوف عرض سرسام است پس بذریعه سهیل تقلیل رطوبات از خون ضرر است تا خون کم گردد و اگر بعد سهیل نبض قوی شود بر صدغین زخم سپانیده خون از دماغ بر آید بعد کلول دو گرین یا بل پدید آید از سکه گرین تا پنج گرین بعد چهار ساعت بنوشانند تا که تلاح ظاهر شود یا شاید بر طرف شوند زیرا که این تدبیر برای محفوظ ماندن از سرسام است پس اگر بعد یکدوبار از خوراندن این دوا در سر رود و خواب آید ضرر نیست که جوشش دهن پیدا کرده شود اما اگر دانسته شود که سرسام قریب است درین وقت تدبیر پیدا کردن جوشش دهن ضرر است و آن نیست که کلول خوراند و هر هم سیاب بر هر دو بغل و کش ران و بر صدغین و پس گوش بالند و غذا کم دهند و بعد رادر مکان خالی تنها با آرام دارند و از شور و غوغا محفوظ دارند چون بعد صحت یابند که بار بار در در و سر مبتلا می شود و خواب کم می آید و از آن ثابت می شود که دماغ از ادنی سبب متضرر میگردد و در میگرد و غالب است که بعد یکدوماه باز بیمار خواهد شد درین وقت ادویه محذره مثل بروماید پیاس و کلورل یا پیتر ریست همراه آب بنوشانند و وقت شب مار فیا خوراند تا خواب بخوابد و اگر در که ام حاسه ضرر آورده باشد و بعد حصول صحت ظاهر شود در پی علاج آن نشوند که لا علاج است آنچه نقصان شدنی بود شد و آنچه در سر که بسبب آده آتشک عارض میشود این هم اصلی است و سببش آنست که استخوان راس گاهی از جانب خارج و گاهی از جانب داخل راس زیاد و متورم و مرده میگردد و همچنین ام غلیظه غشای خارج راس زیاد و غلیظ شده اعصاب را غمزه میکند که بسبب آن در سر پیدای شود و علاقه اش آنست که جایی که در بود آنجا زیادتی و سختی محسوس شود و علامات آتشک موجود بوند و علاجه اش علاج آتشک است و برای آید دهن خواب بانی و ریٹ کلورل بنوشانند و هم از اقسام در و سر اصلی آنست که بسبب دیدن که در عظم پیشانی قریب عظم پیشانی پیدای شوند حادث شود و علاج آن در امراض الفه مذکور می شود و از آنجا جویند و هم از آنست که در کام نیز حادث می شود و علاج آن علاج زکام است چنانکه آئینه نوشته خواهد شد انشاء الله تعالی فصل ششم در سرسام و آنرا بلغت گریک و لاطن ملتری برومن انجیلش یعنی در رم غشیه و نفس و دماغ

کلیه سی پیشانی  
نفیج بین چشمه  
که راسه سینه

وسکون باس  
بین پیشانی و کمر  
باسه سر و دهن

خبر راسه سینه  
وسکون و از کمر  
باسه سر و دهن

الفت و سکون  
و سنجیم و سکون  
قوة غشای

در کمر و کمر  
قوة غشای  
قوة غشای

قوة غشای  
قوة غشای  
قوة غشای

گویند و آن عبارت است از ورم آغشیه و اعصاب استخوان راس و ورم نفس و مانع لیکن باید دانست که از آغشیه ناشی شده و  
 و غشای رقیق همراه ورم نفس مانع متورم می شود و ام غلیظ تنها و مستقل هم متورم می شود و جالینوس ورم آغشیه را  
 سه سام میداند بالجله ورم ام غلیظ اکثر بسبب رسیدن صدمه ضرب و سقوط عارض میشود و گاه گاه بسبب امراض دیگر  
 اعضا هم حادث می شود پس اولاً باید دانست که آنچه ورم ام غلیظ که بسبب رسیدن صدمه ضرب و سقوط اکثر حادث می شود  
 آنرا سبب بود اول اینکه از رسیدن صدمه استخوان راس نشکند و بعضی اجزای آن در غشای مذکور فروزند که از  
 فشار شکافته شود و ورم آنکه بسبب صدمه ضرب غشای استخوان جدا شود و باین سبب در غشای جراحت حاصل شده ورم  
 پیدا کند سوم آنکه استخوان راس از صدمه ضرب متورم شده ورم آن غشای معلوم رسد و از آن غشای متورم شود و ورم  
 این ورم از امراض اعضای دیگری امتداد می یابد از آنجمله است که از لوله آتشک این غشای متورم شود و لیکن این ورم گاهی از  
 استخوان تا غشای زبانی از غشای استخوان بخدی میگردد و هم از آنست که از بعضی استخوان راس استخوان راس متورم  
 شود و این غشای متورم شود و هم از آنجمله است که از ورم غشای اندرون ثقبه گوش این غشای متورم می شود و اکثر این ورم  
 وقتی حادث میگردد که از ورم اندرون ثقبه ریم خارج میشد و کسی بنادانی آنرا نبند کرده باشد بالجله هرگاه از ضرب این  
 غشای متورم شود علامتش تا وقتی که مریض از صدمه ضرب بیوش باشد آنست که مریض بیوش بود و تب و سر غشای  
 و اثر ضرب ورم ظاهری آن در جلده بر ظاهر بود و چون تهر یا میسر از درون غلیظ داشته بهرینند بالضروری که باب از درجه بود و  
 هشت متجاوز باشد چون فی الجمله بیوش آید شکایت در سرد شدن نماید و گاه گاهی هم آید و بیوشی مضطرب باشد و کل  
 راس و سرخی چشمان و نشوونده زبان ظاهر باشد باز چون بعد افاقه فی الجمله مریض زیاده شود باز بیوشی عارض گردد و تب  
 زیاده شود و حرکت شریان که عبارت از نبض است واقع فی الواسطه بود و در کلام او باینان بود و اگر ورم آن بیتب  
 اعضای دیگر مثل آنکه از بعضی استخوان و از آتشک و از ورم غشای اندرون ثقبه گوش بود پس این ورم در اول امر  
 خفیف و علامات آن خفی بودند حتی که تشخیص آن دشوار باشد و اکثر همین مضمون شود که در سرد شری است و بیوشی تیز  
 زیاده شود و خواب نمی آید آنا بخار و در دست و در حال باشند لیکن هرگاه با بخار و ایچی و در دست و پا بر تیره رود آنکه کیده بار  
 آید و همراه آن بعضی استخوان یا آتشک یا ورم غشای اندرون بود و باشد از آن دانسته شود که این جمیع بالمره علامت شروع  
 ورم در غشای ام غلیظ است چون ریم و میان ام غلیظ و استخوان راس پیدای شود آن زمان بمقابل آفت وضع  
 بیرون استخوان راس در جلده برآمدگی پیدای شود و جلده بر غلیظ میگردد و بسبب پیداشدن ریم درین موضع علامت  
 اول بر محل ضرب آب سرد یا برن یا آنچه سرد بود و بگذرد وقت این تدبیر آنست که هرگاه چهار شکایت شروع شدن  
 در سرد نماید و از دیگر علامات حاضر ثابت شود که ورم غشای شروع میشود یا قدری شروع شده بعد آن سهیل قوی دهند  
 تا با ایست از خون جدا شود و خون از دماغ بگذرد و فصد یا تعلیق خلق بر آرد و کلوبل و گرین یا پل هیدراج سکه گرین

بعد چهار ساعت بخوراند تا دهن جوش کند که ازان سوزش و درم دماغ بر طرف خواهد شد و برای دفع کردن جوش خون کینین  
از پنج گرین تا ده یا بست گرین بخوراند و برای آوردن خواب و در فیا وقت شب از چهارم حقه گرین تا نصف گرین بخوراند و  
غذا کم دهند و باید دانست که این علاج عام برای درم غشائی است که در هر قسم آن اول توان کردن بعد علاج خاص  
موافق هر سبب خاص نماید مثلاً آنچه بسبب درم غشائی اندرون ثقبه گوش بود و تپش است که اول علاج عام  
درم غشائی دماغ که تنقیه ماده موزمه بقصد و اسهال است و سپید کردن جوش آن و تقابیل غذا است فراغ حاصل کرده و  
ریسمان گوش جاری کنانند که جنس آن پورث و درم غشائی بود پس برای آن پلاستر از شیش کس پس گوش نهند یا عرق میش  
گس آن نجایانند آب گرم کمال آهستگی بذریقه ذراقه در گوش رسانند تا ریسمان ملایم شده جاری شود و آنچه درم غشائی از تقض  
استخوان سپید شده باشد در آنهم اول علاج درم غشائی دماغ که اول مذکور شده از نوشانیدن سسل و بر آوردن خون بذریقه  
فصد یا تخلیق علق و غیره به بیند که چون درم در جلد راس آمده باشد که ازان تقض استخوان و تولد ریسمان ثابت شود  
محلول آهکی را از نشتر کشاده استخوان راس را با له خاص که منشار بریدن استخوان راس است قطع کرده ریسمان را از سر  
بیرون کنند و آنچه درم غشائی از آفتاب سیه باشد در آن هم بعد علاج عام که مذکور شد خصوصاً تپش و جوش آن و باید یاد کرد که  
پنج گرین تا ده یا بست گرین بعد چهار ساعت همراه مطبوخ عشبه بنوشانند و گاهی همراه درم ام غلیظ غشائی  
موسوم بام قیق و غشائی پایه پیرو هم نفس دماغ متورم میشوند و این وقت همان تدبیر عام که نوشته شده کافی میشود و گاهی  
ام غلیظ صحیح میباشد ولیکن نفس دماغ و هر دو غشائی رفیق همراه آن تورم میشوند پس هر گاه رفیق و پایه پیرو و دماغ  
بدون درم غشائی غلیظ متورم میشوند پس سبب آن یکی ازین اسباب میباشد بخار هر قسم هر گاه زیاده شده جوش غشائی  
پیدا کنند و جدی و قصبه و تپش را یعنی سرخ باوه و راه دفع در آفتاب گرم و نوشیدن شراب زائد و کشیدن و خان گانجه  
و بخور دهن متورم و تنگ و رسیدن فایبرین بخار از درم غشائی داخلی قلب یا ریسمان از وسیله جگر یا به جگر و بدان درم پخته شده ریسمان گردد و  
با خون مختلط شده بدماغ رسد و بزرگندان اطفال پس پاشیدن و میان کبک و در اسهال و شکم سپید شدن و بر کل و خون  
و سپید شدن درم غدوی در استخوان راس و در نفس دماغ و گاهی بسبب مرض کرده هر گاه آن از فعل خود یا از خوردن  
پیدا کنند هم سرسام عارض میشود و هر یک ازین اسباب سرسام پیدا میکنند علامت این مرض اگر به حالت انقباض  
پس ضرورت است که از ابتدای ظهور مرض تا آخر حیات سه مرتبه آن باعتبار زمانه مرض بیاشنند و در هر زمانه و مرتبه علامات  
مختلف میباشد پس در اول مرتبه بخار زیاده بود بعد آن در درم شدید شود و گاهی غشائی هم میباشد و بسبب آن  
قی می آید و در درم می باشد لیکن بی سبب ظاهر در آن زیادتی و کمی ظاهر شود و از دیدن روشنی و نور شمس  
علیل متناذی گردد و در کلام او بزیان بود و چون مریض طفل بود پس وقت زیادتی در درم طفل میگردد و صلیح  
میکند و اگر قدری ساکت شده بخواب رود در عالم نوم صریحاً استخوان عارض شود و سر خود را چپ و راست حرکت



باروغن دندانها و غایبها بر آن اضافه نموده احتقان سازند و مویهای سر و در کرده اشیا را باره بر سر زنند مثل برف  
یا آب سرد و سرکه یا عصاره حشائش باره تا که جوش خون کم شود و کلو بل با انیون بخوراند یا پیل سید را ج غور  
تا دهن جوش کند و از آن سوزش و مانع بر طرف شود و کین خوراند اگر بیوش نباشد و الا بد زلیه ز راقه سوزنی در بدن  
رسانند چنانکه پیشتر بحث صداع طریق آن گویند و اگر مرض طفل باشد تدبیرش اینست که یک زلور صداع یا خلف  
افون چسباند و در آب گرم طفل نشاند آب سرد بر سرش ریزند و اگر طفل اسهال مبهیب بروز داند شده باشد  
لش را از نشتر بکشایند و کلورل یا میثریث قدری قدری از یک کرین تا دو کرین بطفل نوشانند تا اگر ام خوراید و اگر انقیص  
سرم بروزدی رفع نشود از آن مرض عظیم شدن راس بطفل عارض میشود و در آن آب در سر زیاد جمع میشود و آنچه در  
کانه سر از هم جدا میشود و سر بزرگ میشود و آن لا علاج است طفل را بآن بکند و اگر از دیدن بود که در شکم پیدا شده  
بعد علاج عام یک روز به بار سائونان حسب مناسب خورانیده روز دیگر هیچ با سهل مناسب مثل روغن بیدارنجیر باز  
سینونان آمیخته بخوراند تا گرم از شکم خارج شود لیکن باید که هرگاه سینونان نوشانند قدری سو داهم همراه آن  
آمیزند و اگر بسبب کرده بود بعد علاج عام سرم دماغی ادویه دره نوشانند و پلاستر از خردل درست کرده بر محل کرده  
چسبانند و تابست دقیقه دارند و گاه گاه این تدبیر را مکرر بعمل آورده باشند و چون از خوردن شراب بود بعد سهل و فصد  
قدری شراب همراه سیون نوشانند تا تقویت دماغ کند فصل چهارم در دوار یعنی دوران سر و آنرا بخت  
لاش و درتی گویند بکسر و او بکون را بر سر و کسرای ثناء و ثنائی و سکون یا میثایه تخانی و فتح کانت فارسی و سکون  
و او و سبب آن اینست که آنچه دوران خون همیشه در بدن و دماغ میماند و سبب آن صحت محفوظ میباش  
در آن فرق داتی شود و آن اصلی و شرکی میباشند اصلی آنست که سبب زیادتی و کمی خون یا از آن سختن صفا با خون حادث  
شود چنانچه بامرض یرقان بود و شرکی آنست که تبی امراض دیگر اعضا مثل امراض قلبیه یا معده چنانکه در بعضی طعالم  
میشود یا یا لخیل یا امراض رحمیه یا صرع حادث شود علامت این مرض آنست که دوران سر بود خصوصاً وقت نشستن  
و برخاستن و راه رفتن و هر چیز بنظر صاحب آن متحرک بجرکت و وریه محسوس شود و چون این دوران زیاد شود پیش  
چشمان تاریکی محسوس گردد و بعد آن بیماری افتد یا حالتی قریب به سقوط عارض شود و آنچه از این مرض شرکی بود در آن  
حدوث دوران اندیشه نباشد اما دوران اصلی بسی خوفناک است چه خوف درین آنست که بعد این مرض فالج یا سکت  
پیدا شود و از آن بپایمیرد علاج اول تفرقه در اصلی و شرکی کرده بعد تفحص سبب نمایند پس بعد دفع سبب که مثلاً  
هرگاه سبب اصلی زیادتی خون بود فصد گیرند یا بر مدغین زلور چسباند و بر خلف راس محجمه یا بشرط زنند بعد سهل  
و دهند از آنچه مقلل دم و مبروست با خراج رطوبات و موی مثل سگیشا سلفاس و غذا کم دهند و آنچه از کمی خون باشد  
در آن ضد آن بلبل آزند یعنی غذای خوش خوراند و تدبیر بولد دم بلبل آرد مثل اینکه کین و آب آهین در روغن

در دوار

جگرهای بنوشانند و آنچه از این چنین صغرا با خون که در ریه قان میباشد بود در آن تبسبیه تصفیه جگر بر داند مثل اینکه  
 مسهل هندی از کلومل همراه در بر بیا سقوف جیلپ بنوشانند یا آنچه مسهل مناسب دارند بنوشانند تا جگر صاف  
 شود پس بعد برای تصفیه خون مدرات دهند و در انقسام دوران شرکی بسوی علاج اصل امراض چنانکه تبدیل  
 هر یک مسطور است متوجه شوند و دادن مسهل در اکثر امراض شرکیه و دماغ ضرورت و منفید میباشد فتنه کسرا  
 فصل پنجم در سبات و آزاد رفت انگش نام نویسنده هم گویند فتنه کسرا و سیوشتی رسد میگویند و ان فتوح سین مملکون  
 الف ویم وضم نون و سکون واد و کسر لام و سکون نون و سین مملک و باضم کات و سکون واد و فتح ویم و سکون الف است  
 و آن عبارت است از نوم ثقیل ویک که ابتداء آن دشوار باشد و آنهم علامت است که در اکثر امراض یافته میشود و حاصل  
 سببش متضرر شدن جسم سودست از دماغ که از ان ادرک و ثقل میباشد و این یا بسبب افتخار دماغ بود که از  
 زیادتی خون یا زیاده شدن آب در دماغ حادث شود و گاهی این متضرر از رسیدن اجزای سمیه مخدیره تا دماغ  
 حادث میشود و شکل یکد افیون یا ای سانس یا البسکلا را فام را زیاده با استعمال آرو ویم از زیاده نوشیدن شراب  
 سبات عارض میشود و کاک هرگاه به اینچون بخوبی نرسد و اجزای سمیه در خون باقی مانده چنانکه در بعض امراض  
 صدری شود سبات عارض میگردد و کاک از آن نیز منفسه با خون در سین آن در دماغ چنانچه در ریه قان  
 بود هم خواب زیاده عارض میشود چه کار صغرا در دماغ نیست و هم چون صغرا با خون مختلا شود خون کمزور میگردد  
 و بسبب آن غذای خوش بدماغ نیز رسد پس دماغ ضعیف میگردد و جسم سودا کار خاص خود که ادرک است قاصر میشود  
 و بار مانده خواب چنانست که در ان حواس از ادراکات خود باز ماند و همچنین هرگاه گرمی زیاده میشود و نوم غالب میگردد  
 چه از ان خوش خون پیدا میشود و از ان دماغ منضغط میشود و همچنین هرگاه سردی زیاده میشود و برف زیاده بارد  
 از ان هم خواب زیاده میشود چه از ان آب زیاده متولد شده دماغ را تنگ میکند و گاهی بسبب هم ام قتی آب  
 در دماغ زیاده میخورد و این را اطباء وقت بر وزن ان پیا میشود و در پسران هرگاه دماغ طامع و کثرت شود  
 آن زمان این ورم پیدا میگردد و ولیکن این ورم حاو با علامات سرسام نمیباشد بلکه مزمن و سرد  
 بود و از همه این اسباب سبات پیدا میشود و در عرض سکت هم خواب ثقیل عارض میشود و از زیاده خوردن  
 هم خواب زیاده میشود و در بخار هم گاه گاه خواب زیاده عارض میشود و علامات آنچه بسبب افتخار دماغ از زیادتی  
 خون باشد در ان ثقل دماغ و سرخی چنان و علامات و قوت نبض و در ریه و دماغ میباشد و  
 آنچه بسبب زیاده شدن آب دماغ باشد در ان هم ثقل دماغ نبض ضعیف و بطی بود و در بدن آثار کمزوری  
 ظاهر باشند خصوصا هرگاه بیمار پیر باشد پس بسبب کمزوری سید کشیدن الف و عین از چشمها و بینی آب  
 جاری باشد و تکلم صاف نبود و تمام بدن ضعیف بود و چون در دماغ طفل آب زیاده گردد و در ان وقت







و هم هرگاه سوای دماغ در اعضای دیگر امراض بودند و ازین آن بزرگه اعصاب دماغ رسد بخوابی عارض میشود  
و هم از بدنه منی بعد خواب منی آید علامات هرگاه از غلبه خون در دماغ بود علامات غلبه دم موجود بود چنانکه کمر گرفته شدند  
خصوصاً باسر نقل راس و سرخی چشمان و در دماغ خاصه یافته شوند و آنچه از کی خون بود در آن علامات گرمی  
و ضعف باشند و آنچه بسبب محنت و فکر زیاد و یا بخوابی و به سبب اشتغال با امور همه عارض شود در آن وجود خود این امور  
و هم نبودن وجع در کدامی عضو از اعضای بدن و کثرت فازه و قلع و کرب بیمار دلالت خواهند کرد و آنچه از زیاده شرب  
شراب و خوردن تنباکو و نوشیدن افیون و چای و کافی و غیره بود در آن تقدم اسباب مذکوره دال بود و آنچه از گرمی  
و سردی باشد بر آن موجود بودن گرمی و سردی شاید بود و آنچه از امراض اعضای دیگر و بعضی طعام بود در آن وجود  
امراض اعضای دیگر شاید خواهد بود علاج آنچه از جوش و غلبه خون بود در آن تعلیق یک دوز لو کافی است بعد  
ریز این آب سرد بر سر و بطن قطعه برت بر آن مفید است و اگر ازین تدبیر بر طرف نشود مسهل قوی دهند تا مالیت با سهولت  
خارج شده جوش خون کم شود و آنچه از کی خون باشد در آن تدبیر مولد دم بکار برند و آنچه از مالینولیا و کثرت فکر بهم رسیده  
باشد در آن مارقی یا کلورل یا ایڈریٹ و برو یا ایڈریٹ یا سیم خورند و نوشانیدن یک دوا و انس از شراب درین حالت  
معیین بر آن خواب می شود خصوصاً شرب آب بیکه در آن قسمی از بنگ که آنرا هولیس گویند میباشند زیاده مفید است  
چه آن منوم است و آنچه بسبب شرب شراب باشد در آن شرب شراب موقوف کرده عوض آن شور با می لحم بار بار  
بعد یک دوساعت بنوشانند و کلورل یا ایڈریٹ و برو یا ایڈریٹ یا سیم یا آب حلکده بنوشانند و آنچه از زیاده نوشیدن افیون  
بود آنرا بتدریج کم کنند و برای آوردن خواب کلورل یا ایڈریٹ یا آب حلکده بنوشانند و آنچه از چای کافی و خوردن  
تنباکو باشد در آن شرب آب این اشیاء را خوردن و نوشیدن نهند بلکه آب سرد قریب خفتن بنوشانند و اگر از آنهم  
خواب نیاید کلورل یا ایڈریٹ خورند و آنچه بخوابی از در و کلام عضو بود در آن بعد علاج در عضو مذکور کلورل یا ایڈریٹ  
یا آب حلکده بنوشانند و آنچه از زیاده گرمی و سردی بود در آن تسخین و تبرید مکان علیل کنند و جایگه از گرمی است  
بیمار را در مکان سرد داشته بر وجه گردانی تبرید هر چه کنند و آنچه از سردی است در آن بیمار را در مکان گرم نقل کنند  
یا در آن مکان آتش افروخته گرم کرده و تا گرم به علیل بنوشانند و آنچه از شاکت امراض اعضای دیگر باشد در آن  
علاج اصل مرض کرده برای آوردن خواب مارقی یا ای سائیس یا کلورل یا ایڈریٹ همراه آب به بیمار بنوشانند و  
کلار فارم بویانند و آنچه از بدنه منی بود در آن تی کنند و علاج بدنه منی نمایند و اگر بعد آن هم خواب نیاید مارقی خورند و انقیاء  
برای بخوابی علاج عام نیست که خیال خود را بسوی چیزی که واحد باشد مثل چوب واحد متوجه سازند که از آن  
بعد مدت بسیار مانده شده خواب می آید انقیاء چون خواب نیاید نظر را بسوی بالا بلند کنند و متعلق چشم را چشم بند کرده  
هم بسوی بالا راست دارند و بر همین نسبت چشم را خیره بکنند و یا کشانند متعلق را بسوی بالا متوجه و بلند دارند انقیاء

تجرباتی از خوابی خارجی را در یک کشنده و از آن بخوبی بر آنند که او از حروف حلقی است بعد الف و ای بفتح الف و سکون یای شناه  
 بحسانی و ای بکسر الف و سکون یای شناه تحتانی و اضم الف پیدا شود لیکن خیال دارند که او از اضم الف و سکون  
 و او پیدا نگردد چه ازین حرکت در عضلات حرکات متعده پیدا شده بیداری پیدا می شود ایضاً چون بیداری  
 ماند خواب نیاید کتابی را از کتب علمیه در مطالعه آرند لیکن خیال این امر ضرور است که کتاب مذکور هیچ نباشد  
 که از آن اوست دماغ زیاده شود مثل کتب افسانها و قصص و غیره فصل پنجم در نسیان یعنی فراموشی بدانکه  
 نسیان در کتب طبیه عربیه بطور مرض مستقل مذکور است و فی الواقع آن علامت است که در امراض عدیده  
 یافته می شود لیکن در یک مرض دماغی همیشه بطور عرض لازم دیده شده لهذا آنرا از اجزای نسیان نوشته می شود  
 و آنرا از زبان انگلیش دومی پیشانی می نامند و درین مرض در قوت ذکر و عقل و فکر و خیال فساد بطور نقصان یا بطلان  
 باعتبار درجات آن واقع میشود بسبب واقع شدن فساد در دماغ هرگاه بسبب امراض دماغیه و جسم اسود نقصان  
 راه یابد و نقصانش این است که جسم مذکور مرکب است از سل های کثیره که از هر یکی شاخهای آمده باشند و سل  
 دیگر متصل شده صورت شبکه در آن پیدا می شود پس گاهی از کدام سبب شاخهای که از سلها بیرون آمده اند فانی  
 میگردد و تلاشی می شوند و درین وقت از زایل و معدوم شدن راه جریان قوت ذکر و فکر و خیال از سلها بیرون  
 نمی آید و در دماغ منتشر نمی شود و از آن نقصان و بطلان در افعال این قوی ظاهر میگردد و گاهی در نفس سلها  
 مذکوره حالت فانی می خیزد بیداری می شود و درین وقت در ذات سل قوت باقی نمی ماند اگر چه شاخهای آنها  
 باقی مانده و درین وقت هم فساد در ذکر و عقل و فکر و خیال پیدا می شود و اسباب آن کثیر اند گاهی بعد بخار و گاهی  
 بعد سرسام این مرض حادث می شود و آنرا این هر دو قسم لایق علاج اند بخلاف دیگر اقسام که آئینده مذکور می شوند  
 بالجملة گاهی بعد مایا افتد و گاهی بعد صرع و وقتی بعد سکت و زمانی بعد پیدا شدن جوهر کل و دماغ و این در اطفال  
 اکثر حادث می شود و هم هرگاه در اعضای دماغیه ورم غدوی پیدا شود خصوصاً هرگاه استخوان متورم شده  
 دماغ را غمگند از انهم این مرض پیدا میگردد و هم از لیسنت دماغ این حالت طاری می شود و گاهی از رسیدن  
 ضرب و زانی از کثرت مباشرت با عورات و هم در زمان شیخوخت نسیان عارض میشود و علامات یاد کم می شود و یا بالکل  
 میگردد و دو قاعاضیه رایج بخاطر ندارد و آنچه بالفعل پیش می آید یا متوقع الوقوع باشد از آن متاثر نشود و  
 هیچ نماند و پروای ندارد و از خوف و خوشی مانند و منغم نشود و هیچ نماند و بی فکر و اندیشه از لذت شکار و قوت  
 زیادتی و قوت این اعراض گاهی مثل صاحب مایا از افعال سرزدی شوند و درین وقت بعضی سرزده و سرگرم  
 و چشمان میبند و این وقتی می شود که هرگاه در دماغ ورم پیدا میگردد و چون از مایا صحت می یابد بعد از نسیان  
 زیاده و علامات آن قوی و شدید می شوند زیرا که از مایا در دماغ زیاده تر نقصان و ضعف عارض می شود و این

فصل پنجم در نسیان  
 نسیان در کتب طبیه عربیه بطور مرض مستقل مذکور است و فی الواقع آن علامت است که در امراض عدیده یافته می شود لیکن در یک مرض دماغی همیشه بطور عرض لازم دیده شده لهذا آنرا از اجزای نسیان نوشته می شود و آنرا از زبان انگلیش دومی پیشانی می نامند و درین مرض در قوت ذکر و عقل و فکر و خیال فساد بطور نقصان یا بطلان باعتبار درجات آن واقع میشود بسبب واقع شدن فساد در دماغ هرگاه بسبب امراض دماغیه و جسم اسود نقصان راه یابد و نقصانش این است که جسم مذکور مرکب است از سل های کثیره که از هر یکی شاخهای آمده باشند و سل دیگر متصل شده صورت شبکه در آن پیدا می شود پس گاهی از کدام سبب شاخهای که از سلها بیرون آمده اند فانی میگردد و تلاشی می شوند و درین وقت از زایل و معدوم شدن راه جریان قوت ذکر و فکر و خیال از سلها بیرون نمی آید و در دماغ منتشر نمی شود و از آن نقصان و بطلان در افعال این قوی ظاهر میگردد و گاهی در نفس سلها مذکوره حالت فانی می خیزد بیداری می شود و درین وقت در ذات سل قوت باقی نمی ماند اگر چه شاخهای آنها باقی مانده و درین وقت هم فساد در ذکر و عقل و فکر و خیال پیدا می شود و اسباب آن کثیر اند گاهی بعد بخار و گاهی بعد سرسام این مرض حادث می شود و آنرا این هر دو قسم لایق علاج اند بخلاف دیگر اقسام که آئینده مذکور می شوند بالجملة گاهی بعد مایا افتد و گاهی بعد صرع و وقتی بعد سکت و زمانی بعد پیدا شدن جوهر کل و دماغ و این در اطفال اکثر حادث می شود و هم هرگاه در اعضای دماغیه ورم غدوی پیدا شود خصوصاً هرگاه استخوان متورم شده دماغ را غمگند از انهم این مرض پیدا میگردد و هم از لیسنت دماغ این حالت طاری می شود و گاهی از رسیدن ضرب و زانی از کثرت مباشرت با عورات و هم در زمان شیخوخت نسیان عارض میشود و علامات یاد کم می شود و یا بالکل میگردد و دو قاعاضیه رایج بخاطر ندارد و آنچه بالفعل پیش می آید یا متوقع الوقوع باشد از آن متاثر نشود و هیچ نماند و پروای ندارد و از خوف و خوشی مانند و منغم نشود و هیچ نماند و بی فکر و اندیشه از لذت شکار و قوت زیادتی و قوت این اعراض گاهی مثل صاحب مایا از افعال سرزدی شوند و درین وقت بعضی سرزده و سرگرم و چشمان میبند و این وقتی می شود که هرگاه در دماغ ورم پیدا میگردد و چون از مایا صحت می یابد بعد از نسیان زیاده و علامات آن قوی و شدید می شوند زیرا که از مایا در دماغ زیاده تر نقصان و ضعف عارض می شود و این

علامات که نوشته شد در بالای سیان صادره قوی اند که گاهی میماند و بعد آن بجز بسوی صحت و یا لاکت علیل میشود و آنچه از  
 مزمن بود در آن ذکر عقل قدری زائل شوند و قدری باقی مانند لیکن روز بروز بدتر و بدتر باطل مزائل میشوند و درین  
 قسم خواب زیاده بود بسبب ضعف دماغ یا زیاده شدن آب در آن دقیقه دماغ لین و رقیق میگردد و بولیموس  
 یعنی زیاده خارش غذا درین قسم میباشد و بیمار را بسوی شستن بدن خود و تبدیل لباس توجه نباشد اگر کسی غسل نکند  
 و بدو لباس پوشاند انکار نکند لیکن غویبیکند چه او نمیفهمد که چرا کمالی بدن و جامه نومست و چون تنهانشند  
 خود بخوابد و کلام میکند و گاهی سگریه و گاهی ضحک میکند و چند روز بسکوت نشسته میماند و رنگ روزی شود و چشمان مکرر  
 پر آب میباشد و همیشه آب از چشمان و بینی می افتد و ثقبه عنیه کشاده میشود و حرکت چشمان بطبی بود و عضلات و هر ستری میشود  
 که از آن بی عقلی و بدحواسی آن ثابت میشود و چون قبض شکم او را پیدا کرد و بعد آن سرگرم میشود و چشمان سرخ و نبض سطح  
 میگردد و در برابر غیظ و غضب پادیه میشود و خواب کم می آید و چون بعد تبه پیر رقیق قبض و جری اسهال آنرا ازین حال صحت  
 میشود و بعد آن علامات سیان مزمن آنچه نوشته شده اند قوی و شدید میشوند و بسبب زیاده شدن ضعف دماغ  
 علاج باید دانست که درین مرض قصد ضررت لیکن اکثر برای دفع کردن گرمی راس محتاج به تقویه دم میشود و چنانکه  
 وقت وقوع این احتیاج بسوی اخراج خون از دماغ میشود پس درین وقت باید که زلو بر صد فین چسباند و سهیل قوی  
 دهند و بعد سهیل چون خواب به شواری آید دماغ را آرام دهند و بخورانی مثل بر دماغ یا سیم و کلورل  
 یا سید ریث و چون این بیمار زیاده در پیش شود یا خواب زیاده آمده باشد و در سر گرمی نبود و درین وقت پلاستر از پیش گیس  
 درست کرده موافق مقدار غلظت بر سر نهند تا وقت داشتن سر بر بالین در نشود و اگر در سر گرمی باشد پلاستر مذکور  
 بالای گردن نهند باقی تدبیر بویست بدن آنچه صحت آور باشد بل آر مثل اینکه اغذیه خوش وادویه مسقویه خوراند و چون درین مرض  
 از بی خبری علیل اکثر بول و بزور شانه و اسما جمع میباشد انداختن خیال دارند که هرگاه از وقت متاخر و اندک آن باز تاخیر نمایند  
 باو حال قاتل طریقه متعاقب مثانه و اسما خالی کرده دهند و آنچه از سیان مزمن باشد در آن مقویات بدن خوراند و صلاح  
 تدبیر سه ضروری فرمایند اما هرگاه شکایت درد سر گرمی دماغ کند آن زمان سهیل قوی دهند و پلاستر از پیش گیس  
 بگردن نهند بعد دوائی منتهی خوراند و انجام این مرض به ترتیب فصل ششم در الجوزیا و از احاطه الینوس  
 بمنت که یک یک گویا بعضی غلط اسوکه غلط بود و ام نهاده بود و این تسمیه پیش شان بطور تسمیه مرض با هم سبب بوده و آن  
 متغیر شدن ظنون و فکر است بسوی فساد و خوف و سبب آن کمتری آن و ضعف دماغ است و حدوث آن از اکثر اسباب میباشد  
 و بیشتر بعد مانها و بعد کمالی حاد و بعد سرسام و بعد منال شدن مان با بجمه از غموم و هم نهاده حادث میشود و همچنین از جلق  
 زدن و زیاده با شربت با عوارات کردن و از زیاده مختل و شفت و زیاده بیداری و آنچه حدوث ضعف دماغ و کمزوری بود  
 از آن حدوث این مرض ممکن است و اکثر این مرض بچرانان و مردان و کبار عارض میشود و بچرانان و پیران کمتر عارض

فصل ششم در الجوزیا

شود و علامات اصحاب این مرض اکثر گسائی هستند که بر روی شان زردی یا سیاهی غالب بود و چنان که بر روی صورت بسیار  
و جای که بر روی نشینند هر طرف خائفانه بگردند و خود برای خود تدبیر حفظ صحت میکنند لیکن ازین خائف بسیارند که کسی  
اورا قتل کند و همیشه در خیال خود مستغرق میمانند و بر یک طور نشسته میباشند و ساکت میمانند کلام نمیکند و گاهی صاحب  
این مرض میگوید که سر بسیار ثقیل است و گاهی گوید که خفیف است گاهی میگوید که در سر کمال اذیت است لیکن صافستایان  
کردن نتوانند که آن کلفت همیشه در مرض آن متغلف میباشند اکثر سرگرم و اطراف سر و در کف دست و کف پا در روی تریزان  
و بر وسط زبان چربک جمع میباشند و خشونت بود و کناره های زبان بسیار سرخ بودند و از آن ثابت میشد و که در سده  
هم فساد است داشتند که بود و چون طعام میخورد و آرد و غیره میآید و اکثر قبض شکم میباشند و شکایت گری و کلفت  
شکم همیشه زیاده میکنند و بول صاف بود و خواب کم میآید و چون خواب رود در پیازده میبیند و همیشه مغرم و مضطرب و دل تنگ  
و بر پیشانی چین زیاده بود که هر وقت عبوس میباشند و از امر که او را غم در میآید میشد و آنرا کبسی نمیگویند یا کمتر بیان کنند  
و از عزیزان و اقربای خود متنفر بود و دوری جوید و کار کردن را پسند نکند و هیچ محنت و مشقت را برای خود کارا نکند  
و یکجا نشستن خوش نیاید گشتن در مقامات مختلفه او را خوش میآید و گاه گاه خود را مرغ چند اردو گاهی بادشاه بشمارد  
و زمانی با اینکه ادا است خود را فقیر میداند و گاهی خیال میکند که خود چای دان است گاهی میداند که ظرف کبر آب  
مثل دُن و غیره شده و گاهی لاغر و زمانی فر به بشمارد و علاج با یکدیگر را بجا نگیرد و از زنده ماندن گذارد و چون چنین فتنه بشود  
سهل دهند و برای تفریح و شغول کردن قلب آن کوشش کنند تنها نشستن ندهند و ده او خدا سے مقوی  
خورانند و چون در سرگرمی زیاده یافته شود پلاستر از پیش کس برگردان چسباند یا زیاده سهل قوی دهند  
لیکن اگر ترقن فصد درین مرض ضرر حاصل میشود ایضا بدانکه نوعی از المیخولیا است که آنرا المیخولیا سے مرافی در  
لغت عربی و بانی پوکنڈرای اس لفظ بانی از سکون الف و کسری بای ثناءة تحتالی و ضم بای موحده فارسی و سکون  
و او فتح کاف سکون نون و فتح دال مله هندی و رای ممله و سکون الف و کسری بای ثناءة تحتانی و فتح الف و  
کسریین همسایه اول و سکون ثانی بزبان گریک نامند و معنی آن حالتی است که زیر اصداغ خلف و روزه  
یافته میشود و وجه تسمیه آن باین اسم نیست که اقرط و اتباع شان در سبب علت مذکور میگفتند که آنرا اعضا شایع  
سراشیف میباشند و آنها نقصان و فساد پیدا میشود و اعضای مذکوره معده و طحال و جگر اند لیکن جالینوس  
گفت که از خلط اسود یعنی صفرا سے سیاه پیدا میشود لهذا به المیخولیا نام نهاده چنانچه بای معنی سیاه است و المیخولیا بمعنی صفرا  
و فی الواقع این قسمی از المیخولیا است و ایضا باید دانست که این مقوله جالینوس تا مدت دراز در ولایت انگلستان  
مقبول ماند و بعد آن حکیمی در ولایت در تشخیص آن گفت که این مرض از فساد شدن خون طحال پیدا میشود و لهذا نام المیخولیا  
را پسین یعنی طحال گذاشت و تا یکصد و پنجاه سال طبایع انگلستان بر همین رای متفق بودند که اکنون از مدت پنجاه

سال بد تحقیق کامل چنان ثابت شد که این مرض از ضعف دماغ و اعصاب خصوصاً از ضعف سهیمی و سنیوگاسک  
 پیدای شود حاصل مرض مذکور گاهی اولاً از محض مزاج عصبی می‌شود که بسبب آن مریض از ادنی سبب متاثر شده غم  
 و فزع و حزن و جرم پیدا میکند و گاهی اولاً کدام مرض در معده یا در جگر یا در طحال یافته میشود و بعد آن بسبب  
 ضعف مزاج عصبی پیدا گشته از آن اعراض بالخصوص یا حادث میشوند بهر صورت این مرض در رجال زیاد  
 پیدا میشود چنانکه بیشتر یا در زنان زیاد حادث میشود و بی تحقیق این مرض بیشتر یا در صورت سستی سبب اکثر  
 کسانی که فارغ و طالبی از پیشه و صنعت و هرگونه کار و بار شده در خانه خود نشسته می‌مانند و از عدم مشغول خارجی  
 مشغول نفس خود میشوند و هم کسانی که زیاد نشسته کار میکنند مثل محرران و علما و متدین و کاک کسانی که پاؤ  
 مشقت دماغی می‌نمایند و بسبب آن قوت عصبیه شان کم میشود و هم کسانی که زیاد مبتلا بجموم و افکار میشوند و هم کسانی که  
 مرض قوی سبب پیدا کرده بعد آن صحت بدتر می‌گردد و از صحت بدتر می‌گردد و از صحت بدتر می‌گردد و از صحت بدتر می‌گردد  
 تا آنکه میشوند و هم کسانی که زیاد مباشرت با عورات نمایند یا زیاد در خیال عورات و در عشق و محبت بسر میکنند  
 و هم کسانی که مشغول جلقی زدن می‌دارند مبتلا باین مرض میشوند و اکثر این اسباب سبب اول واقع میشوند و بعد  
 وجود این اسباب بر بعضی معده پیدا شده از آن مرض های پوکندری اساس حادث میشود و گاهی از اول  
 بر بعضی معده همراه این اسباب موجود می‌باشد و بعد آن مرض مذکور پیدای شود باجمله اصل سبب آن کمزوری  
 دماغ و نخاع است که گاهی فطری می‌باشد و گاهی از انایابی غذا که از بعضی اسباب پیدا شود دماغ و نخاع  
 کمزور می‌شوند و از آن بعضی پیدای شود و گاهی اول بر بعضی پیدا شده از آن غذای دماغ و نخاع بخونی می‌رسد  
 و از آن علامات های پوکندری می‌آیند پیدا میشوند علامات و علامات از علامات ملازمه این مرض و علامه  
 علامات آن هستند که در بعضی انانیت پیدای شود یعنی من چنان استم و من چنین میکنم و مرا این اذیت است یعنی در  
 هر کلام خود فقط من بگویم و خود را یک روز کار میداند و همیشه بر حال خراب خود نظر میکنند و میدانند که مثل من دیگر  
 مبتلا باین مرض سخت نیست دوم ضعف دماغ که بسبب آن از سستی و ضعف هم مثل مرض خفیف متاثر میشود  
 و همین سبب عزائم و اراده های آن غیر مصمم می‌باشد زیرا که از ضعف برزخ کردن توان خفیفه را و ده خود  
 هم قدرت ندارد و هم صورت مریض نیکو بود و لیکن مریض بیان میکند که کدام عضو من  
 از اعضا سبب باطنه صحیح نیست همچنین اکثر افعال از اعضا سبب آن بخوبی صادر میشوند لیکن او میداند  
 که همه ناقص صادر میشوند و همیشه بول و زبان و نبض و جلد بدن و ظاهر اعضا سبب خود را می‌بیند و با بآ  
 سعالین را حال خود می‌نماید اما اکثر علامات بر بعضی مثل درد سرد و معده و درد صدر و کثرت ریاح  
 شکم و دروغ ترش و سوزش معده و غیره علامات بد بعضی یافته میشوند و گاهی کدام علامت از علامات

بیشتر هم در آلات غذا یافته نمیشود بلکه محض از اثر خانه آن اعراض المیولیا یافته میشوند اما این قسم عسر العلاج است  
 چه در آن اصلی ضعف اعصاب سبب مرض واقع میشود و این اکثر مودی المیولیای اصلی میشود و علامات فارقه  
 در میان آنی بگویند رای اسس و اصل المیولیا این هستند که صاحب المیولیای اصلی بکدام قسم مشغول نمیشود  
 بسبب فساد نظون و فرغ خود را فراموش نمیکند و صاحب این قسم مرض را ممکن است که با اشتغال مشغول شده باشد  
 اشتغال از وسوسه و بدبختیای خود بازماند و بپیدا صاحب المیولیای اصلی عزیزان و اصدافان  
 خود را دشمن میدانند و بفکر ایزد سائی آنها میباشند و صاحب این قسم از جانب عزیزان خود بدگمان نمیشود بلکه  
 گاه گاه و فکر تحسین عواقب امور عزیزان خود میباشند و در آن غور و تدبیر میکنند و متاسف میباشد که بعد از  
 عزیزان من چه خواهند کرد و چگونه عمر خود را سپری خواهند کرد و فی الواقع این عطف و اشتد و ضد خیالات صاحب  
 المیولیای اصلی است چه او گاهی شیر طایب ای عزیزان خود نمی باشد بلکه آنها را دشمن و قاتل خود می داند و خود را هم فکر  
 تخریب و قتل ایشان میباشند و علاج اول شخص سبب کرده بر رفع آن پردازند مثلاً کسانی که بیکار بودند آنها را  
 مشغول بکار و صناعت فرمایند و کسانی که شسته میباشند آنها را امر بر ریاضت و مشقت کنند خواه مبنی یا به  
 طردخیل یا به ریاضات دیگر که شغل بر لب باشد مثل لعب بالصوبحان و غیره و چون حکیم معالج درین مرض میبیند  
 که اکثر شکایات مریض خیالی هستند لهذا این رای خود را بر مریض ظاهر نکند و الا مریض خواهد دانست که این  
 طبیب کم فهم و بی علم است مرض مرا نمی فهمد و تشخیص آن خوب نیست بگفته این طبیب غما و اعتقانی نماید بلکه در تلغ  
 حالات آن بی پروائی نماید و کمال توجه بشنود و قبل اظهار شکایات مریض آنچه از آیی خود را علیل بیان کند خود  
 طبیب آنها را بیان فرماید تا مریض را از طبیب حسن وثوق بر تشخیص و علاج آن بهم رسد چه ازین امر اعتماد  
 مریض بر طبیب زیاده میشود و بسبب آن گرفته طبیب اعتمادی نماید و تا تاثیر کلامش زیاده میشود و بسبب آن  
 اکثر شکایات مریض دفع میشود و درین مرض از تبدیل هوای مسکن و از ملاقات اجناسی که دل و دست و پا مالیدن  
 و هم از ریاضات بدنیه نفع کثیر حاصل میشود و هرگاه بعضی معده پیدا شود آنچه علاج بد بعضی نوشته خواهد شد  
 بعمل آرند همچنین آنچه شکایات در بدنش عارض و حادث شوند تدارک هر یک با آنچه در ذیل هر مرض نوشته شده  
 با استعمال آرد فستق که **فصل نهم** در مانپا و آن قسمی از جنون است که آنرا بلفظ انگریزی مینویسند  
 در آن فساد و عقل انفعال ماغیه عارض میشود که از آن حسن ترتیب افعال باطل میگردد و همیشه در پیار آثار ثوران و  
 هیجان و مجرور و بیهوشی آنکس متعلق و مضروب میباشد سبب آن گاهی المیولیا و گاهی نسیان و زمانی شرب کاذب و بنگ  
 و جوزائل و بلادونا و امثال آن سموم مخدره میباشد و در عورات اکثر بسبب قرب بلوغ و در و حقیقت عارض  
 میشود و چون حیض آید بر طرف گردد و گاهی هرگاه بعد از مدتی و جریان حیض باز احتیاس آید یا بدهنین هرگاه بعد ولادت


ما و لافاس نخوبی جاری نگردد و نبندد و هم این مرض عارض میشود و آنرا اسپور پیل مانیا میگویند و گاهی چون از نوشانیدن  
 شیطان فیصل زدن کمزور و ضعیف میشود این مرض پیدا میکند از اثر خاندان هم این مرض حادث میشود و قتیکه در خاندان علیل  
 این مرض بمقادیر و علامات قریب شمرده شدن این مرض اول در سردی و ضربان شمرین صلیح و دوران سردی و بخوابی عارض  
 شود و بیمار را در خانه نشستن خوش نیاید بلکه بیرون خانه رفتن بیکار گردیدن در طرق و اودیة خوش آید و حرکت چشمان زیاده  
 بود و چنان معلوم شود که چشمانش از اندرون بیرون می آیند چون در قتل فساد حاصل خواهد شد و در آن وقت سرخی چشمان و غلظت  
 و التهاب وجه یا زردی رنگ بشود و پنجه را و وجه که غلظت وجه است ظاهر باشد چنان ظاهر آن متغیر میشود که دوست و دشمنی  
 صورت تمام بشود و این پیشانسد در سر گرمی زیاده و بر بدن موافق هوا و حرارت محسوس شود و در چشمان سرخی بود و ثقبه  
 ضعیف می شود و مگر اینکه از خوردن جوز یا مثل بلا و ناهار عارض شد باشد در آن ثقبه ضعیف می شود و بیاض می شود بود اما گاهی  
 قوی و زانای ضعیف است لیکن آنچه بسبب ریدن بلا و ناهار آن نبض عارض می باشد ممکن است که نبض درین مرض بحال خود  
 باشد گاهی درین مرض ششما که بود و گاهی بولیموس عارض شود لیکن اکثر همین است که ششما نباشد و درین بسیار آب یا پیدا  
 میشود که از آن همواره تری میاید و در بینی همیشه خشک می باشد برکناره های زبان سرخی بود و در وسط آن چرک مجتمع باشد  
 گاهی بر زبان بیخ تغییر محسوس نشود و همیشه طبع قبض بود و بر آن که خارج میشود خشک است سفید می باشد که زان دانسته میشود  
 که صفت البسوی است اکثر بیرون و قمار و گاهی صاف مثل آب خالص گاهی سرخی بود و بیمار روز بروز لاغر میشود زیرا که محتسب یاز  
 می کند بیرون عرق می آید و غذا کم بخورد و از آن خون کم پیدا میشود و غذای مغذی تر حاصل شود و مزاج علیل تبدیل گردد و از غریزین  
 و جواب کسی که محتسب بود از آن عداوت میکند از لافاس و ششما و ششما بی شمری بر زبان جاری میشوند و چون عوارض را  
 عارض شود از آن کلمات مخالفات میا و شمر سرد شود و کلماتی که مخالف حیا و حجاب بودند از زبان بر آید از کسی شرم نگیرد  
 و بول در برابر خود را بر بدن خود مالده و درین وقت نهان است اما عقل قوی شود و با آواز سخت کلام میکند و زور و قوت درین وقت  
 در بدن آن زیاده میشود و از آن اکثر حرکت و ثوب میکند و طراف را بچوکت ارد و چون باین مرتبه رسد از سردی گرمی متجاوز  
 نمیشود اگر چه به بانیش از آن ضرر رسد لیکن خود نمی داند و اگر برای دفع ضرر برودت و رلهاس پهنه که پوشد آنرا چاک کرده  
 می اندازد و کلام مطابق واقع از آن سرزد نشود گاه همراهی و گاه غضب میکند و خجاست که یا از کمزوری که روز  
 بروز زیاده میشود و هلاک گردد یا مرض نسیمانی می دی ششما پیدا کند یا هیچ گردد علاج اول این مریض را چنان در مکان  
 محفوظ و از آنکه خود و دیگران را ضرر و نقصان نرساند و بنی تحت نظر مسهل پهنه گاه قوی و گاهی ضعیف مثلاً گاه در گرمی  
 و نهان پیمان و و ثوب یافته شود مسهل قوی پهنه و بهتر است آن روشن حسب سلاطین است که دو سه قطره از آن بنوشاند  
 و چون تلخین بطن فقط مقصود بود و مگر ششما سلسله قیاس یکدرد و هم و مگر برای سائیس نصف درم با هم تخمیه همراه دو سه انوش  
 آب بنوشانند بعد هر چهار ساعت این را بنوشانند تا اینکه یکبار حاجت بپسند شود و اگر سبب بدجاسی و جنون آن نوشان

این دو



این دو امکان نباشد روغن حبس اسلاطین بتبذیل مزین مثلاً از نیم قطره تا یک قطره بنوشانند وقت بیدار در آب گرم  
نشانیده آب سرد بر سر بزنند و چون در سرگرمی و آثار جوش خون زیاده پخته شوند زو حجب مناسب چسبانند و در آن خیال  
این امر ضرورت است که اگر ضریان شش را کمین اصدان زیاده بود بر صد غین و اگر سرخی چشمان زیاده بود بر مقلین و اگر برآمدگی  
دور مینی زیاده بود در منخرین و اگر آواز در گوش زیاده بشنود و بگوید که فلان این میگید و این میگید بسبب تشوش پس  
خلف ازین چسبانند بعد و باغ را آرام دهند بخور این در مخدرات و منومات و بهترین آن درین وقت بر و مانند پیاسم  
و کورل یا ندریت است که از رخ کرن تابست گریں بخوراند تا که خواب آید و غذای خوش خوراند و شیر زیاده نوزشاند بطوریکه  
همیشه شکم خالی نماند چه مادام غذا شکمش میماند و باغ را ازیت کم میشود و درین باره اجبار کنند و هرگاه عوارض را بعد از این  
از بعد شدن نفاس عارض نشده باشد و در آن بعد علاج عام غایله را در آب گرم نشانند و آب گرم بذریعہ زرا قه در رحم رسانند  
و آنچه از نشانیدن شیر عارض شده باشد و در آن امر ترک نوزشاند شیر فرایند و آنچه از احتباس حیض یا قریب بلوغ و  
در حیض عارض شده باشد تدبیر مذکور حاصل آید چنانکه نوشته خواهد شد ان شاء الله تعالی و چون مریض را غفلت در مرض  
حاصل شود و لائق نشستن در صحبت گردد و در میان بر طرب شود آواز در پیوای خوش دارد و سوار کنند و بر سر و سرگردان کردن  
کار لائق طبع را مائل سازند که از آن فائده کثیر حاصل میشود **فصل در قطع کس** فصل در قطع کس در قطع کس در قطع کس  
چه در آنهم جب و جدت و فساد طنون بسوی عوف میباشد و آنهم از فساد جسم اسودد و باغ عارض میشود و علاج آنهم علاج  
بالخوبی است **بینه فصل** یا زو هم و حرق و آن خلفی بود و آن علاج است و آنچه بسبب فساد فکر عقل بطور مرض  
عارض میشود علاجش همان است که در نسیان برای فساد فکر ذکر شده اعادة سورت تطویل است **فصل** دوازدهم  
در عشق و آنهم قسمی از رنج و فساد فکر است علاجش همان است که در نسیان ذکر شده و زیاده از آن است که بتجانیل رتقا  
سکونت و تبدل یوانانید و مشغول باشغال گردانند تا بما معشوق را فراموش کنند و اگر تجرد و عدم از دواج بر آن محرک  
زیاده باشد با غیر معشوقه امر کنند که مجامعت کند تا قوت باه از خروج منی کم شود و عشق بر طرب گردد و فقط **فصل** سیزدهم  
در کابوس و آنرا از زبان انگریزی نیت میسر خوانند و آن خوابی است که در آن بیمار صورت هولناک را می بیند و بسیار گشتار  
میشود و درین حالت نفس بدشواری می کشد بسبب تشنج عضلات اندرونی اضلاع و پرده شکم و بیش آنست که از بدبختی  
اعصاب متنازی میشوند و از آن تشنج و عضلات که در اضلاع واقع اند و هم پرده شکم عضله کبیره است واقع میشود  
و بدبختی سبب قریب است ولیکن سباب بعیده آن بسیار اند چنانچه از غم و خوف و کثرت مشقت و غمت نفسانی و از زیاده  
نوشیدن مطبوخ چای و زیاده خوردن و کشیدن تنباکو هم پیدا میشود زیرا که از اینها بدبختی پیدا میشود و بعد استعمال مطبوخ  
چای و تنباکو خواب نمی آید ولیکن هرگاه می آید پس آن کابوس عارض میشود و همچنین از خوردن بعضی غذای مثل باقالا و بویا  
و تخم سیسم و گوبی و غیره آنچه بدبختی پیدا میکنند اکثر این خواب حادث میشود و اطفال اوقت بروز ندان یا پیدا شدن کرم در شکم

فصل اول از بیان فضائل و معانی و احوال و عیال و موطن و غیره

[illegible]



ایشان این مرض عارض میشود علامات دیدن خواب هوایانک وقت خفتن و از ان خائف شدن و در سینه وقت خواب تگی محسوس میشود و اول تنفس سریع میشود و بعد عیسیر سگردد و پیش قلب زیاده شود و در سر آوازها غیر موجوده در خارج زیاده محسوس شود زیرا که بسبب شدت طبعش قلب خون در سر زیاده میرود و در ان حال از بدن حرکت نمی شود با آنکه بپارسی خواهد که حرکت کرده خود را ازین خوف و از پند و آواز صان از بدن نمی آید و تکلم صحیح نمیکند و درین وقت اکثر چشم نیم کشاده و میخواب میباشند و ثقیله بنهیه کشاده میشود و چون بیدار میشود تشنج فوراً از او کمرود و قوت اصلی در بدن خود میکند و غوت بر طرف میشود لیکن طبعش قلب باقی ماند و تشنج دفع میشود **علاج** اول اصل سبب را در یافته باز آن کوشند و چونکه سبب قریب به بعضی است لهذا باید که برای دفع کردن آن مسهل دهند من بعد بهینند که اگر بعد طعام نفخ میشود پس مایه پیکر الیسه و آیات از پانزده تا بیست قطره همراه آب ساده آمیخته بنوشانند و اگر بعد طعام همیشه آروغ ترش آمده باشد برای آن سوذا کار بناس یا میگنیش یا کار بناس یا پلاس باقی کار بناس همراه آب حل کرده ده پانزده گرم جدا بنوشانند هر آنچه موافق طبع افتد آنرا زیاده دهند و هرگاه اطفال را بسبب دیدن شکم افتاده باشد درین وقت ساقها را با سودا آمیخته در آب سرد حل کرده بنوشانند بعد چهار ساعت در یک روز سه بار و روز دیگر این را بار و غن بنوشانند بنوشانند تا همراه مسهل که هم از شکم خارج شود و هر که را عارت کابوس بود آنرا باید که وقت خواب کولر یا نیر یا همراه آب حل کرده بنوشند تا از ان خواب قلیل آید و اعصاب و دماغ را آرام رسد و ضرورت که وقت خواب قریب این بیمار شخصی موجود باشد که جزا وقت شروع مرض بیمار را از خواب بیدار کند که از ان دوره تشنج قوی نگیرد و فقط **فصل چهارم در بیان اولیسم طریقی** یعنی ندیان و بنخود که بالزده و رعشه اندام و زبان باشد و این ندیان و بدعوی خاص است که از نوشیدن شراب زیاده از مقدار مجعین گاهی از زیاده نوشیدن انیون عارض میشود و این مرض در جای که شراب زیاده نوشیده میشود مثل ولایت انگلستان زیاده عارض میشود و در هندوستان هم پیدا میشود و این مرض هم بطور یونجه دوره میکند چنانکه صرع بادوار حادث میشود و اول خواش شراب نوشی ظاهر شود بعد علامات دیگر پیدا میشود از انجافات اول و دوم و خیزن برین عارض میشود چنانکه در اینجا بود پس بخوابی عارض شود و بر تریج کار دل مائل نشود و بیکار جایا گردیدن نمی آید پس بعد از آنکه ساقها شده و فاسد گردد و کسب چیز در سده از شسم آب و غذا اقرار گیرد و وقتی دفع میشود و تشنج زیاده که در خواب شراب خوردن زیاد میشود بسبب کرب و ازیت و در طلب شراب کما جرت و اصرار میکند و گاهی شراب شفه خور باشد من بعد بدعوی و اختلاط عقلی ندیان عارض شود و غوت زیاده در دل پیدا میشود و میداند که کسی او را قتل خواهد کرد یا که ام حیوان می آید و او خواهد گریه و آنچه نمی بیند در ان صورت نمی خوف پیدا می کند مثلاً اگر چه

فصل چهارم در بیان اولیسم طریقی  
یعنی ندیان و بدعوی خاص  
است که از نوشیدن شراب  
زیاده از مقدار مجعین  
گاهی از زیاده نوشیدن  
انیون عارض میشود و این  
مرض در جای که شراب  
زیاده نوشیده میشود  
مثل ولایت انگلستان  
زیاده عارض میشود و در  
هندوستان هم پیدا  
میشود و این مرض هم  
بطور یونجه دوره  
ک میکند چنانکه صرع  
بادوار حادث میشود و  
اول خواش شراب نوشی  
ظاهر شود بعد علامات  
دیگر پیدا میشود از  
انجافات اول و دوم و  
خیزن برین عارض  
میشود چنانکه در  
اینجا بود پس بخوابی  
عارض شود و بر تریج  
کار دل مائل نشود و  
بیکار جایا گردیدن  
نمی آید پس بعد از آنکه  
ساقها شده و فاسد  
گردد و کسب چیز در  
سده از شسم آب و غذا  
اقرار گیرد و وقتی  
دفع میشود و تشنج  
زیاده که در خواب  
شراب خوردن زیاد  
میشود بسبب کرب و  
ازیت و در طلب شراب  
کما جرت و اصرار  
ک میکند و گاهی  
شراب شفه خور  
باشد من بعد بدعوی  
و اختلاط عقلی  
ندیان عارض  
شود و غوت  
زیاده در دل  
پیدا میشود  
و میداند که  
کسی او را قتل  
خواهد کرد یا  
که ام حیوان  
می آید و او  
خواهد گریه  
و آنچه نمی  
بیند در ان  
صورت نمی  
خوف پیدا  
می کند مثلاً  
اگر چه





که مضموم میباشد کشاده بر وقت بر آن دست زدن تا تشنج کشاده شود و اگر کار فام موجود بود بقدر نصف دهم از آن گرفته  
 بر پارچه پاشیده بزرگه هوا بوی آن در بینی رسانند از این تدبیر تشنج فوراً رفع میشود و این را آرام میسر است لیکن تدارک وقت  
 پارچه کار فام پاشیده را با بینی متصل سازند الا صورت بیوشی خواهد شد بلکه قدری از بینی دور دارند و چون دوره صرع  
 بر طرف شود بعد از آن تدبیری بعمل آید که کشنده از وقوع دوره امان شود و مرض نویسه نکند بیکه که تواتر و توالی او دارین مرض  
 مهلک است این تدبیر خصوصاً در اینکه مانع از آرام و بهند خواب آرنده او و به بخور انداختن بهترین همه برب و امید پاشیم که اولیای  
 و ریت است که بستن گریز از آن آب حل کرده بنوشانند بهتر از این او و به درین باره دوائی تا حال تجربه نرسیده  
 لیکن اگر این او و به وجود نباشد باید که رنگ سلفاس رنگت لیکن از هر یک پنج گریز تا بستن بست گریز گرفته و آب حل کرده  
 بعد چهار ساعت بنوشانند که طبای سابقین در این مرض این او و به را استعمال می آورند و نافع یافته اند لیکن  
 هر دو دوائی سابق نفع اند اما باید که با هر دو دوائی صرع ریشه سنبلیطی شریک کرده باشند که آنهم نافع است بجهت  
 فصل او و به مخصوصه را قوی میکند اما باید دانست که هرگاه کلورل باشد ریثت خوراندند قدری سود کار بناس هم همراه آن  
 بالغه و آینه نیک از این مقدار قلیل آن نفع زیاده میسرساند چنانکه دوائی تلخ همراه آن نوشانیدن ضرر و است بجهتین قدری  
 سود و آینه همراه آن دوزن در حین طفول را بسبب بروز دندان صرع عارض شد باشد و درین وقت مقدار قلیل کلورل  
 با لیکریت آب نبات حل کرده ببرد و در سه ساعت بنوشانند باین طو که اگر طفل شش ماهه بود تا یک سال که از عمرش  
 بگذرد و یک گریز بدین مقدار بعد یک سال تا دو سال بکنیم گریز از بعد و سال تا سه سال کامل سه گریز مقدار کلورل با لیکریت  
 اضافه کنند تا دهم که آرام بای دماغ حاصل شود و آنرا نوشانند بعد از دو ساعت قبل و به یا بعد از مصروع رشک کافور  
 نوشانند و باینده و سودا کنند از نقطه ای که از او در این نافع این مرض دوائی است موسوم سری اکسلس که آن ملک میری هم  
 و سه گریز از آن همراه آب گریز بنوشانند و سه گریز بدهد و سه بار به بار بنوشانند و سه بار به بار بنوشانند و سه بار به بار بنوشانند  
 و گریز خورانیدن و بار در روزانه و همچنین سلفیت آف کو پرر بگریز و دو بار خورانیدن و لایکه آتشک سه سه قطره همراه آب  
 نوشانیدن بعد غذا درین مرض مفید است و تدبیر بدن از روغن زیتون برای تقویت دماغ و نخاع نافع است  
 فصل شانزدهم در سکت و آنرا اوبه کسی بلفست گریز گویند بفتح الف و هم بای موحده فارسی و سکون او  
 و بای موحده فارسی ثانی و فتح لام و سکون کافور که سترین جمله سکون بای مشتاة تخانی و آن مرضی است که آن حسن  
 حرکت یکبار معطل میشود و بجهت نبض نفس که آن بهر و بحال خود باقی میماند و سبب خالص آن در دماغ میباشد در  
 عضو دیگر و آن اغماز دماغ است خواه غافتر زید دماغ باشد یا بالائی آن تشنج دماغ این مرضی آنچه دیده شد است که  
 گاهی تشنج عرق در میان عظم غشائی دماغ یافته میشود و زمانی در ششاقه و گاهی در میان دماغ و غشا و وقتی نقطه دماغ  
 آثار تشنج عرق محسوس میشود و گاهی در تشنج عرق دماغ زیادتی خون محسوس میشود و آنکه از آن خون خارج شده باشد

فصل شانزدهم در سکت

و گاهی آب زیر غشائی رقیق و بالای دماغ یافته میشود و گاهی در شریان دماغ را مینوریم که آن زیاده شریان است در عرض خود یافته میشود که بسبب آن دماغ منقبض میشود و السبب بدانکه سبب انقباض دماغ که مورت سکنه است گاهی رسین صدمه ضرب یا سقوط بود که از آن عرق منقبضه خون از آن خارج شود و دماغ را غمزمیکن و گاهی بسبب بعضی مرض گره چنانکه مذکور خواهد شد زمانه بسبب بعضی مرض قلیه چنانچه در امراض قلبی شده خواهد شد شایسته تعالی و وقتی از مرض شریان دماغ هرگاه در آن مینوریم عارض شود یا غشاء شریان مذکور سخت و صلب گردد و که از آن حرکت شریان بند گردد و در وقت بسبب اجتماع خون در آن زیاده شود و از آن دماغ منقبض گردد و گاهی از زیاده خون هرگاه در بدن متلاطمی و موی بود و وقتی کمی خون هم این مرض پیدا میشود چه در وقت زیاده خون خود خون دماغ را غمزمیکن و در صورت قلت دم آب دماغ زیاده میشود زیرا که دماغ خالی نمی ماند اگر خون کم میشود آب یاده پیدا میکند و چنانکه در حالت کمخوری کمی خون سستلای ضعف شایسته که آب در تمام بدن یاده پیدا میشود و بسبب آن هم شکم طراوت و حج و جود بیاریان مرض غمزمه که پیدا میشود و هم از زیاده زور بردن که شریان بر دماغ رسد چنانکه برای دفع کردن فضول یا بسبب معاندت شریان وقت بر دوشن شمی ثقیل شایسته شایسته هم این مرض حادث میشود و گاهی زیاده راه رفتن در تابش آفتاب یا در سردی و وقت کثرت برفتن دگی هم خوف و ترس این مرض است چه در اول خوف زیادتی خون و در ثانی خوف یابی آب در دماغ سست از زیاده رنج و خوشی بیجان و ثورت غصه و از زیاده تکی سغزاز طعم که از آن شکم پر شده زیاده بیرون می آید هم این مرض حادث میشود و از زیاده تکی سغزاز غصه و ترس عسر ضیق عارض میشود و در وقت حرکت قلب سریع گردد پس بسبب سرعت حرکت قلب آن یاده بد دماغ میرود و از آن نفس خون از دماغ کمتر فرآید و در دماغ زیاده شده دماغ را غمزمیکن و از آن این مرض عارض میشود و این مرض مردن به نسبت نماند یاده عارض میشود و از این پنجاه سال تا شصت سال یاده خوف عروضا نید باشد گاهی این نفس سست خاندانی پیدا میشود و علامات گاهی قبل از عروضا سکنه مثل صرع علامات مندره آن هم یافته میشوند مثل در دوسر دوران سر و تشیجان آوازهای گوناگون که آنرا میباشینود و ثقل ساعده در یک گوش بسبب اجتماع خون در آن جانب دماغ محسوس شود و همچنین گاهی ثقل لسان در کلام و کمخوری در دست یا در پا و از این شدن حسن است یا پادشاه بیب مثل حرکت جفیف چیزی از زیر جلد دست یا پا محسوس میشود و گاهی من ظاهر شود و گاهی در یک دست یا یک پا تا مدت و وقتا فو قتا یافته شود و با نایل گردد و این علامات مجتمع در یک شخص یا در یک وقت نمیشوند بلکه بعضی در بعضی و بعضی دیگر هم ضرورت نیست که یا شوند چه گاهی بدون ظهور که امی علامت هم دفعته بیماری افتد و بیوش میشود و حسن حرکت معطل میگردد و زمانی بتدریج بیوش عارض گردد و لیکن هر که دفعته بیوش میشود حسن حرکت آنهم دفعته معطل میگردد و هر که بتدریج بیوش شود حسن حرکت آنهم بتدریج معطل میگردد و گاهی با بیوشی در یک جانب بدن لجه هم عارض گردد و این دهنسته میشود و اینکه هرگاه جلد پیر دست بیمار از سرنگشان برود و بگردد از جانب صحیح فوراً بیمار دست خود را میکشد و آنچه در جانب متعرجی تقو م وقع است آنرا

نیکشده و از آن متاثر نمیشود و دوم آنکه هرگاه دست جانب علیل را برداشته بگذارند و در دست علیل مثل سستیت بر زمین می افتد  
و دست جانب صحیح آهسته آهسته و با قدری تاخیر و سبکی بر زمین می آید و ایضا تشنه عنبیه وسیع میشود چه از غم و مانع به تنبلی آن بزم  
منتهی شده کشاده میگردد و چون بیمار بهوش میشود و بهوشی بدرجه قصوی میرسد آواز غلط پیدا میشود و در نفس بطول میبرد و  
در آخر تنفس آواز خفیه پیدا میشود بسبب مغلوج و مستقر می شدن اجزای او و وقت تنفس متحرک میشود و اطراف علیل سرد  
میشوند و بول و بول از بی اراده جاری میگردد و گاهی در مثانه بول مختص میماند لیکن باید دانست که پیدایش غلطی و طوار آهستگی  
خفیت و تنفس با صدای خفیه و ضعیف شدن حرکت قلب جاری شدن بول و باز ویر آمدن زهر در دایان درین مرض علامت  
هلاک علیل است انجام مرض نیست که گاهی صحیح میشود چنانکه هیچ شکایتی بعد از و ال مرض باقی نیماند و شاید که بعد آن مدت العمر این مرض  
عود نکند و گاهی بعد از و ال بهوشی فالج در یک جانب بدن بیمار باقی میماند و گاهی لغوه میشود و زمانی منجر به نسیان یعنی دیمنسیا میگردد  
و لیکن اکثر آنست که بعد از و ال مرض و حصول صحت باز مرض نوبه کند تا اینکه دیده شده که تا مدت نوبه بیمار زنده ماند و بعد آن سیه و فریاد  
از بیم اینست که در ابتلای او درین مرض هلاک میشود و نجات نیابد و گاهی از زیاده خوردن فیون و از زیاده نوشیدن شراب از عوارض  
هم حالتی مشابه سکته عارض میشود و این زمان احتیاج بسوی تفرقه در سکته حقیقی غیر حقیقی ضروری افتد لهذا باید که هرگاه بیمار بعد از سکت  
پیش طبیب حاضر شود باید که طبیب اول بوی هان علیل را بویید اگر بوی شراب یا فیون از او پاش آید بداند که سکته حقیقی نیست  
لذا آنرا امری کتمانیدن فرماید چه بعد آمدن فی صاف و واضح خواهد شد که بهوشی از شراب بوده یا از فیون لیکن گاهی از و ال  
فیون خورده بوی فیون نمی آید مگر تقیه عنبیه فیون خورده ضیق میشود پس ازین علامت هم ممکن است که در حقیقی و غیر حقیقی که سبب  
خوردن فیون افتاده باشد فرق توان کرد با جمله چون شبهه در تشخیص سکته حقیقی و غیر حقیقی واقع شود آن زمان نمی گماند که از این  
عمل السدقه بخوبی حال هم واضح خواهد شد و از خروج شراب و فیون که سبب حالت مذکوره بوده اند سکته هم بطرف خواهد شد اما اگر سکت  
بود که سکت حقیقی است درین صورت زنهاری که گمانند که در سکت از آن ضرر عظیم عارض میشود و مورت زیادتی مرض حقیقی است و آنچه  
در کتب قدیمه عربیه بیان در علاج سکته اجازت داده اند از قلت تدریست چه در وقت فی کردن خون زیاده در دماغ منع میشود  
و هم حرف الضداع عرف میباشد با جمله آن در سکته اضرا شفاست فتکدر علاج هرگاه علامات مندره سکته یافته شوند  
آن زمان باید که بیمار را از زیاده حرکت و تعب بدنی و نفسانی مثل زیاده نخ و غشی محفوظ دارند و از سرنگون کردن بسوی  
زمین منع کنند که از آن هم در دماغ خون زیاده جمع می شود و بریزد و فریاد و اگر درین حالت خون زیاده بود غذا کم دهند و سهل  
قوی بدهند تا از و ال محفوظ بماند و نوشتن سکت سهل قوی برای هر سکت سکت علامت عام دانند و در هر حال آنرا از و ال  
بکنند که درین مرض ملاک امسال است فتکدر اما هرگاه سکته شروع شود و حس و حرکت سطل گردد و بهوش  
طاری شود درین وقت غم و تامل نمایند اگر آثار زیاتی خون بعلامات باشد مثل اینکه سر گرم باشد و در گمائی سرود و در و  
طاهر بود و در مشاغل با صدای ضربان چشمان و جلد و چه سرخی و برآمدگی و در بعضی یافتن شود و بر این تعلیل هم اول فصل گذشت

در سکت حقیقی و غیر حقیقی

از هر دست و پا که باشد و چون ارمان فائده حاصل نشود و لور محل صد غین یا موقین یا در مغزین چسباند و بعد برف بر سر بچند  
 یا آب سرد و شراب یا آب سرد و سرکه مزوج کرده یا از آنجا لصر که از انبوره یا دیگر تدبیر سر کرده باشند پارچه بآن تر کرده  
 بر سر زنند و چون گرم خشک شود دیگر تر کرده بجایش نهند و مسهل قوی بپوشانند لیکن چون بیاضیوش است و نوشانیدن سهل  
 دشوار بود پس درینوقت روغن حب السلاطین یا یا کهن یعنی زبد حلو کرده و اصل زبان مالند تا دو گوی فرود یار و غن حب  
 السلاطین را با شربت نبات آمیخته در گلو اندازند که فرو خواهد رفت و بهر حیل که ممکن شود مسهل بپوشانند چون حلال امی سهل نفوذ  
 تا خیر خواهد شد و جمله امید فالج و نجات درینوقت درین مرض منحصر و اسهال است پس تا وقتی که اسهال آن شروع نشود احتیاطاً  
 تنقیه نمایند هر نسخه که مناسب دانند لیکن ادویه احتقان باید که جاد باشند تا بسبب آن خون بسوی اسهال یاده جذب شود  
 و از دماغ فرواید و غمزدماغ دفع گردد و بهتر آنست که ایلو زجهل گرین و ثپاس کارناس پانزده گرین با مارا شپیر که ده اولش  
 باشد حلو کرده احتقان فرماید که تا بزرگوار آن خون کثیر بسوی اسهال جذب شود و از دماغ فرواید زیرا که ایلو ز خون را بسوی اسهال  
 جذب میکند و از مرض بواسیر استعمال آن ضرری نشود و بهیچ سبب احتقان موافق این نسخه برای دفع احتباس حشیش بسیار  
 مفیدست زیرا که رحم و معای آخر متصل اند چیزیکه خون را در معا جذب میکند و در رحم هم جذب میکند و بسبب آن حشیش برای  
 میشود و فکاکو و پنچین مسهل قوی هر روز درین مرض به بیمار نوشانیده باشند که سوای اسهال دیگر علاج مفید نیست  
 تا اینکه صحت شود و یا آثار کمزوری ظاهر شوند و بیمار ضعیف گردد آن زمان دست از تدبیر اسهال بکشند و بپنجه که اگر در شانه بول  
 مجتمع بود و خال قاتا طیر بزنند و شور بای لحم برای تقویت عللیل بپوشانند و اگر نوشانیدن ممکن نباشد بزرگه احتقان شور بای لحم را  
 در معای عللیل رسانند تشبیه و گاهی درین مرض بیمار بعد عرض منفع و کمزوری برای علاج پیش طبیب حاضر کرده بشود  
 و چون طبیب می بیند سرگرم و اطراف سر و فمض ضعیف میاید پس باید که درین وقت اگر گرفتن فمض احتراز نماید و ایونیا کاربان  
 یا شرب پورث وین که قسمی از شراب است به بیمار نوشاند و اگر ممکن نشود احتیاطاً در اسهالش رسانند و آب گرم در بوتل چکرده بند  
 نموده از آن بر قدری تکیه سازند و هم خردل را بآب و قدری سرکه ساییده بر پارچه آلوده بر ساقین و بالای سده بطور پلاستر کنند  
 و هرگاه بعد این تاثیر آثار قوت در ریفین یا بعد دوای مقوی خردا نیز در ترک کنند و درین اثنا به تدریج بسوی حال مشابه دارند  
 که بول مجتمع نشود چه اکثر درین حالت تقطیر البول هم میباشند و مهند کاک بول در مشاء مجتمع میباشد و از آن بجا در کرب و اذیت  
 میاندازند و ضرورتست که یکبار با خال قاتا طیر ضرورت حال مشابه را دریافت نمایند تا که اگر بول مجتمع باشد آنرا بیرون آرند تا از آن  
 نقصان آید و نیز سرد و میوکس میچین آن متورم شده و مرض دیگر موزی پیدا کنند و چون اطمینان از خود قوت حاصل شود مسهل  
 قوی دهند و اسهال آورده باشند تا که صحت شود یا بهیچ وجه تدریجین است که اسهال شود و اگر بعد بخورد و اهل در حال  
 مرض بطلان است و تا نفع ثابت نشود که سبب سکه از یاد آب و دماغ بود و از آن دماغ منقرض شده درین وقت هم اول مسهل  
 قوی دهند تا آب کثیر و اسهال علاج شود و من بعد تمام موی سحر را تراشید و در وی موله آید که از راس ساخته میشود و بر پارچه آلوده

احتقان بواسیر را با شربت نبات آمیخته در گلو اندازند که فرو خواهد رفت و بهر حیل که ممکن شود مسهل بپوشانند چون حلال امی سهل نفوذ تا خیر خواهد شد و جمله امید فالج و نجات درینوقت درین مرض منحصر و اسهال است پس تا وقتی که اسهال آن شروع نشود احتیاطاً تنقیه نمایند هر نسخه که مناسب دانند لیکن ادویه احتقان باید که جاد باشند تا بسبب آن خون بسوی اسهال یاده جذب شود و از دماغ فرواید و غمزدماغ دفع گردد و بهتر آنست که ایلو زجهل گرین و ثپاس کارناس پانزده گرین با مارا شپیر که ده اولش باشد حلو کرده احتقان فرماید که تا بزرگوار آن خون کثیر بسوی اسهال جذب شود و از دماغ فرواید زیرا که ایلو ز خون را بسوی اسهال جذب میکند و از مرض بواسیر استعمال آن ضرری نشود و بهیچ سبب احتقان موافق این نسخه برای دفع احتباس حشیش بسیار مفیدست زیرا که رحم و معای آخر متصل اند چیزیکه خون را در معا جذب میکند و در رحم هم جذب میکند و بسبب آن حشیش برای میشود و فکاکو و پنچین مسهل قوی هر روز درین مرض به بیمار نوشانیده باشند که سوای اسهال دیگر علاج مفید نیست تا اینکه صحت شود و یا آثار کمزوری ظاهر شوند و بیمار ضعیف گردد آن زمان دست از تدبیر اسهال بکشند و بپنجه که اگر در شانه بول مجتمع بود و خال قاتا طیر بزنند و شور بای لحم برای تقویت عللیل بپوشانند و اگر نوشانیدن ممکن نباشد بزرگه احتقان شور بای لحم را در معای عللیل رسانند تشبیه و گاهی درین مرض بیمار بعد عرض منفع و کمزوری برای علاج پیش طبیب حاضر کرده بشود و چون طبیب می بیند سرگرم و اطراف سر و فمض ضعیف میاید پس باید که درین وقت اگر گرفتن فمض احتراز نماید و ایونیا کاربان یا شرب پورث وین که قسمی از شراب است به بیمار نوشاند و اگر ممکن نشود احتیاطاً در اسهالش رسانند و آب گرم در بوتل چکرده بند نموده از آن بر قدری تکیه سازند و هم خردل را بآب و قدری سرکه ساییده بر پارچه آلوده بر ساقین و بالای سده بطور پلاستر کنند و هرگاه بعد این تاثیر آثار قوت در ریفین یا بعد دوای مقوی خردا نیز در ترک کنند و درین اثنا به تدریج بسوی حال مشابه دارند که بول مجتمع نشود چه اکثر درین حالت تقطیر البول هم میباشند و مهند کاک بول در مشاء مجتمع میباشد و از آن بجا در کرب و اذیت میاندازند و ضرورتست که یکبار با خال قاتا طیر ضرورت حال مشابه را دریافت نمایند تا که اگر بول مجتمع باشد آنرا بیرون آرند تا از آن نقصان آید و نیز سرد و میوکس میچین آن متورم شده و مرض دیگر موزی پیدا کنند و چون اطمینان از خود قوت حاصل شود مسهل قوی دهند و اسهال آورده باشند تا که صحت شود یا بهیچ وجه تدریجین است که اسهال شود و اگر بعد بخورد و اهل در حال مرض بطلان است و تا نفع ثابت نشود که سبب سکه از یاد آب و دماغ بود و از آن دماغ منقرض شده درین وقت هم اول مسهل قوی دهند تا آب کثیر و اسهال علاج شود و من بعد تمام موی سحر را تراشید و در وی موله آید که از راس ساخته میشود و بر پارچه آلوده



مثل قفسه بر تمام سر چسبانند تا هفت برشت ساعت بماند و دارند تا آب عظیم بر آید و اگر ممکن باشد او به مده هر آنچه مناسب و موجود باشد بنوشانند تا آب خارج شود و اگر ریاس سیاس یا ریاس نیرسل یا شرک ایشرباب حلاکه نوشانند بهتر باشد و بخوبی اوراری نماید و بعد حصول صحت علاج تندرستی نماید و تقویت بیمار ملحوظ دارند بنوشانیدن او به مقویه مثل آب آهمن و کینین و غذایه مقویه تا که مرض باز عود نکند تنبیه و تذنیب باید دانست که گاهی چند روز قبل از حدوث سکته حاتی که آنرا در کتب طبیه عربیه لوی و فحیدق سیکویند حادث میشود و آن از علامات مندره سکته است و آن نیست که در عضلات و عروق حالتی مثل اجهاد مانگی عارض گردد و بسبب آن در عروق تردد پیدا میشود و بسبب آن تشاوب و غلطی از یاده می آید و رنگ رخسار و چنان سرخ میگردد و انسان میخواند که در خیالات اعضای خود را پیچیده و متعده سازد پس هرگاه اینجالت که از علامات مندره سکته است یافته شود باید دانست که بعد از آن سکته حادث خواهد شد و در وقت برای ازاله آن تقدیر محفوظ تدبیر مقفل مهم باستعمال آرنج مثل اینکه تقطیل غذا نمایند و مسلمات که مخرج بایست رقیقه باشند و هم بدرات مکرر نوشانند و از حرارت آفتاب دور دارند و اگر این تدبیر کافی نشود و حسب مناسب زیر بوق اکبر یا در مغزین چسبانند فک کفصل هفتم در فکج و آنرا پالاس سنج ای فارسی وای جمله سکر الف لام و کس الف و سین هله اول و سکون بین هله ای نامی و آن حاجت است که در آن قوت حرکت و حس هر دو یا فقط قوت حس یا قوت حرکت تمام بدن یا عضو خاص ناقص یا باطل شود و سبب آن رسیدن ضرر و نقصان به باشد به هم اسود دماغی یا کما یا متضرر و ناقص شدن جسم ایضاً نشسته دارد دماغی یا نخاعی و گاهی نقصان و آفت در جسم اسود و در جسم منصف محفوظ از آفت و صحیح میباشد و این نقصان بجز جسم بودگی آنکه در جسم اسود افضل مشین ورم حادث شود و بسبب آن جسم مذکور لیس و یکار و ضعیف گردد و بسبب آن قوت حرکت و حس از آن پیدا میشود نقصان معدوم شود و دوم اینکه جسم مذکور بسبب نه رسیدن غذایش ضعیف و کمزور گردد و چنانکه وقت انداد شیریان از جسم غریب مثل خشک ریشیه یا خون غلیظ که این مرض پیدا میشود سوم آنکه جسم اسود صحیح و آفت محفوظ باشد لیکن جسم ضعیف از چیزی متضرر شود یا بسبب کلام آفت قطع گردد پس قوت حرکت و حس را از جسم اسود گرفته و بدن نرساند چهارم آنکه اذیت در اعضای دیگر باشد مثل درو مثانه یا کرم شکم و اثر این اذیت و درد بدریه اعصاب بدماغ یا نخاع رسد و از این جهت عروق و شریان که در دماغ انداخته و متبعض شده ضعیف گردند و بسبب ضعیف و تنگی آن غذا بدماغ و کما کم رسد و از آن قوت جسم اسود دماغی یا نخاعی ضعیف شود و از ضعف آن در عروق کما ازین محل ضعیف عصب محرک و حساس آن بسته قوت حس و حرکت پیروز استر خا عارض میگردد و چنانکه در درو مثانه اکثر آنکه تا قدیم بدن مسترخ می شود و گاهی یک عضو مسترخ در حرکت استر خا بود و لیکن قوت حس متضرر نمیشود و صاحب مرض ازین عضو طلیل احساس حار و بارز میکند لیکن در عضو یک جواب و مقابل نیست در حرکتش صحیح است حس معدوم یا ناقص میشود مثلاً در یک دست استر خا در حرکت بود و در دست دیگر حرکت بر ستور باقی و صحیح باشد لیکن حس آن ناقص گردد و بسبب اینست که اعصاب حس و حرکت از مبادی های مختلفه نخاعیه رسته اند و کوفت ظاهر از یک پائین شاع بر می آیند و از هرگاه در سبب عصب حرکت نرسد و راه یا بکند

فصل شانزدهم در سکت

در بیان سکت حرکت که بعضی باطل است و در سکت متعالی آن ناقص یا باطل گردد



این عصب عضوی که رفته حرکت آن عضو فاسد میشود و چون عصب حس آن عضو از مبدأ دیگر که صحیح است آمده ازین جهت  
حس عضو مسترخی میماند اما آنچه عصب حس عضو صحیح از زیر مبدأ عصب فاسد رفته عضو مقابل آن که صحیح حرکت است رفته  
در آن حس فاسد میشود بسبب فساد مبدأ عصب حس عضو مذکور و این امر اکثره حادث میشود و باعث تخریب میارشد که اطباء  
ماداقف از تشریح در بیان سبب آن مبهوت میشوند فتنه گران و گاهی حرکت عضوی باطل میشود و استرخاداران  
ظاهر کرده و لیکن در حس که ام فساد راه نیابد چنانکه در لقوه هرگاه سبب فساد زوج سالم تنها عارض شود و زوج خاک  
که آرند حس در وجه است از آفت محفوظ باشد پس درین وقت حرکت رخسار باطل میشود لیکن حس آن باقی میماند زیرا که  
آرنده حس در آن ریشه زوج خاص است که محفوظ از آفت است و گاهی فالج و استرخا کامل بود یعنی حس و حرکت هر دو باطل  
میشوند و گاهی ناقص بود یعنی قدری حس و حرکت هر دو باقی میماند و گاهی فالج در نصف بدن از سرتا پا واقع میشود و گاهی  
سوی سر و گردن تمام بدن بود و گاهی از کمتر تا قدین بود و بالای که جمله اعضا صحیح بودند و گاهی نقطه هر دو دست از زردین سر  
میشوند و تمام بدن صحیح میماند چنانکه این مرض اکثر کسانیکه اسیر میگردد و از آن ظروف و غیره میسازند عارض میشود و گاهی  
در یک عضو منفرقه رخسار یا یک دست یا یک انگشت استرخا عارض میشود اما آنچه ازین اقسام در نصف جمله بدن عارض میشود آنرا  
زبان انگشت میانی جیبا کسری هوز و کسریم و سکون بای تخانی و کسریای فارسی و کلام و سکون بای تخانی و کسریم  
و نسخ ای تخانی و سکون الف می نامند یعنی فالج نصف بدن و اگر چه فالج و استرخا بحسب حقیقت واحداند لیکن این قسم را  
مخصوص باسم فالج ساختن مناسب اهل لغت است زیرا که عرب نصف را فالج میگویند و فلیت الشی ای شقیقه نصفین  
با بحسب آن همانست که سبب سکت نوشته شده زیرا که این قسم هم از انفاز دماغ عارض میشود مثل آنکه خون کثیر از اندام  
عرق خارج شده و دماغ را غرق کند یا آب در بطون آن زیاده شود یا در دماغ ورم پیدا شود یا دماغ نرم شده منفر گردد و گاهی اصل  
مرض در اعضای دیگر بود و ازین آن بدماغ رسیده مورث فالج میشود چنانکه در امراض رحم و در مثانه و وقت تولد که کم  
در شکم فالج پیدا میشود و درین مرض رخساره یکجانب لغت زبان و تمامی عضلات نصف بدن از دست و پای جانب  
علیل مسترخی میشوند لیکن چشم و ابروی اینجانب صحیح بودند و اختیار بیمار حرکت کند و بند می شوند زیرا که عصب محرک آن از زوج  
سالم آمده که از آفت محفوظ است و در آن فساد راه نیافته و گاهی درین قسم فالج حس هم باطل میشود و لیکن اکثر آنست که قوت  
حرکت باطل میشود و حس قدری باقی میماند علامات یکبار یا آهسته آهسته قوت حرکت نصف بدن زایل میشود و گاهی مثل  
گزیدن مورچه قبل حدوث مرض حالتی را انگشتان دست و پا محسوس شود یا نقطه احساس سوزش قلیل در این مقامات بیمار میکند  
سپس بیمار را بیکه گویند این کیفیت مثل ریب غل از انگشتان بالا می رود و بهش نیست که چون انقل میشن در جسم اسود پیدا میشود  
و آن میخواند که ازین خود را دفع کند پس بار بار برای دفع آن کوشش و حرکت میکند و از آن با حسیاب ازین میسر میسر و اثر  
آن ازین تا سر انگشتان که محل تمامی اعصابست ظاهر و نشی میشود و در این حالت مادام که جسم اسود ضعیف شود و از دفع کردن آفت

باز مانده محسوس میشود بعد از این میگردد و چون دست و پایی علیل از دست خود برداشته و اگر اندر خود را بر زمین می افتد و بیمار را اختیار  
و قدرت نباشد که دست و پایی خود را از افتادن باز دارد و در شروع این مرض هرگاه که دست آن از فعلش جستم اسودد و مانی باشد  
تند و سختی در اعضائی بیمار پیدا میشود زیرا که اعصاب حرکت متناوبی میشوند و چنانکه از تازی اعصاب حس کثیف گردیدن موجب حرکت  
آن بر سر انامل محسوس میشود از تازی اعصاب حرکت کثیف تند و در عضلات حادث میشود و لیکن برداشتن اعضائی  
ممکن نباشد و بسبب ضعف شدن جسم اسود که مسبب قوت حس و حرکت است و بعد چند روز هرگاه جسم اسود بسبب ورم منقبض  
و بیکار میشود اعضا استرسی میشوند و کمی در دهن عارض میشود و شلخ جانب علیل سست می شود و بسبب آن اعصاب  
از دهن جاری میماند و لیکن باید دانست که جانب سست نمی شود و وجه بیمار میماند و جانب تشنج می شود و چون بیمار را میکنند  
که دهن را جمع کرده هوا را بر دفع کند چنانکه برای قیح کردن چراغ میکنند درین وقت اطفالی چرخ ممکن نباشد بلکه  
هوا از راه شلخ خارج شود و رخسار علیل متنفخ میگردد و بسبب ضعف بردفع کردن هوا قدرت ندارد و هوای که در  
می آید خارج نمیشود و از آن متفخ پیدا میشود و چون طعام بخورد طعام در میان دندان در رخسار علیل جمع میگردد  
چرا و بسبب ضعف استرخای خود و وقت از در طعام از خود دفع نکند و در آن باقی میماند و چون خواهد که زبان را از  
دهان برآورد و زبان را بسوی جانب صحیح بگرداند نمی تواند و اختیار زبان بسوی جانب علیل مایل میشود زیرا که در زبان دو  
عضله از یکدیگر بسیار آمده اند و عضله جانب این تحریر یک بسوی جانب الیه می کشند و عضله جانب الیه تحریر یک بسوی  
این می کشند و چون در جانب الیه استرخاشد از تحریر یک عضله جانب الیه بسوی الیه می کشد و در زیر که تحریر یک بسوی  
این باقی مانده و دهن فرق است در زبان و رخسار که رخسار بعد استرخا بجانب صحیح مایل شود و زبان بعد استرخا  
بسوی علیل میل میکند و از انقباض علیل قنبر واقع میشود و بسبب ضعف عضلات حلق و زبان و دهان چنان کلام قشیل  
داد آکنده که دیگران بدستواری می نمند و درین قسم بیمار را تقیض عین ممکن میماند زیرا که زوج سابع از عصب که تحریر است  
بر تقیض از آفت محفوظ میباشد لیکن چون در زوج ثالث که کارش برداشتن و کشادن چشم است هم نقصان راه باید در چشم  
هم استرخا ظاهر گردد و قدری چشم کشاده و کمی محسوس شود بسبب استرخای جفت اعلی و چون در زوج خامس هم نقصان  
راه باید حس در جانب علیل ناقص یا معدوم گردد لیکن اکثر آنست که این زوج محفوظ میماند و حس وجه  
بحال صحت درین مرض میماند و در هر عضله که استرخا عارض میشود لاغر میگردد زیرا که بسبب استرخا از کار خود محفل  
میشود و بسبب بیکار شدن آن غذایش کمتر میرسد چه غذای عضله از کثرت حرکت آن میرسد پس لاغر و بیکار و  
ضعیف میشود و چون بعد لاغری عضله صحت حاصل شود و مرض فالج زایل گردد و باز بذر یه عصب قوت حس و حرکت  
از دماغ در آن میرسد این عضله اثر قوت را قبول نمیکند و بعد زوال مرض اصلی هم مرض نقصان فعل موجود میباشد  
لذا از این گفته است اذ کان عضواً مفلوجاً بعد از انقضائه لا علاج عام این مرض آنست که چون



که تا قدنین سترخی شوند و درین قسم حس و حرکت هر دو برابر ناقص یا باطل میشوند و سبب آن در نخاع میباشد و این ظاهر میشود  
 بانگی که درون و وجه عقل و حواس و دماغی صحیح میباشد و سببش همین است که در دماغ آفتی نه رسیده و سبب مرض یا رسیدن ضرر  
 و نقصان بسبب ضربه بر ممره های گردن و پشت میباشد که از آن فقار از هم جدا شوند و سبب آن نخاع شکسته یا منقطع  
 شود لیکن اگر از فقره اولی عتق تا فقره سوم شکسته شود فوراً بیماری میرود و اگر از چهارم تا آخر ضرر رسد بخود که در این مرض  
 عارض میشود و ازین بیان ثابت شده که سبب این مرض از فقره چهارم گردن شروع میشود و گاهی بسبب مرض عظام فقار  
 هم این مرض عارض گردد مثل اینکه استخوان فقره ملائم شده بسوی قدام یا خلف یا مین یا بسیار مانع شود و از آن نخاع  
 منقطع گردد و این سبب اکثر اطفال تا سن شانزده سال و دختران را تا رسیدن بهر چهارده سال پیدا میشود و گاهی بسبب  
 درم نخاع و گاهی از لین شدن آن این استرخا پیدا میشود و گاهی عروق منهار که در غشا اند متصدع شوند و از آن  
 خون کثیر خارج شده نخاع را غرق میکند چنانکه در سکت دماغی میشود و فی الحقیقت اینهم خود سبب سکت دماغی است که از آن فلج  
 حادث میشود و گاهی بسبب دردمشانه که وقت پیدا شدن رمل و حصاة یا از درم که بسبب تشک و سوزاک ران حادث میشود  
 این استرخا پیدا میشود و هم از کثرت مباشرت با زنان و از رسیدن سردی مثل آنکه کسی در آب سرد تا که فرو رود و در آن  
 مکث کند و از درم هر دو غشای غلیظه و رقیقه که بالای نخاع محیط اند و هم از خوردن بعض اغذیه مثل دال که قیسم کرسته که دانه  
 آن خرد میباشد و از خوردن حیوان سیاه که در گندم پیدا میشود و در آن سوراخ میکند هم این مرض حادث میشود و از  
 زیاده خوردن اگر کسی که قسمی از پوست هم این استرخا حادث میشود عللاً ماست آنچه ازین قسم استرخا سبب مرض عارض  
 میشود در آن از اثر انگشت هر دو با حالتی مثل گردیدن مورچه محسوس میشود و قوت کم میگردد و ممکن نبود که بیار قدهای خود را  
 با اختیار و قدرت از زمین بردارد بلکه با انگشده راه میرود و با جگره یا با اختیار مرضی نمیشود و قوت حرکت را قایلین طلبا شده  
 تا که میرسد به تریج و گاهی تا شکم هم میرسد و یار اناجا اینکه استرخا رسیده منتهی شده و حس معطل شده چنان معلوم میشود که گویا  
 کسی آنجا را ازین محکم بسته است و از آن گاهی سلس البول و گازی احتباس بول و همچنین جریان شکم یا قیص طبعیت  
 عارض میگردد و با تحلی بول و براز از اختیار مرضی دفع نمیشوند و قارور که ریاسفیدی و بدبوی بسیار بود و قرن سرن بر  
 مفصل استخوان و رگ یا جگر خم پیدا میشود زیرا که سبب عدم حس و حرکت چون غذا کم میرسد جلد ضعیف میگردد و از مالیدن  
 در آن زخم پیدا میشود و چون زخم پیدا شود و از علل و ران نشی ظاهر گردد و روز بروز زیاد میشود و گویا بسبب عدم حس شکم  
 از دروه الم نمیکند لیکن بسبب خارج شدن ریم و فاسد شدن خون روز بروز ضعف زیاده میشود تا آنکه می میرد و  
 آنچه بسبب رسیدن ضرر بود فوراً بعد ضرب و سقوط عارض میشود و انجام این قسم آنست که آنچه بسبب ضرب و شکستن  
 استخوان و جدا شدن آن از مفصل فقار بود لا علاج است و آنچه از مرض فقار یا نخاع بود در آن از علاج قدری  
 خفت ظاهر میشود لیکن محبت کلی حاصل نمیشود و آنچه به پسران و دختران تا بالغ یا از کثرت مباشرت زنان یا از دردمشانه

سبب فلج گردن که درون فقره  
 از فقره چهارم تا آخر رسد

پیشتره فلج گردن که درون فقره  
 از فقره چهارم تا آخر رسد



چنانکه قوت حرکت و حس در آن نفوذ میگرداند و نفوذ می شود و اگر قدری نفوذ هم کند عضلات بسبب فساد حال عصاب از اثر قوت متاثر نمی شوند و گاهی اجزای اسرلی بدلیه طرود طعام و آب در بدن داخل میشوند و باید که همیشه از خوردن و آشامیدن در طرود اسرلی احتیاط کرده شود علامات اول آنکه هر دو دست از مفصل زدن که باشت دست ست مسخری شده می آویزند و یکا میشوند دوم آنکه عضلات زدن جانب انسی و وحشی هر دو خشک و لاغر میشوند سوم آنکه بر سر لته گردند از ان خط سیاه پیدا میشود و بیش آنست که اجزای اسرلی عروق لته را که بر سر لته هستند از حرکت بند میکنند و ازین جهت خون در آنها جاری نمیشود بلکه قدر بر سر آنها سیاه شده باقی میماند چهارم آنکه طبع بسیار قبض بود پنجم آنکه گاه قویج از ان عارض میشود انجام مرض اینست که اگر علاج کرده شود صحت میشود و گاهی منجر بصرع میگردد و بعد آن هلاک میشود علاج اول اجزای اسرلی را از بدن بیرون کنند و برای اخراج آن پشاس ایدائیذ از پنج گرین تاده و یا بست گرین بعد چهار ساعت آب حل کرده بخوراند یا فیری ایدائیذ از پنج گرین تاده گرین بنوشانند و در آب گرم علیل را هر روز بنشانند تا اجزای اسرلی خارج شوند و اگر این آب گوگرد بود بهترست و اگر آب گوگرد میسر نشود سه توله گوگرد ساییده با پشاس سلفائیذ که ارد و اوالتس تا چهار اوالتس باشد حل کرده در آب گرم آمیخته در آن بیمار را نشانند این تدبیر اخراج اجزای اسرلی است چون اسرب خارج شود تدبیر تقویت اعضای مسترخیه نمایند و برای آن بر اندام و عضلات علیل مالش زیاد سازند و بعد مالش را در پنج برقی تحریک و تقویت کنند باین نحو که یک سر آن در دست راست و یک سر آن در دست چپ بسیار داده و تحریک کنند و اسرک کنیا خوراند بقدر رست و چهارم حصه گرین و این را روزانه خوراند و بنشیند بخوکیه سابق گفته شده و چون درین مرض طبیعت قبض میباشد و بلا طور صحت در بدن از دادن مسهل در دوا معاز داده میشود زیرا که درین مرض ریشیه طولانی است مسترخیه و ریشیه مدور عریض متشنج میباشد درین صورت مسهل فعل خود را بدشواری میکند لهذا تا بطور صحت و خفت مسهل ندهند و عوض آن از آب گرم یا آب صابون یا از آنچه مناسب دانند از ان بطور حقه اعمارا هر روز صاف کرده باشند قبض شکم رفع شود و چون آثار صحت ظاهر شوند مسهل دهند و مسهل قدری لاؤ و ناضر و شراب کنند که تشنج ریشیه عریض را کم کند و همیشه آهسته شکم را از جانب راس تا جانب چپ مالیدن بمین بر رخ قبض میشود و چون بیمار صحت تامه حاصل شود لیکن بعد آنهم او را اجتناب از عمل اسرب ممکن نباشد درین صورت او را امر و تعلیم کنند که قبل خوردن طعام دست و دهان و ریش و بروت خود را خوب از آب بشوید و آب کبیکی بنوشد و در آن قدری سلفیورک ایستد انداخته بنوشد و لباسی که وقت کار اسرب می پوشد آنرا بعد فراغ از کار

نوشته و از بدن فوراً جدا کند تا از ضرر آن محفوظ بماند و قسم چهارم که استرخای عضو خاص ضعیفست مثل استرخای  
یک دست یا یک انگشت و آن بسبب منقرض شدن عصب که آرند حس و حرکت باشد می افتد بی آنکه سببش  
در و مانع یا مخرج بود و آن بچند وجه میشود یکی آنکه کسی دست خود را بر جسم صلب نهاده بخواب رود و از آن عصب  
منقرض شود یا در عصب مذکور سختی یا ورم پیدا شود و هم چنانکه از غیر عصب این استرخا پیدا میشود از قطع عصب هم پیدا  
میشود اما آنچه از غیر عصبست اگر تادیر غیر عصب رسیده باشد گاهی این استرخا همیشه باقی میماند لیکن در حس فتور و رقیق  
نمیشود و گاهی این قسم استرخا از بستن رباط که وقت شکستن استخوان بزور و قوت بدش میکند حادث میشود و گاهی  
طیب خیال آن نکند و آنچه از قطع و زخم عصب حادث میشود پس اگر عصب کبیر قطع شده لا علاج است و اگر عصب کوچک  
قطع یا زخمی شده باشد بعد اتصال سید صحت است بآنکه درین جمله اقسام مالش اندام و تقویت اعصاب بذریعہ تخمیری  
نماید و گاهی استرخای عضوی از کمزوری شروع میشود و لیکن سببش ظاهر نباشد و رفته رفته تمام بدن را عام میگردد و همه  
بدن در آن خشک میشود و لاغر گردد و آخر امر بسرفراگانه منقرضند و بلکه میکنند و سببش اینست که چون کمزوری  
بر پدید آید از دفع کردن بلغم عاجز شود و بسبب آن از انسداد تنفس هلاک میشود و در بعضی سبب آن در میان  
اطباء قیل و قال بسیار است اما اقرب آنست که این استرخا از فساد و جسم اسودد و مانی میباشد و علاج خاص آن نیست  
شاید از تحریک و تقویت بواسطت تخمیری برقی فایده ظاهر شود و البته گاهی قسمی از استرخاست که در آن عضله کف دست  
راست که زیر انگشت است مافت و متنازی و مسترخ می شود و ریشۀ عصب ترک که در آنست ضعیف و مسترخ میگردد  
و بسبب آن قوت در انگشت زایل میشود و اکثر این قسم استرخا بکاتبان و محرابان که زیاد تحریر میکنند عارض میشود  
امد از زبان انگریزی آنرا اسکرو ورس یا لزی بکسر اله و سکون سین مملو و کسر کاف و ضم برای مملو و سکون و او فتح  
نوز و سکون رای مملو و سین مملو و فتح بای مملو و فارسی و سکون الت و لام و کسر رای مملو و سکون بای مملو و تبتانی بمعنی  
فلج کاتبان نامند و اکثر این مرض از زیاده مشتت کردن در کتابت عارض میشود علامتش آنست که در زمان نوشتن دست ماست  
در وی شود و رفته رفته این درد تا مفاصل نرسد و اگر گرفتن قلم در دست و نوشتن از دست و در انگشت زیاده میشود  
و آخر چنان شدت میکند که اگر بجز قلم گرفته نوزم کتابت نماید از او مت انگشتان کشاده قلم خود بخورد از دست می افتد  
و نوشتن ممکن نشود علاج این مرض آنست که دست را آرام دهند و بحالت سکون دارند و مطلقاً تا عود قوت کتابت  
ترک کنند و هرگاه در شدت کند سکونت و جمع و محملات را بنهم مقویات از خارج استعمال نمایند و مقویات راس و عصب  
مثل مرکبات فاسفورس آهن و کچک و استرخا و ادویه که آرام بدماغ میرسانند مثل بروما و ایدریم و هایدریت کاول  
لیکچرانی سائیس و غیره حسب مناسبت ضمیمه کرده بنوشانند و آنچه در علاج قلم نوشته شده اینجا بجل آرند  
و طبع را همین دارند و آنچه مقویه خورانی و تخمینی برای تقویت غول کتبین بنوشند و در تهلل نوشتن ایشان















شود و بعد شش کام تاثیر نیست آن نیست که تشنج در گلو و بر پرده شکم معضوض ظاهر میشود و از فم معده و شروع میشود و تا قلب گاهی  
 تا گلو میرسد و در بین علل لعاب پنج چسبند پیدا میشود و عطش زیاد میگردد لیکن از آب خائف میباشد ازین سبب نمیشود  
 و در او ایل هوش و حواس علیل صاف بودند لیکن در آخر امر در مرض بخودی و بدجوابی و پندریان ظاهر میشود و بعضی تا مرگ میگرد  
 حواس باقی میماند لیکن باید دانست که این علامات مذکوره بر یک طور در همه اشخاص یافته نمیشوند بلکه در اشخاص متعددا بطور  
 مختلفه یافته شوند چنانکه گاه قبل از ظهور علامات مذکوره بر تحمل زخم گزیدن سنگ یوانه که بشه باشد سرخی ورم ظاهر میشوند  
 قدری در دوران مثل غزازه پیدایشه بسوی اعلی بدن صعود میکنند از همه پیشتر طبیعت کلب کلب فی سگ گزیده علامات  
 مایه نولیا مثل غم بی وجود حشمت کفی خوابت شب حب حرارت عارض میشود و آنها ساقها گردن بدن عطش پیدا میشود  
 بعد آن علامات مذکوره عارض میشوند اما هرگاه مرض مستحکم شود تشنج عام بدن باد و عارض میگردد و وقت دور تشنج عقل  
 زایل میگردد و در کلمات مخوفانه صادر میشوند گاه گاه میخواهد که هر که از پرستاران و نچیره ازان قریب آید آنرا بگردد و لعاب از دهانش  
 جاری میشود و هر قدر که لعاب جاری میشود عطش زیاد میگردد لیکن هرگاه آب و بروی آن آید یا کسفی که آب کند یا رشتی پدید  
 یا هو باد و رسد یا کسی بدن آنرا مس کند فوراً تشنج خالیف عظیم باو عارض شود مثل حالتی که طفل از نشاندن در آب سرد عارض  
 میگردد و بر او طاری میشود و او از خایفانه از او بر آید و گاهی تشنج او چند ساعت بر طرف میشود و بسبب آن آب مینوشد ازین سبب  
 مردمان گمان میکنند که صحیح شد لیکن بعد آن باز تشنج عارض میشود انجام این مرض هلاکت است گاهی از بند شدن حرکت  
 قلب غش کرده میبرد و گاهی بسبب بند شدن حرکت ریه تشنج خلق هلاک میگردد و زمانی بسبب یاقی ضعف شدت کمزوری  
 می میرد و لیکن باید دانست که ضرورت نیست که هرگاه سنگ یوانه کسی را بگردد معضوض باین مرض مبتلا شود بلکه آنچه از تجربه لایق باشد  
 آنست که از پانزده یا بیست کس معضوضین که با چاکلت مبتلا میشوند و پانزده یا بیست کس که تشنج زخم بر دست یا روی آن رسیده باشند زیرا که این مرض بواسطه  
 سائر غیبات که بسبب آن دندان سگ از لعاب سمی صاف شده بدن دخیل شوند و گاهی در و ماغ سگ ورم پیدا میشود  
 و بسبب آن بعضی اعضایش مثل دست پاسترخی میشوند و درین وقت بسبب متنازی بودن خود هر که نزد آن رود آنرا میگزیند  
 اما از گزیدن آن ضرری نمیرسد علاج هرگاه این مرض موجود بود و لا علاج است اما اگر قبل از ظهور این علامات برای حفظ وقوع  
 در این آفت بجهت گزیدن سگ دیوانه گوشت زخم رسیده را از کار برد و برید بران حجامت نهاده بکشند یا خود یا کسی امر کنند که از  
 تشنج خون فاسد را کشند و برین کند بعد زخم کار و کاشک بخوبی نهند تا گوشت مرده شود و ریم کند زخم را بجلد بپوشانند  
 تا خوب ماه ریم ازان خارج شود و هر فسادی که در آن آمده باشد خارج شود بهتر است و امید قوی نیست که از این تدبیر  
 اگر چه یک عضو خواب شود لیکن بجات بدن نقصانی نرسد چون مرض عارض شود درین وقت جز اینکه حفاظت مرض  
 هماکن نمایند وقت یاقی تشنج کلار فام بپایند و کلورل یا میدیث آب حل کرده نوشانند و بدماغ آرام رسانند و گیتریک  
 نیست و انجام بر آنست که نوشته شد و ایضا علاج جدید برای این مرض که ازان مرض صحت یافته نیست که اول بعد

ظهور علامات سنگره و سوزیدن و دوائی پیکر کار برین که جوهر حشیش جوهر نندی است به قیتم حصه گیرین که وقتیه بآب ساده حل کرده بر  
جلد بازوی جانب چپ بزیاده راقه رسانند برین بعد بروایکد شپاس و درم و کلون با یکدیگر ریخت چهار درم شیرین کبودا پاک  
اوش همراه آب ساده حل کرده بتدریج برین نوشانند تا تشنج را بالغ شود و چونکه جوهر نندی لعاب و هن زیاده پیدا میکند ازین  
سبب از راقه جوهر آن برین مرض خشک نمیشود و همیشه تر میماند و از آن تشنگی غالب نمیکند و فصل بیست و چهارم در تندرستی  
و کمتر از آنکه از زبان گشایش کسری منقوطه بندی اول و سکون تابی منقوطه ثانی و فتح نون و سکون سین جمله نندین  
قسم تندرستی که از تشنج باشد و این تشنج در عضلاتی که حرکت آن اختیاری است و عصب حرکت آن از نخاع آمده اند واقع میشود و در  
عضلاتی که حرکت آن بلا اختیار واقع میشود و عصب حرکت آن از عصب سینه میگذرد و از شل قلب عضلات معده و غیره حادث  
نمیشود و کمتر از بر سهیمیت واقع میشود که آنکه بجانب قدم کشد و آنکه بجانب شانه کشد و سوم آنکه بجانب سین یا یسار کشد که شش است  
که بجانب خلف میکشد حرکت تشنجی میکند عقل حواس درین مرض سالم و صحیح میباشد زیرا که سبب آن در دماغ نمیشود بلکه از نخاع  
بود و سبب متناوبی شدن آن بهین سبب فساد عقل حواس غلیل ظاهر نمیشود و تعیین اصل سبب فساد حاصل آن غلیل  
است لیکن آنچه بعد تشنج عقل پاره شده است که دم یا آب در نخاع پیدا میشود فی الواقع این سبب هم در اکثر مرض یافته میشود و  
بهین مرض نیست بالجمله اصل سبب فساد حاصل آن تا حال تحقیق نرسیده بهین قدر دانسته میشود که متفر شدن نخاع سبب  
محدث است زیرا که اکثر مرض تشنجی در عضلات است که حرکت آن بلا اختیار است و تعلق این عضلات به نخاع ظاهر است چنانکه عصب  
حرکت آن از نخاع آمده اند و سلاست عقل حواس دلیل واضح است بر اینکه فساد در دماغ نیست این مرض اگر چه در بلا و حار بارز و  
میشود لیکن در بلا و حار زیاده میشود سبب بعید آن گاهی رسیدن هوای سرد به بدن باشد گاهی بسبب زیت زخم که سبب قطع  
عضو یا سوختن آن یا از زاییدن واقع شود و اکثر طفل نوملود را اندرون و هفته اولی عارض میشود و آنرا بهندی  
هموگامینا مانند گاهی از نخودن شکر مینمایا کچالو گاهی از اذیت گرم شکم گاهی از اذیت زخم عارض میشود و گاهی گز سبب آن ظاهر  
نمیشود علامات اول برگردن و فکین و صلبان و در گلو و قدری در سینه محسوس میشود و تا آنکه از رسیدن هوای سرد میباشد  
و وقت از دوا و طعام و نوشیدن آب قدری دشواری حادث میگردد و درین کم کشاده میشود و در سینه تنگی محسوس میگردد و عضلات  
بطرف سخت میشوند و بر پرده شکم تشنج محسوس میشود و در تاقاطا غیری که در دین مرض کمتر دوره میکند و صدق بیمار درین  
بر این نیست میباشد که اگر با ابراهیم متصل و تشنج با تبسط مشابه بدن ضاحک بالای پیشانی چین زیاده بود و عیوس قوت  
دوره شدت زیاده تبسط میشود سبب اینکه یک عضله دقیق زیر جلد آمده است که آن محرک جلد است آن در حیوانات زیاده است  
چنانچه از قوت همان عصب است که جلد خود را جدا گانه از بدن خود حرکت میدهد و با یکدیگر تشنج این عضله از گزین تشنج آمده  
پس هر قدر که در عضله تشنج واقع میشود انقباض تشنج زیاده محسوس میشود و از آن صورت ضاحک پیدا میگردد و چون تشنج  
متشکم شود و دوره مرض بادی سبب مریض مثل دیدن آب یا دیدن روشنی آفتاب بلکه قسم ضواء و صدقه لبس بدن یا صدقه هوا یا تشنج

فصل بیست و چهارم

در تندرستی

جوهر کافور از زردی و تشنج





نی هر قهلال را و باید و تفکر هم ناقص میشود و بتدریج عقل و حواس درین مرض کم میشوند تا اینکه هرگاه آب برداغ زیاد شود یکبار حالتی مثل سکنه عارض میشود و از آن مرضی بپاک میگردد و و این قسم رعشه که به پیران می افتد لا علاج است لیکن برای بزرگه مرضی قوی نشود و و به تقویه مثل آب آهین و کینین خوشانند و اغذیه مقویه مثل لحم و زرده بقیضه مرغ با نان کنند هم بخوراند بزرگه زنجیر برقی تقویت نمایند و گاهی رعشه بسبب خوردن سیب عارض میشود چنانکه جالبان تادمت در آن زیاد بخوراند و از بدن برآوردن آنرا انداختن پس هرگاه اجزای حیوانی در درماغ و نخاع مجتمع میشود و درماغ از آن متاثر می شود ضعیف میگردد و از آن رعشه پیدا میشود لیکن درین قسم رعشه علم برای بدن یکبار عارض میشود مثل رعشه پیران اول تنها در سر عارض نمیشود و علامتش آنست که ایواید شپا سیم همراه دمای تلخ مثل آب قصبه الزریره یا آب کلنا حله کرده بنوشانند تخصیص استعمال این دو باد دمای تلخ بنا بر آنست که ایواید شپا سیم برای سیکون هم چون معالض است ازین سبب سقا طهوت طعام میکنند ضرر نیست که استعمال آن تادمت دراز کرده شود پس اگر بلا مصلحت تادمت دراز مستعمل شود با سقا طهوت طعام ضرر عظیم بین خواهد رسانید از این چون تلخی مقوی معده و دفع ضرر دایمی که کور است پس آنرا شرط استعمال آن کرده و همچنین قدری سودا همراه آن ضرر نداشتند که از آن فعل یقین واقوی میشود و هم درین مرض بهتر نیست که گوگرد را که هم حله کرده درین آب بیمارانشانند تا بسبب قفح مسام اجزای حیوانی از خون جدا شده از راه مسام هم خارج شوند و هم گوگرد صاف از ده گریز تا بنیست گریز باشد خالص یا شیر و حله کرده بیمار را بخوراند و گاهی رعشه بعد سکنه و فاج عارض میشود و علامتش آنست که در یک دست یا یک پا یا یک جانب بدن که در آن بیشتر فاج بود عارض میشود و جنبش آنست که هرگاه قدری عضو قوی قوی آید این قسم حرکت میکند و این قسم لا علاج است زیرا که در آنهم درماغ انقباض رسیده است لیکن برای تقویت عضو قوی تر و فرمایند که و لک زیاد نمایند و بدینجهت زنجیر برقی تقویت عصبان نمایند و شکینا نورانند و گاهی از کیفیات نقصانیه مثل خوف و خشی و از خوردن تنباکو و زیاد نوشیدن طبع چاسی یا شراب هم رعشه عارض میشود و درین قسم رفع سبب کافی است مثلاً اگر از زیاد خوشی بود از خوردن غاصه مقابله سبب کنند و اگر از کثرت خوف بود خوف را رفع سازند و اگر از خوردن تنباکو یا نوشیدن شراب بود آنرا ترک کنند و اگر بعد از آن قدری باقی ماند تقویت کافی است فصل سبب ششم در صرع یعنی بی حس شدن عضو از ابلیغ گر یک آن بیشتر بگویند و این مرض آنست که ثبوت حس در عصب آنرا حس نیاید یا کمتر آید و از آن حس عضوی که این عصب در آن آمده باطل یا ناقص شود و باید دانست که گاهی حس در قبل عروق فاج عارض میشود و کثرت آنست که همراه فاج میباشد و گاهی بدن فاج هم میباشد و فی الحقیقت حس در بیشتر عروق عصب حس است چنانکه هر فاج عصب حرکت فاج است چنانکه در فاج دست و پا گاهی حرکت باطل و گاهی ناقص میشود همچنین درین مرض هم گاهی باطل و گاهی ناقص میگردد و زیاد اثر این مرض بر ظاهر جلده بدن محسوس میشود و اگر بزرگتر عصبه هم می افتد زیرا که عصبان حس زیاد بر ظاهر جلده اند و گاهی بی حسی در بعضی و انتفع یک عضو میباشد و گاهی تنبنا

اگر از اینها سبب در دست و پا گاهی تنبنا

فصل سبب ششم در صرع





سم افکار صید منفعت است و بعضی طببا خوراندن و غن کردن را برای این خدر امر کرده اند و مالش کردن و غن کردن  
بر عضوی حس مفید است و طببا نهادن پلاسترش گیس را بر محل خدر مفید گفته اند فصل سست و نهم در لقوه یعنی کج  
و من بلغت گشایش فیشل بر لوزیر گویند و آنهم فاج عضو خاص است که سبب استرخائی ریشه ریح سابع که محرک است  
عارض میشود و گاهی با استرخائی ریشه زوج سابع زوج خاص هم مسترخ می شود هرگاه سبب استرخا و داغی بود و این  
وقت همراه لقوه خدر هم میباشد و از تخلع هر دو هم دهنسته میشود که سبب داغی است الاسباب سبب آن باد داغ  
بودن و دم داغ یا نرمی یا صلابت آن یا انقباض داغ بسبب یادتای خون و عروق و شریان داغ یا زیادتی آب در  
بطون داغ یا در عصب بود مثل آنکه دم در منفذ عصب مذکور که در استخوان گوش است قمع شود یا دم بالای رخسار  
فتی و از آن عصب منفر شود یا نرم بر رخسار قریب گوش و از آن عصب مذکور قطع شود و گاهی سبب در عضای دیگر  
بود و بمشاکت آن لقوه پیدا شود مثل در دندان یا خارج بدن بود مثل آنکه از رسیدن هوای سرد عارض شود و معلوما  
اول درین علیل کج میشود و بسبب اینکه عضله که از تحریک زوج سابع متحرک میشود ضعیف و مسترخ می گردد و عضله که در  
صحیح مقابل جهت علیل است بسوی خود میکشد چون استقامت درین موقوف بر نیست که هر دو عضله برابر باشند  
تا درین است ماند و هرگاه یکی بسبب ضعف و استرخائی خود از کشیدن باز ماند و دیگری بسوی خود کشد پس در این  
وقت بسبب کشش صحیح بسوی آن برین منجذب شده کج نماید چون طعام بخورد و در رخسار مسترخ می شود و طعام جمع میشود و او بسبب  
استرخائی خود طعام را بسوی حلق دفع نمیکند چنانکه در حال صحت دفع میکرد و هرگاه لقوه بسبب داغی بود در آن اثر  
استرخا بر زبان هم ظاهر شود و اگر غیر داغی بود از آنست که بان محفوظ ماند چنانکه بر رخسار و پیشانی بود زایل میشود و علیل  
ضعیف ممکن نبود و چنانچه چون خواهد که ضعیف او کند و از شدت خارج شود و از ضعیف بر نیاید و چشم با هم نشود و بسبب کشا و  
ماندن چشم است که در چشم دو عضله اند که یکی گرد مقله از آن چشم بد میشود دوم از داغ رست بخط مستقیم در جنب علی آمده  
و از آن چشم کشاده میشود پس هرگاه عضله ثانی ضعیف شود و فاتحه بر قوت خود ماند چشم کشاده می ماند و حرکت اجفال کم شود و در  
بند شدن چشم سرخ گردد زیرا که صاف کننده چشم که جفن است از کار خود باز ماند و بسبب آن هوا و غبار و دخان چشم میبرد  
و خشکی بر زبان چشم افتد که از آن متنازی شود و سرخ میگردد و هرگاه لقوه با در گوش باشد از آن دهنسته میشود که دم قریب منفذ  
عصب که ریشه زوج سابع است حادث شده و در گوش بران دلالت میکند علاج اول هرگاه لقوه ظاهر شود  
بلا انتظار رفع سهل میباشد که این علاج عام است و چنانکه در کتب طبیه عربیه نوشته اند که دو هفته مسلسل نهند بر ابرو  
نوشانند قابل التفات نیست سن بعد آنخص سبب نمایند و باز آن پروازند مثلاً هرگاه سبب آن در استخوان گوش باشد  
ز لوزیر گوش چسباند و قدری کاویل خوراندند که دم را دفع کند و اگر خوراندن کلوم بقدر قلیل کافی نشود و مکرر خوراندند  
تا درین جوش کنند بر بعد او و اندک پاش همراه وای تلخ از ده گریز تبست گرین بخورند و کک پلاسترش گیس بر گوش نهند و چشم

در  
نهم  
در  
لقوه

فصل بیست و ششم و هشتاد

در رسیدن سردی بود در آن آب آهن کمین خوراندن بسیار مفید است و پارچه آب گرم تر کرده و نشسته روغن قارمین  
 بر آن پاشیده بر محل ملقوبه بندند و هم نوشانیدن روغن تارمین ده قطره همراه آب مفید است من بعد علاج تنه رستی  
 از غریبه و اهوویه نمایند فصل بیست و هشت و نهم در هتلاخ یعنی پیری عضو و این باخود است از قول عرب احتیاج  
 العبدن ای طارک و ان قسی اتشخ خفیف است که در عضله میشود و کثر این حالت بمقام خاص عضله عارض میگردد  
 در تمام عضو بلکه در تمام عضله هم مکرر عارض میشود الاسباب فی الواقع این مرض عصبی است و سبب قریب آن مجهول است  
 از تشنج ثابت نشده اما فور است که اذیت عصب سبب آن واقع میشود زیرا که این مرض از جمله حرکات است و جمیع کار  
 منوط با عصاب اند و موزی عصب عام است که در داغ و دیار و شخاع باشد یا در عضای دیگر بود زیرا که عصب  
 چنانکه از آنکه متنازی میشود همچنین از آنکه طراف هم متنازی میگردد و مثالش نیست که اگر کسی کار در ابر کفون بالای  
 محل شخاع زند چنانکه از آن شخاع قطع شود و از آن حد دست حرکت تشنجی ظاهر میشود همچنین اگر کسی کار در ابر سر امان از قطع  
 کند از آنهم در دست تشنج ظاهر میشود و بسوی مبداء خود هر یک یک و عضله تشنج میشود و ازین ثابت شد که عصب از اذیت  
 مبداء و غیر مبداء خود متنازی میشود اما سبب مبداء آن متعذر دانسته میشود زیرا که بیرونه صان شدن خون است وقتی که گردد  
 یا جلد از کار خود بازماند و فضول و موی را از دم جدا کند از آن عضله را خدای صاف نیست زیرا که از عضله هم فضول  
 دفع نشود و در آن مجتمع مانده ازین سبب عضله و عصاب تضییع میشوند و میگویند که نیرایه حرکت این فضول را دفع کنند  
 و هم کثر از زیاد خوردن تنباکو و طبخ چای ایستاد عارض میگردد زیرا که قوی بسیار آن باخون مختلط شده چون باغ  
 پیوسته از افریتم خوردن و تنباکو را خورده و گاهی تشنج شکم هم هرگاه معده را درگیر جمع شود و قدری از آن در خون  
 مختلط شده در بدن حرکت کند این حالت عارض میگردد زیرا که از تشنج معده را جمیع تشنج عارضی صاف و بعضا نیر عصب  
 ضرورت من بعد اگر از نرسد و مسام جلونه آمدن عرق باشد و آب گرم میل را نشانند و دوا می معرق مثل و در  
 پودر از پنج شش گرین تاده گرین بالا بکریه و بنایه ششاس دوسه درهم آب حاکم نوشانند تا عرق آمده جلد صاف شود  
 و اگر از ضعف گرده بود دوا می در بول مثل ششاس نیرین ششاس بنیاس نایه گریه همراه آب حاکم ده نوشانند  
 یا اکثر اکث کاشیک که رب سورنجان تلخ است یا خود سورنجان تلخ همراه آب یا پودر بنیاس همراه آب گرم دوا می  
 بنوشانند که آن یور یا راکه جوهر فاسد مختلط باخون بود از خون میکشد و از خوردن تنباکو و چای بود آنرا ترک کنند تا کمتر  
 استعمال آن و در دوا می صاف بیمار را بگردانند تا خدای سینه خارج شوند و آنچه از قبض شکم بود در آن مسهل ملین دهند  
 و آنچه از جمیع صفرا و جگر و مختلط شدن طی از آن در خون بود در آن اول مسهل غریج صفرا مثل آب ترندی یا شیر شست  
 یا سمنونیا یا لیل زرد همراه بول بنوشانند تا آنچه صفرا و جگر است با سهال خارج شود و خون نیاید و آنچه باخون مختلط شده  
 در بدن رفته و بند ریمه سهال دفع شدن آن از توسط کبد ممکن نیست پس ازین مسهل ای نیست که از آن صفرا و جگر در بدن نشسته

و بعضی

در کبد آید و از آن در معده و معاً آمده با سهال دفع شود زیرا که دوران خون که از دل شروع میشود اول با عضای دیگر  
میرسد و قریب ختم تمام دوران به جگر میرسد پس بهتر برای اخراج آن این است که بعد نوشتن این سهال ادویه مده بول  
چنانکه پیشتر نوشته شده نوشتن تا از راه بول بسوزد دفع شود و موافق همین قاعده در علاج یرقان هم سلوک حبیب  
دانند که سهال بقدر احتیاج صفرا در جگر نمایند و بعد از آن در خون مختلط شده آنرا بنده باده ادویه مده بول بیرون آرند باز  
دست که هرگاه اختلاج بسبب مانعی بود مثل آنکه خون در عروق مانع یا آب در بطون آن مجتمع شد باشد اختلاج مدتی  
ثابت باقی بماند نجاش نیست که صرع یا قوه تشنج یا لخته یا پدید میآید بسبب ضعف نقصان مانع پس اگر اختلاج از  
اجتماع خون یا آب در و مانع عارض شده باشد بر آن مدتی بگذرد که زایل نشود و خوف عارض امراض مذکوره بود  
و اختلاج مندر برای امراض صعبه قویه باشد در این وقت باید که مسهل قوی مثل روغن حبیب اسلاطین بنوشانند تا که خون  
یا آب هر چه در و مانع مجتمع بود کم شود و بعد بپنجه که در فعل گردد یا فعل جلد بدن نقصان است اگر باشد موافق آن  
تدارک نمایند مثلاً اگر بول کم آمده باشد در رات بول نوشتن و اگر جلد گرم زیاده بود و عرق نیامده باشد یا قبلت آید  
بیمار را در آب گرم نشاند و معرقات نوشتن تا اختلاج از سبب مانعی یا از نوشیدن مطبوخ چای یا از کشیدن دود و بخور  
تنباکو پیدا شده باشد و آن از نوشاندن هشت کتیا که محلول با سلفیو کایس و آب ساده باشد یا از خوردن کپله کپاش  
آن نفع کشیر ظاهر میشود و کسی که مجتنب از شراب نباشد آنرا شکر و نمک و آب پیچ قطره تا ده قطره همراه یک و او نش آب ساده  
حاکم و نوشاندن بسیار مفید است فتک اگر فصل بست و نهم در زکام مندر در کتب عربیه زکام نیست که ما و  
از و مانع بسوی منخرین نخته دفع شود و نزله نیست که از بطون مانع ماده بسوی حلق میرود گاهی هر دو را نزله مینامند  
اما این قول از صحت عاریست زیرا که از و مانع که راه بسوی بینی حلق نیست که از آن ماده ریزد و فی الحقیقت کام هم هم  
غشائی اندرونی بینی است که مولد رطوبات است و آنرا میکوس میگویند مینامند این هم گاهی تا داخل میشن یعنی هم حار  
که با سرخی و درد بود و میرسد و گاهی قبل از رسیدن باین حد زایل میشود و موافق تابعین اطباء یونانی ما و کم این ورم  
تا استخوان نفوذ از آن تجاوز بسوی حلق نموده کام نام کرد و خواهرش چه منافق جویان طوبات از نف زکام مینامند  
ولیکن بربان گر یک قدیم آنرا کتار بفتح کات نامی هندی و سکون الف و رای مملیه یعنی جاری شدن آب مینامند  
عام از نیکله بینی یا از چشم یا از دهن جاری شود پس بنا برین کام و نزله مترادف خواهد بود و بربان نگارش کوله بضم کات  
و سکون و او و لام و دال هندی یعنی سردی نامنا السبب بسبب این رم رسیدن سردی بود مثل آنکه کسی تعب و شفت  
بدنی نماید و از آن بدش گرم شود و در حال گرمی بدن هوای سرد یکبار به بدن سواران این مرض پیدا میشود و همچنین از  
تبدیل فصول اختلاف قوع خرو برد در هوا خصوصاً و قتی که از گرمی هوا بسوی سردی میل کنند این مرض پیدا میشود  
و این مرض عموماً به کبار و صغار هر دو مرض میشود اما کسی که ضعیف و کمزور اندر زودی ترین مرض مبتلا می شود این مرض هم بطور امراض

طریق اخراج مندر در رتقان

فصل بست و نهم در زکام مندر

عام میگردد و کلک کثیر یکبار عارض میشود مثل هر ضربه بای از یک بلده به بلده منتقل میگردد علامات باعتبار درجات  
و هم در خفت شدت خفت شدید باشد که نت است که قبل حادث ورم و ظهور کام بالای ناف در پیشانی قدیمی و نقل  
محسوس میشود در بینی خشکی و اولا ظاهر میشود در چشمان قدیمی حرمت ظاهر میگردد و منخرین بند میشود یعنی تنفس راه بینی بشود  
میشود بعد از بینی آب جاری میگردد و اول آنچه جاری میشود بسیار قوی گرم بود و گاهی ری خون هم آن مختلط میباشد  
افتاح عروق صغائر از حدت این آب بر منخرین حرمت ظاهر میشود گاهی بشور خرد بران می خندند من بعد این  
آب بتدریج از رقت بسوی غلظت مایل میشود و هر قدر که غلیظ میشود مرض خفیف میگردد تا اینکه مرض صحیح میشود و این حال مال این  
ورم است و نمیکه خفیف باشد را چون این م شدید کثیر دوس عظمه است و از تر می بیند آب کثیر جاری بود و حرمت چشمان زیاده بود  
و آب از چشمان هم جاری باشد بسبب سیدن اثر این م تا میگویند منخرین چشم شریک شدن آن با ورم میگویند منخرین بینی  
و هر گاه هم در عارض شود و وقت از در او دوری ظاهر گردد زیرا که اثر این م تا میگویند منخرین حلق هم میرسد از آن این عارض ظاهر  
میشود و از گوش کم شنیده میشود زیرا که اثر این م میگویند منخرین مجری گوش که در آن از راه دهن هوا جاری میشود و م  
میگردد و بسبب م آن آمد و رفت هوا بند میشود و از آن در سماعت قلت آید میباید چون این م تا حلق رسد از علیل میگرد و  
قدیمی سرفه هم عارض میشود چون از حلق هم فرو آید تا خنجره و قصبه میرسد این وقت در میان عظام ترقوه قریب جلد علیل است  
از قسم حکان غیر حنا که در خیم تازه میباشد محسوس میشود و بسبب آن بار بار حرکت سعالی میکند تا بیدار بعد آن ذیت را از خود دفع  
کند چون این م بر میرسد از آن عوض کام زبر که کاش می بیند یعنی سرفه قوی مینامند هم چون م ز کامی قوی میگردد و  
بخار هم در آن عارض میشود که آنرا بخار کامی مینامند آن قریب من زیاد میشود و در نصف اول شب بسبب یاد قی کافت حمی بشود  
خواب می آید و بعد نصف شب چون حمی کم میشود آرام خواب میکند چون بیدار میشود خفت مرض ظاهر میگردد و انجام این مرض اول  
است که اگر مرض خفیف است نو خود یا از علاج سهل مایل میشود و اگر قوی است بسوی درد گلو و قصبه یا سرفه مودی میگردد و یا از  
پیدا میکند یا سرفه اگر مرض مسلول و زیاده پیدا میکند علاج اگر مرض خفیف بود پس بهر گاه خشکی در بینی محسوس شود باید بخار  
آب گرم در بینی رساند که از آن خشکی رفع شود و رطوبت پیدا شود جاری گردد و همچنین حوض سی یا مثل آن آب گرم بر کرده در آن بجای  
نشاند تا اگر می آب نون بسوی جلد آید از محل م کم شود و اگر مرض را تا زانو در آب بطوخ فرول نشاند پاشو کند و بعد  
بر آوردن آن آب بطوخ چای یا آب بطوخ شعی را آب بطوخ کتان یا آب بطوخ سبوس کند که هم گرم بوند یا تنها آب گرم نشاند  
لباس گرم پوشاند بر بستر سایش خوابانند که ازین صحت خواب شد نشاء است تعالی و ایضا در تبدای ز کام شایسته در مینا  
مفید است صفت اسپریت نامیر که چهار نیم گرم تا یک گرم سلفر که صاف و سفید باشد از بست گرمین نیم گرم همراه آب ساده که از یک  
اونس تا دوش باشد با هم مخته بوشانند ازین جلد طب شد سری بر طرف گردانند چون م زیاده بود درین وقت دای قوی مثل  
مار مار میسک ششم صده گرم یا پخته و نپاچ گرین یعنی سفوف نمینی بپزند یا بپاکوانا از دوسه گرم تا پنج گرم یا نیم گرم و آب

حکمرانه نبوشانند تا قدری غشیان از آن عارض شود و بسبب آن خون بجانب علی می رسد و دم کم گردد و سن بعد سه روز بنه با پنجه  
مسسل با در قیق باشد مثل بیکیشیا سلفاس از چهار دم تا شش دم آب حکمرانه نبوشانند اگر با مسسل مذکور را با زردی یک  
هشتم حصه گرین ترکیب کرد و نبوشانند که سهال هم پیدا سازد و غشیان هم پیدا کند انفع خواهد بود و وقت شام و درین پوره گریز  
کنین پنج گرین با هم تخم بجزر نهند خوب و در عرق بیدرخت بچون از زکام فقط درین بلامی آن پیشانی ازیت بود و در شان تانوش و  
حلق خمد زرسید باشد و ریاضه و صمغ عربی با هم تخم قدری قدری بعد سه ساعته درین سوط نماند چون این فیض شروع  
شود و ملت تطهیر سابقه مذکور برای مرض حاصل نباشد باید که بکچر فیون از بست قطره تا بست پنج قطره آب تخم نبوشانند اگر  
مجتنب شراب بود و در گریز فیون بخورد و طریق دیگر برای علاج این مرض برای کسیکه تداوی بکارد و را میسر نباشد خصوصاً در بلاد  
بست بست چهار ساعت شروع مرض خیری از قسم طعام آب بخورد و نه آشامد تا خون کم شود از شدت زکام محفوظ ماند آنچه از این  
مرض بطور مرض افده خلق اکثر را یکبار عارض میشود و تقسیم سواهی علامات سابقه ضعف و کموری زیاد میباشند حمی زکامی  
در این قسم بسیار کم و با تلسه عارض میشود و علاج در این قسم همانست که گفته شد و علاوه بر آن در این قسم آب بکندین فیون  
و غذای جید مثل شوربای لیمو مثلاً آن بچر بصلت بضم شو خورد و نه شراب قهر هم که باشند نباشند که مجتنب شراب باشد  
آنرا ایله نیا کار بناس آب پودنیه بنمردق یا با نقوع برگ پودنیه یا آبیکه در آن کافور محلول بود نبوشانند فصل ششم سن ام  
در عصابه و آنرا بلخت گر یک تمیمی گریز نیا گویند آن سم در نیم سرت که کثر از ابروی یک جانب شروع میشود و بالا میرود و حقیقت  
این مرض عصبانی است در عصب زنده محل زوایا این در عارض میشود و بیانش نیست که زوایا غاس عصبان از داغ حسه  
کثر عضای جسم میرساند یک فرد از این عصبان بسیار چون از بعد خود و در شود و خواهد که در ثقب عظامی باغ نفوذ کرده  
بعضای ظاهر رسد سه شاخ میشود و شاخ آن در ثقبه عظم مشا بختاش واقع است مثل شد بسوی دندان های بالا و زیر  
میرود و یک شاخ آن در ثقبه از اتصال استخوان پیشانی عظم مشا بختاش پیدا شد و داخل گویا و در چشم بسیار از ایجاد گویا که در  
عظم پیشانی برابر واقع است در آن از آن تیرن می آید بالای سر میرود یکی از جانب پلین و دیگری جانب بسیار و آن و شاخ که بسوی  
دندان پیر از آن شاخی بسوی دندان های بالا که در فک علی اند و نه تا حصول دندان مذکور رسید از ایجاد منفذی که در فک علی تیر  
بینی واقع است مثل شد و در وجهی خسار می آید از آنجا منشعب و منتشر شد و قوت حس در دندان خسار میرساند شاخ دیگر که در دندان  
زیرین مذکور در فک سفلی اند بعد رسیدن خود و نه تا حصول دندان مذکور در ثقبه در فک مثل شد پس مثل شد پس می آید در لب پیرین رخ  
قوت حس میرساند چون این رخ غاس در عارض شود جایکه ازین مواضع ثلثه باشد عصابه بدینا من این در مجرای برود و بر عارض  
قریب بینی بالای رخ قریب شقیقه علی ظاهر میشود لیکن ضرر نیست که هر سه شاخ یکبار در دندان شوند بلکه گاهی یک شاخ و گاهی دو  
شاخ گاهی در هر سه شاخ در میشود و در بلاد باره کثر عصابه که چرنا از رخ خود در بلاد حاره بر یک بر و لیکن هر گاه در شاخ بالا که در گویا  
برآمده عصابه افتد و در آن صعب شد و بدینا شد و کتب عربیه و موم باسم عصابه پین است این قسم مثل مرض مذکور می کنند

و نصف برود در آن ظاهر شود چنانکه گاهی از صبح قریب طلوع قیام شروع میشود و تا ناهار زیاد میگردد و تا نصف روز از بعد زوال شمس  
در آن خفتن و نخلط ظاهر شود و تا نیمه وقت شب بیمار بآرام میماند و گاهی از اول شب شروع باشد و تا ناهار صبح سکون باشد و تا نیمه  
روز بآرام میماند و بعد از آن رگشمنی تانی را قریب میگردد و با یکدیگر چون در شاخ بالای این عصب که از اندرون چشم آمده و اگر او بود  
سیر در آن این مرض حادث شود بسیار سردی خود قیام ماند و در جرم خاص چشم از مس در محسوس شود و نیز قریب جوق کبر در زیاد  
و بسیار کمکنش شده چشم حرکت و در میاید یک برادر و وقت شدت چنان محسوس شود که گویا جبین قریب شکافتن است برابر و بالا  
آمده و در صبح اینجانب بالای سر در و بیاض از لیس نامل ستادی میشود و گاهی از چشم جانب علیل شکستگی میشود و این قیام بود که  
از بیت این عصب تا غده مولد و مع که بالای سق صخره است مودی شود چون این در و در شاخ اوسط آن در کمال علی بر خور آمده عارض  
شود عضما یکدیگر چیریم واقع باشد مثل عضلات خسار و یک منخر جانب علیل از بینی نصف لب بالا میزند و منبسط باشد چون در شاخ سومی که در  
نکات فصل است این در و پیدا شود و شفت غلیظ نصف لب از جانب علیل شریک درین در و بیاض و باید است که کثیر در و در تشخیص این  
بخطای فتنه زیرا که در و این مرض در حقیقت در دندان هم هرگاه در یک جهت باشد عصبه شبیه بیاض شد و بنا بر این تقریر درین ضرورت  
پس بدانکه فرق در عصاب در و ما نیز هم بجهت کبره میشود اول است که عصابه او فی صدره است نهادن یا رسیدن هوا بلکه از ذکر عصاب  
متن می شود و شدت میکند و در و ما نیز هم چنان نیست که از دانی سبب یاده شود بلکه در آن چنانکه است میماند و دیگر آنکه و ما نیز هم میماند  
در و عصاب جی غیب است و هم آنکه گاهی بار و ما نیز هم سخی هم بر ظاهر جلد محسوس میشود و در عصابه جلد راس بر رنگ صلی خود پیدا باشد  
فرق در عصابه شقیقه است که عصابه محل بر و گویا و در عصب که است شروع میشود و تا منتی شاخ خومیر سرد و شقیقه برابر یک  
جانب است این البته تمام عام و از جای مخصوص شروع نمیشود و فرق در و دندان عصابه است که در دندان غایب بود و دانی در آن یکجا اند  
و قیام باشد و در عصابه در عضلات خسار و جلد عارض جایی که شاخ های آن منبسط شدند و شدت میکند محسوس میگردد  
زیادتی و کمی درین در و ظاهر میشود و سبب گاهی سبب رسیدن هوای سرد و دانی سبب قضا و هم مدی و زیاد شدن ترشی معده  
و دانی سبب آن در و ما نیز هم است که سبب آن همان بود که سبب تپ لرزه پیدا شد آن سردی و تری مقام سکونت و  
سردی شب گرمی روز است زیرا که این مرض چشم مثل تپ لرزه نمیکند چنانکه گفته شد گاهی بسبب استخوانیکه در آن منفر و در عصب  
واقع است پیدا میشود و آن قیام بود که این استخوان عظیم شد عصب کور را غرق کند و لیکن اکثر قسم عصابه بصاحبان مرض است که لایق میشود  
قسم عصابه و ولایت یک اکثر صاحب عارض شد و بود چنان شد که در که مرض کور از کا خود باز ماندند و از این فساد و از دانی عصبانی  
سکته شد فعال کردند چون بعد مردن مانع شان کشاده و دیگر معلوم شد که عظم پیشانی زیاد شد و از آن عصب که کور و غریبی و گاهی  
استخوان مجری میروند و در آن لایق شدن یعنی در و در عضلات عارض میشود و از آن این مرض پیدا میشود و کثیر از کور و غریبی و گاهی از جوش زیاد  
خون عارض میشود و دانی از فساد و دانی یعنی متعفن فاسد شدن دندان این مرض پیدا میشود زیرا که درین وقت شاخ این عصب تا حصول دندان  
پیدا سبب فساد دانی فساد می شود و در دندان در و دنیا شد چه از نقص فساد و در آن باقی نماند که از عصب و پیدا شد و از آن عصابه ظاهر بود

تفاوت در عصابه در و ما نیز هم

و



و گاهی از روماتیسم این در پیاپی میشود علاج اول علاج عام در همه اقسام فرمایند و آن نیست که هرگاه در بسیار قوی باشد و بیمار تحمل آن نبود قوی کلار نام بر پارچه انداخته بویانند لیکن نه آنقدر که بیوشی آرد بلکه بقدریکه حس را کم کند و ازین تدبیر قوی از در مسکن میشود و همچنین کابل یا یثرب نشی گرین آب حل کرده بنوشانند و اگر ازین سکون در در و ظاهر نشود بخت گرین دیگر آب حل کرده بنوشانند تا آرام شود و از اینت محفوظ ماند و چون از اینت کم شود و تخصص سبب کرده حسب سبب علاج کنند مثلاً اگر از رسیده بوی بود دران بدن و سر را گرم کنند نمک طعام سائیده گرم کرده بر سر و پیشانی بپارند و در مار فیا بزرگ بر زرقه سوزنی زیر جلد رسانند و اگر مار فیا موجود نباشد آیکونامی یا بایر عمل در دالشی کنند که آن دو واسطی قوی است از ان عضو خدر میشود و طریق استعمالش است آیکونامی یا یک گرین با یک درام موم روغن حل کرده از ان قدری قدری از محل در دالشی و محل الش همان موضع است که برابر و این عصب از گوی استخوان پیشانی بیرون آمده است و اگر قبض باشد درین قسم هم سمل ملین دهند و هرگاه بسبب فساد و تصور مضمع می باشد گرین بود و کار بناس بخوراند که از ان از اینت و ترشی رنگ گردد و اگر ازین کار بنیاید و بر بپانزده گرین و بیگیشیا کار بناس از سی گرین تا چهل یا پنجاه گرین بخوراند و بعد خوراندن آن هم آیکونامی برابر و مانده هرگاه سبب آن در امعا از جهت قبض شکم بود و در حب السلاطین یا هر سملیکه دادن آن مناسب اند و بنوشانیده بگلین شکم کوشند و روغن حب السلاطین بسیار مفید است و هرگاه از سبب تب لرزه بود اول سمل دهند و من بعد کینین از پانزده گرین تا سی گرین قبل از خوردن و آنچه از فساد زیادتی استخوان عارض شده باشد دران علاج آشکاف مفید است یعنی بخوراندن کیلول با فیون جوش دهند پیداکند و بعد آن الودا می کشیم بخوراند و هرگاه از کموری خون باشد فیسی کار بناس که سفوف جدید سرخ رنگ است بخت بخت گرین در یک روز سه بار به بپار بنوشانند و آب آهن از بخت قطره است و پنج قطره همراه آب بنوشانند لیکن قبل از خوردن سفوف جدید یا آب آهن عده و اسعار از سمل یا هم مثل و بر ب و بیگیشیا یا روغن بنیاد صفت کرده باشند اما سمل قوی این بنیاد نه دارند دهند و آنچه از زیادتی خون بود دران اول فصد گیرند و سمل قوی دهند مثل روغن حب السلاطین و غیره تا که نه ده بار از ان اجابت شود آب شیر خارج گردد و از ان خون کم شود و اگر در بیگیشیا سلفاس چهار درام یا ششم حصه یک گرین یا شش یا یک همراه آب خالص که چهار انس بود حل کرده بنوشانند بهتر خواهد بود که با سهال قدری غشیان هم پیدا خواهد کرد که بسبب آن خون بسوی دماغ کم خواهد رفت و آنچه از روماتیسم بدن یا روماتیسم فکلین همراه آن یا بعد زوال روماتیسم بسبب انتقال آن بسوی عصابه عارض شده باشد درین قسم بعد سمل از پانزده گرین تا بخت گرین میوریت آن آیمونیا همراه آب حل کرده چهار پنج خوراک بخوراند که ازین مرض دفع میشود و اگر تا خوراندن پنج چهار دفع نشود این دوران دهند و دوی دیگر بخوراند و چون که این مرض بسیار پیوسته است و اکثر آنست که از دوی واحد و جمیع ابدان فعلی و احصا در نمیشود و اینها بر مزاج تمام اعضاء بیکار و پیوسته میشوند که وقت ضرورت بآن تفصیل نمایند پس بدانکه وقت شدت این مرض تنگی بلا دونا یا اکثر اکسیر اکسیر بلا دونا یا سمل ملین بر و مانده طمک کردن تنگی بود و اینست که قوی بود و بوی صاحب عصابه روزانه دوسه بار باعث صحت میشود و اگر از نما کردن اکسیر اکسیر بلا دونا نفی ظاهر شود بعد آن دو



و در گریه بلا و ناخوارانیدن باعث حصول فائده نمائند یعنی حصول صحت میشود اما هرگاه بلا و ناخوارانیده میشود از تمیست آن در ششم  
 و در ماغ زیاد و ظاهر میشود مثل آنکه تقیه عنبیه کشاده و در مع میگردد و بسبب آن کم دیده میشود و در ششم چشم طاری کرده محسوس میشود و اند  
 گرمی دماغ بر روی عین سحری ظاهر میگردد و در دهن حلق خشکی پیدا میشود و در گاه این آثار ظاهر شود فوراً استعمال بلا و ناخوارانیدن  
 باید که طبیب بعد استعمال بلا و ناخوارانیدن این آثار باشد و چون این آثار را باید شناسد و مضطر نشود و الا در کمال خدائت از آن  
 نقصانی راه خواهد یافت و در سیم باید از این ارم نباید آنکه بر ورم گهیگاه نماید کرده میشود هم چای عصا بنافع است بهرگاه که بقیام  
 عصب ناکور ضما کرده شود لیکن بعد استعمال آن اول قدری در محسوس میشود من بعد آب که بر جای که ضما کرده شده برمی آید  
 و چون آب بر آید نشانه آن ظاهر میشود و فائده در علاج قسم عصا به که از زیادتی خون و جوش آن رفته نوشته شده که فصد گیرند  
 و مسهل قوی نشانند از این ضما بطه آن گفته میشود و باید دانست که هرگاه در خون زیادتی و جوش می آید در وقت بالضر و معضرا هم زیاده میشود  
 اما در وقت بهرگاه که ضرورت هر دو ادعای شود اول سهل دادن ضرورت و تقدیم آن بر فصد بهتر است از نیکه فصد را بر سهل تقدیم  
 چه اکثر آنست که از اخراج صفرا و ماییت جوش خون و زیادتی آن کم میشود و بگرفتن فصد حاجت نمی آید پس اگر بعد سهل هم احتیاج بانی  
 ماند آن مان فصد گرفتن شاید و آنچه در کتب عریه طریقه نوشته است که هرگاه که احتیاج بسوی فصد و اسهال می شود فصد را بر سهل مقدم  
 از صواب و درست و سبب آن غفلت قدامی طبا از مسئله تولد خلاط بوده که فصد است که فصل سی و یکم در نور الحیاة  
 یعنی در ورم عصب و اگر چه جمیع او جلع بذریع اعصاب محسوس میشود چه در ورم او را که بر عضو بسبب عصبیت و بحقیقت  
 جمیع او جلع نور الحیاة اندکی که سبب مطلق هرگاه که ام سبب و مع ظاهر شود مثل نیکه ورم باشد آن زمان نور الحیاة میگردد و اگر ورم  
 خارج بود نور الحیاة نخواهد گشت و اسامی خاص آن بحسب مواضع متغییر اند مثلاً هرگاه در عصب و جع خاص از اعصاب ماغیه در ورم  
 شود خواه بمقام ابر و یا رخسار از این زبان انگریزی ملک از ذکر کمتر تا سه هندی و سکون کاف و فتح دال هندی سکون  
 الف و لام و ضم برای همه و سکون الف یعنی در ذکر بطور دوره و عادت شود نامند و چون در نیم سر بود آنرا همی که دنیا بکسری  
 و سکون یای نشانه تختانی و کسریم و سکون یای تختانی و فتح کاف و کسریم برای همه و سکون یای نشانه تختانی و کسریم و فتح  
 یای نشانه تختانی و سکون الف یعنی در نیم سر خواهند گفت و هرگاه در دل بود آنجا یکسری فتح الف و سکون نون و کسریم  
 و سکون یای نشانه تختانی و فتح نون و سکون الف و کسریم برای موحده فارسی و سکون کاف و فتح تاسه هندی و فتح  
 رای همه و سکون هین و همی در سینه نامند و هرگاه در مع بود آنرا گاه شتر و ویشیا الف کاف فارسی و سکون الف و همی  
 و تاسه نشانه عربی و ضم برای همه و سکون او و کسریم سکون یای نشانه تختانی و کسریم و فتح یای نشانه تختانی و سکون الف یعنی در معده  
 خواننده هرگاه در جرم بود مثل جیا که کسریم و سکون تاسه هندی و فتح تاسه برای همه و سکون الف و لام و کسریم و فتح یای نشانه تختانی و سکون  
 الف یعنی در جرم که کسریم هرگاه در جگر بود و همی از جیا که برای یوز و سکون بای موحده فارسی فتح تاسه نشانه تختانی و سکون الف و لام و کسریم  
 فتح یای نشانه تختانی و سکون الف یعنی در جگر که کسریم و لام بود و مثل جیا که الف و سکون یای نشانه تختانی و فتح تاسه هندی

فصل سی و یکم در نور الحیاة و در ورم عصب

نور الحیاة

و فتح برای مملو و سکون الف و لام و کسر جیم و فتح یای ثنائه تحتانی و سکون الف یعنی در دماغ نامند و هرگاه در عصب عریفه که از نخاع رسته و نواز  
آمده و از آن خارج شده در محل آخر یا رسیده یافته شود آنرا سنیا حکما الفتح سین مملو و یای ثنائه تحتانی و سکون الف و کسر ثنائی یعنی فتح  
کاف و سکون الف یعنی و جج الورك نامند و چون در غیر این اعضا یافته شود آنرا عمو و نوزالجهیا گویند با هم عام و این در دوا و جاع دیگر تفرقه  
کرده و دانسته میشود و باینکه این درد و دفته پیدا میشود و زیاده میگرد و دفته زائل میشود و باز بر همین عنوان عود و شدت میکند و باز فرو  
میشود بطور دوره و هم ورم حار با این در دنیا باشد ناگهانی ورم بار که در آن خون زیاده در عضوی آید همراه آن ممکن الوجود است لیکن  
این ورم همراه آن میشود و باز ازل آن ازل میگردد و از این و جاع عصبیه پیشتر مذکور شده و باقی اوجاع بجای خود و ذیل امراض عضو  
مذکور خواهند شد اما سیاه که پس چونکه در کتب عربیه آنرا با هم عرق النساء و ذیل اوجاع مفاصل ذکر کرده اند و آن بر خلاف حقیقت است  
چرا آن فی الواقع از اوجاع عصبیه است و اوجاع مفاصل لهذا اینجا بعد امراض دماغیه از جاع اوجاع عصبیه مثل عصبیه و عصبیه  
می شود باید دانست که این درد اکثر در پای واحد میشود و در هر دو پا بسیار تللیل میشود و هم این مرض اکثر کلهول میشود و گاهی از دو  
هفته تجاوز کرده اگر علاج نکند شود تا دو سه ماه بماند و دشواری از آن میگرد و السبب سبب آن اکثر آنست که از غز کردن دماغ  
هرگاه از سد و بر این ممتلی شده عصب عریفه را غمز کنند میشود و هم هرگاه نرم در مقدار خود زیاده شود مثل اینکه در آن یا دواوی سلع  
پیدا شود یا متورم گشته عصب مذکور را غمز کنند و همچنین هر عضو که در خانه یافته شده چون گیشته بهر سبب باشد عصب مذکور را غمز کنند  
این غمز پیشتر مذکور است و کسانیکه اوجاع مفاصل یا نفوس مبتلا میشوند یا اینها را هم این مرض پیدا میشود و شاید سبب آن در وقت  
منور شدن غشائی این عصب بوده باشد لیکن در ازل مرض در خارج ورم ظاهر میشود و زیاده از دیگر اسباب سبب تن  
در جای سرد تر پیدا می شود و هم از هوای رطب فاسد مثل هوای که در آخر بنگال محبت حمیات میشود پیدا میگردد و هم استقامت  
آتشک و وجود زهر آن در بدن میشود العلامات اول این درد و جای که عصب عریفه از خانه بیرون شده و بسوی رطل بوده  
شروع میشود و جای مذکور در میان مفصل و رگ و استخوان همیشه است که بر آن می نشیند پس از آنجا شروع شده از جانب  
خلف بنیزی آید و گاهی تا رگبیه رسیده متوقف میشود و گاهی تا قدم و عظم کعب و قدم میرسد و این درد اکثر وقت سبب زیاده میشود  
و در بعضی در عضلات سرین و خنجر و ساق خود سختی پدید و سبب آن حرکت دشوار بود و اندا چون راه رود و بر عصب پای صحیح خود تکیه  
کرده و نقل بدن انداخته راه می رود و بر پای علین و نقل آن بیندازد بخوف اینکه در زیاده خواهد شد و ورم درین مرض لازم نیست  
اما هرگاه مرض شدید توی شود آنرا با آن در جلد خنجر و ساق جای که در پیشتر ورم یافته میشود و غالباً درین وقت ورم غشائی عصب  
عریفه زیاده شده باشد و درین وقت این مرض بار و مانع میشود از حرکت و سبب یافته شود یا از آن بر دانه  
مثلاً اگر قبض بود از نوزانیدن سلمات و دادن خنجر و فیض نایز خصوصاً آنچه ادویه بر مای قویون و مستقیم خوشتر میشود مثل صبر کراقر  
و غیره و در همه قسم نوزالجهیا روعن حب سلاطین یک و قطره همراه نبات بنوشانند یا یک قطره از آن باقی گرین اگر کثرت کالوسه یعنی  
شخم خلل بقدری علتی نوزانیدن بسیار مفید است و درین مرض نفع است و اگر سبب تشنگ بود و آید و آید چاه و سبب باده نفع

استعمال نكته استيل همراه اسهل

عش پوشانند به اسهل اگر انقباض بلوى طبلس بود پس اگر نياز قوى بود بايد مسهل كنند و نكته استيل پوشانند و اگر ضيف بود فري سلفاس يا نكته استيل  
 بقدر مناسب راه اسهل مثل ميگشتيا سلفاس يا سلفيت آن سودا آسيخته پوشانند و اگر كنين هم همراه آن كنند بهتر بود و صفت اسهل در خجاول هم در حيات  
 نايه بر ضيان ضيف كوساينكه خون ايشان كمزور بود و نشانيد شوميكشتيا سلفاس شش قرص نكته استيل يا نيزه قطره كنند سلفاس از دوسه گرين  
 تلخ گرين آسيخته و هشت انوش ب حلكه ده حصه ساخته اول يك حصه از آن بنوشانند و بعد يك ساعت اگر دست نياي چصه ديگر هم بنوشانند  
 پس اگر بعد انهم دست رقيق نيايد بعد يك ساعت يك حصه ثالث هم بنوشانند پس اگر وقت اين نيمى قوسب نبوده در گرين كافى باشد اگر ضرورت دان  
 مسهل دو وقت هر نيم ده هم قوسب يا نكته سلفاس پنج گرين بياميزه نذاد و ده هم نيايد اسهل هم در هجدين اگر وقت و ده بود و اول اسهل ضرورت نيايد  
 بمقدار زياد باداى اسهل آسيخته نكته استيل صاف كرده بنوشانند و چون از عمل و اى اسهل رخ حاصل شود يا كنين بمقدار زياد كرده گرين يا نيزه گرين  
 نوزان چنانكه در حيات نايه داده ميشود و قيام بلوى حمام هم گاهى مفيد ميشود و لا سالكه العرقا و اگر كنين نباشد لباس حار پوشيدن من  
 آن هم در بلد حاره فصل حاصل كافى خواهد بود و گاهى سلف در آب گرم حلكه و در آن نشاندن بريض نافع ميشود و گاهى از نمادون يا شيركه از خردل است  
 ساخته باشد و ده دقيقه در محل شروع در و تا آخر با سيار مفيد ميشود و در طريقيه استعمال آن اين است كه اول ده دقيقه پيشه نكته در محل شروع شده و  
 آن جاي خروج عصبه عرضيه از غده است نه من بعد از آن نوزان ده دقيقه از نمادون يا نيزه نذاد و تا ده دقيقه در نوزان و بدين موال استنسا  
 وجع پيشه خردل نذاد و ده دقيقه داشته باشد و گاهى از نمادون يا شيركه از و اى آبله انگير كه از كشتاوس يعني نرسيج نامند و چنانكه اين عصب  
 از حرام مغز آمده در غده داخل شده بسيار فائده حاصل ميشود و آن موضع آخر حرام مغز است كه آن تبداى شروع استخوان قطن است اما اين شير  
 تا هفت هشت ساعت دارند تا آبله پيدا شود پس اين آبله را از انشيد مازياري گرين يا نايه بنفسيه زخم باطلا سازند پس بدين نيكو يا هم  
 بلاد و نايه مازياريه زخم باطلا سازند و چون از نيم فائده ظاهر شود و مازياري محلول باب بذر ليزه زده سوزنى تحت جلد رسانند كه از آن در شكين  
 ميشود و چون از او به فائده ظاهر شود در محل شروع و ده نكته سوزن باريك در جلد خاند و بموضع متعدد سوراخ كنند و سوزن  
 را تا عصب نكته در رستان نذاد و غشاي بطور غلظت و بسيار غشاي عصب نكته زخمى شده چن قطره خون از آن خارج شوند و بسبب  
 آن درم آن رفيع گردد و يقينى از اين تدبير فائده ظاهر خواهد شد و وقت شدت در جهت شكين آن بويانيدن كلافام اگر بريض قوى بود  
 يا سلفيور كه ايتهر اگر ضيف باشد مفيدست و اگر از سى قطره تا چهل قطره سلفيور كه ايتهر همراه آب ساده اول نوشانند بعد آن كلافام يا سلفيور  
 ايتهر بويانند از آن فائده تمام براى شكين در جى حاصل ميشود ليكن اين محيض براى شكين الم است در از الة مرض از داخل نيت فائده  
**باب دوم در امراض منقعه عيني كه كره چشم است** و آن هم مثل است بر چند فصل فصل اول در تشريح  
 عيني بدانكه از اجزاي منقعه عيني كه در آن امراض واقع ميشوند سه طبقه و سه غشا و سه رطوبت اند اول ينهمه از روي جفن كه بر ملتحمه  
 قدرى بالاي قرنيه و با هم كنند جن چشم و ماس از هو است غشاي مولد ملتحمه است كه از اميوس ميگيرد يعني غشاي احاد بار آن  
 بالاي طبقه ملتحمه و قدرى بر قرنيه است و بعد آن طبقه ملتحمه و قرنيه است تا جاي كه سفيدى محسوس ميشود و چشمه است  
 كه از غشاي غليظ دماغ پيدا شده و جاي كه رنگين است در ميان سفيدى قرنيه است كه با ملتحمه متصل است

باب دوم در امراض منقعه عيني

در تشريح

در تجربه غشای است سیاه رنگ که مقابل موازی ملتحمه اطراف آن رسیده و آن مثل نخل غالی سیاه است و چنانکه در وسط ملتحمه قرینه است  
 در وسط این غشا عنبیه است و آن بمقابل قرینه رفته و رنگ در همین طبقه است و الا قرینه بی رنگ و شفاف است و لون عنبیه  
 از قرینه دیده میشود و در اشخاص مختلف رنگ آن مختلف میباشد در بعضی شمشاد و در بعضی کحل و در بعضی اسود و در بعضی قهوه  
 و قرینه موافق رنگ عنبیه متلون میشود و در عنبیه ثقبه است که از راه آن صورت و اشباح بر حلیه میرسد و منطبق میشوند و پیش  
 پس ثقبه عنبیه رطوبتی است سفید مثل آب لیکن غلیظ القوام و شفاف که از در کتب طبیه عربیه رطوبت بیضیه گویند  
 و آن پیش ثقبه عنبیه زیاده و پس آن قلیل است و بعد این رطوبت رطوبت حلیه است و آن رطوبتی است بسیار غلیظ مثل  
 ژاله مدور و در آن ناقص است از هر دو طرف خود قدری پهن و بسیار شفاف میباشد و فی الحقیقت آن چنینک چشم  
 است و بعد آن رطوبت زجاجیه است و آنهم قوام مثل سفیده بیضه یا زجاج ذایب و بسیار شفاف و کثیر المقدار و بعد  
 آن یک غشای است که از اطراف عصبه محبوسه برآمده و در چشم منبسط شده و آن بسیار سخت است و ثانی که طبقه صلبیه  
 در کتب طبیه عربیه اسم همین غشا بوده باشد و رنگ آن قدری مائل به یلغی و از اندرون تا نصف منقلبه رسیده و در آن  
 روشنی از خارج چشم وقت دیدن از مریات بطور خطوط شعاعی جدا شده می آید و بواسطه رطوبات و در جمیع چشم منبسط میگردد  
 لیکن طبقه عنبیه که در کتب عربیه طبیه باسم طبقه مذکور است و آنرا بلغت گر یک های لا یمیرن یعنی غشای مشابیه  
 بزجاج نامند و مراد از آن چشم شفاف است و آن جسمی است خانه دار باریک شفاف که در آن رطوبت زجاجیه میماند  
 چنان که آب در سنجج میماند لیکن بسبب لطافت و شفافیت بودن آن غشای مذکور می نمیشود بلکه وقت دیدن چنان  
 معلوم میگردد که محض رطوبت است اما هرگاه رطوبت زجاجیه از آن وقت تشریح بیرون می آرند آن زمان اجزای  
 آن که پیشتر منبسطی بودند اکنون از حال شدن از آب مجتمع میگردند پس از اجتماع کثافت در آن پیدا شده سری میگرد و در وقت  
 میشود که جسم مذکور مثل ریشه عنبیه است و پس منقلبه و عنبیه حرکت تعیسینا و شمالا محک بسوی فوقی تحت اندکی جدا که از در وقت  
 بطور محق و کارا و گردانیدن منقلبه است بجز حرکت دوریه و اما در این چشم در همین اجزای آن واقع میشوند و یک عصب  
 مجوف در چشم است که از طرف یکین بسوی بسیار بسوی یکین رفته است و اما عرض آن خارج از اعضاء چشم اند  
 فتد کما فصل دوم در امراض میو کس میو کس چشم و جفن که آنرا بلغت گر یکیه کان جلیت میگویند و اما این  
 آن نغمه از در اقسام امراض آن که آنرا بر لبی میگویند و در معنی در چشم است و آنرا بلغت لاسن اف ثمال نیامعنی موضع چشم و جفن  
 عام از یک در کلام طبقه بود یا در غشا و در هر طبقه و عشا که میشود منسوب بسوی آن میگردد و مثل اینکه هرگاه در میو کس میو کس  
 چشم و جفن اف ثمال میپایدا شود آنرا کان جنگل و تیش میگویند زیرا که کان جنگل نامی است میو کس میو کس چشم و جفن است  
 و کان جنگل و تیش بر چند نوع منقسم میشود اول سبیل کان جنگل و تیش یعنی خالص آنرا کثار اف ثمال میگویند  
 و دوم پس چو کثاف ثمال یا سوم پیو یو کثاف ثمال یا چهارم اشرف ثمال یا پنجم کثور ثمال یا ششم

فصل دوم در امراض میو کس میو کس چشم

بیان اول در کفر اول

و در کفر اول بیان این هفت نوع درم در میکوس سیمین چشم و حقیق یافته میشوند و در این امراض  
 این غشا هستند و این فصل ششم است بر چند بیان بیان اول در کفر اول و این نوع اول که یک کل حقیقیت چشمی که در کفر اول  
 پس آن درم میکوس سیمین چشم و حقیق است که از اسباب بنفیه پیدا میشود و مثل هوای سرد یا کینه غیره هرگاه در چشم انداز آنهم بر و چشم  
 اکبر یعنی قوی و شدید و کرا یک یعنی خفیف و اعراض السبب قسم اکبر است آن هم گاهی از اسباب بنفیه پیدا میشود مثل یازده شفت  
 کفر اول از چشم در وقت حروف و نظر کردن در امور دقیقه یا ضعیف شدن مرضی از امراض دیگر یا زیاد ماندن در روشنی و گاهی  
 از اسباب فاعله میشود مثل سیدن برودت یا حرارت یا پدیده هوای سخت یا روشنی زیاد مثل آنیکه کسی در شعاع و آفتاب تورا راه رود و یا  
 در آفتاب نشسته کار کند و گاهی از افتادن کد ام جسم صلب و چشم مثل گلاب و براد و آهن و غیره و هم از افتادن کد ام شتی حاوی مثل مریخ  
 سرج و غیره در چشم این درم پیدا می شود و گاهی که ام سبب ظاهر نباشد لیکن بر پیدا میشود و علامات اول مرضی چنان پیدا  
 که گویا چیزی در چشم آن مثل یک یا خاکل قناده و میخ و در حقیق غلط و صلابت یافته میشود و میکوس سیمین چشم سرج میگردد و از این  
 این سرجی ظاهر میشود که حرارت از جانب حقیق شروع شده بسوی قرینه بلند میشود و این حرارت در حقیق زیاد می باشد و قریب قرینم  
 و هم این سرجی مثل شبکه سرج می باشد یعنی عروق سرج می باشد از متلی شدن خون و از این آنها سفیدی می آید و دیده میشود  
 لیکن این شبکه سرج سبب متلی شدن عروق میکوس سیمین چشم و حقیق از خون طایع میشود و کد ام قوی تازه اینجا پیدا میشود و در حقیق  
 در سبیل پیدا می شود و بعد چند مدت صورت شبکه زائل شده سرجی محض باقی ماند و این حرمت بسیار شدید پیدا شد و از حرکت  
 کردن چشم متحرک میشود و این ثابت میشود که سرجی در میکوس سیمین است و در حقیق اگر در حقیق بودی سرجی متحرک نیست و هم سرجی  
 متحرک قلیل بر یک گلابی پیدا شد و در آن خطوط مستقیم سرج رنگ از کفر قهوه دیده میشود و هم اگر در قرینه شروع میشود و از آنجا  
 متحرک میرسد قریب حقیق سرجی متحرک زیاد پیدا شد بلکه هر قدر که از قرینه دور میشود کم میگردد و هم برین مرض در چشم گرمی و درد  
 محسوس میشود و تشنگی گرم جاری گردد و چون که مرضی از دیدن روشنی متناهی میسازد و در آن اکثر چشم را بنی و در خصوصاً  
 در روشنی و این حالت تا چند ساعات ماند و بعد آن مرض در چشم پیدا میشود و در گوشه چشم میگیرد و در وقت شب موی آن  
 بسبب آن چند روز میگردد و گاهی درین قسم درم آب از خون زیاد میسرید و از آن درین غشا و غم غم پیدا میشود و حقیق که بسبب  
 شدت درم چون این غشا قدری بالای قرینه را زیاد و خودی آید ازین جهت مقدار قرینه در دیدن بیشتر نماید و هم اکثر درین  
 قسم درم در چشم متناهی میگردد و گاهی که بیشتر درم میشود و بعد آن در چشم دیگر آن نال بسیار پیدا میگردد و انجام این قسم  
 است که اگر علاج نکند شود ممکن است که درم طمره و قرینه دیدم غشای سیاه پیدا شده از آن چشم خراب شود و بصارت مایل  
 یا مرض از وقت خود در حقیق بسوی ازمان رفت تا به سوم آنکه از علاج یا بدون علاج خود بخود زایل شده و صحت حاصل شود  
 اما علاج اول سبب مرضی در یافته بسوی دفع آن مشغول شوند مثلاً اگر از افتادن چیزی در چشم باشد حقیق را منقلب ساخته  
 چشم را از آن خالی و صاف سازند و بعد صاف کردن چشم دو سه گریش یا یک یا یک سلفاس و یک یا یک دوش آب ساده جلد صاف



بیان سوم در ذکر نوع سوم

بر آن نهاده باشند بخوبی بر چشم نرسد و اما گفته اند که این مرض بعد زوال از عود میکند لیکن مجربین میگویند که هرگاه از ادویه دیگر و علاج  
کفار آن نال یا نوشته شده حکمت حاصل شود و مرض ممکن است لیکن هرگاه از کببول مرض نال شود پس عود نمیکند وقت که کس  
بیان سوم در ذکر نوع سوم بر مدافعت ثالث از ورم میگویند چشم چشیم و جفن پس پوریلوت آن نال است آن نام  
ردی است که در آن رص و بیم کثیر از چشم خارج میشود و هم این مرض از یکی به دیگری متعدی میگردد و از آن جائیکه حادث میشود  
و اختصاص کثیره عام میگردد و از آن جهت که آن نال میاهم میگویند زیرا که سکنه ملک است یعنی سکنه ملک صرا این مرض زیاده  
عارض میشود السبب اکثر سبب آن قدرت در کلبا و مکان و هوایا باشد و هم در جائیکه اجتماع مردم زیاده مانند مثل خانه بزرگ  
که در آن اجتماع زیاده باشند یا مثل مدارس محاسن که در آنها اجتماع مردم زیاده بود و هم کسانی که لباس قدر کثیری پوشند مثل خنجرها  
خصوصا پیشانی و صورت سیما مریات اطفال از مس شدن جابه قدر ایشان چشم اطفال این مرض پیدا میشود و چون  
هرگاه کس از چشم مرض بر خواسته چشم صحیح طفل نشیند از آن هم این مرض پیدا و عام میشود و کج چونکه اجزای ریم در رص  
در هوا همیشه از چشم جدا شده بنوش میخورند از این جهت هم ریم مذکور از مواد چشم صحیح رسیده این مرض پیدا میکند اما کلمات  
انچه در کتال آن نال یا نوشته شده اند همه موجود میباشد لیکن چنانچه چنانچه حاضر و بود اول اینکه تراید و این مرض بزودی میشود  
دوم آنکه اعراض علامات درین نوع شدید و قوی میباشد سوم آنکه رص ریم اینجا زیاده پیدا میشود و چهارم آنکه اگر علاج این من  
باوصف قوی و شد بدو بدن آن نکرده شود عود اینست که این مرض و ورم در قریه رود و از آن چشم خراب گشته بصارت طلب  
گرد و چشم آنکه در بین مرض حرارت باطنی و جمی اکثر میباشد اما علاج هرگاه ذیف باشد درین وقت انچه در علاج کتال آن نال یا  
نوشته شده کافی میباشد لیکن تعجیل و علاج ضرورت تام رص قوی و مستحکم نشود اما هرگاه قوی باشد مثل اینکه ورم چندان زیاده  
بود که از آن قریه صغیر دیده شود درین وقت بهتر است که جفن را منقلب ساخته از زهر بیشتر بر میگویند چشم چشیم و جفن در ریه  
کشیدن خطوط زخمها پیدا کرده در سبب آن قدری خون خارج شود و بعد آن از آب گرم چشم را بشویند تا سبب آن  
خون بسبب است از زخمهای مذکوره جاری کرده و چشم از رص ریم پاک شود و اگر سبب موجود بود در کتال این تدبیر میسر شود  
زیر بر موق اکثر چنانچه بار صد غین تعلیق سازند و بعد بنه شدن خون جفن را منقلب ساخته اصل کاشک نقره بگویند و بیشتر  
جفن بمال عجلت و بنگی نهند و بعد آن آب سرد چشم اندازند تا اویت و سوزش و در اطراف شود و اگر جفت این تدبیر هم در کتال  
نباشد ناظر سوار زده گرین تا بستی گرین در کتال و من آب مقلط حاکره از قلم موئین بر میگویند جفن اعلی و اسفل خوب  
طلا ساخته و بعد بر روی یک دقیقه آب سرد چشم انداخته بشود چنانکه ازین تدبیر اکثر مرض در روز اول تدبیر و با خطاط  
می آرد و زاید آن بر طرف میشود و بلا دوا یا محض محلول آب بر و چشم مناد ساخته باشند چشم را از عصا به بنده لیکن  
بعد دو دو ساعت عصا به را کشاده از آب سرد شسته باشند تا از رص ریم صاف شود و ریم اندرون چشم مجتمع نگردد  
و بعد هر نصفه چشم را با شربانی محلول آب یا پلینای ایشش محلول آب که هر یک ازین ادویه جدا جدا

در کتال



یک و دیگرین در یک و نفس آب حاکم و چشم انداخته باشند پس اگر بعد از این تدبیر چشم روز دوم و دم موجود باشد بر هیچ قول بشمار  
چشم غش سلوشن قوی تاثیر سلوشن خفیفه لوز آن مثل آنیکه از دو گریین تا چهار گریین زان در یک و نفس آب حاکم و یک قطره  
یکبار در چشم انداخته و بعد از آن عصا به چشم بزند و بعد هر دو ساعت کشایند چشم بشویند از سلوشن های مذکوره که دایم سلوشن  
بر بار چشم انداخته باشند لغز این تدبیر مانند تا که دم بالکلیه بطرف شود تا به گاه ضربان هم در چشم باشد در این وقت شستن چشم را بیک  
بر برف سرد و گرم باشند بهتر است مرضی آرام دارند و وقت شب درین نوع و دم بالفرد چشم نریا سوم روغن بر کنایه های پاک طلا  
کرو باشند تا جفان با هم نه چسبند از آن جریان یکم بزند و اگر هوارش کمی بود سهل بزند و غذای لطیف چنانکه بحدی می  
هم این مرض را خورند باین ستم و ای مرض علاج سازند لیکن بی تاملت در قدری مرض باقی میماند سبب ضعف چشم  
چون می میت گران بولاف مثال میایافته میشود درین وقت آنچه در علاج آن نوشته خواهد شد بمثال آن رند قسمی ازین مرض طمان  
نومو نو عارض میشود خواه در روز اول لادت یا بعد آن تا روز پنجم آنرا بلفست گمیک مثال میانی آن آئوم معنی چشم نو نو  
گویند و که درین هم در هر چشم مساوی اول در یک چشم بیست و چهار ساعت در چشم دیگر بیست و چهار ساعت و السبب نه صاف شدن  
چشم از لایه بات غمزه وقت لادت یا رسیدن شش یا چشم یا رسیدن ده نفیسه بعد لادت در چشم طفل زنی احتیاطی مریات میباشد  
اعلامات هرگاه مرض قبل بود علامات که در آن مثال میاموجود میباشند تا که قوی بود درین وقت موافق علامات پیشین  
ان مثال میاعلامات قوی ظاهر میشود لعل لاج چشم را از آب گرم یا از شیر یا در فیه بشویند و صاف سازند لیکن اگر از شیر یا بشویند  
باید که مادر طفل را در کنایه و که فیه چشم را و اگر از آب جانب حق که از شیرستان شیر در آن که از اند و صاف سازد و درین مرض غش  
و همیشگی درین غش است که جفان با هم نه چسبند و چشم طفل مجتمع نگردد و الا آفات کشید زان پیدا میشود و تا اثر سلوشن  
در یک و نفس آب قطره حاکم از آن یک قطره روزانه یک بار در چشم طفل انداخته بعد از آن آب نیم گرم چشم بچشم از نیم و در هر صفا  
کرو باشند و گریین چهار دم در هر کره ربع ربع از ربع از ربع که شش و آن مثال میاست آن نام رسیده است  
در بدن مستعدین خنایر پیدا میشود و از خاصه این قسم است که هر چند دم و سرخی کم باشد لیکن از دیدن قوی مرضی یاده خالیف  
میباشد السبب اصل سبب استعداد خنایری است اما سبب محینه که در دم اول مذکور شدند و از دیدن مستعدین خنایر  
بجاء مرض میگردد هرگاه درین طفولیت این قسم عارض شود بعد بلوغ زایل میگردد و علامت که در سرخی چشم کم میباشد لیکن  
خوف و ریش از دیدن روشنی زیاد بود و چون چشم را کشاوی بنیند سبب خوف از ضوای چنان که مرضی ظاهر میگردد یافته میشود  
یعنی دم و سرخی زیاد در چشم دیده نمیشود و اینها از خاصه این قسم است که در آن در و اذیت چشم در اول ندارد زیاد میباشد  
و در آخر نما قریشام کم میشود بخلاف آن که قسام که در آنها اذیت در و از آخر روز زیاد میشود و درین قسم رسد که بر کنایه  
قرینه دم و زخم های صغیر پیدا میشوند و در این وقت در زیاد در چشم میگردد و چون این حالت پیدا میشود طفل باین جهت میباشد  
که در کنایه پیری و خوی خود را از جانب شش گرانید و چشم را از نور و قوت بند کرد و پشت و شمای شود از چشمان گشته میان

در بیان تمام خواصک باطلال از لوز و عارض میشود و چشم غش میشود

در بیان چهار دم و در قوی رانج

در بیان





کرده خواهد شد ان شاء الله تعالی باطل آن غشای است که در مرض کرویپ اندر زدن حلق و قصبه پدید میشود و چنانکه آنجا برکت  
 حلق و غیره پدید آید و این پدید آمدن چشم پدید می آید از همان زهر که از آن در حلق و قصبه حادث میگردد و علامات اول شکل کمال آن است  
 که نوع اول است باور و در سرش چشم شروع میشود و بسبب آن در آخر میگویند که چشم در جفن بسیار غلیظ میگردد و لیکن فرقی است  
 که در کمال آن مثال میاز زیاده در جفن آب از خون درم زیاده میشود و در وقت لغت از زیاده ریختن فاسدین از خون یکسیم چشم  
 زیاده غلیظ میشود و همین سبب است که چشم از قسم اول که پدید می آید که از غلظت آن فاسدین خون از عروق میگویند که این غلظت  
 میگویند که چشم درین نوع بعد از حکام مرض سفید بال برزدی و شک و مستوی میباشد و چون مرض ترشاید و در این  
 ماده فاسدین بالای میگویند که چشم ریزد از آن غشای جدید بالای میگویند که چشم هم پدید می آید که از آن غلظت آن پدید آید و در  
 چون مرض این جدرسد و در و سوزش و چشم پدید آید که قدری آب در چشم پدید آید جاری میگردد و همراه آن اجزای غشای میگرد  
 هم خارج میشوند و در آخر قدری رسیم هم می آید پس از خارج شدن اینها در چشم هم میشود و انجام این من است که از علاج صحیح  
 لیکن اکثر درین نوع قرص یا غلظت رسد باینکه درم و چشم دریم آن می افتد و بسبب آن که جگر و عین پدید می آید چشم ترشاید و اگر صحت هم  
 درین نوع شود بعد آن جفن منیر شده بسوی باطن باطن هرقلب میگردد و علامت کمال آن که عین از آن پخته گردد و از آنجا جوش  
 و من پدید آید آب از من زیاده جاری گردد و در در چشم اردی مسکنه و جع مثل لای و نا و جف منضض نماید و جفن را منقلب  
 ساخته اصل کاسکات قد بر میگویند که جفن اعلی و زیرین نهاده آب سرد و چشم ریزد و بشود و چون من شود سلسون ظاهر شود  
 یا سلسون نک یا سلسون شب بمانی که جف قلیل لوزن بودند و چشم اندازند و از جایکه مرض شروع شده باشد مرض اجمالی می  
 که بواسطه صاف بود و نقل کنند و اعتدیه و ادویه قویه خوانند و گفت که اینها من غشای در ذکر نوع سابع رسد  
 اما من سابع رسد آن گران که این مثال میباشد و آن چشمی است که در آن در میگویند که جفن اعلی و زیرین نور پدید میشوند و قوت  
 حرکت جفن از اصل کاسکات چشم اذیت پدید آمده چنان معلوم میگردد که گو یا در چشم یکا افتاده و از آن اشک و من پدید آمده از  
 چشم جاری نمایند و بسبب این اذیت در قرص هم درم حادث شده بالای آن سفیدی و رنگهای سبب مستطیلی از خون پدید می آید  
 که این را در کتب عربیه طبعیه سبل و لغت لائن پینیس شمع بای موحده فارسی و سکون بای شانه تخانی و فتح نون و سکون بین  
 دهانه یعنی پارچه منق میگویند و مراد از آن غشای جدید است که منتهی از عروق بود و السبب اکثر از قسم ثالث رسد و گاهی  
 از اقسام دیگر آنهم هرگاه مرض شود این مرض پدید میشود و آن بر دو قسم است اصلی و غیر اصلی اصلی آنست که در آن غده ای  
 پاپی اسی یا زیر جفن که شایع میگردد می اندازد و متورم شده ظاهر و بلند گردد و همراه آن زیر میگویند که جفن هم درم میباشد که از آن  
 مواد غشای خانه در میریزد و بسبب آن غشای مذکور هم متورم شده جفن غلیظ میگردد و در آن معلوم میشود که از منتهی  
 این مواد پاپی ای یا بار بلند شده و غیر اصلی آنست که در آن در پاپی ای یا بار غشای خانه دار درم نباشد بلکه زیر جفن بر میگویند  
 آن دانه ای خرد سفید رنگ سخت مثل ساگودان یا سیفه غده دار دیده میشود و این قسم از درم پدید نمی آید بلکه بسبب فاسدین

چنان چشم در ذکر نوع سابع که آن گران است











پیدا میشود درین وقت گاهی در میان قمرینه غبیه چشم میریزد و در محل طوبیت بعضیه میماند و گاهی از آن در قمرینه نهیهای کوچک بر  
صوت نقاط ضرر و حادث میشود این قمرینه معلوم میشود که مریض در روشی چشم خود را کشاده و مقله ابوسوی همین بسیار ترک  
پس درین وقت جای که زخم است مثل نگیله خروالاس میزدند و فرقی فیما بین هر دو آن میباشد که نگیله الماس ترفع میباشد و زخم  
غایر میباشد گاهی یک زخم عظیم قمرینه پیدا میشود و گاهی یک زخم کوچک بر کنارهای قمرینه یافته میشود چنانکه وقت پیدایش آن  
این صفت از خناریری این زخم با حادث میشود و باقی قمرینه صاف میباشد اما آنچه از سته و ادتک خاندانی حادث میشود  
پس این زخم منصفی خواهد غلط بود و یار فقی جابجا بر تمام قمرینه یافته میشود و احلاج اول سبب مرضی انقضی که در دفع آن کوشند  
مثلاً اگر از پیدایش آن باشد از قمرینه آن که باشد علاجش نمایند با آنچه گفته شد که از آن این مرض خود دفع میشود اما هرگاه حرارت  
جوش باشد پس مسهل بدهند از او میسر است که از قمرینه که در بدنش سنگین باشد سببش را بکشند و اگر از دیدن شوی در زیاده شد باشد پس  
مسهل ماراژا شک قمری شریک از ند چون مرض غرس گردد و یقیناً شل کنند باریک منزال است که اجماعی از قمرینه مرکبات  
آهن حسب مناسب نباشد و مریض را در خانه تاریک اندازند تا از اذیت اعضا متناهی گردد و اگر ضرورت فتن و غش و شمس یا در روش  
داعی شود که از قمرینه رنگ سلیه و از مثل سایبان پیش چشم انداخته از مکان بیرون آرند مسکنات جمع مثل بلادونا یا حضض  
محلول باب بر دو چشم خود سازند و درین صم تاثیر سلور را مادم که مرض بر صحت خود بود و زهر را در چشم نه اندازند بلکه  
از وی محمول باب در چشم انداختن در این وقت یاده نافع یافته اند و چشم از صابون رقیق نازک بر بندند لیکن چندان در بستن احتیاط فر  
است که بعد از قمرینه بکشد و حصول آن در چشم بر بندند هرگاه مرض قمرینه گرانیک گردد و بر صغین یا پس گوش پاره از کتار و معنی و وی  
فرایح نهند و بعد پیدایش آن بانه ترا قطع کرد و بر محل بله مرهم سیاه باند و بر پارچه کرده نهند از آن نفع کثیف حاصل میشود و صحت قمرینه دم  
از تاثیر سته و ادتک خاندانی بود و درین وقت که از سته و ادتک باشد از او این شپا سیم همراه وقوع عشته و لک سر پیغمبری یا درین  
و هم سته و ادتک خاندانی و در این حالت نافع است هرگاه از او خناریری بود درین وقت آنچه در علاج سته و ادتک خاندانی نافع است  
شد نافع میشود و از تبدیل هوا خصوصاً از شستن بسیار در هوای بخار و بخور و انبساط الفذیه که در آن شیر و زرد و مرهم مرغ زیاده باشد  
نفع زیاد حاصل میشود و گفت که گاهی در این وقت قمرینه و از بلغت انگشت شصت معنی اول و سیم و شصت کانی همین الفذیه  
مها و سکون بای موحده فارسی اول کسر بای موحده فارسی ثانی و ضم بای ثلثه تحتانی و سکون و او معنی و ریکه در آن در آخریم  
پیدا شود و میگویند با بکله گاهی در تمام قمرینه گاهی در جای خاص از آن مل پیدا میشود و دیگر مواضع از آن از بیم خالی میباشد و گاهی  
ریم در جبهت زیرین آن می افتد و سفیدی آن مثل سفیدی سنگ سیامانی میباشد و انداختن انگشت انگشت معنی سنگ سیامانی  
نامند مواضع دیگر آن خالی از ریم میباشد درین وقت گاهی از جبهت خلف قمرینه کافه در طوبیت بعضیه بده میریزد و جمع میگردد پس  
در این وقت و از بلغت گریک پنهان یعنی ده کم پس قمرینه در جانب خلف جمع گردد و میماند لاسب گاهی بسبب ضربه زخم و زخم  
پیدا میشود و گاهی بعد کشادن چشم از نشستن مرض پیدا میشود و این کسر و قمرینه بود که مریض قبل کشادن چشم مریض ضعیف بود و گاهی

بعد از مدتی که بعد از قریه خصوصاً اگرگاه مریض از قبل حدیث دوم مریض ضعیف شد باشد پیدا شود اعلیاءات  
 چون تل در قریه شود پس جای که ریم افتاد و بر قریه سفیدی می آید میشود مثل ضباب با موریایم این که در وقت ریاض هر روز غلظت  
 میگردد و یک که اول نایسین در دل میریزد بعد از آن ریم پیدا میشود تا هرگاه ریم بجا کمل خود رسد سفیدی مذکور باطل نمیرود  
 میگردد و هرگاه ریم زیاده بود این سفیدی بر تمام قریه عام یافته میشود چون قلیل باشد در بعضی از مواضع قریه یافته میشود و بعضاً در چشم  
 در دو گرمی محسوس میشود و در یک گرمی محسوس چشم چرخان و در تخم و تخم میگوید و مریض از روشنی ستادی شد از آن خائف اند و شک  
 چشمانش جاری میشود تا انجام آن نیست که گاهی بسبب قریه نرم شد بسوی خارج می آید و همراه ریم خود جاری میشود و از آن  
 چشم فرو می نشیند چون در جای خاص از قریه ریم پیدا شود پس گاهی بسوی بالا می آید و میگردد و در این وقت از آن صحت میشود اما  
 سفیدی بر محل نرم میشود و بهتر آنجا مریض است که این ریم جذب شود و کم نشاند آن مانند و این حالت گاهی از علاج پیدا  
 میشود و اصلاح اول ازیت و در چشم دفع کنند این امر از تکیه طب که از آب طبعی پوست شش چشم که در چشم می آید و میشود حاصل میگردد و  
 همچنین چون بلاؤ و نار آب که هم حکم کرد و پاچه بان تر کرد و بعد یک ساعت تکیه چشم سازند سفید میشود و در میان آن مانده که از  
 تکیه طری می باشد پاچه از آب که در آن بلاؤ و نار محلول بود و تر کرد و چشم نهادن نافع است و این که بلاؤ و نار آب حکم کرد و در چشم می آید  
 سازند نوع دیگر ضایع و جفای سفیدی افرونی بر دو چشم بسیار سفید است و بر پیا محلول آب چشم اندازند و فایده مدور بالای  
 چشم نهاده بر آن عصا بر بندند و بچین منوال روزانه علاج کرده باشند نگران مانند که ریم جذب میشود یا نه اگر جذب نشود  
 خود المراد و الا بر صد غنیمت پس از کنتاروس درست ساخته نهند و هر سه سیاه مرهم بلاؤ و نار با الما صنفه بر دو چشم تا بالای ابرو  
 خوب اندازند اگر از آن ریم جذب نشود و گمان انفجار قریه پیدا کرد و در این وقت باید که دستکار از نشتر باریک آن ریم بپای کرد  
 ریم بیرون آن در و بعد از آن باز بلاؤ و نار بر دو چشم ضام سازند تا تکیه غلیظه کرد و عینیه با قریه ملتمس نشود و نه چسبید و در چشم قریه  
 داخل نشود و هرگاه در چشم در و تعد و زیاده باشد که از آن قریه خواهد که بسبب غمز و دافعت مریض باطن خود بیرون آید در این وقت  
 از نشتر زدن در آن نفع کثیر حاصل گردد و نیز که از آن طوبست بعضی خارج میشود و بسبب آن چشم خالی شد و لین میگردد و ازیت دفع  
 میشود و گاهی این عمل نشتر زنی در چشم بعد از سه و سه روز درین مرض کرده میشود و آنرا بلف لاشن پارسون شمس نامند یعنی پیکار  
 سوراخ جدید این مریض را از کنتاروس فصل غیره مستغفرت ضعیف سازند بلکه آرام زیاده رسانند و شب افیون خوراند و اغذیه  
 مقوی مثل شیراده گاؤ و زرد که بهیضه مرغ و کوم جی و روغن جگرهای و ادویه تقویت مثل نعین بارک مرکبات آن نوشانند بیا موسم  
 در زخم قریه که از آن کثرت کار دنیا بلف لاشن می نامند و در قریه به خصوصاً حادث میشود گاهی بر سطح بالای آن بود گاهی  
 غایب باشد گاهی مثل نقاط خرد و اکثر موضع آن میباشد و گاهی نرم غیر غایب و جای خالی آن پیدا میشود که از آن عینیه می آید و هر سرف  
 درین وقت نام کرد میشود و گاهی از جانب خلف با قریه عینیه متصل گردد و از آن قریه منفرشت و ازیت پیدا کرد و تکیه عینیه کرد و دیده میشود  
 السبب گاهی از مد شدن چنانکه از قسم ثالث آن موسم به پیوریورنت پیدا میشود و گاهی بعد از قریه یا در آن حادث میشود





سپهر چشم یا از قریه مده فایبرن در سطح بالای میوس سپهرن ریخته بطور غشای قیق جدید میشود یا اگر نرم خفیف اینچونه  
 و برای انجام غشای قریه بود پس آن بعد حصول صحت تخم اینجا بطور غشای قیق گشته باقی میماند و میباید عملیات بالای  
 قریه قدری که در وقت شل خان یا ضبابه محسوس میشود و بصورت کدو دیده میشود و بصارت صاف نیباشد علاج اول  
 غور کنند که هرگاه که کم ازیت در چشم نباشد آن مان بجا جوش پروازند و الا اول ازیت هر گونه چشم را بر طرف سازند زیرا که علاج آن  
 منحصر درین است که قدری ازیت در چشم بپاشند و ازیت مجاری صفای شعریه لطف که در قریه منفتح شود و از کاف و ویند  
 و این ماده را از اینجا سپهرن از این ماده جذب میگردد و برای این کار ویکشیر مستعمل میشود اول کیلوتل آنرا بچشم طوری بجا  
 استعمال می آورند اول اینکه قدری از آن بر کف دست نهاده کف دست را قریه چشم برده بذریعه تنفس و صبح کردن در چشم رسند  
 و دوم آنکه آنرا در آب بویله ختمه بذریعه تنفیج بمحل سفیدی رسانند سوم آنکه بذریعه قلم موین کیلوتل بعد از شستن چشم باقی بمحل  
 سفیدی رسانند و چندان این درو را با تمام آن زند که صحت شود ولیکن اگر از استعمال آن ازیت پادیده پیدا شود و از آنرا ترک کرد  
 باز استعمال آن زند تا که دم از ازیت پیدا شود و همچنین آنکه ساید آف ننگ یا شب یانی بریان یا سلفیت آف سوه یا انبات سفید  
 سفوفات مثل سفوف کیلوتل استعمال می آورند و ایضا آنرا و بطور سلسون صفت برای کلار داف مرکب کوی یکبار در وقت اول آن آب مقطر  
 حلکو و یک قطره از آن صبح و شام در چشم اندازند تا حصول صحت ایضا آنکه سلفیت آف ننگ یک و گرین در یک و نس آب مقطر  
 حلکو و صبح و شام و دو قطره از آن در چشم نیز ایضا آنکه کلوراید آف ننگ یک و گرین در یک و نس آب مقطر حلکو و یک قطره از آن  
 در چشم اندازند و ایضا در وقت تاریک یک گرم بارون کنج که صفت درم باشد خوب حلکو و دو سه قطره از آن در چشم اندازند پس اگر  
 از این ازیت پادیده شود مقدار روشن تاریک از یک گرم هم کم کنند ایضا آنکه ایتر اید پاشیم که گرین و یک و نس آب حلکو و دو سه  
 قطره از آن صبح و شام در چشم اندازند و در این مرض از نو شایسته آن ایتر اید پاشیم فایده جلیله حاصل میشود خواه در چشم هم در آن  
 اندازند یا دو یک که نوشته شد در زیر فک آنرا قسم دوم که کوکواس با آن سقیق کشیده است که بعد صحت شدن تخم کبیر قریه سبب  
 که پیدا شد باشد عاوض میشود و سبب این است که هرگاه ماده فایبرن زیاد برای صحت تخم کبیر قریه در جرم آن میریزد پس  
 بعد صحت تخم مذکور بطور شکسته پاشیده مذکور غشای غلیظه گشته آنجا باقی میماند و بجه بالای جراحت های اعضای دیگر باقی  
 ماند و این زیاد در جرمی دیده میشود و سبب در آن این است که اینجا در قریه نقصان پیدا شد از برای اصلی آن این میشود  
 و بجای آن این غشای جدید پیدا میشود با حلال آنهم گاهی بر تمام قریه گاهی بر اکثر از برای قریه یافته میشود و این صورت در یک  
 زیاد یافته شود و گاهی در موضع که چاک تر از آن یافته میشود ولیکن هرگاه بمقابل تقیه غلیظه واقع شود مانع از صحت میگردد و اما گاهی  
 مرخص در این وقت باین نحو چیزی می بیند که سر خود را بر سر آورده و صفت چشم ابسوی بالا بلند کرده قدری می بیند  
 چه ازین جهت هرگاه تقیه غلیظه بجای میرسد که آنجا بیاخت قریه نباشد البته چیزی دیده میشود و گاهی در حالت تخم قریه غلیظه از آن  
 تخم قریه می آید و از آن مورج پیدا میشود و گاهی غلیظه درین حال با قریه میچسبند و سبب آن تقیه غلیظه باقی میماند یا کج میگرد

سلفیت آن صورت را در غایت شستن سفیدی که بر چشم حاکم میشود و از آنرا غرض

و ازین سبب بصر است محرم میگردد بی آنکه بیاض قرنیه مانع ابصار شود و علاج اگر چه این قسم لا علاج است لیکن چون که بر طرف  
 آیین بیاض گاهی وقت میباشد آن از علاج کم یا زیاد میشود و از آن قدری دیده میشود اگر چه فرق کردن در میان روشنی  
 و تاریکی باشد یا قدری بسبب آن راه رود و اندک برای تحصیل این منفعت آنچه دوید که در علاج قسم اول نوشته شد از آنجا  
 اینجا هم حسب مناسب استعمال آرند و هرگاه این بیاض بمقابله ثقیفه عینیه آمده باشد اینجا و ثقیفه جدید در عینیه ممکن باشد در  
 فوقانی آن ثقیفه جدید پیدا کرده و منهدم گردد و جهت فوقانی ممکن نباشد درین وقت در هر جا که قرنیه را بیاض غالی و صاف بود  
 بمقابل آن در عینیه ثقیفه جدید پیدا کرده و منهدم و تدبیر را از آنرا بکنیم گویند نفیج الف و کسریای شناه تختانی و رای مملو  
 سکون ال مندی کسری الف سکون کاف و صمغای بندری و کسریم سکون یای شناه تختانی بکنی قطع کردن عینیه ثقیفه از آن  
 تدبیر هرگاه ثقیفه جدید در عینیه پیدا شود آنرا از فی نشل بنویسند و معنی پیدا کردن ثقیفه جدید در عینیه هرگاه عینیه باقر حسیه پیدا  
 باشد درین وقت هم از همین علاج و تدبیر دیدن اشیا ممکن میشود و گاهی سفیدی مذکور لایق علاج نمیداشد اما برای رفع کردن  
 قبح منظر چشم از ابتلای سیاه می کنند از رنگ خاص قسمی از سیاهی است که از آن عورات هستند اکثر چشم خود را با مختلفه لصبه  
 پیدا میکنند و در بیان شان از آنرا گویند سیاه گویند لیکن وقت این عمل جنبه اضطراب است که رنگ بر بیاض مذکور چندان کدره شود که از آن  
 بزرگ صلی عینیه چشم صحیح مشا به شود و الا در صورت اختلاف رنگ هر دو چشم باز قبح منظر پیدا خواهد شد بر بیان پنجم در بیرون آمدن  
 قرنیه از جای خود و اندر از زبان انگریزی شفاف گویند که قرنیه از جای خود بسبب غمزدن  
 اجزای اندرونی مقله پیش آید خواه بعضی اجزای آن یا با تمام قرنیه از جای خود بیرون آید بسبب تورم یا زخمی شدن آن جزا  
 اندرونی چشم یا بسبب رم خود هرگاه از آن نرم گردد و علاج هرگاه بعضی اجزای آن بیرون آمده باشد درین وقت برای منع  
 کردن اجزای باقی مانده آنرا از بروز و رجوع تدبیری سازند که غمزدن اجزای داخلی چشم کم گردد و آن از قطع کردن عینیه حاصل  
 میشود و اینهم از آنست که است چه از قطع کردن عینیه چون غمزدن رونق کم میشود از آن بروز و رجوع قرنیه هم رفع میگردد و هم ثقیفه جدید  
 در عینیه پیدا میشود که از آن دیدن اشیا ممکن میشود و درین وقت ثقیفه قدیم کم میگردد و بسبب آن رویت اشیا معاروم میشود  
 پس ازین سیر باز دیده میشود هرگاه با تمام قرنیه از جای خود بیرون آید باشد پس درین وقت آن لا علاج است لیکن برای دفع کردن از دست  
 چشم قرنیه را قطع کرد و جمله طوایف و اجزای عین از ساعه چشم برین رفتار و تکلیف بر طرف شود تا اگر فصل چهارم در امراض طبعیه چشمه  
 که آنرا سکه گویند که بخت گریک گویند یعنی غشای سخت صفتی که آنرا غشای غلیظه و غلیظه است بسیار سخت است سته از امراض آن که تر میشود  
 و هم طبعیه است که آنرا سکه گویند یعنی غشای سخت صفتی که آنرا غشای غلیظه و غلیظه است بسیار سخت است سته از امراض آن که تر میشود  
 میشود لیکن هرگاه آنها یافته شود پس که از دو سبب میشود یکی روایت نموده اند که این طبقه غشای شیشه است روایت نموده اند که غشای شیشه است  
 میشود و هم رسیدن نری آن میباشد این مرض سن طفولیت شباهت بپیری کمتر میشود و در سن کهنه است یا در عارض میگردد و اکثر در چشم  
 میباشد اعلی مات اول در دو چشم محسوس میشود مثل جمع مفاصل که با تمام غشای میباشد از غمزدن بالای چشم از حرکت چشم در

بیان پنجم در بیرون آمدن قرنیه از جای خود

فصل چهارم در امراض طبعیه چشمه

در این فصل



مدت دراز تا ده کرانیک شود و همچنین میگردد و سبب تشنگی غشای سیاه مذکور از زیر آن می شود و درین وقت چشم نرمی پیدا می کند  
و از مس کمر این محسوس میشود و بصارت ناقص یا باطل میگردد و گاهی ورم کوایه مخصوصا هرگاه شدید باشد گاهی در عنبیه هم ورم  
پیدا میشود چنانکه گاهی از ورم عنبیه این غشا ورم پیدا میگردد زیرا که در عنبیه غشای سیاه رنگ بیشتر است و سبب اتصال آنها زیاد است  
پس از مرض عنبیه غشای سیاه و از ورم غشای سیاه عنبیه متورم میگردد و خاصه هرگاه مرض کثیر و شدید باشد و علاج اول سبب  
مرض مشخص گردد و دفع کردن آن اهتمام نمایند مثلاً هرگاه بسبب غلظت یعنی تشنگی ورم درین غشا پیدا شده باشد درین وقت آنچه  
در علاج سفلیس شری یا سکندهی دویه مستعمل میشود مثل بای کلار و آف مرکبوی یعنی رسکوک صاف ایو و آف پائاس مسداده  
سار یا ریا یا مطبوخ غشیه فیه نشان از چشم بسیار کم کار گرفته باشند و جودین پلاستر از مرهم بنایترایند درست کردند و درین  
قسمت اتقان عمل سینین صدغین بخوریکه در علاج نقل میشین عاظم شده خواهد شفع کثیر حاصل میشود و ایضا عینک آینه های نیلگون  
یا سبز رنگ یا رنگ خانی درست کرد و همواره بر چشم دارند و درین قسم حاجت نبر یا ده تنفرخ از قسم فصل سال کمتر داعی میشود و آنچه  
بسبب یاده شفت که رفتن از چشم شقی قلیل این ورم پیدا شده باشد در آن چشم زیاد تر از آن است مانند درین قسم بر صدغین یا پلاستر کنند تا  
درست گردانند و نافع میشود عینک بصفتی که در قسم سفلیس منفیه میشود اینجا هم بهمان صفت چشم باید نهاد تا ازیت از دیدن شقی  
کم شود مقویات خون اعضا مثل آیرین بارک کنین نوشانند غذیه جید خوردن خون صالح قوی پیدا شود و ضعف کمزوری اعضا  
خون بر طرف گردد و قد که فصل ششم در امراض عنبیه آن هم شمل است بر چند بیان بسیار اول ورم عنبیه که از بلغت  
لاش چشم بزرگ میشود سبب آن بسیار اندک گاهی بسبب تشنگی مانع از سیکه و جمع مفصل با حسی عارض میشود و همان سبب آن علت این  
مرض هم حادث میشود و از یاد نظر کردن قطرات عروق قیقه و دیگر کارهای باریک مثل ساعت یا زنجی بافتن بشنیکه در آن هم بسوی باریک بینی حیات  
می افتاد و نشود و چون از نظر کردن ای بسوی آتش چنانکه طباطبائی طعام حاد و آن ضرورت می است این ض پیدا میشود و گاهی رسیدن هوا می  
چشم مثل شخصی که در کوچه ای باشد یک وازه آن از آن بوب باج سرد شدت بود و پرملوی آن کشا و بود و او ششول کاری باشد و هوای سخت سرد  
از پرملو چشم او رس آن مانع از این مرض عارض میشود علامت هرگاه این ض شروع شود اول در قلمه غمی پیدا شود و آن سرخی چنانکه سابقا  
در بیان ورم میوکس میگویم گفته شد رنگ پانزی خفیف میباشد هر قدر که قریب بنیه سرد سرخی یاده شود و از هر جانب چشم بگمای تخمه است بخاطر  
ستفیم با سرخی قلیل تا قریب میرسد و قریب آن زیاد سرخ میشود که ازان گرد قریه حلقه سرخ محسوس شود تنبیه گاهی این مرض  
با ورم ملخه و غشای میوکس میمیرن هم ورم عارض شود و درین صورت سرخی رگهای میوکس میمیرن که با اشکال متعلقه میباشد  
با سرخی رگهای ملخه که راست اند جمع میشود و تشخیص شود اگر در ورم در میوکس میمیرن است یا ملخه پس درین وقت باید که طبیب  
بسیار غور کرده باین طور هر دو را جدا کند که عروق ملخه کم رنگ و راست و زیر میوکس میمیرن خواهند بود و عروق میوکس میمیرن  
مختلف الاشکال یاده سرخ بالای عروق ملخه که کم سرخ اند بوده باشند و ایضا میوکس میمیرن از حرکت است متحرک شود و ملخه  
از جای خود حرکت کند با یکدیگر درین صحن رنگ صورت اصلی عنبیه هم فرق میشود زیرا که ماده ورم که از عنبیه بیرون آید بکرات با عنبیه

ملخه میوکس میمیرن در امراض عنبیه

در این وقت













در چهار آنرا و تغییر و درین اعضا فواید پیدا میشود یکی در هر یک این اعضا فرق از حال صحت واقع شود مثل آنکه از مردم مقدار آنرا زیاد شود یا چیزی از آن کم گشته نرسد و یا منقبض شده ضعیف گردد و دوم آنکه اعضای مذکور در ساخت خود بر مقدار و صحت طبیعی خود باشند لیکن در عروق آنها از حال صحت فرق واقع شود مثل آنکه از جمیع خون قلیل از اشتقاق زائد مانده شده از کار خود بازماند السبب پیدایش تغییر در دماغ یا در غشای نوری یا در عصبه مجوفه که از حصول درم در آن پیدا شود و چنانکه بعد سرسام یا بعد درم غشای نوری پیدا میگردد و در نهایت هرگاه در دماغ آنرا زیاد شود چنانکه وقت انفجار عروق دماغیه از جمیع شدن خون بر دماغ سکنه حادث میشود یا هرگاه که دماغ منقبض شده و دماغ یکدوم عصب که از راه سلیج مذکور آمده باشد غیر که این حالت حادث میشود و گاهی در امراض نخاع هرگاه از آن استخوان نصفه اسفلین پیدا شود یا در استخوانهای هام بدن که استخوان استخوان میشود هم این حالت پیدا میگردد و در نتیجه اسباب بسیار که هستند زیرا که در اینها در ساخت اعضای مذکور تغییر واقع میشود و گاهی از اینها پدید میآید که در دماغ یا در عصب یا در غشای نوری از جمیع خون پدید میآید مثل احتباس طمث یا قبض شکم و همچنین از زیاد شدن غشای نوری از چشم و هم از زیاد شدن غشای نوری در غشای نوری اجتماع خون پیدا میشود و گاهی از صندلین اسباب که مولد اینها یعنی قلیت خون است و مثل زیاد شدن غشای نوری یا در عورت یا از کبود شدن و خورون تنبک یا از زیاد شدن خون از بدن دفعه چنانکه در ولادت یا بواسیر میشود هم این حالت پیدا میآید که در دماغ یا از هر یک و مشارکت در امراض اعضای دیگر هم این حالت پیدا میشود چنانکه در کم شکم یا هرگاه در دماغیت بر ریشه های از دماغ غاس عصب که در وجه آمده اند رسد مثل آنکه دماغ لای دندان یا بر خنجر پیدا شود یا یکدوم زخم بر خنجر یا در خصوصاً هرگاه آفت بر ریشه این عصب که بر پیشانی آمده رسد از آنهم این حالت پیدا می شود و گاهی از زخم گاهی از آتش گاهی از زخم یا از هر یک هم این حالت حادث میشود

العلامات عمومی که در این اقسام آن در بصارت ضعف پیدا می شود و آهسته آهسته زیاد میگردد و تا آنکه بصارت مطلقاً باطل گردد و در چشم تعبیه و سلیج میشود و عصبیه ضعیف شده آهسته آهسته از دیدن روشنی حرکت اجتماعی میکند یا مطلقاً از حرکت خود باز میماند و چشم در بعضی همیشه مفتوح میماند و مثل کسیکه بسیار در غرور و غرض چشم کشاده و بیچاره و گویا پیش روی خود تا دوری بیند چشم کشاده و از دست خود انداخته کرده و در فترت آن قدری ضعیف می باشد با کجایه مثل کسیکه در شب تار و در تاریکی راه رود و در روشنی از قیاس آن میباشد و این علامات از علامات خاصه این مرض است و این مرض بر سه قسم است یکی آنکه در آن که دماغیت و در چشم نمیشناسد جز اینکه بصارت روز بروز ضعیف میگردد و این قسم وقتیکه از ضعف و کمزوری مرض پیدا شود حادث میگردد و دوم آنکه در آن یک دو هفته مدتی پیدا شده منع گردد و بعد دفع شدن صدرع ضعف بصورت مرض چشم ظاهر شود و اینجا بالضرورت در دماغ یا در غشای نوری اول پیدا میشود و بعد دفع شدن آن آنچه ضرر و نقصان که درین اعضا پدید آید به بود بانی مانده و در شان مرض میگرد و سوم آنکه اول در سر پیدا میشود و بعد دفع شدن آن ضعف بصارت عارض شود و یکی آنکه صدرع به بزرگ گردد و بزرگ میشود و در سر هم همراه آن بانی مانده و این روشنی میشود که در دماغ سلیج پیدا شده و دماغ عصب را غرق می کند و چنانکه اکثر مرضیانی که شان از حال انجام مرض میسر رسد از اینها اول باید که کیفیت حدوث مرض از زمین و پستی و بلندی یا غنای یا فقر آن را نظر کرده

حکم کنند باینکه اگر مرض در وقت پیداشده باشد چنانکه در سکتہ میشود و همچنین آنچه بعد در دوسر سبب از زوال آن یا بعد شدت صداع بصیرت و  
 بقای در دوسر حادث میشود به انجام ست و آنچه آهسته آهسته حادث شود یا شکر یا با سبب آشک یا رو یا بیشتر هم یا تقریباً  
 شده باشد نیک انجام میباشند و از علل زائل میشود و الا ایضا از دریافت کردن وقت غشای نوری هم حکم با انجام مرض که در میشود مثلاً در وقت  
 کنند که مرض چه قدر از بعد رسیدن می بیند و چنانکه پیش روی غشوی بین از جهات دیگر چشم هم مثل جانب عین یا سایر اجزای قوت  
 می بیند یا نه پس اگر از بعد زایل میسر آید و همچنین از جهات چشم مرئی را بر این نیک انجام ست و اگر از پیش و بین یک از جهات دیگر  
 مثل جانب عین یا سایر چشم می بیند با انجام خواهد بود زیرا که این امر دلالت میکند بر اینکه در کار غشای نوری بمقابل این جهت است  
 و تفسیر پیداشده و همچنین اگر گاه بزرگتر آن شامل می شود و در آن ظاهر شود که در غشای نوری قوی و سفید گشته دلالت میکند بر اینکه در جرم آن ضعف و  
 استخوانی و نیم انجام ست از علل آنچه از اسباب باغی و عصبی پدید میشود و آنچه از امراض اسباب دیگر پدید شده باشد در آن سبب ادریا  
 تبدیلی کردن آن شکر از در همان علاج این مرض است که گاهی بزرگ وانی است و عین صحت حالت از زمان پدید آمدن آن ضعیف و در آن یک  
 از نشان دادن است که گاه و گاه آن ظاهر شود و همچنین از زمان پدید آمدن آن در چشم و حرکت اول آن در بین آن است که شکر حاصل میشود و فصل  
 در گلو و گاه و گاه آن است که یک است بعضی درم چشم که در آن حرکت چشم بزرگ نبری آب سحر عظم کرد و حقیقت این مرض تا حال بعد  
 ثبوت در سبب بعضی میگنید که درم غشای نوری است و درای بعضی است که با درم غشای نوری درم غشای سپاه هم میشود و گاه  
 بعضی آنکه باین هر دو درم در طریقت عینید هم درم و تفسیر از حال صحت و ذات و لون آن بسیار می گردد و اقرب اینست که درین  
 مرض درم و تفسیر درین خصوصاً در جمله جزای چشم عموماً پدید میشود و این مرض بر سه قسم است اول الکیوت دوم که آنکه  
 و این هر دو قسم از اول خودی واسطه امراض دیگر پدید می شوند سوم سکندری و این بعد امراض دیگر چشم مثل سیدان شکر چشم یا  
 حادث شدن آن درم در آن پدید میشود و در اقسام ثلثه عموماً در چشم ستمی از مس که در زیاد محسوس میشود و دوم آنکه مرض شکر پدید  
 و در سیدان و شکر کثرتی پدید سوم آنکه در بصارت ضعف مطلقاً پدید می شود که از آن شکر قریب راهم صاف نسپیند و انجام قسم  
 ثلثه مذکور هم نیست که اگر از علاج صحت نشود و در بصارت باطل میشود و بعضی در اسرع مدت و در بعضی بعد مدت بسیار  
 المتبیب قسم اول و ثانی بدون گذشتن چهل و پنج سال از عمر کمتر دیده میشوند و خود بخود حادث میشوند و سبب محدث آن ظاهر نگردد  
 لیکن اکثر بعد عرف شد که در وقت رسیده افتادن برق یا شنیدن صیحه و آواز قوی مثل آواز عرشید یا قوب عظیم یا عظیم  
 و رخ عظیم که بعد از اب مال یا بعد از اول دفعه رسد حادث میشود و یک قسم ثالث پس ممکن است که آن در هر وقت و عهده از اوقات عمر انسان  
 عارض شود و درم شد چشم یا بعد رسیدن آن لیکن اکثر آنهم بعد چهل و پنج سال از عمر انسان عارض میشود و آنکه آنکه ایستاد است اکثر  
 قبل ظهور شدت آن علامات نند و آن یافته میشوند مثل آنکه چند روز قبل ظهور شدت آن مرض از نزدیک که و از دور زیاد می بیند و از جهت  
 محتاج میشود بسوی آن نیک می بیند و از آن در نزدیک و قریب هم می بیند و هرگاه عینک چشم می گذارد پس هر عینک که امر از بخوبی می بیند  
 بعد در ده پانزده روز از آن باز نمی بیند و محتاج بسوی عینک دیگر که از آنهم قوی باشد میشود و از این نکته میشود که قوت باصره روز بروز در اسرع مدت

فصل نهم در امراض عین  
 که در وقت پیداشده باشد چنانکه در سکتہ میشود و همچنین آنچه بعد در دوسر سبب از زوال آن یا بعد شدت صداع بصیرت و  
 بقای در دوسر حادث میشود به انجام ست و آنچه آهسته آهسته حادث شود یا شکر یا با سبب آشک یا رو یا بیشتر هم یا تقریباً  
 شده باشد نیک انجام میباشند و از علل زائل میشود و الا ایضا از دریافت کردن وقت غشای نوری هم حکم با انجام مرض که در میشود مثلاً در وقت  
 کنند که مرض چه قدر از بعد رسیدن می بیند و چنانکه پیش روی غشوی بین از جهات دیگر چشم هم مثل جانب عین یا سایر اجزای قوت  
 می بیند یا نه پس اگر از بعد زایل میسر آید و همچنین از جهات چشم مرئی را بر این نیک انجام ست و اگر از پیش و بین یک از جهات دیگر  
 مثل جانب عین یا سایر چشم می بیند با انجام خواهد بود زیرا که این امر دلالت میکند بر اینکه در کار غشای نوری بمقابل این جهت است  
 و تفسیر پیداشده و همچنین اگر گاه بزرگتر آن شامل می شود و در آن ظاهر شود که در غشای نوری قوی و سفید گشته دلالت میکند بر اینکه در جرم آن ضعف و  
 استخوانی و نیم انجام ست از علل آنچه از اسباب باغی و عصبی پدید میشود و آنچه از امراض اسباب دیگر پدید شده باشد در آن سبب ادریا  
 تبدیلی کردن آن شکر از در همان علاج این مرض است که گاهی بزرگ وانی است و عین صحت حالت از زمان پدید آمدن آن ضعیف و در آن یک  
 از نشان دادن است که گاه و گاه آن ظاهر شود و همچنین از زمان پدید آمدن آن در چشم و حرکت اول آن در بین آن است که شکر حاصل میشود و فصل  
 در گلو و گاه و گاه آن است که یک است بعضی درم چشم که در آن حرکت چشم بزرگ نبری آب سحر عظم کرد و حقیقت این مرض تا حال بعد  
 ثبوت در سبب بعضی میگنید که درم غشای نوری است و درای بعضی است که با درم غشای نوری درم غشای سپاه هم میشود و گاه  
 بعضی آنکه باین هر دو درم در طریقت عینید هم درم و تفسیر از حال صحت و ذات و لون آن بسیار می گردد و اقرب اینست که درین  
 مرض درم و تفسیر درین خصوصاً در جمله جزای چشم عموماً پدید میشود و این مرض بر سه قسم است اول الکیوت دوم که آنکه  
 و این هر دو قسم از اول خودی واسطه امراض دیگر پدید می شوند سوم سکندری و این بعد امراض دیگر چشم مثل سیدان شکر چشم یا  
 حادث شدن آن درم در آن پدید میشود و در اقسام ثلثه عموماً در چشم ستمی از مس که در زیاد محسوس میشود و دوم آنکه مرض شکر پدید  
 و در سیدان و شکر کثرتی پدید سوم آنکه در بصارت ضعف مطلقاً پدید می شود که از آن شکر قریب راهم صاف نسپیند و انجام قسم  
 ثلثه مذکور هم نیست که اگر از علاج صحت نشود و در بصارت باطل میشود و بعضی در اسرع مدت و در بعضی بعد مدت بسیار  
 المتبیب قسم اول و ثانی بدون گذشتن چهل و پنج سال از عمر کمتر دیده میشوند و خود بخود حادث میشوند و سبب محدث آن ظاهر نگردد  
 لیکن اکثر بعد عرف شد که در وقت رسیده افتادن برق یا شنیدن صیحه و آواز قوی مثل آواز عرشید یا قوب عظیم یا عظیم  
 و رخ عظیم که بعد از اب مال یا بعد از اول دفعه رسد حادث میشود و یک قسم ثالث پس ممکن است که آن در هر وقت و عهده از اوقات عمر انسان  
 عارض شود و درم شد چشم یا بعد رسیدن آن لیکن اکثر آنهم بعد چهل و پنج سال از عمر انسان عارض میشود و آنکه آنکه ایستاد است اکثر  
 قبل ظهور شدت آن علامات نند و آن یافته میشوند مثل آنکه چند روز قبل ظهور شدت آن مرض از نزدیک که و از دور زیاد می بیند و از جهت  
 محتاج میشود بسوی آن نیک می بیند و از آن در نزدیک و قریب هم می بیند و هرگاه عینک چشم می گذارد پس هر عینک که امر از بخوبی می بیند  
 بعد در ده پانزده روز از آن باز نمی بیند و محتاج بسوی عینک دیگر که از آنهم قوی باشد میشود و از این نکته میشود که قوت باصره روز بروز در اسرع مدت











از اجزای گیر عین قطره خون میچکد بعد چکیده آن اجزای دوسویه در آن شناوری میکند گاهی تک قطره عینیه گاهی تک غشا  
سیاه در آن محسوس میشود الی علامات در بصارت ضعف پیدا میشود و اکثر سبب این سبقت روم عینیه و روم غشای سیاه و روم  
غشای قرمز چشم میباشد و هم سبب که در عالم جابجیه در مریات صاف معلوم نمیشود و اندک معلوم میشود و هم سبب که در  
محل خاص از تولد نقاط در آن میباشد بصارت ضعیف میگردد و این سبب شد و هم چنانچه رومی بیند گاهی تمام سری که در درون  
معلوم میشود گاهی بی صاف محسوس گردد و لیکن بر آن گاهی هم مدور مثل نقطه سیاه یا طول مثل خط مستقیم یا منحنی دیده میشود و گاهی مثل  
قطعه غشای مری محسوس میشود یا کله در جابجیه که در صورت که میباشد بر مریات نیز تا انصوت که در آن مذکور شد باشد  
اعلاج از هر مرض که این حالت پیدا شد باشد علاتش نمایند اما هرگاه سبب تشنگی یا حالت حادث شد باشد در آن مری قوی بی  
مصول تحت میباشد و آنچه در علاج سفاس کنند بی دوی فیه میشود اینجا استعمال رند بیان سوم در مری و دوی فیه  
یعنی طریقی که پیش چشم معلوم شود و این قبل خیال است که پیش چشم محسوس میگردد و آنهم بر دو قسم است یکی آنکه آنچه صوت محسوس  
شود و شفاف باشد مثل آنکه زجاج یا بلور که از ابظون پر در گلولی اندازند دوم آنکه صوت مذکور که در دیده شود مثل صوت گلس یا شیشه  
و اینجا نیز صوت پیش چشم محسوس معلوم میشود بخلاف صوت و پیس که در اثر تزلزل مری که آنجا صوت مرقومه میباشند هر طرف که چشم در آن  
میگردد صوت مرقومه هم همان طرف بر مری دیده میشود و اینجا در آن که میباشد السبب سبب این پیدا شدن مثل شفاف یا شفاف  
سیاه در زجاج میباشد این جسم که در زجاجیه کسی که وقت شب ترات حروف تبقیه یا ده شفت از چشم میگردد یا کسی که  
ضعیف البصر علی بوند و در آن قریب شدن بی از چشم نمی بیند پیدا میشود علامات این صوابا میباشند چشم معلوم میشود و آنچه  
میباشد یعنی از جانبی می آیند بجانب دیگر طریقی که در رفته معلوم میشود پس گاهی پیش چشم معلوم میشود و گاهی بی ایل میگردد و نیز که  
سل نقطه مذکور در یک جا در زجاجیه قائم نباشد بلکه مثل شناور در آن متحرک بوند از این سبب شناوری خود هرگاه بمقابل  
می بیند محسوس میشود هرگاه از مقابل آن رایل شوند محسوس نگردد و گاهی تا دو سه ماه این جسم پیش چشم دیده نمیشود و بعد از  
مرئی میگردد اعلاج چشم از آن زیاد رسانند و عینک نیلنجی چشم نهند بر آن گاهی در روشنی زیاد هم این صورت جسم مذکور زیاده  
دید میشود پس هرگاه از عینک نیلنجی روشنی کم کرده شود و مذکور هم دیده میشود و اینجا خیال توجه مریض را که بسوی مریض  
میباشد باطون خیل کم کنند و دوی مقوی کل کنند با رکن آهین حسب مناسب بوشانند و غذایه تقویه چیده خوراند بیان  
چهارم در رویت ضواء و شبیای بر تهمیش چشم و انرا البفت الاثن و کجینس سنشل الاثن یعنی زیر افتادن اجزای در خشن  
با هم شده مثل اجزای برقیه یا اجزای طلائیة سندان نیست که مریض پندارد که گویا اجزای طلائیة خشنند از بالا بر میریزد السبب  
چیزی در خشنند که آنرا گول بر سرین گویند در زجاجیه یافته میشود و قتیکه از آن افتاد سسکوب می شود و این جسم که در وقتیکه قدری خون  
در زجاجیه ریخته بچند گره در آن پیدا شد باقی میماند اعلاج لا علاج است از آن که در مریض بصارت نمیرسد فقط فصل  
دوازدهم در امراض رطوبت جلدیه و آنهم شمل است بر چند بیان بیان اول در ظهار حقیقت طوبت جلدیه

بیان سوم در مری و دوی فیه  
بیان چهارم در رویت ضواء و شبیای  
بیان اول در ظهار حقیقت طوبت جلدیه  
و آنچه در مری محسوس میشود  
و آنچه در زجاجیه پیدا میشود  
و آنچه در رویت ضواء و شبیای  
و آنچه در ظهار حقیقت طوبت جلدیه



بیان دوم در اختلاج جلدیه

که آنرا بعلت گشایش نفس که سگرم و سکون در سینه حمله یعنی جسم شفا که بسبب آن چشم مرئی ضعیف و کم معلوم شود و میانه مندرج چشم شفا که  
 در بعضی بدن حساب صغیر و کبار است اکثر از زجاج و گاهی از سنگ براق هم ساخته میشود و لیکن طوبیت جلدیه پس آنهم چشم شفا که  
 صلب است مثل غصه که در خریده خود در میان طوبیت بعضی زجاجیه توسط رباطات خود متعلق چشم میماند و در حال استیجاب  
 صفا و شفیع خود اندرون چشم یک نمیشود اما هرگاه از جای خود خارج شد زایل گردد و یا در جسم آن تغییر کسب یابد و پدید آید و شغل  
 اینکه سفید گردد و درین وقت مردم محسوس میشود و لیکن این طوبیت بعد از خلل از جای خود می آید و میماند بسبب سست شدن  
 معالیه خود و از عللش بعد از خلل همین است که یا آنرا چشم بیرون آید یا از سرشون نیره ریزه گردد و اگر از آنجا خود بخیزد شود  
 بیان دوم در خلل جلدیه که آنرا بعلت گشایش نفس که گشایش گویند باید دانست که طوبیت جلدیه بعد از خلل خود از  
 هر سبب که باشد گاهی بجانب قدم خود آمده در محل طوبیت بعضیه که پیش عنقیه است می آید و گاهی بجانب خلف و در محل طوبیت  
 زجاجیه نعل میشود و اگر از آنجا نعل آید باشد درین وقت گاهی از راه زخم مذکور اگر کسی که سیمین چشم از زخم محفوظ باشد زیر آن قرار  
 میگیرد و اگر آن زخم بود از چشم بیرون می آید و این بیان هم مثل است بر سه تنبیه تنبیه اول در اینکه در جانب قد آمده  
 در طوبیت بعضیه آید پس بدانکه هرگاه در جهت قدم حرکت کرده در محل بعضیه که پیش عنقیه است داخل شود سبب آن سیدن  
 ضربه خارجی چشم میماند گاهی از زیادتی کردن خصوصاً که زور و عنف تی کرده شود و هم حادث میشود و لیکن درین وقت بسیار  
 هم مثل درم متقدمه عضای چشم ضعیف لیس شدن عین هم شریک میشوند و اعلیامات هرگاه چشم را بدین محل مردک چشم چشم  
 در محل طوبیت بعضیه چنان معلوم میشود که گویا قطره کلان از روغن در آب افتاده است بر کناره های آن سبب سیدن و شنی قدری  
 بیاض با صفت محسوس میشود و ثقبه عنقیه وسیع میگردد و عنقیه سبب اینکه از آن طوبیت جلدیه بیرون آید و منقلب بسوی طوبیت جاجیه  
 بطور تقوس میشود و کناره های عنقیه نقطه پس جلدیه دیده میشود و چون که طوبیت بعضیه در دو جای میماند یکی پیش عنقیه و هم عنقیه  
 چون در این صورت طوبیت جلدیه در محل بعضیه که پیش عنقیه است می آید و در آن داخل میشود و از این محل بعضیه باقی میماند بلکه از  
 طوبیت جلدیه ملو میگردد و چون که عنقیه منقلب شود درین صورت بر طوبیت جاجیه میرود از سختی مکان گیر بعضیه پس عنقیه  
 آنهم باقی میماند و هر محل بعضیه بر آن تنگ میشوند و اکثر غریزیه بر غریزه عنقیه میرسد از آن اکثر آید و در پدید آید و گاهی دوم  
 هم در این طبقات پدید آید و اگر درم پدید شود نرمی و سست خاد عنقیه حادث میشود که از آن چشم نقصان عظیم میرسد و علاج چشم  
 است که در محل قرینه شکاف پیدا گردد و طوبیت جلدیه بیرون آید یا سرشون چشم داخل کرده طوبیت جلدیه ریزه ریزه کرده و در  
 تا منجذب شود و بعد از آن عینک خارجی چشم نهاده کار دیدن از چشم از آن گیرند تنبیه دوم در خلل جلدیه و فتن آن بسوی خلف  
 یعنی جلدیه در مکان طوبیت جاجیه نعل شود که سبب این خلل هم از رسیدن ضربه از خارج چشم حادث میشود و اعلیامات  
 اول بعد سیدن ضرب چشم در بصارت نقصان پیدا میشود و در بعضی قریب صاف نمی بیند هم بدون داشتن عینک چشم  
 مثل حال صحت خود می بیند چون چشم را بدین ثقبه عنقیه وسیع دید میشود پس اگر جلدیه بعد سیدن خود بر جاجیه مقابل ثقبه عنقیه باقی

چشم از خلل

باشد و این امر در طوبت مذکوره هم شکی نایست بزرگی یا سفیدی محسوس میشود چنانکه از داخل شدن شبنم غیر طبیعی در چشم ازین  
 پدید میشود و همچنین اینجا هم اکثر غشای سیاه در و ازین پدید میگردد و گاهی گلاب و گوناگون حادث میشود که بسبب آن بر مردمک چشم نیکی  
 رنگ آب قلم و حتی در چشم محسوس میگردد و گاهی که دام ازین حادث میشود و بعد مدت طوبت مذکوره خود بخوبی بگریزد و علاج  
 هرگاه بعد رسیدن ضرب چشم ازین ریسان ضربه دفع گردد و چشم کم در و کلفت باقی نماند عین که شیشه ای آن بنابر چشم چشم  
 گذشته کار دیدن چشم گیرند اگر در چشم ازین باقی باشد و از آن اندیشه پیدا شدن ورم غشای سیاه رنگ نقصان چشم پیدا شود  
 در این وقت در محل اتصال تخمه قرینه ضربه پیدا کرده طوبت جلیدیه بپزدان رند تا اینکه تخم در انحلال طوبت جلیدیه هرگاه بعد  
 انحلال از تخم تخم پیر آن در زیر میکس میبینیم چشم قرار گیرد البته گاهی از رسیدن ضربه چشم تخم در طبعه تخم غشای سیاه  
 پیدا میشود لیکن میکس میبینیم چشم بسبب آن در نه خود متحرک نگردد و از زخمی شدن محفوظ میماند و در این وقت طوبت جلیدیه ازین  
 زخم مذکور برآمده و زیر میکس میبینیم بماند اگر میکس میبینیم چشم تخم پیدا شده باشد در این وقت طوبت مذکور بعد انحلال از چشم پیر  
 می باید املات چون چشم را بعد رسیدن ضربه می بیت و جهت فوقانی آن یعنی زیر جفن اعلی در تخم خمدیده میشود و قرینه تخم مذکور زیر  
 میکس میبینیم آن چیزی در و شفاف یافته میشود که آن طوبت جلیدیه پیدا شده چون ثقبه عینیه را میت کشاده و وسیع دیده میشود و بر  
 کناره های آن اکثر حرکت معلوم میشود علاج آنست که میکس میبینیم چشم جای که زیر یک طوبت جلیدیه دیده میشود قدری  
 شش با یک کرده طوبت مذکور از آن بر آورده چشم را بند کرده زاده خفیف بران نماده از عصابه بر بند تا قدری غم بران شود  
 بعد صحت چشم عینیک بران نماده کار چشم گیرند فتک که سبب آنست و در و الا و انرا بلفظ لاشن کنار کت یعنی انصباب از بالا  
 بپایین نامند آن فی الواقع بیاض یعنی سفیدی است که اکثر در نفس جلیدیه پیدا میشود و در طیان صاف میماند و گاهی غریب طیان سفید  
 میگردد و طوبت جلیدیه شفاف میماند و گاهی نفوس جلیدیه غریبه آن هر دو میباشد السبب سبب قریب آن نیست که در جلیدیه  
 جید آن نیمه سوزین سبب طوبت مذکور شفاف آن نایل میشود و کثیف و سفید میگردد اما سبب بعیده پس گاهی درین پیری و  
 گاهی از ضعف کمزوری عام بدن چنانکه در فیا بیطس میباشد گاهی بعد از غشای سیاه و ورم غشای نوری پیدا  
 میشود و گاهی بعد رسیدن ضرب چشم عارض میشود و گاهی فطری بود املات اول در بصارت ضعف پیدا میشود و آنچه میبند  
 مکه معلوم میگردد و این ضعف و کورت رفته رفته روز بروز زیاد میگردد و هر آن که دام ازین چشم نمیداشد چون مرضی در  
 روشنی یا بطرف روشنی عینکم معلوم میشود و هرگاه در سایه یا بسوی ظل نظر کند یا دهی بیند زیر که ثقبه عینیه روشنی می شود و در  
 سایه تاریکی وسیع میگردد و چون نکاتین سفیدی اکثر در وسط جلیدیه میباشد پس هرگاه ثقبه عینیه تنگ میشود خطوط شعاعی از بهر ترا  
 غشای نوری کمتر پدید آید سبب کم دیده میشود چون ثقبه مذکور کشاده گردد و در این وقت خطوط مذکور بر اطراف جلیدیه که  
 اینجا سفیدی نمیداشد بسیار کم بود اقلا تا غشای نوری میرسد ازین مرضی زیاد دیده میشود لیکن اینجا حالت ما دام که سبب  
 بر تمام جلیدیه پیدا میشود یافته شود اما هرگاه جلیدیه سفید گردد در وقت زرد روشنی زرد تاریکی معلوم میشود و هر دو برابر شود

بسیار معلوم در منزلت املات

و هرگاه چشم این مریض را بیند اگر از دم غنیه این مرض پیدا نشود باشد ثقبه غنیه بر حال صحت میباشد و بطا هر معلوم میشود که در وقت  
 در ثقبه غنیه است لیکن چون بغور قائل بدینکه در وقت مذکور پیش غنیه محسوس میشود و این که در وقت اکثر بزرگ سفید و گاهی که در  
 از بیاض مسود و گاهی نیلگون و گاهی بزرگ شمع مثل که برای و گاهی سیاه میباشد اکثر از یک چشم ابتدا میگذرد بعد در وقت در  
 چشم دیگر هم حادث میشود چونکه درین مرض هم بصارت مثل مرض ما روزی یا گاه که در روز بروز ضعیف میشود لهذا گاهی با این  
 مذکور در مفاصل میگذرد و در وقت بینا باین نحو توان کرد که در ما روزی سفیدی در چشم میباشد چنانکه اینجا بود و گاه که اکثر در هر دو چشم حادث  
 میشود و ابتدا میگذرد این مرض از چشم واحد شروع میشود و ایضا در ما روزی و گاه که با هر دو ثقبه غنیه سیاه میباشد اینجا بر حال طبعی خود  
 و ایضا در کمره تاریک چون بعد از آن شمع روشن میشود چشم در چشم سیاه صورت یک شمع روشن یافته میشود و این ترتیب یک چشم  
 طویل است میباشد طویل تر از شمع خارجی و آن عکس آنست که بر قرینه منطبق میشود و صوت شمع روشن که در قدام شمع روشن صغیر میباشد  
 درست بود و آن عکس آنست که در جلیه منطبق میگردد و صوت آن که صغیر تر از شمع خارجی معکوس بود یعنی همان بطرف پائین و  
 و بنا به آن بسوی اعلی بود و این عکس شمع خارجی است که در قرینه جلیه بطرف خلف آن منطبق میشود و این صوت بظاهر چنان معلوم میشود  
 که گویا در طوبت برقیه است لیکن فی الواقع در خلف جلیه میباشد و در صوت اولی که یکی طویل و دیگر صغیر است لیکن است بوند هر دو شمع  
 خارجی هرگاه آنرا بالا و پائین ببرد حرکت کرده بالا و پائین پیروند و باز از شمع خارجی و این صوت ثالثه که عکس است در خلف  
 جهت حرکت شمع خارجی با حرکت آن حرکت میکند یعنی هرگاه شمع خارجی را بسوی بالا بزنند این صوت ثالثه بسوی پائین می آید  
 و بالعکس نیز که چون صوت موقوفه معکوس است انداز حرکت آنهم خلاف جهت حرکت شمع روشن محسوس میشود و در نزول الماء  
 در چشم مریض بهمانی مرض صوت معکوس معلوم نمیشود زیرا که آنچه سفیدی که پیش جلیه میباشد نظر را از دیدن قرینه خود که خلف است  
 و آن صوت ثالثه منطبق میشود دیدن آن نمیشود پس بعد چون سفیدی مذکور شکل شده بر جلیه جلیه نام گردد و صوت صغیر شمع روشن  
 که درست میباشد و نفس جلیه منطبق میشود دیده نمیشود فقط یک صوت طویل است که بر قرینه منطبق میگردد و بعد شمع کام مرض در چشم مریض  
 دیده میشود ایضا دیگر آنکه هرگاه در تشخیص دل الماء اشتباه واقع شود بلا دوائی محلول آب را بر دو چشم ماساژند تا ثقبه غنیه سیاه گردد و که  
 از آن بخوبی ظاهر میشود که سفیدی در جلیه است در ثقبه نیست چنانچہ چون آن نفس شیشه دیدن شیا می صغیر است در کمره تاریک بوند  
 روشنی در پهلوی چپ از جانب پهلوی بیمار به بیت بخوبی واضح میشود که گمراکت است مرض دیگر نیست ایضا باید دانست که  
 نزول الماء در چشم است اول آنکه در آن نرمی در جلیه میباشد و آنکه در آن جلیه سیخت بود و علامت قسم اول نیست که رنگ آن اکثر  
 مثل شیر یا شیر مزج آب میباشد و درین قسم اکثر ثقبه غنیه سیاه سیاه بود و در طوبت جلیه سیاه برآمده مثل متورم معلوم میشود زیرا که از اثر  
 جسم مقدار آن زیاد میگردد و هم این قسم از سن طفولیت تا ختم سن نموده سی سال است حادث میشود و علامت قسم ثانی است  
 که اکثر بعد از چهل و پنج سال زمره نهمان حادث میشود و سفیدی آن قدری مایل بسپاهی یا رنگ آن بزرگ موم خام شباهت میشود  
 و هم درین قسم ثانی طوبت جلیه بر جلیه سیاه میشود و از وسط جلیه سفیدی شروع شده بسوی اطراف آن منبسط میگردد و تا اطرافش پیر

نقشه در سیاهان کاتارکت و گلاو کوک و اراک و روز

در سیاهان

و در مکان تاریک یا در سایه از توسیع ثقبه عنبیه زیادترن بلا و نای محلول آب مرصع یا ده می بیند و ثقبه عنبیه درین قسم بر مقدار طلسم  
خود میماند تا گاهی درین قسم سفیدی از اطراف طوبت جلیده شروع شد بطور خطوط مستقیمه متقاطع در وسط آن میسرست جای که  
در آن خطوط سفید باشند که ریبا شد جای که از خطوط معلوم خالی باشد شفاف دیده میشود و در اینجا از تضیق ثقبه عنبیه صاف  
معلوم میشود زیرا که چون اینجا سفیدی از اطراف شروع میشود پس اطراف یا ده و در وسط آن کم میباش پس وقت تضیق ثقبه چون  
اطراف جلیده که سفید گرداند مخفی میشود و وسط آن که صاف است باقی میماند ازین سبب از تضیق ثقبه یا ده مرصع می بیند  
اعلاج درین مرض چونکه اصل علاج اخراج و اعدام طوبت جلیده است که سفید شد لهذا این شفقت از او دیده حال میشود  
اینکه از دشکاری قیج کرده شود یا اینکه از نشتر بشت کردن قرینه طوبت جلیده بیرون آرند یا سوزن در چشم و از خاک کوه بگریز  
آن رطوبت جلیده را از مقابل ثقبه عنبیه و کرده و دهند یا از سوزن بر اثر رطوبت جلیده خط مستقیمه حاجت بکشند تا بسبب آن طوبت  
بعضیه با جلیده ملاقی شود و بسبب آن طوبت جلیده ریزه بگریزد و یا رطوبت جلیده را در چشم از سوزن ریزه ریزه کرده و دهند  
تا خود بگریزد و یا در جلیده از سوزن ثقبه جلیده مقابل ثقبه عنبیه پیدا کرده و دهند تا ناکه از نشتر بشت و خشک ثقبه پیدا میکنند  
تا در آن طوبت بعضیه خف شد و بگریزد و در رطوبت جلیده بعد آن بطور مجری و انبویه باقی ماند و ازین راه خطوط نور از مرصع جدا  
شد تا غشای نوری رست و بصرات معلوم شوند لیکن از تجله شراط قیج و دشکاری که ضروری اندیکه نیست که ادا م قدری  
بصارت باقی ماند تا قیج نکرده شود و کما دهم که چشم دیگر هم قدری دیده شود قیج در چشم کامل البیاض نکرده شود و الا غش  
است که اگر چشم نکرده قیج خراب شود چشم دیگر هم همراه آن بسبب هم دروی خراب گردد و دیگر آنکه قیج عین قتی کرده شود که سوا  
نزول الما و دیگر مرض از امراض عین نباشد مثل اینکه اگر همراه نزول الما و از زریا کلا و کوا هم باشند و بسبب آن هم بصارت باطل  
شده باشد از قیج عین اخراج رطوبت جلیده بگریزد از سانی مرض نفی بران مترتب خواهد شد و ایضا از شراط قیج نیست که  
وقتی قیج کرده شود که هم مرض از امراض عین مثل تشنگی عین مرصع نداشته باشد و درین وقت از نشتر زنی در چشم و ارام پیدا شود  
بصارت باطل میشود و بعد قیج عین هر مرض در کم پیدا شود و علاجش چنانکه نوشته شده نمایند و ادا م که بصارت قدری باقی بماند  
یا ضعف بصارت بهتر باشد برای دفع ضعف و کمزوری عام او و میگوید مثل کنین سرب فیری ایو و ایند یا سرب کینا یا سرب  
پونا سفید آن لایم یا ناک سرب با کماله قویات بنوشانند و اغذیه پیچیده فرارند و اگر از او غفلت و انچه او پیش سرب پیچیده فرارند  
پیشتر سرب سار یا کماله برای اتصال مایه سفلی مفید اند بنوشانند و اگر انچه جمال از کمالان بر صانع داغ میدهد بنوشانند که  
ازین راه آمدن آب بند میشود پس مثل نیاب اغوال است بر صرافی شان گوش ندیند و انچه بعضی بر جودت و صحت این علاج  
حکایات مرضی ذکر میکنند که فلان فلان مرصع داغ که نفعند بر آن مرض شان بر صری که بوده از آن بجا و ز کرده پس تحقیقش  
اینست که گاهی این مرض خود بهم بعد شروع شدن خود متوقف میشود و بر همان حد حاجات میماند و الا کاتب این اوراق پیشتر  
کسان دیده که داغ گرفتند و بعد آن باز مرض یاده شد تا اینکه بصارت با تمام ایل شد و از قیج صحت شد و قیج

فصل سیزدهم در سببهای شکیک

فصل سیزدهم در سببهای شکیک فتال میا و گاهی آنرا در این کس اطفال میا هم گویند که حاصلش نیست که چون در یک چشم فساد  
خوابی باشد چشم دیگر صحیح و محفوظ از فساد مذکور بود هرگاه در چشم صحیح هم درم و ازین فساد چشم فاسد مذکور بسبب هم در دست  
مشارکت پیدا شود باین سبب هم میگذرد و آنهم بر دو قسم است یکی نفیض که از سببهای شکیک از ریه میباشند گویند و هم آنکه شدت  
قوی بودنی از مرتبه اول چشم زیاد باشد از اصل سببهای شکیک فتال میا می نامند یا قلیل پس علامت آن نیست که سبب اول  
و هم یک چشم میباشد مثل آن که چون در چشم غیر خراب سبب زیاد میشود در وقت چشم صحیح هم ازین چشم و هم پیدا میشود  
ازین چشم نیست که قدری سرخی و در چشم صحیح پیدا شود و قدری آب هم ازین چشم جاری میگردد و صارت چشم صحیح هم کم میشود  
و گاهی عوض این علامات فقط نور یکچشم از چشم صحیح پیدا شود و ایضا این علامات گاهی پیدا میشود و گاهی زایل گردند بسبب شدت  
و خفت ازین چشم خراب سبب هم که در چشم فاسد ازین باقی ماند اما هرگاه چشم فاسد شد ازین قوی و ازین چشم صحیح و این علامات  
بظهور میشوند انجام علامات آن مدت دراز باقی میمانند اگر چه در چشم نیکوین خوف آنست که بعد از آن اصلی سببهای شکیک فتال میا هم  
شروع شود چه بعد از آن که این چشم هم خراب میگردد و علاج هر دو چشم از یاده بند دارند و کار از آنجا نگیرد و چشم هم آرام  
رسانند و آنچه ازین فساد که در چشم خراب پیدا شد آنرا دور کنند و اطفال نسبت که برای حفاظت چشم صحیح چشم فاسد از حد  
بر دارند ازین مشارکت دفع گردانند اما قسم ثانی که اصلی سببهای شکیک فتال میا است پس آن قسمی از درم است در چشم که از ازین چشم فاسد  
خراب چشم صحیح پیدا میشود و درین درم اگر چه هم پیدا میشود لکن فایسری از درم مذکور جدا شد و طبقات چشم میریزد و از آن طبقات  
بسیار حسین و میشود و این مرض اکثر از درم غنیمت پیدا میگرد و از آن در غشای سیاه و از آن در غشای نوری منتهی میگردد و گاهی  
از غشای نوری شروع شد تا غنیمت میرسد السبب اول اکثر از درم چشم خصوصاً هرگاه درم مذکور در چشم قریب مثل اتصال آن با قریبه  
پیدا شود و هم هرگاه که درم غیر طبیعی مثل قطعه کوچک آهن یا سنگ یا خشک چشم قدر در آن نفوذ کند سوم هرگاه ضعف و فساد  
در چشم سبب هم آن که در کدام طبقه اش باشد پیدا شود و از آن در چشم دیگر درم حادث شود پیدا میگرد و دو هم باعتبار عمر و کسری  
مثل طفل یا جوانان قریب الی عهد بن طفولیت درین مرض یاده مبتلا میشوند و از ماده نفوس روانی هم و استعداد و تشنگ هم این  
مرض پیدا میشود علامات درابتدا در چشم اولی سرخی و میکس میباشند چشم پیدا میشود و آب قلیل می آید و نظر کردن بسوی دشواری  
و عکس آفتاب کرده و خودی میباشد ضعف در بصارت پیدا میگرد و از اوئی کار کردن از چشم در چشم اندکی پیدا میشود و تا این حد  
آنها سببهای شکیک نمیباشند تا این که گفتن بعد چون مرض یاده شود سرخی گلابی رنگ در چشم مذکور پیدا میشود و قریبه غنیمت ازین  
تنگ میگردد و در غنیمت گاهی پیدا شود و آن بر رطوبت جلیده میوه میپزد از چشم پدید آن بر رطوبت جلیده میوه هرگاه چشم پدید آید  
و بر ریه پدید آید غنیمت که در چشم و حرکت غنیمت بسوی انقباض معده گردد و غنیمت پدید آید و ترتیب عضلات مدوره و طولی آن  
که در چشم آن هست ششها نشود از غنیمت فایسری در آن و در آخر کت آنهم نبت میگرد و در جلیه میوه نفیضی پیدا میشود و رطوبت  
از جایی هم در مقدار زیاد و چون که میگذرد و از این رطوبات در چشم سختی و تند پیدا میشود و غنیمت چشم سخت محسوس میگردد و در

اینجا فصل

[illegible]

و قریب بینی میرسد و گاهی این در و مثل عصبیه شروع میشود یعنی در اوقات مقرر کم و زیاد میگردد اما بعد از تکامل مرض پس قوت  
از ویاد خود قایم نمایند و ضربان در چشم هم پیدا میشود و شب خواب درین مرض از شدت دروغی آید انجام آن است لیکن گاهی بصارت  
چشم محفوظ میماند اگر رفع کردن سبب ممکن باشد اما اکثر آن چشم خراب بصارت باطل میشود احلاج چنانکه در ورم قوی کس  
میسر چشم علاج نوشته شده موافق آن انجام هم عمل رز که لیکن هرگاه چشم تمدد زیاد باشد از زیاد شدن رطوبت بیضیه جابجیه  
دانسته میشود و پیش از آن بدن قریب از جای خود و در این وقت از داخل کردن سوزن قریب از خارج رطوبت بیضیه چشم نفع کشیده حاصل میشود  
و این عمل اربع مرتبه در چهار ساعت یا بعد از هشت ساعت بقای مرض قوت از ویاد با احتمال درده باشد سیر که رطوبت  
بیضیه چشم در اسرع مدت یاده پیدا میشود و نور اندک طلایه درین فصول درین مرض بسیار مفید است برای تقویت مرض که  
درین مرض ضعف یاده میباشد شوربای لحم بالضرر نوشانید باشد همراه اغذیه ماکوله قند اکثر فصل پانزدهم در حول  
و آنرا بافت گریکائی پوپیا یعنی و چندیدن از چشم نامند این مرض گاهی فطری بود و آن را علاج است اما آنچه بعد از آن  
طفلی پیدا میشود بسبب نظر کردن بیک طرف از آن و از تدبیرش نیست که بجانب مخالف نظر کنند آنچه بچوانان پیران عارض میشود  
پس آنهم بر دو قسم است یکی آنکه هر دو چشم جدا جدا مری و واحد را در و صحت بیضیه آن سبب خلل کشش عضلات هر دو چشم پیدا میشود  
چنانچه اختلاف حرکت عضلات چشم علیل شرف کج میگردد و از آن صحت بیضیه ناغشای نوری هر دو چشم در جای و آنکه مقابل گیر  
باشد زیرا پس این اختلاف محل انطباع که غیر مقابل باشد و صحت بیضیه آن سبب قریب آن همانست که مذکور شد بسبب  
آن چشم عضلات هر دو چشم بیضیه مستقر می شدن عضله حرکت که چشم قوی صحیح مانند عضله چشم که صحیح میباشد پس عضله چشم صحیح  
بسیوی خود یک عضله مستقری از شرف خای خود چشم مرض نمیکشد اما انطباع صحت هر دو چشم در مقامات غیر مقابل باشد که بشود و آن  
در محل انطباع صحت جدا جدا پیدا میشود و علامات علامتش نیست چون هر دو چشم اکثرا صحت بیضیه و صحت بیضیه و صحت بیضیه و صحت بیضیه  
اگر یک چشم را بگرداند از چشم دیگر بیضیه یک صورت پیدا میشود قسم دوم آنکه از یک چشم صورت مری واحد و تا دیدن سبب  
سبب نیست که چون در اجزای عین که توسط آنها صورت مری تا محل انطباع میرسد تغییر واقع میشود و این حالت پیدا میگردد  
و این خبری عین چهار اند طبقه قریب رطوبت بیضیه رطوبت جلیده رطوبت زجاجیه که از وقوع تغییر در اجرام اینها حول در یک  
چشم پیدا میشود و مثل آنکه هرگاه بعضی از اجزای آنها غلیظ و تورم میشوند و بعضی بر مقدار طبیعی خود مانند درین صورت چون  
سطوح مختلفه پیدا میشوند اما جای که سطح آن مستوی و بر مقدار طبیعی است از آنجا خطوط شعاعی منفرجه از مری جدا شده  
بطول استقامت و غشای نوری میرسد جای که در سطح آن از تورم و غلظت شدت یا کمب پیدا شد از آنجا این خطوط سیر به استقامت  
خود باقی نمیمانند بلکه بسبب مرور خود بر سطح مدور یا کمب کج و منحنی گشته تا محل انطباع که غیر مقابل یا محل رسیدن خطوط  
مستقیمه است میرسد پس هرگاه محل رسیدن خطوط شعاعیه مستقیمه منفرجه از مری محل رسیدن خطوط شعاعیه غیر منفرجه مستقیمه منفرجه  
و در چندین مورد و صورت از یک چشم دو جا پیدا میشود چنانکه هرگاه قدری چشم پیش نیوی آید پس و قریب از آنجا جدا شود و دو صورت

فصل پانزدهم در حول

حول آنچه بخواند چنان عارض میشود بر دو قسم است

و این














ضمیمہ متعلقہ صفحہ ۱۱۳ بیان دوم از فصل سبت و چہارم امراض عین و رہای پرت روپا  
نقشہ رتصا ویرہیات خمسہ و ہشتم



از بعد شست یا ذره پنجم خوانده شوند از برای نهادن بر چشم خود اختیار کند و چون که صاحب این حالت اکثر سنگگون کرده اشیا را می بیند از آن  
 در سر اجتماع خون پیدا شده امراض حادث میشوند پس از آنکه سنگگون کردن بعضی است که تعلیم سازند که وقت فراغت که است سر را  
 پس پشت کرده بر کمر بایستد گداشته مری مکتوب اقرب چشم آورده به بنید و هرگاه سوار شود پس وقت حرکت که در کج چرخ می گذارند  
 نه بیند و نه خواند که از آن ضرر نیاید شود و هرگاه از مطالعه حروف در چشم عیال پذیرد فوراً مطالعه کتابت ترک کند تا رفع شدن آنکه چشم باز  
 مطالعه کند و بجز روشنی روز در روئیدهای دیگر که وقت شب که در پیشوند مثل شمع یا کبریا کتابت را نه خواند و اگر ضرورت مطالعه حروف و قضا  
 دانی شود از آنکه غلبه یابی با سبب شست درست کرده بر فالوس غلاف حاجی که بر بلع میماند از آنکه مطالعه حروف نماید و اگر از مطالعه حروف  
 ازیت در چشم پیدا شده باشد یک پسر چشم زیاده رساند تا از آن قوت در چشم بپوشد و هرگاه همراه با پیا انیت چشم و علامات مرض آنهم ظاهر شود  
 هیچ کار از چشم نگیرد و آنچه در غلاف و غشای سیاه رنگ چشم یا در غشای نوری نوشته شده آنرا بجلان زد فستق که بیان سوم در سبب  
 پرمش روپیا و آن ضاؤل است چه بای پیمیزی چیزی است که از خود زیاده در دردد و مراد از حد چشم غشای نوری است که انجا انطباق  
 صورتی شود از ملاقی شدن خطوط نوری که از مری منفصل شده و از ملاقی آنها بدین نحو طری پیدا میشود و از آن صورت مری تطبیع میگردد و صورت روپیا  
 مرکب از نقطه سبز که پیا نش است و از لفظ او پیا که معنی چشم است مراد از آن نوری زیادتی از خطوطی چشم مخروطی نوری است که از خطوط منفصله  
 مرکب میباشد و خطوط در چشم داخل شده غشای نوری رسیده و از ملاقی خطوط مذکور بهیئت مخروطی در آن بپیکرند و از آن انطباق صورت میشود  
 پس که چشم بر بیست طبعی خود که بری چشم معین مقرر است باشد درین وقت خطی که از خطوط نوری در وسط چشم داخل شده بر مرکز آن گذشته تا فستق  
 نوری که حد چشم و محل انطباق است رسیده با خطوط دیگر ملاقی و متصل میشود و از این اتصال ملاقی بهیئت مخروطی پیدا شده انطباق صورت  
 میگردد و در حد اعتدال که لایق هر چشم است میباشد و هرگاه چشم از بیست طبعی نخبه باشد پس اگر بی آن زیاده بود که سبب آن خط نوری که بطول  
 محاذ خارج چشم در آن میرساند زیادتی عن چشم قصیر گشته تا غشای نوری علی مایع می رسد و از آن انطباق صورت مری بعید گردد و پیا  
 پیدا میشود و اگر غشای چشم کم باشد در جانب مری بسیار چشم را اگر در و از آن قطر مری قصیر شود و بسبب قصور خطوط تا غشای نوری رسیده  
 ملاقی و باهم نشوند بلکه از آنهم تجاوز گشته و از غشای نوری فاصله باهم نشوند ملاقی گردند و از پیا نشین بیست مخروطی بر غیر محل غشای نوری انطباق  
 صورت و غشای نوری نشود درین وقت این من مودم به بای پیمیزی در بیست پیا نشین و درین وقت چون کلفت و وقت در پیمیزیات  
 بعید و قریب پیدا گردد و در وقت دیدن اشیا احتیاج بسوی تقصیر عین مجتمع خاتم جلید زیاده دانی میشود زیرا که از اتصال جلید به عین  
 در آن سبب است پیا میگردد درین وقت خطوط طویل که از خارج در چشمی آید بسبب دور آنها بر اطراف مستطیل جلید به قصیر گشته در محل غشای  
 نوری ملاقی باهم نشوند و بیست مخروطی پیدا شده صورت مری منطبع میگردد و درین وقت دیدن شی بعید کلفت و حرکت در چشم کم میشود  
 و در دیدن شی قریب زیاده میگردد و چشم محتاج حرکت انقباضی زیاده میشود السبب اصل سبب در آن فساد بهیئت چشم بود و  
 اسباب آن متعدد اند که از آن تغییر شدن چشم از بیست طبعی است بحسب خلقت و فطرت مثل آنکه چشم صغیر پیدا شده و خصوصاً  
 قطر عمیق آن قصیر باشد دیگر آنکه چشم از روی خلقت طبعی منجس بود لیکن آنکه سبب مرضی جلید یا از عیال خود در چشم بر آورده شود و از

چشم در امراض متعلقه بین بیان اول الفصل سیم در مایوسا ۱۱۳  
 جامع شفا فی ۱۶۵۸ کتاب مشرق  
 در سبب پیا نشین و در وقت دیدن اشیا احتیاج بسوی تقصیر عین مجتمع خاتم جلید زیاده دانی میشود زیرا که از اتصال جلید به عین در آن سبب است پیا میگردد درین وقت خطوط طویل که از خارج در چشمی آید بسبب دور آنها بر اطراف مستطیل جلید به قصیر گشته در محل غشای نوری ملاقی باهم نشوند و بیست مخروطی پیدا شده صورت مری منطبع میگردد و درین وقت دیدن شی بعید کلفت و حرکت در چشم کم میشود و در دیدن شی قریب زیاده میگردد و چشم محتاج حرکت انقباضی زیاده میشود السبب اصل سبب در آن فساد بهیئت چشم بود و اسباب آن متعدد اند که از آن تغییر شدن چشم از بیست طبعی است بحسب خلقت و فطرت مثل آنکه چشم صغیر پیدا شده و خصوصاً قطر عمیق آن قصیر باشد دیگر آنکه چشم از روی خلقت طبعی منجس بود لیکن آنکه سبب مرضی جلید یا از عیال خود در چشم بر آورده شود و از



بدون آن که نفس جامع خطوط است خطوط نوری که از آن چشم محرومی پیدا میشود از عدم جامع و محل غشای نوری که جدا از چشم است ملاقی و متصل نمیشوند بلکه از آن دور تر رفته ملاقی شوند و از آن در غشای نوری الطباع صورت گیرد و سوم آنکه استدارت قریه مقفود گردد و یا طریقت برضیه باز جاییه فقی گردد و استدارت آنها را ازل شود یا در استدارت جلیدیه تغییر پیدا کرد یا عضلاتیکه جلیدیه را از حرکت انقباضی خود با مستدیر بسیار از حرکت یک ضعیف و قاصر شوند و اکثر همین اسباب مولد این مرض میشوند زیرا که قریه در طریقت انقباض از حیث آنکه بیشتر مبین شده و از تغییر فساد آنها در بصارت فرق پیدا میشود و وقت جمع کردن خطوط نوری در غشای نوری مقفود میگردد و از آن الطباع صورت نمی شود و علامات غشی قریب را بکمال دور و وقت و به تقبض عین و از چشم قریب کرده ای بپیدا می شود و از آن فائده استدارت جلیدیه که سبب اجتماع خطوط در غشای نوری است حاصل میشود و چون که در جات این مرض سبب کمی و زیادتی متعدد اند لهذا ما دام که مرض قلیل است صاحب آن کار و پلانی از چشم میگیرد و اگر بکلفت و اذیت و از زیاده کار گرفتن از چشم دوم در غشای سیاه در غشای نوری میگشاید بصارت ضعیف میگردد و علامات از هر عینیک که دیدن اشیاء نذر لیه آن سهل شود چشم گذارد و نذر لیه آن کار از چشم گیرند و بدون عینیک که با هم چیز را نذر لیه زور و قوت نه بینند و اگر از زیاده مشقت چشم بگذرد عینیک که ارم اذیت و مرض در چشم پیدا شود چشم را آرام رسانند و آنچه برای رفع کردن از چشم تند بگردانند و پیاپی نوشته شده آنرا با احوال آنرا بقتل آن بیان سوم در پریس بی اوپا پنجم بای موده فارسی و رای مملو و سکون بین جمله و کسری موه فارسی و سکون یای تختانی و ضم الف و سکون و او و کسری بای موده فارسی و فتح یای تختانی و سکون الف مرکب است از لفظ پریس است که بعضی ویریه و پنجم است و اوپا که معنی چشم است و مولا و از آن حالتی است که در چشم بپایافته میشود و آن نیست که می بیند یا بخوبی بیند و می قریب به دور و نوری بیند زیرا که خطوط نورانی منفرجه علی لمی البصیر به استقامت خود با غشای نوری می رسند ازین جهت در دیدن آن حاجت بسوی حرکت جلیدیه ای نمیشود و خطوط مذکوره از هر می قریب راست کش بر هر دو صورت و چشم داخل میشوند لهذا بدون مجتمع شدن جلیدیه آنها در غشای نوری جمع نمیشوند ازین جهت پریس بی اوپا قریب حاجت بسوی حرکت چشم زیاد و دانی میشود و اگر چنین حالت در های پرست روپایا هم یافته میشود لیکن آنجا وجود این حالت بسبب تشنگی چشم حادث میشود و اینجا در سبب چشم که ارم فساد و تبخیر یکجای نفس یعنی طوبت جلیدیه سختی پیدا میشود که بسبب آن عضلات حرکت آن قاصر از حرکت میباشند و ازین جهت استدارت در جلیدیه پیاپی شود پس از عدم استدارت خود خطوط نورانیته را در غشای نوری جمع نمینماید و چنانکه در عدم جوانی میگوید لهذا این حالت بعد هر چهل و پنج سال از عمر بخوبی ظاهر میشود اگر چه ابتای آن از بعد گذشتن ده سال از عمر هرگاه میگوید و این پنج که از سن یازده سالگی حروف را که از قریه بفاصله هشت آنچه بصیرت یافته بخوبی می بیند و بعد در سن ده و از ده سالگی هرگاه قدری از هشت آنچه هم زیاده بعید میشود بخوبی بیند و اگر از آن کم دور باشد بوقت دیده میشود همچنین سال بسال این حالت

سلام  
والله اعلم  
بما یخفی  
نفس  
در قول  
بگو  
از این  
نشده  
نه  
سلام  
نه

بیان سوم در پریس بی اویا

بیان چشم دوم و ششم و اول

زیاده میشود تا اینکه عمر انسان بکلی منقضی شود آن زمان محتاج باحالت عینک میشود و چون آن در ویدن مرئیات  
وقت واقع میگردد العیال را هرگاه در ویدن مبصرات وقت واقع شود عینک را که در آن سبب چشم هاست و همیشه بای آن  
محبوب بودند و آنرا کان و کسب لنس گویند چشم که داشته کار چشم که در ویدن عینک را عینت این امر است و در دست  
که آنرا بخوبی چشم نمند که با عینت آن آشنایی فریب را بیند و آشنایی بعینه را قدری سزگون کرده بلا عینت و در دست  
عینک دیده باشند بیان چهارم در آستگ مست از هم جدا و فتح العین و سکون عین و کسرتای ثناته قوتی است  
و سکون کان فارسی و فتح عین و سکون تائی ثناته قوتی کسرتای عین و سکون عین است از یک مری عینت دیده شود  
بسبب اینکه در کان لنس بای اربعه که قرینه و رطوبت میخیزد و رطوبت جلیده و رطوبت زرد با پیچید اند بار مستعد و از این جهت  
پیدا شود یعنی اجزای آنها پست و بلند شوند و بسبب آن خطوط نورانی بر نسبت واحد از مری منفصل شده و غشای نوری زرد  
یا کبک بعضی قصیر و بعضی طویل شده و بعضی بر جدا اعتدال خود مانده در چشم داخل میشوند پس چنانکه در اجزای آن از انحراف بود و آنجا  
خطوط نورانی قوی کشیده چشم رفته مایه پیدا شود است که در چنانکه در اجزای آن عین و از خطا من است خطوط نورانی از آنجا  
طویل شده و چشم داخل گشته بای پرست رو پیا پیدا میکند و بر آنکه اجزای آن بر خطا من است باشد از آنجا خطوط نورانی کشیده  
باید بر جدا اعتدال لایق در چشم داخل شده و غشای نوری مایه می شوند و از آن لایق خارج و صورت مری میشود پس از انحراف این لایق  
و خلط شدن آنها صورت مری نامان و بر نسبت غیر طبیعی دیده می شود السبب سبب قریب بان است که مذکور شد اما آن  
گاهی خلقی بود و درین وقت در چشم کیسان میباشند و گاهی مرضی باشد که از امراض لنس بای اربعه مثل چشم و در مری قریب  
و غیر پیدا میشود چنانچه از امراض این جنس جدا اجزای آنها متغیر میشوند آن که در چشم جدا یافته میشود و چشم این جنس اکثر همراه مایه پیا و گاهی پیا پیا  
یافته میشود با جمله هرگاه در چشم بود اکثر خلقی بود و هرگاه غشوی چشم واحد بود در مری لنس یا چشم و هرگاه از سبب خلقی پیا پیا اکثر  
از امراض قریب حادث میشود العیال است هرگاه مری که مثل حروف باشد قریب چشم آورده بعضی نیند گاهی بر دور حروف  
مذکوره حلقه یافته میشود و گاهی شکل بر غیر مثل حقیقی و کج معلوم میگردد مثل اینکه خط مستقیم منحنی دیده میشود و گاهی حروف هم  
و متصل معلوم میشوند العیال عینک که شیشه بای آن دراز و از جانب داخل مقعر و از جانب خارج محدب در ویدن که از آنجا  
اگر نری ساند ری کل لنس میگویند چشم گذاشته کار چشم که در فتنه که فصل است و چشم در آستن او پیا  
بدر و فتح الف و سکون عین و کسرتای ثناته قوتی و سکون تائی ثناته قوتی و کسرتای چشم که از آن بصارت هم ضعیف  
گردد و مراد از ضعف چشم و بصارت اینها نیست که عضلات چشم ضعیف شوند و بسبب آن در بصارت ضعف پیدا گردد فقط و الا  
ضعف بصارت و اکثر امراض چشم یافته میشود و آن بر دو قسم است قسم اول آنکه در عضلات خارج چشم که در جانب لنس چشم است  
و چشم را بسوی عینی میکشد ضعف پیدا شود و چشم دوم آنکه در عضلات اندرون چشم بطبعت جلیه بر این مقصود کرده مستعد پیا پیا  
ضعیف شوند از آن قسم اول پس سبب قریب آن مذکور شد یعنی ضعف عضلات جانب لنس چشم و سبب بعد از آن پیا پیا

بیان چشم دوم و ششم و اول

که اکثر همراه آن این حالت یافته میشود و العلامات هرگاه این مرض بسبب ضعف عضلات جانب انسی پیدا شود و همراه آن  
 مایو پیا باشد درین وقت شش بعید را بخوبی می بیند اما شش قریب را پس اگر قدری دور باشد هم می بیند لیکن هرگاه زیاده از بیستم  
 قریب سازند و برای دیدن آن چنان بسوی بینی نائل شوند و از ضعیف شدن عضله جانب انسی چشم مرضی باین سویا بد بلکه  
 عضله قابضه جانب وحشی بسبب قوت خود و ضعف عضله جانب انسی چشم مذکور را بسوی خود کشد و درین وقت یک چشم صمیم  
 بسوی انسی و یک چشم مرضی بجانب وحشی رود ازین سبب مری واحد دو تادیده می شود مثل احوال و اگر مری از قسم چشم  
 باشد درین وقت حروف متحرک و بر غیر بیست اصلی خود دیده می شوند و اگر زیاده از بیستم بذریعہ زور و قوت کار گیرند و چشم درو  
 پیدی شود و چون دیدن حروف را که کرده چشم را آرام دارند بعد مدت قلیل باز چشم لائق گرفتار کاری شود و هرگاه با این من  
 مایو پیا هم باشد درین وقت دیدن حروف و اشیای صغیره بسیار دشوار می باشد و از دیدن آن در چشم ادیت پیدا می شود  
 و اما قسم دوم که از ضعف عضلات جلیده پیدا می شود سبب قریب آن این است و سبب بعید آن اکثر بای پرست و بیلا  
 میباشد که بسبب آن عضلات رطوبت جلیده را حاجت بسوی تحریک جلیده زیاده می افتد و از کثرت کار این عضلات  
 مانده و ضعیف شده از کار خود باز میمانند و این حالت در پرس پی او پیا هم یافته می شود و ایضا گاهی در انیمیا یعنی  
 وقت دم و در ضعف بدن هم این حالت پیدا می شود و العلامات صاحب این حالت اکثر مری قریب و بعید را می بیند  
 لیکن در دیدن مبصر قریب هرگاه آن از قسم حریف باشد البته دشواری پیدا می شود مثل اینکه از زیاده غور کردن و مطالعه  
 نمودن بقوت چشم پیش چنان سیاهی معلوم میگردد و شکل حروف دیده نمی شود و اگر زیاده زور کرده بعد از آن چشم درو  
 پیدا می شود و اگر از آنهم زیاده بقوت بیند این درو چشم تا صد غمیرسد و ایضا درین حالت چشم بسوی جانب وحشی می پرتد  
 و شش واحد بسبب آن دو تادیده می شود لیکن بعد زیاده کار گرفتن از چشم بسبب ضعف عضلات مذکوره است و از جلیده  
 کم میگردد و بسبب آن حروف با هم یا بر غیر بیست حقیقی خود محسوس میشوند و هرگاه شش بعید را بیند در دیدن آن که ارم و  
 ادیت پیدا نمی شود و العلاج در قسم اول هرگاه بسبب مایو پیا باشد آنچه در علاج مایو پیا برای نهادن عینک خاص است  
 و این آن عمل آرد و اگر از اصل پید شدن ضعف در عضلات چشم بود علاج تقویت نماید مثل اینکه اسکرکینیا و حدیدیک  
 و غیره ادویه مقویه نوشاند و آن یک سر یک جامع ادویه ثلاثه مذکوره است درین وقت نوشانیدنش بهتر است و اغذیه  
 جیره مقویه بخوراند و چشم را از دیدن شش قریب باز دارند و اگر ازین هم نفع ظاهر نشود پس عضله جانب وحشی را چشم  
 کرده و شش و آن از قطع کردن حاصل میشود لیکن مطلقا آنرا قطع نکنند بلکه چند ان قطع کرده و منته که قوت آن با قوت عضله جلی  
 انسی که ضعیف شده مساوی ماند و در قسم ثانی آنچه در علاج بای پرست رو پیا برای عینک خاص مذات شده موافقات  
 عینک چشم نهاده کار دیدنی از چشم گیرند و اگر مایو پیا پیدا شده باشد آنچه عینک برای مایو پیا تجویز شده از بیستم نهند  
 و اگر از انیمیا یا از ضعف شدن بدن این حالت پیدا شده باشد ادویه مقویه بدن و دم مثل اسکرکینیا و حدید و بارک و غیره

حسب مناسب بنوشانند و اخذیه جبهه خوراندند فتن کمره باب سوم و در امراض آریت یعنی خانه  
 متعلقه چشم و آریت بفتح و مد الف و سکون رای مملکه و کسر ای موحده و سکون تاي هندی بمعنی راه و مدار است که بر آن  
 کوکب مثل قمر و غیره حرکت میکنند و چون که مقوله چشم هم در خانه خود که آنرا بلغت عرب محجر گویند متحرک میباشد لهذا در لغت انگریزی  
 آنرا آریت مینامند و مراد از آن اجزای هستند که از مقوله چشم خارج باشند و بطور خانه چشم اندوین باب هم چند فصل از مقوله  
 اول در تشريح خانه چشم پس بدانکه خانه چشم مرکب است از عظام که در هر خانه هفت عظام یافته میشوند و مجموع آن  
 در هر دو خانه یازده عظم اند و چونکه سه استخوان در هر دو خانه مشترک اند لهذا از یازده عظم در هر دو خانه هفت یافت میشوند  
 و حاجت به چهارده عدد بودن آن نیست و عظام مشترک عظم پیشانی و عظم منشاشی و عظم موسوم عظم خفاش است و درین خانه  
 سوای مقوله چشم شش عضلات که محرک مقوله اند و یک عضله کبیره که جنین بطوریکه را بر می دارد هستند و چند اعصاب هم از دماغ  
 در آن آمده اند اول عصب نوری دوم عصب بصری و ج ثالث سوم عصب و ج رابع چهارم یک شاخ از عصب و ج خامس هم از  
 آمده پنجم عصب و ج سادس با عصب و ج ثالث پس آن جمیع عضلات عین را حرکت میدهد سوای عضله که از آن در چشم حرکت  
 دوری پیدا می شود چه محرک آن عصب و ج رابع است و همچنین عضله محرک چشم بجان چشمی که آن از مقوله خارج است از حرکت  
 عصب و ج سادس متحرک میشود و شاخ عصب و ج خامس جمیع اجزای چشم که درین خانه اند از فاده حس نماید و بعضی ریشه های شاخ  
 نمکوره از اجزای خارجیه چشم چون آمده بسوی پیشانی و هم بر مینی آمده اند و از آن پس بین مقامات می آید و اینجا در خانه چشم  
 چشم زیاده است که بالای عضلات چشم و در میان آنها در اجزای عین در خلقت مقوله چشم می آید که بسبب آن غشای نخی پیدا شده  
 بر مقوله چشم آمده که در آن مقوله سهولت حرکت میکند و آن برای چشم بطور وقایه است و اینجا از زیاده ماندن آن پس مقوله چشم را  
 عضلات بسوی خلعت زیاده می رود و آن در بعضی یاده در بعضی کم هم میباشد و بقدرت یاد می آید که چشم کبیر و بر آمده و ضعیف و فرو رفته معلوم  
 میشود و هم در سن سیری و وقت لاغری بدن چون چشم کم میگردد و اندوین و قات علقه بر دور چشم محسوس میشود و چشم کوچک فرو رفته  
 و بر شود اینجا درین خانه نموده مولد و در هر شکل با دام میباشد و مرکب از غده های کثیره و مجاری صغیر صغیر که قریب به بیست و شش باشد و اینجا  
 مقوله چشم و استخوان کاسه چشم قریب موق خوشی یافته میشود و بزرگ این مجاری مذکوره آبی را که پیدا میکند در چشم اندازد و این آب  
 به هم موسوم میگردد و درین هر خانه کثیره یان یکور بد کبیر است که از شاخ های کثیره تر است که او را ضعیف مینامند و درین جمله اعضا درین  
 خانه بزرگه کثیره غشای خانه دار که در وسط و گرد و پیش جمله اعضای مذکوره آمده با هم ملحق و موله اند و کثیره غشای ریشه دار که در کاسه چشم  
 بر استخوانهای کاسه چشم است چون از آن تجاوز گردد و در شاخ شده یک شاخ را بطی آن بر استخوان پیشانی پیرو و در کثیره شاخ را بطی آن در چشم  
 آمده و جن میگردد و در آن غضروف پیدا میشود و جن هم مرکب است از اجزای چند آنچه بالا می آید و در آن خارج لاتی با پوست جلد بزرگ است و در  
 آن عضلات ضعیف صغیره اند که از حرکت آنها جن نیز میشود و با هم میگردد و در این عضلات ضعیف و ضعیف مقوله فاتحه جن است که در  
 نسبت و با غضروف جن متصل بود و آن جن غشای علی میباشد و از کثیره آن جن نفع میگردد و در آن غضروف است و در آن کثیره

باب سوم در امراض آریت یعنی خانه چشم







یافته میشود و در آن غشای بیضی که همیشه قدری آب پیدا می کند گاهی از رسیدن سردی و غیره ورم پیدا می شود و بسبب این ورم  
 در آن آب کثیر پیدا شده بسبب آنکه در طرف جریان اندوم و آنجا متجمع می ماند و استخوان مذکور از آن منفرجه می شود و از زیادتی انقباض می شود  
 و غشای چشم را که شش از آن فرغ می سازد پس بسبب غنطه آن غشای چشم می کشد و چون غشای چشم را از آن غشای چشم جدا می کنند و در آن غشای چشم را از آن غشای چشم جدا می کنند  
 را در محل فیصله بین شش کرده بعد پرورج آن اخل کرده راه از گوی مذکور تا آخر خلف جاری و صاف کرده و در آن آب جمع از جری طبیعی خود  
 جاری گردد و از زوال مزاج است چون طریقی که در چهارم آنکه سبب جگر و در خانه چشم بود و آن گاهی خلقی می باشد و آن را علاج است و ذکرش غیر مقصود  
 و گاهی بطور مرض پیدا می شود و آن چند قسم است یکی آنکه چشم در خانه چشم پیدا شده و ظاهر از جایش منقطع و قطع کند و از آن جوی خطا همین پیدا شود  
 و علامتش شکل است اما هرگاه بینید جگر زیاد و در آن خوف ذهاب بصارت است درین وقت بالای جگر را علی جانیکه حلقه خالی می شود  
 در نیم طول چندین پیرسانند که از آن غشای خانه دار خانه چشم هم شش که در جگر بین وقت غشای چشم از نیم پیران خواهد آمد و آن یک شش مذکور است که از  
 خانه چشم بیرون که از بعد از نیم مذکور را بجهت کرده و در وقت به سازند دوم آنکه در خانه چشم سلع پیدا شود و اقسام سلع کثیر اند که در بحث سلع مذکور  
 خواهند شد و از آن هم جوی خطا پیدا می شود و درین وقت هم هرگاه خوف نقصان بصارت از زیادتی جوی خطا پیدا شود سلع مذکور را از خانه چشم  
 بیرون کنند و یک یکی اگر سلع از نیم طول بود و در اینجا انتظار نقصان بصارت نکند بلکه فوراً سلع مذکور و متعلق چشم هر دو را از خانه چشم بیرون  
 آرند تا فساد آن دیگر اعضا را به مودی به بالکت نکند و در چشم که از کبر شدن استخوان خانه چشم و از تشکک هم جوی خطا پیدا می شود و در اینجا علامتش  
 علاج آن تشکک است قسم چهارم آنکه آنچه سبب است در آن در جگر غشای خانه دار خانه چشم پیدا شود و در آن جوی خطا پیدا می شود و در آن جوی خطا پیدا می شود  
 و علاج آن همان است که در فصل سابق مذکور شد و چشم که در آن کس از افتاد که کثیر که مرض عروق است و در امراض خلق و در آن شش مذکور  
 هم سبب جوی خطا پیدا می شود و علامت خاصه آن و علامتش در فیل مرض مذکور شده خوانند شده وقت ضرورت بآن جرح کرده علاج  
 نماید و گفت که فصل چهارم در نقصان جگر و عروق آن متعدد و یکی از آن که نوزاد است و آن درشت گریک بنی پیدا  
 شدن سیاهی است بالای جنین و سبب آن بختن خون است که در عروق بسبب رسیدن صدمه ضرب بر چشم و حوالی آن می باشد  
 و علامات اول بعد رسیدن صدمه ضرب یا سقوط سیاهی در جنین جلوت می شود و همراه آن گاهی مضمغم و گاهی زیاد می باشد  
 بعد از بختن خون غشای خانه دار از عروق و اکثر بعد از شش ساعت از رسیدن ضرب این رنگ بالای جنین پیدا می شود و گاهی فوراً  
 بعد رسیدن صدمه ضرب پیدا می شود اگر ضرب بسیار قوی بود و آنجا منتهی است که اکثر در دو سه هفته آن حالت ازل همیشه دو قبل زوال اول  
 بعد سیاهی جلوت رنگ می شود و در آن استهسته است و در آن هم دفع می شود و گاهی آن را هم جاری پیدا می شود و علامت مقصود از علاج ازل  
 و در چیز اندکی اگر بعد رسیدن خون از عروق که خارج شود دوم آنچه از آن برآمده باز در عروق متخلف گردد و از اول بعد رسیدن  
 ضرب که در شش بار و در فصل چشم نهند و آویز از چشم برفت پس از آنکه شش کوفه بکشد و در چشم که از آن با پاچه در آب که از آن جوی خطا  
 کرده باشند که در چشم منتهی باشد یا به ساده است و یا به چشم که از آن متخلف شدن سکه سرفی چشم پیدا شود یا در کوفه که در  
 پاچه که در چشم منتهی است که در کوفه که در چشم منتهی است و در آن هم دفع می شود و گاهی آن را هم دفع می شود و گاهی آن را هم دفع می شود

فصل چهارم در نقصان جنین

و در آن







قریب و منتهی صحت نماند حاصل میشود اما قسم دوم که بر روزش اکثر است در آن الجفن قریب کشته و کلاه یک یا بیشتر خورده که سخت باشد پدید می آید و آن تنگی  
که میگردد و تا که بقدر که نشود و بعد در آن حکم و عارض پدید می آید جانشین شش نیمه مادامی که بعد از نیمه نکو و شکر است بر آید و بعد  
در آن شکر شش مقدار نیم زیاد میگردد و همچنین بار بار بر آن شکر شش پدید می آید و ساقط شده نیمه که میگردد و تا اینکه جسم تمام جفن منطبق  
میشود و از تنگی تیرید علاج میگیرد و شش است زیاد شده جفن خسار می خورد و گاهی الجشم پیشانی هم پیدا و گاهی این نیمه نشان گیریت  
دندان و شش می آید می باشد اما قسم ثالث که آنست که یک یا دو نیمه پس از نیمه شش از رویش السیر می باشد حتی که گاهی نفوذ می نماید و شش  
در آنجا که یک فرقی نیست که قسم ثالث اکثر از قریب آن که بر جای یک یا دو نیمه جفن با جلد جفن آتی شده و شش و یک دو نیمه هر دو این قسم غده  
لنفی که در آن جگر در آن متورم میشود بخلاف رونت اکثر آن در جلد پدید می آید و همراه آن این غده با متورم نمیشود و تا حال این جگر می  
دور تر آید و نفوذ می نماید و در یک جگر که در آن نفوذ می نماید و در رونت اکثر از نیمه دندان و شش بر کمانه نیمه موجود و بزرگ  
اچسبیدگی که غده غشی و سیاهی رنگ بر نیمه که در آن ای نیمه با جلد جفن در ارتفاع و انخفاض می باشد و در نیمه نقاط شش  
در جلد ای متفرق محسوس میشود که آن جلد می باشد که در آن عروق متورم و انقباض و رونت اکثر از نیمه جلد جفن می باشد بخلاف نیمه  
سطحی العلج و در قسم نیمه ای قسم ثانی و ثالث از حوالی نیمه جلد جلد صحت قطع کرده و تا جایی که جلد صحت باشد از کار می  
جمله عمل منقطع و جلد و نیمه ای که در آن متورم و شش و در هر دو غده که در آن کار ممکن شود و تا میزد که این هر دو قسمی قابل اندکی  
از جفن که در شش تا خسار یا تا پیشانی رسیده باشد درین قسمت هم همین تأثیر پیدا کند و اگر درین قطع که نام شش آن کثیر قطع شود و آن از شش  
و اگر بعد قطع کردن لحم و جفن ثابت شود که چیزی از مرض در بعضی مقام باقی مانده بر آن از آهن گرم دغ نهند یا کلاه ایستاد آن رنگ که دای  
اکال است بر آن نهند تا گوشت فاسد را بخورد و بعد آن بچند سیرای بر کردن جراحات در علاج عام الشش نوشته خواهد شد از آنکه عمل کنند  
آنچه نقصان از قطع کردن جفن پدید می آید اگر در حین زیاد قوی و عظیم نباشد خود را میگوید از یک جفن بقطع اگر زیاد قطع نکرده باشد باز در کشته  
چشم را بشوید اما اگر مرض عظیم بود و چندان جفن قطع کرده شود که بعد از آن باید درازش آن بعد بپوشان چشم مفقود باشد و درین وقت باید که با قطع کردن  
جفن چشم از خانه آن بیرون نرود و الا بدون جفن از کشته ماندن چشم نقصان عظیم خواهد رسید از آن که اکثر در عبارت هم از آن باشد  
و باز احتیاج بسوی بر آوردن چشم دای خواهد شد و درین تعمیر نقصان آن نیز و البته باید بار باری نجات حاصل میشود تا که فصل مفصل  
در سلع الجفن در ابلفیت انگیزی جوهر آن آبی که گویند در ریختن سلع مثل که اعضا پدید می شود و آنهم بر دو قسم است اول که الجفن  
موسوم است به کلارین و در لغت عربی نام کرده میشود و بزرگ و آن شبیه به بزرگ می باشد و دوم آنکه از ابلفیت انگیزی پیش چشم که سلع شش می گویند  
و در کتاب طبریه عربی هم شراق نام کرده میشود اما قسم اول که بزرگ است پس از غده ای که در آن کلاه که در آن غده باز بر یکون که بر جفن بالای غده  
می باشد پدید می آید و این نحو که چون این کلاه غده ازین غده های مذکور پدید می آید و بسبب آن جریان طوبیت و دهنیه از آن مسدود گشته و  
طوبیت که در آن بوده خنثی شده و دهنیت خض در آن باقی می ماند و تا زمانه می شود تا آنکه اکثر شش را که در شش پدید می آید و گاهی  
جفن منقطع می آید و شش که اکثر از جفن علی زیاد می شود و گاهی در یک جفن یک غده گاهی متورم می شود که پدید می آید و فرق میان بزرگ و

فصل نهم در علاج الجفن

مشهور است که شیء همیشه برکنار بعضی ظاهر میشود و بره نیز کناره چنین پیدا میگردد و خواه در جانب داخل چنین یا در جانب خارج لیکن اگر در جانب  
خارج هم شود وقت از یاد خود میل بسوی داخل مسکند و این سلسله بعد از یاد خود مایل شود در مثل یک سو مان براتی میماند و در آن حرکت تارین  
واقع نمیشود لیکن بعد مرورت در آن نوشته شد که بکار بسیار این سلسله در چشم میگذرد و در بیم از آن کمال ذوق خارج شده و عرض میاید چشم بخارج شود که اگر آن  
مرت و از این زمان در اندامی بروز خود این سلسله موسوم بر برده مثل خود در محسوس میشود و اول آنکه گفته اند که کسی که برض کل ازین مبتلا میشود در اینها  
کسانی میباشد که برض بعضی و فساد که در معده مبتلا میباشند و در معده نشان ترشی و در امعای ایشان ریا ح زیاد بود و علاج ملام  
که این سلسله کو چنان سخت مانده علاج نباید کرد و اما هرگاه مثل سکه گیر گشته و در آن میگذرد و سکه میگویند بر جرح کند و بسبب آن در میگویند  
چون وقت پدید شود و رنگ آن مائل بسبای گردد و در وقت جفت شدن سلسله که در آن نشتر بار کین طول سلسله را مشت کرده و سبب پس که بعد از آن  
موا جونی خارج نشود و عرض هم سلسله را شق کنند من بعد بر و پادان داخل کرده و خوب حرکت دهند تا آنچه موا که در آن است بدینجه و پادان خارج گردد  
و چون بعد از این عمل هم چون خون در خطبه سلسله مذکور فوراً داخل میشود و ازین سبب مقدار آن هر قدر که قبل از این عمل بوده اند نیم برهان مقدار دیده  
میشود و ازین سبب نامفومان یکدیگر بجز ازین زمانی که فایده بر این تدبیر مترتب گشت لیکن هرگاه بعد چند روز آهسته آهسته این خون  
منجرب میگردد و زیادتی مقدار آنهم زایل میشود و هرگاه بدینضمی موجود باشد و از آن درین موضع پدید آید و در وقت تصفیه معده و جگر نماید باینکه  
اول بولوی خوراند و سه روز بعد از آن آنچه اندوخته که ترشی معده و ریا ح امعاء دفع کنند بنوشانند و باین دو پیوسته عموماً و خصوصاً مبارک  
و کدوی از کربات آن بنوشانند چنانچه این علاج هم این سلسله یا کم میگردد و یا زایل میشود اما قسمی که آن کیشیش چو بر معنی سلسله میگویند  
که آنرا نشتر ناقص است پس آن خطبه میماند و هر چه که شخم در چنین نمیشد لیکن درین سلسله گاهی نظری پدید میشود و این سلسله و جفت اعلی در و ح  
زیاده و دیده میشود و یکی قریب الف با بالای سوق اگر دوم قریب استخوان ابرو بالای سوزنی صغیر باشد این سلسله بر استخوان بینی یا بر استخوان  
ابرو پدید آید و زیر جلده جفت می آید بر جفت خاص پدید می آید و اصل آن در استخوان های مذکورین باشد و هم این سلسله زیر جلده جفت میماند  
میماند که اگر از سلسله خارج نگردد که جفت میماند و حرکت مسکین و نظام هر زیر جلده محسوس میشود و لیکن اصل آن بسیار خاکی بود و چون خطبه از این  
آهسته آهسته در آن همراه هم موهای خنجر با یک مثل موهای پاک با فایده میشود و اندک گاهی آنرا بخت انگیزی از او بر خطبه یعنی خطبه شفا  
بجمله هم بگویند و علاج او هم که یک اندوهی نباشد از علاج آن قرض تا باینکه هرگاه مقدارش زیاد نموی یا موشوخ نظر گردد و در وقت آنرا از  
بهر خط که بخواهد از خط محسوس جلده جفت آنرا شق کرده بدینجه غمز از خطبه بیرون آرد و بعد از کشتن کساره آنرا گرفته از جایش بیرون خطه  
و اگر چیزی از آن در کشتن باقی خواهد ماند باز خود را که در اندام باطنه در استیصال خطبه آن کرده شود و هرگاه این سلسله قریب بینی باشد  
فصل کردن آن گاهی شریک آنجا میباشند هم قطع مسکین و در آن خون بعد از کثیر خارج میشود و پس از خپین مرطوب رسد فوراً سرنه را بر آن  
نموده و کشته تا آنکه خون بند شود و اگر نه بگردو شریان مذکور را از کلبین گرفته و درای کثیر درای مذکور را کشته تا قطع شود و بسبب آن  
در و بر آن شش پدید آید خون بگردو در وقت کشته فصل ششم در سحر صا و جفت که آنرا بخت انگیزی یا ازین آئی آئی اندک گویند  
آن وقت سستی که از بخت گرگب کوزه و بنیمای سندی و سکون و او و کسری از جمیع اول سکون ثانی یعنی اتفاق پکن قسمی از بخت

فصل ششم در سحر

شان لاک افتاد و آن سگ گویند و لاک رفت نشان بینی تحریک است و چون که درین چشم همیشه کشاده میماند و بنده میگرد و چشم گوشت اندازد  
 باین اسم موسوم کرده شده اما قسم اول آن افتاد و جفن علی بر جفن اسفل است بخوبی برداشتن آن ممکن نباشد پس سبب آن گاهی خواب جفن  
 بود چنانکه در سیه آن دیده میشود و گاهی از رسیدن صدمه ضرب یا زخم جفن عضلات پلاگ بسته میشوند و از آن جفن علی بر جفن اسفل است جرف  
 شده می افتد و گاهی از ضعف عام بدن هم عضلات جفن ضعیف گشته اند این حالت پدید میشود و گاهی باین شیوه طفل بیای شود و سبب  
 فطری بود و گاهی از استرخای شلخ عصب و ج تا آنکه مانی که در جفن آمده هم این حالت پدید میگیرد و سبب این فایده خاص مرض خلص  
 دماغ میباشد مثلاً آنکه بر سبب زوج عصب ثانی که میانی یا ترمی و در مایع پدید شود یا که در مایع و در خانه چشم حادث گشته باشد نشان آنرا که در جفن می آید  
 عمر کن و از آن استرخای این عصب از مسدود شدن و از آمدن قوت محرکه پیدا گردد و گاهی سبب یاده آفتاب گاهی از ماده و صفت حاصل  
 و تقریب هم این شرح پیدا میشود زیرا که از سفاس استخوان عظیم و متحرک است عصب را غیر ممکن و سبب یاده و روماتیسم تقریب عصب و عصب  
 میگرد و راه آمدن قوت محرکه نباشد و فایده درین عصب پیدا میشود و اعلا مات هرگاه در جفن آن کشاده گید از جفن علی علیاً و از جفن  
 اسفل افتد و باز باراده علیل منفع نمیشود و هرگاه از فایده شلخ عصب و ج تا آنکه مانی که در جفن آمده هم این حالت پدید میگیرد و سبب این فایده خاص مرض خلص  
 یاده خانه چشم باشد ضرر استرخای آن اکثر عضلات دیگر چشم هم ظاهر میشود و هرگاه خاف عصب صحت و راه شلخ عصب کور اگر سبب  
 جفن آید و تقریب چشم باشد این استرخای مخصوص جفن میباشد و علل آنچ از خواب و از آن در جفن اگر رانی و سیه باشد جفن  
 مستحی را بطور آن غصون جفن قطع کرده کم کنند و بعد آن بدو دندان زادی آن کم گردد و هرگاه سبب چشم جفن باشد بعد صحت زخم  
 قوت در جفن پدید میشود لیکر بعد مدت دراز پس اگر بعد آن استرخای جفن چنان باشد که قدری چشم جفن آید آن کشاده هم شود و درین وقت از  
 جفن شلخ عرض شوند و الا جفن را قدری بریده و باقی آنرا از کشاده جفن باری و ضم کرده و وقت در جفن از این اتصال همه عضلات پیشانی  
 در آن هم حرکت پیدا شود و آنچه از ضعف عام بدن حادث شود در آن تقویت عام نمایند و برای اصلاح جفن پارچه استخوان آلود همچون  
 بنجی چسباند که یک سر آن بر پیشانی و یک سر آن بر جفن باشد تا از ریه این اتصال در آن قوت حرکت پیدا شود و از ادویه بکتاب تند یاز  
 سلوش شیبانی یا قدری آلود یا باده آمیخته از بنها هر چه میسر شود از آن چشم را بشویند یا پارچه در این ادویه بیکر کرده چشم را بشویند و انقیاد الف  
 من الجع آب بهک یک انس نیز با اینو نیای خالص میگردم با هم آمیخته پارچه در آن کرده چشم را بشویند و آنچه فطری باشد اگر چه عللش  
 با دوی بیکارست لیکر در آنهم از دخن جفن باری و فایده حاصل میشود و هرگاه سبب استرخای شلخ عصب و ج تا آنکه مانی که در جفن آمده هم این حالت پدید میگیرد و سبب این فایده خاص مرض خلص  
 درین وقت در سبب فایده آن عور کرده موافق سبب علاج نمایند مثلاً آنچه از سفاس یاده و ماییم یا تقریب پیدا شده باشد علاج جفن  
 این را من نمایند و تقریب جفن در محل صغ یا خلف اذن پس از کشاده در سبب تا از دیت پیدا شود و از آن استرخای جفن اکل گردد و دیگر  
 سیه ابر پیشانی و صغ یا خلف اذن تا از دیت پیدا شود و هم درین وقت از مالیدن اسپرٹ ایدو نیای و میکانیک پیشانی و صغ یا خلف این  
 مرض نفع حاصل میشود و اگر از این تدبیر فایده ظاهر گردد در بخیر تری جفن نمایند باین نحو که یک اس آن بر سرک دن بالایی خلع و یک سر آن بر  
 جفن نهاده تحریک نمایند یا یک سر آن بدست و یک سر آن بر جفن چسباند و حرکت دهند تا اگر فایده نکند از جفن مانی پدید

باشد درین وقت استعمال بخیر برقی جائز نخواهد بود و چه از آن درم و نرمی و دماغ و نقصان آن زیاده خواهد شد پس اگر این تشنج در سیم فائده ظاهر نشود  
 چنین را بریده با بر و ضم کرده بدوزند اما قسم ثانی که لاک آفتاب شست و در آن چشمه چشم کشاده بماند حتی که وقت خواب هم بندیشود پس سبب آن  
 اکثر استرخای شاخ عصب است سبب آن پدید آمدن سبب بر خسار بود که آن عصب مگر در از غم کردن خود ستری سازد  
 یا رسیدن سردی باشد که قریب گوش رسیده از ماده سفلس یا از رویش نرم یا از فقر سبب یا در شدن آنخوان یا منورم شدن غلا  
 عصب که در هم حادث میشود گاهی از قاع عام بدن که از ابلت اگر نریزیم یا کونیدیم این غلاف خلص و شیشو گاهی بعد از خون گاهی بعد  
 به شدن زخم آن از وقوع خشک نشسته در جفن که کور متشیخ و متفلس شده در جانی کشیده میگردد و از آن جفن اسفل می آید و سبب  
 آن این مرض پدید میشود العلامات چشم همیشه کشاده بماند چنانکه وقت غم کردن و امی کشاده بماند و از ابلت اگر نریزیم یا کونیدیم  
 میگویند چه پیرس کسیرا و سکون یا می کشاده تختانی و فتح رای سلسه سکون بین بهنگامی غم گوش وانی معنی چشم است و مراد از آن چشم منشاء  
 چشم که گوش است پس از تشنج جفن و همیشه کشوف ماندن چشم نه پاره اذیت در چشم میرسد زیرا که همواره هوا و بخار و اضواء  
 قوی با لکه میوزیات عین در آن میرسد و از آن در سوس سبب جفن درم و ستری و در و پیدای میگردد و هرگاه همراه فاکج عام بدن مرض  
 یافته شود در آن قدری قوت در جفن برای بند کردن پاک میباشد اما هرگاه از فاکج خاص مزاج سابع بوده باشد در آن مطلقا قوت بند  
 کردن پاک جفن نه و در استرخای آن بسیار قوی بود و العلامات آنچند در قسم اول نوشته شده موافق آن در سبب علاج نماید اما آنچه  
 سبب سبب است که در خسار پدید شده باشد بود در آن سلع عام عصب از جایش بیرون آرند و حاصل صحت برای تحفظ چشم از وصول هوا  
 و بخار و استرخای چشم را بند کرده بر آن پانچو گل آلود چسبانند یا با بلبر آن بندند لیکن چونکه این هر دو هم بعد و سه ساعت مشغول میشوند  
 لهذا است که جلد بالای سر و جفن را با هم کرده چند جا دوخته و سه و بعد حصول صحت باز این رشته دوخته را بریده اطفال را بجا  
 خود آرد اما هرگاه بعد از تشنج جفن یا بعد از تشنج جفن اعلی این مرض پدید شده باشد در آن جفن را در محل تفلس مقام شد و خشک نشسته  
 قطع کرده جفن اسفل آورده و آن متصل ساخته بالای آن پانچو گل آلود چسبانند تا با حرکت کرده از جای خود نرو و در این خطا و  
 دارند که آنچه چشم تازه پدید شده از پدید شدن انکور برگردد و در باز نوبت متفلس شدن جفن نه رسد فاکج کل فصل نهم در تشنج  
 عصب است جفن فی آن در قسم یک را ابلت که با بلیف و اسپریم کسیرا بای موصوف و لام سکون یا می کشاده تختانی و فتح فاکج  
 رای سلسه سکون و او و کسلف و سکون عین موصوف فاکج بای موصوف فاکجی در سکون ای همه و چشم گویند و بلیف و در لغت شان معنی آن  
 و اسپریم معنی تشنج است و قسم دیگر را کتیش کسیرا و سکون کاف و کسری تشنه فوقانی اول و کسری تشنه فوقانی ثانی و سکون یا  
 تشنه تشنه و فتح تشنج معر و سکون نون گویند و نکته کسیرا سکون کاف و تشنه تشنه فوقانی و سکون و او و لغت لاثن معنی پاک  
 پاک و تشنج تشنج معنی حرکت است و مراد از آن زیاده شدن حرکت جفن است اما قسم اول آن که بلیف و اسپریم است و آنرا انکال پنجم  
 هم گویند چنانچه تشنج قوی است که تاریر حال خود مانند تشنج از زویر و سبب قریب آن اذیت شاخ عصب خامس دماغی میباشد  
 چون این اذیت بدماغ میرسد و از آن باز بطور ریف لکس در مزاج سابع عصب از عصاب ماغیه می آید و چون تشنج این عصب

فصل نهم در تشنج عصب

در تشنج







میشود و در چشم هم سرخی و درم حادث گردد و چون که از نابین گلا اندوز میسوس میسر چشم جفن از قهوه سوله شعر بکوت  
خارج شود بر کناره پلک جمع میگردد و ازین سبب قشج اهداب با هم ملتزم یافته میشوند و مرض میدان که گویا در چشم یک فنای  
و چون بسوی ضوئش نظر میکنند تندی میگرد و بصر ضعیف میشود و از دیدن شیائی صفار کلال پیدا گردد و چون مرض قوی  
و تیز گردد پس هرگاه اهداب ملتزمه را جدا سازند موهای پلک شکسته گردند و بویست شعر زخم گاهی شود بر ریم پدید میشوند و موها  
پلک بسبب طوئی که خارج میشوند با هم چسبیده بالائی خم می آیند پس زنه خارج شدن هم از خم کناره پلک هم مذکور و صبح و کبیر  
میگرد و کناره های پلک غلیظه و مستدیر میشوند از ستره کناره جفن سفلی چشم غنی شکست همیشه از غده خود پیدا شد از پنهان  
بودن آن بسوی موق که بر دبر بینی میرخیزد ازین قضا منوع شد فوراً از چشم همی افتد و مرض سیلان موع حادث میشود پس از همیشه  
جاری ماندن شکست چشم هم زنه کناره جفن سفلی رخسار پیدا میگردد و بنجامین مرض گاهی کناره پلک خارجش پیدا شود و بالائی آن سبب  
حادث گشته مرض متوقف ماند و گاهی سرخی کناره پلک زیاد میشود که در آن چشم یا بعد از بصری زیاد میشود و گاهی این هم کناره پلک  
بر تمام جفن هم میگرد و درین وقت مصلحت است که جفن پیدا شود حرکت جفن که برای تقطیع و تغصیف چشم میشود متوقف شود و قشوی از نور هم  
گاهی اینجا پیدا میشود و گاهی بعد سلاق مرض موهای پلک فنای و کناره های پلک غلیظه و مستدیر و درخشان محسوس میشود چون  
باین حد رسید نیست غده های سوله طوین و سوله و همینست سوله شعر غلیظه می شود و گاهی ازین مرض کناره های پلک بسوی  
خارج منقلب شده متشنج میشوند پس از تشنج جفن سفلی بجان جفنی در نیمه من مجری شکست برنگد و نیست بر جای خود مانند از آن شک  
در بینی زنه سیلان موع پیدا شود و گاهی کناره های پلک بسوی داخل چشم منقلب میشوند و درین وقت از تحلیلدن موهای پلک چشم  
اوست پیدا میگردد و گاهی از درم کناره پلک موهای پلک خارج می شود و این را می شود بلکه از وضع مختلفه گشته بعضی بسوی خارج و بعضی  
بسوی داخل چشم پایل میشوند و از آنهم چشم زیاد اوست پیدا شود و اصلاح اول از سیه صاف کردن چشم جفن است بنا بر آن باید که از  
آنکه هم مکرر شود و نیز تاریم خشک شده و سبوسه بر آن باقی نماند بعد بر کناره پلک هم سیاه و سوسه به دیلوٹ مکرر نشیند تا بمرهم  
سوسه به دیلوٹ ریخته و سوسه مکرر کوی و غلیظه وقت شب طلا سازند و آنچه وقت صبح اهداب با هم چسبیده میشوند آنرا با قوت دست  
جدا سازند بلکه بر آن که هم سوسه با هم مخرج کرده ریزند تا نرم شود خود جدا کنند یا ز پدیر آن طلا سازند من بعد صاف کنند و  
بعد صاف کردن جفن چشم سلوٹن اثر سلوٹ بر آن طلا سازند و اگر که هم بشود بر ریم بود آنرا از سر سوزن شوق کرده از آن هم ببرد آورده باز  
بر آن سلوٹن اثر سلوٹ طلا سازند و روزانه شبکی یک و گریز یک الون گلاب عملی حکم و از آن جفن چشم بشویند یا از سلوٹن یک  
چشم بشویند و نیز شربت حاصل صحت بعد تصفیه مرهم سیاه که بر آن باید باشد هرگاه کناره های جفن منقلب و متشنج شده  
از آن سیلان موع پیدا شود باشد در این وقت از ستره راه جدید مجری شکست برنده که تا مینمی رسند دست پیدا کرده و بین و اگر تنها  
خارش و حریت و سوسه بر کناره جفن پیدا شود باشد در اینجا اگر طلا کردن مرهم سیاه وقت شب از شستن چشم روزانه آب نیک  
سلفاش یا از آب شبکی یا صحت شود و اگر از مرض شدن من این دو فایده ظاهر شود سلفیوٹ یا فایم شون یعنی آبیکه در آن



این دم متراپد و در دوسری زیاد شود بر آن از آب مطبوخ پوست ششام تکبیر سازند یا پارچه از آب گرم تر کرده یا از تخم کتان  
 آب گرم سرشته بر پارچه آلوده چشم نهاده بر بندند تا بروی چشمه منفرجه شود و در پنج الی شش قطره خود منفرجه نشد نمایند بر رویه حدیث بگویند  
 و این دم هرگاه در غده شعریه و وقت انفجار یک ثقبه در آن حادث شود ریم جاری میشود و اگر در غده مائی بوسین گلا اند باشد ثقبه با  
 متعدد برای جریان ریم در آن شکل گریه شود و گاه هرگاه ریم در آن قند در این وقت هم تظار است که خود منفرجه شود با عانت غم  
 شق نمکنت الا و دم مذکور در غده مائی و گریه یا خواسته شود چون بدون انفجار و جریان ریم در آن میماند و ریم زایل میشود بعد از آن درین موضع قدری  
 صلابت نامدت و در از باقی میماند پس اگر چنین شود در این وقت برای دفع کردن صلابت مذکور سه سه سیاه زرد رنگ لایسی بر آن  
 نهند یا شکر بودین آن طلا سازند علاج عام این مرض نیست که چون ظاهر شود که هم سه سه زرد رنگ نهند بعد از آن وای مقوی  
 و بهر مثل منزال است که آنرا با کم دم وای تلخ مثل نفوع بارک یا کوشیلا یا قصب الزریه نوشانند یا گندین همراه آنکه پخته شیل بنوشانند  
 و اگر این مرض طفل حاضر شود اگر گریه و در مسهل فشانند و بعد از آن سفوف بارک سودایای کار بناس نه و مساوی الوزن  
 گرفته کمی کوزه از دو نیم گریه پنج گریه ازین و هر روز روزانه دو سه بار همراه آب ساده بنوشانند بعد و سه روز از خوردن این و  
 فیری میوینا سیاسیاس و سه گریه همراه نبات سفید آب بصری دو سه بار روزانه طفل انوشانند یا سرپ فیری یا ملج فانیات از  
 پنج قطره تا ده قطره همراه آب صاف حله کوزه بنوشانند هرگاه بسبب استعداد بخار فیری کسی را بار بار این ورم پیدا شود و آنرا سرپ  
 فیری ایو و ایند همراه روغن جگرهای نوشانند و در همه قسم آن غده قویه خوانند و فصل دوم از دهم و التماس الحقیقین در آن  
 بر دو قسم است یکی آنکه کناره یک جنس با کناره جنس دیگر چسبیده آنرا با لخت گریه یا آنکه بلعین فتن و الف و سکون و نون کس کاف و خلم  
 و سکون او کسرای سوده و لام و سکون یا ای شنه تخانی و فاف و فتح رای حله و سکون فتن یعنی چسپیدن یک است نامند چه  
 آنکه زرد و لغت گریه زردی حقیقت عبارت است از آنکه مفصل و نخوان با خود با چسپیدن چون که اینجا کناره مای هر دو یک با هم چسپیدند  
 اندا مجازا بر آنهم آنکه طلاق کرده شد و بلعین یعنی جنس است و هم آنکه جنس با مفصله چشم متعلق گردد و آنرا با لخت گریه هم بلعین  
 بکسین حله و سکون میمانند چسپیدن و لغت شان یعنی مشتق شدن و و چسپیدن چون اینجا جنس با چشم که غشیت ملتزم میشود  
 اندا این هم مودم شد تا قسم اول آن که چسپیدن کناره یک یک با کناره یک دیگر است پس سبب آن هر جنس جنس است که سبب آن  
 میگویند جنس از برای خود زایل گشته و از زوال آن اینجا خرم پیدا شد کناره مای آن چسپیدن چنانکه در قسم دوم مشاهده میشود  
 و گاهی از نخوت جنس هرگاه بسبب کم حرکت مثل لاریاد وای محرق یا از آب گرم بسوزد هم این مرض پیدا میشود و گاهی وقوع  
 ضربه یا حادث رخیم که تفاقا بر کناره یک است سوزان میگویند میبرن آن زوده شد و خرم پیدا گردد هم حادث میشود و اعلا ماست  
 التماس الحقیقین گاهی در تمام یک عام میباشد گاهی در بعض موضع آن واقع میشود و این اکثر ترمیق کبری فتن بهر صورت خواه عام  
 باشد یا خاص در بعض موضع باشد لیکن یک ثقبه در میان جنین قریب موق کشا و میانه که از آن آب از چشم جاری میشود و گاهی  
 التماس بر این نحو واقع میشود که هر دو کناره یک بیو حله و بالذات با هم می چسپند و در این وقت در حرکت جنس سرپ را میگرد

در این دم متراپد و در دوسری زیاد شود بر آن از آب مطبوخ پوست ششام تکبیر سازند یا پارچه از آب گرم تر کرده یا از تخم کتان آب گرم سرشته بر پارچه آلوده چشم نهاده بر بندند تا بروی چشمه منفرجه شود و در پنج الی شش قطره خود منفرجه نشد نمایند بر رویه حدیث بگویند و این دم هرگاه در غده شعریه و وقت انفجار یک ثقبه در آن حادث شود ریم جاری میشود و اگر در غده مائی بوسین گلا اند باشد ثقبه با متعدد برای جریان ریم در آن شکل گریه شود و گاه هرگاه ریم در آن قند در این وقت هم تظار است که خود منفرجه شود با عانت غم شق نمکنت الا و دم مذکور در غده مائی و گریه یا خواسته شود چون بدون انفجار و جریان ریم در آن میماند و ریم زایل میشود بعد از آن درین موضع قدری صلابت نامدت و در از باقی میماند پس اگر چنین شود در این وقت برای دفع کردن صلابت مذکور سه سه سیاه زرد رنگ لایسی بر آن نهند یا شکر بودین آن طلا سازند علاج عام این مرض نیست که چون ظاهر شود که هم سه سه زرد رنگ نهند بعد از آن وای مقوی و بهر مثل منزال است که آنرا با کم دم وای تلخ مثل نفوع بارک یا کوشیلا یا قصب الزریه نوشانند یا گندین همراه آنکه پخته شیل بنوشانند و اگر این مرض طفل حاضر شود اگر گریه و در مسهل فشانند و بعد از آن سفوف بارک سودایای کار بناس نه و مساوی الوزن گرفته کمی کوزه از دو نیم گریه پنج گریه ازین و هر روز روزانه دو سه بار همراه آب ساده بنوشانند بعد و سه روز از خوردن این و فیری میوینا سیاسیاس و سه گریه همراه نبات سفید آب بصری دو سه بار روزانه طفل انوشانند یا سرپ فیری یا ملج فانیات از پنج قطره تا ده قطره همراه آب صاف حله کوزه بنوشانند هرگاه بسبب استعداد بخار فیری کسی را بار بار این ورم پیدا شود و آنرا سرپ فیری ایو و ایند همراه روغن جگرهای نوشانند و در همه قسم آن غده قویه خوانند و فصل دوم از دهم و التماس الحقیقین در آن بر دو قسم است یکی آنکه کناره یک جنس با کناره جنس دیگر چسبیده آنرا با لخت گریه یا آنکه بلعین فتن و الف و سکون و نون کس کاف و خلم و سکون او کسرای سوده و لام و سکون یا ای شنه تخانی و فاف و فتح رای حله و سکون فتن یعنی چسپیدن یک است نامند چه آنکه زرد و لغت گریه زردی حقیقت عبارت است از آنکه مفصل و نخوان با خود با چسپیدن چون که اینجا کناره مای هر دو یک با هم چسپیدند اندا مجازا بر آنهم آنکه طلاق کرده شد و بلعین یعنی جنس است و هم آنکه جنس با مفصله چشم متعلق گردد و آنرا با لخت گریه هم بلعین بکسین حله و سکون میمانند چسپیدن و لغت شان یعنی مشتق شدن و و چسپیدن چون اینجا جنس با چشم که غشیت ملتزم میشود اندا این هم مودم شد تا قسم اول آن که چسپیدن کناره یک یک با کناره یک دیگر است پس سبب آن هر جنس جنس است که سبب آن میگویند جنس از برای خود زایل گشته و از زوال آن اینجا خرم پیدا شد کناره مای آن چسپیدن چنانکه در قسم دوم مشاهده میشود و گاهی از نخوت جنس هرگاه بسبب کم حرکت مثل لاریاد وای محرق یا از آب گرم بسوزد هم این مرض پیدا میشود و گاهی وقوع ضربه یا حادث رخیم که تفاقا بر کناره یک است سوزان میگویند میبرن آن زوده شد و خرم پیدا گردد هم حادث میشود و اعلا ماست التماس الحقیقین گاهی در تمام یک عام میباشد گاهی در بعض موضع آن واقع میشود و این اکثر ترمیق کبری فتن بهر صورت خواه عام باشد یا خاص در بعض موضع باشد لیکن یک ثقبه در میان جنین قریب موق کشا و میانه که از آن آب از چشم جاری میشود و گاهی التماس بر این نحو واقع میشود که هر دو کناره یک بیو حله و بالذات با هم می چسپند و در این وقت در حرکت جنس سرپ را میگرد

فصل دوم از دهم در التماس الحقیقین



[illegible]











میشود و جلد زخفین عارض نمیشود تا خواش بپایند بلکه از بالای سر هم جاری میگردد و اگر کسی میمیرن منقلب یا ده غلیظ باشد از  
 سرشتر اندر جای بجا شق کرده خون بریزند ایضا الجفان را بجایش آورده برابر ساخته پارچه شکلی بپوشانند آنرا بر آن نهند تا از جای نخورند  
 بقدر آن را بجا نمانده از رباط بر بندند ایضا اصل کاشک نفوذ حاصل توتیا یا سلوشن قوی یا کسر سلور یا سلوشن قوی توتیا بطول  
 بر میوکس میمیرن منقلب نیست قدری سفیدی در آن دشت شد زخم پیدا شود و بعد از شدن زخم مذکور از حدت تقلص و جتماع آن  
 انقلاب منع گردد ایضا الیوکس میمیرن منقلب چندان زخم عارض میرند بعد صحت زخم بر مقدار اصلی خود آید و انقلاب بکمال گردد  
 ایضا خود منقلب در وسط آن بقدر زیادتی آن که از سرهای خود طولی شد تا عارض برید و بعد بریدن بدو زخم بر جای  
 نمانده بر بندند تا صحت شود ایضا اول زخفین منقلب عارض زخم پیدا کنند تا بسبب آن زخفین منقلب تر خاپید باشند و بسبب  
 آن بر آن بجایش ممکن گردد پس بجایش رسانند برای ازاله طولش از جانب فوق و منفرجه منفرجه مذکور بقدر ضرورت بریده بدو زخم  
 تا بر مقدار طبیعی خود آید و طول آن که از سر خاپید باشد بود دفع شود و اگر انقلاب خفین بعد زخفین از تقلص یشه های جدیدی بماند  
 در محل زخفین دشت شد با درین وقت بهتر نیست که شکسته یشه را بریده جلد جدید را محل عارض یا پیشانی گرفته در میان کنایه های  
 زخم تازه نمانده بدو زخم تا تقلص پیدا شود و اگر بچندین انقلاب خفین ایل نگردد و اوسیت سیلان و موج مودی باشد درین وقت بر آن  
 دفع کردن اوسیت مذکوره راه جدید برای سیلان و جریان شک لبوی بینی پیدا کرده و هندی چنانکه پیشتر نوشته شد شک لبوی بینی  
 پیچیده هم در امراض الکری مل سیم ششم فصل لام و سکون الف کاف و کسری هم لام سکون یای شناه تخفانی دفع سیم سکون  
 لام و کسری هم لام سکون الفی دفع تابی شناه فوفانی و سکون سیم یعنی امر اضیکه در آلات تولد اشک حادث میشوند و در انهم دو  
 توضیح اند توضیح اول در الفل شین لاک ی مل کلان یعنی ورم غده مولد اشک از اباحت گریک الک فی او اذن انشیش گویند  
 و لاک فی دفع دال بهندی و سکون الف کاف و کسری هم لام سکون یای شناه تخفانی ورم لام سکون الف یعنی شک است و اذن به  
 دفع الف و کسری هم لام سکون الف یعنی غده است و ایش دفع الف سکون یای شناه تخفانی و کسری هم لام سکون سین مل  
 یعنی ورم است و صال نه ورم غده شک است با جمله این مرض خلیل الحدیث است لیکن بر دو قسم است کیو یعنی حاد و کرا نیک یعنی مزمن  
 و سبب هر دو هم اکثر رسیدن ضرر به چشم میباشد و گاهی که ام سبب ظاهر نباشد و علامات هر گاه کلیت بود و زخفین بطی قریب فوقی صورت  
 و سوزش ورم یا ذره میشوند و ایضا ورم های موسوم به ورم یا بر تمام زخفین بر میوکس میمیرن چشم سیم دیده میشوند بعد این علامات خود یا علامت  
 رفع میشوند یا در غده مذکوره ریم متولد میشود و درین وقت ضراب سوزش درد با جمله علامات پیدا شدن نیم یا ده حادث میشوند  
 العلاج اول چندی در زخم بر محل ورم غده چپسانند و آن را نیکه ورم و تر باشد شل پوشش هم گمان بر آن نهند همیشه ورم تر تا  
 و ایضا از او بیست که در قسم نکات نه حال نمایند پس اگر ازین بیم رفع نشود و نوبت به تولد ریم شدل را از سرشتر کشاده ریم هم  
 آنرا در پارچه بر وزن کار بکشد و ایلو تر کرده بر محل زخم نشتر بکشد و اما هرگاه این ورم مزمن بود و علامتش آنست که اول تا مدت  
 و از میان نماند و آنکه نرمی و درکم میباشد لیکن ورم سختی در محل غده مولد شک پیدا بود و قدری او را چپانند و میوکس میمیرن چشم سیم



حادث میگردد و در آن قدری سوزنی ظاهر میشود و بعد آن درم برکنار هر دو جن حادث میگردد و گاهی بر هر دو جن او و یا چندان پدید میشود  
 که از آن کشادگی چشم ممکن نباشد و در عظیم این حادث میشود که تا موخر اس میرسد از آن مرض بسیار متشادی میگردد و میگویی که سوزش  
 میشود و هیچ نوع بر آن صبر کردن ممکن نباشد پس این در دو بعد چند ساعت یا بعد چند روز دفع میشود زیرا که ما دام ریم در خریطه که در  
 میان از غم آن زیاد شده مقدار خریطه از تند و در پی میشود و چون از خریطه اند که ریم خارج شود و غشای خانه دار زیر جلد جفن می  
 از غلی شدن خریطه در ذایل میشود لیکن از دل زیر جلد جفن با نجات میماند سیکرد و در ابتداءی مرض علامات این مرض با علامت اکبرال  
 اطفال میماند و پیش از آنکه فارق بینا در موضع خاص پیدا شود و صاحب گاه انگشت را بر آن نهاد و قدری غم کند چه درین وقت  
 مریض این مرض غمناک و بیقراری مینماید بخلاف صاحب کسار اطفال میماند که در آن بخار و نینباید انجام گاهی خود بخود منقوخته بجا میماند  
 یا از علاج و بر آوردن بیم صحت میشود و گاهی هم در آن باقی مانده تا صبح پدید میشود و از آن گاهی هم و گاهی شک جاری ماند علاج در ابتدا  
 مریض را آب گرم یا از آب طبخ پوست شمشاد و آب کافور کافی نشود و در هر حال هم چنانکه در مریض از او پدید میماند سلیفت آن  
 سیکندیشا نوشا نند اما سهل کشیده شود چون تا شمس ظاهر شود پویش را در و یکدم در بر آن نهند و بعد چنان در شتر شتر قیق کشاده ریم از آن بیرون  
 آرند و در ثقبه نیم فیتله از پارچه ساخته نهند بعد آن پویش را ترخم کنان درست کرده بر آن بزنند و چون هم حار ذایل شود ثقبه نیم باقی نماند  
 در آن بعد هر دو سه روز پودنی قیق که برای این کار خاص موضوع است نهند و مریض شک بر نهد و تا این سیست صاف کرده شود  
 و با حصول صحت تا این عمل را ترک نکنند و در این مدت مریض را در خواب روز و شب با ریا یا ایتون نیند  
 باشند تا از تخیر آن وقت کم محسوس شود و قدری را بهر گاه این هم کرانیک یعنی فرمن باشند این امیو کو سیل میناسند و جوی سلج یعنی زیر کد آن  
 همیشه که با نزع در خریطه اشک مجتمع همانند که غده غم از آن بر می آید و در تمام خود مشابه به بلغم میباشد زیرا که چون در این قسم قدری درم  
 در این خریطه میماند که بسبب آن که جریان اشک بسوی بینی است تنگ میگردد و پس بسبب خفتن و انسداد طریق اشک بسوی بینی کم میروند و مطلقا  
 نمیروند و از آن همیشه خریطه مذکور اشک مجتمع میماند و از جمیع قوایش غلیظ میگردد و السبب اکثر از رسیدن هوای سرد و گاهی بعد از کاه  
 بعد از جراحی حصه گاهی بعد از کد کردن کشیده میشود و اکثر در مستعدین خنایر حادث میشود و شاید بیش نیست که در این کسان در امراض  
 میگویند میبیند اکثر پدید میشود و ایضا این قسم در زنان بیشتر مردان پدید میشود و شاید بیش آن باشد که ایشان گریه پدید میکنند  
 هر گاه استعداد حدث این مرض کدسی بوده باشد از رسیدن هوای سرد بعد گریه بدن هم از گریه کردن هم از رنگون شدن نبردی  
 این مرض در آن پدید میشود علامات اشک از چشم جاری میماند و جریان آن بنیج زیاد میشود و قدرت و از میان جتی که از زیادتی  
 تدیر جی از آن آن مریض هم نمیداند که مرضی را که اقامت شروع گشته و هر گاه قدری کار چشم گیرند مثل مطالعه کتاب غیره فوراً اشک جاری  
 میشود و در هوای باد و طبع جریان اشک زیاد و در هوای حار یا پس کم سائل میشود و چون از اجتماع دو گلی اشک مریض متشادی و تنگ  
 میگردد و خود انگشت را بر محل این خریطه نهاد و غم میکنند از آن قدری آب را راه بینی بر می آید و از بر آمدن آن اشک که در چشم مجتمع بوده بسوی  
 بینی جاری میگردد و از جریان آن بسوی الفیت سیلان آن چشم هم بسوی عارض کم میگردد و پس اینحال هم تا مدت دراز مانده بعد آن در

در محل خراش مذکور حادث میشود و چون بعد پیدایش آن هیچ درین موضع مرخصی از انگشت نمیکنند آب لبوی بینی چنانکه پیشتر جاری  
 میشود باینکه نسیج در زیر آن که اکنون درم زیاد شده و از آن راه جریان اشک مسدود گشته بلکه عوض آن از غلظت و طوبت سفید  
 باقیمانده در زیر پلک مذکور چشمی آید و لبوی خارج دفع میگردد و بعد از این علامت هم تادرت دراز مانده بعد از آن یک بار در وقت عصر می  
 درم و ضرمان پیدا شد قسم اول این درم که اکثراست حادث شد و دل پیدا میکند و بعد از آن جراحت و خروج ریم ناصور پیدا میشود و این  
 ناصور بار بار جاری میگردد و باز بند میشود و ازین انسداد و جریان بار بار گاهی ثقب های متفرقه بطور ناصور تا خسار پیدا میشوند و این  
 آنچه در اطفال نابالغ پیش میشود بعد رسیدن بسن بلوغ زایل میگردد و آنچه بسیار است از علاجات کثیر زایل میشود و از بار بار پیدا شدن  
 نقصان استخوان خارج و داخل انف میسر شد العلاج اول در ابتدای مرض مجری اشک بنده را تا غلظت اشک از شتر با یک شق  
 کرده و بهندتا حصول صحت بعد و سه روز به پیش از پر و پیچ که برای این کار مخصوص است اه اشک تا اندرون بینی به پیش میآید  
 باشد هرگاه درم دور پیدا شود آنچه برای این حالت در قسم اول آن تارک نوشته شد از قسم دیگر تعلیق و نوشاندن مسهل بعد  
 ظهور فنج نشتر داده ریم را بر درون اعمال آید و برای کشاده ماندن راه اشک سیل قیق نقری که بصورت حرف میم خط است تعلیق شنبلیله  
 درین ناصور انداخته متناوب این تدبیر لازم باشد تا اشک بخوبی از مجری طبعی خود جاری ماند و دل پیدانه شود و وقت ترک این تدبیر  
 نیست که جلوه درم و اذیت زایل شود و از آن آنرا بر درون آن رتبه زخم میل گردد و گاهی مدت الطهرین میل را در زخم میدارند و برای دفع کردن  
 قبح منظر میل مذکور اگر کدام رنگ مشابه رنگ جلد باشد نگین میسازند و این مریض را در ویه قویه مثل آهن کنند و روغن جگر  
 ماهی و غیره و اغذیه چید شل و حوم البان خوراند و توضیح سوم در آنکه بکسر الف و بای موحده فارسی یکسوه و سکون فافج  
 رای مملو سکون الف و لغت که یک یعنی ترماندن چشم و جاری شدن آب چشم از موق که بر است که از اد لغت عرب سیلان دفع  
 مینامند هر چند که جریان اشک از چشم و اکثر امراض عین مثل اقسام دیگر یافته میشود بسبب اینکه در آن امراض اشک چشم بسته است  
 اجزای عین پدید آید و لیکن بر آن انفر اطلاق کرده میشود بلکه هرگاه اشک بر مقدار طبعی چشم پدید شود لیکن بسبب فساد  
 از جریان خود در مجری طبعی منجمد گشته از گوشه چشم سایل شد لبوی خارج بطور ناقاط بریزد و از آن موموم با سیم افرای صطلا  
 میشود و در این مرض موم بآلشین هر دو یافته میشوند باین نحو که هرگاه سبب آن ضعیف تغلیل بود و از آن بوالشین پیدا میشود چون  
 سبب قوی باشد و مع پیدا میکند البسبب گاهی از ضعف مجاری اشک برنده حادث میشود و این حالت گاهی درین صبی و گاهی  
 در سن شیب پیری یافته میشود و درین وقت در میوکس میبرن جفن و چشم فیدمی و استر خا با جمله آثار قلت نمیده میشوند گاهی  
 از انقلاب ثقبه موق که بر پایش چنانکه انقلاب الجفن الی الداخل انقلاب الجفن الی الخارج مذکور شد زیرا که بسبب آن اشک مجری  
 طبعی خود داخل نمیشود و در فریطه خود نمیرود بلکه در چشم مانده از آن خارج میگردد و گاهی از مسدود شدن مجری اشک برنده تغلیظ  
 آن پیدا میشود و انسداد آن گاهی خلقی بود و گاهی بعد برز جدی یا حصیه مسدود میشود و از سبب آن سبب  
 ثلثه انسداد هرگاه تغلیل باشد دقیق مجری مذکور و هم پیدا میشود و از آن درین مجری جریان اشک کاسین نمیشود و گاهی در وسط مجری





توی بینی آن جلد است و توی میانی آن غشای ریشه دارد و غشای اندوهی آن میوکس میبرن است و هوا از خارج تا به گوش  
 میرسد فقط زیر که برین ثقبه غشای سفروش است راه مسدود است ازین سبب هوا اندرون گوش نمیرسد لیکن آنچه از اندرون  
 راه بسوی گوش است از تهوتا اندرون گوش هوا میرسد پس ثقبه غشای عظم بصورت مختلفه واقع اندکی بصورت رکاب که بر آن قسم نهاد  
 بر سبب سوار میشوند و بصورت مطبقه صداد و کناره آن را جایگاه بصورت سته مطبقه است متصل از میوکس میبرن که از غل بالای ثقبه  
 گوش است میباشد سوم بصورت آنکه از آن خشت و سنگ عمارت آهن را می شکندند اندر استخوان گویند و بعد از حوضی ای بر آب  
 بصورت مختلفه یکی از آن کثیر قریب شکل ناشپاتی متصل از استخوان مشاب بصورت رکاب میباشد چه استخوان مذکور بر همین آن مثل سرب  
 بود که بسبب آن تپش محفوظ از جریان ماند و الا از آن خارج شد از راه ثقبه که در همین است جاری میشود علاوه از آن اجیاض دیگر  
 مختلفه از اشکال گرد و حوض کبیر مذکور بعضی قریب بعضی بعید از آن بر صورت سانیس که در دماغ اند مخلوط از آب میباشد در جمله  
 اجیاض مذکوره اندرون آبیکه در آنها اندر ریشه های اعصاب سمع مثل شنادر وجود میباشد و واقع اند چون هوای خارج  
 غشای یک ثقبه سفروش است میرسد و آنرا صدیده دهر و اثر صدیه بطنام نشسته مذکوره که متصل پس ثقبه اندر سینه بذر یقه عظام مذکوره  
 تا اجیاض توصوفه منتهی گردد و از آن حرکت متوج در آب حیاض مذکوره پیدا شده بذر یقه ریشه های عصب حساس صوت مذک  
 میشود و عضلات محک گوش و انسان کوچک و ضعیف اند و در حیوان مثل سبب غیره قوی اند لهذا حیوانات گوش های خود را با آن  
 خود حرکت میدهند بر سو که خواهند منعطف ساختند و غشای انسان که بر آن قدرت ندارد با جمله در گوش هم امر متع  
 عارض میشوند فصل دوم در در گوش است و آنرا بلفظ انگلیش ایریک بالرف و سکون یای شناه تخانی و کسرای  
 جمله سکون کاف بلفظ گریک و کاف بلفظ لغ و سکون او و تاسی هندی فتح و بالرف سکون لام و کسرتیم فتح یای شناه  
 تخانی و سکون الف ثمانه و اکثر سبب آن هم بود که خارج ثقبه یا در دال آن در اعضای گوش از غشای و لحم افتد اما آنچه از آن  
 در خارج ثقبه قد در راهی که بسوی ثقبه فته است پس درجات آن بسیار اند چنانچه بعضی حیوان چنان ضعیف بود که بخورد و اثر و در  
 محسوس شود و گاهی چنان یاده میشود که راه گوش مسدود میگردد و سماعت باطل میشود و در در گوش یاده بود و در  
 محسوس شود و اگر علاج آن نکنند در میوکس میبرن هم می افتد و این وقت در گوش بسیار گردد و تا ریم خارج نشود و در وقت  
 نگردد و سبب این هم اکثر رسیدن هوای سرد یا هوای رطوبت مثل هوای شربکال میباشد و گاهی در اطفال سبب بروز دندان  
 عارض شود چه آنچه عصب بسوی دندان رفته کیشاخ آن بسوی گوش هم رفته است ازین سبب محدث درم میگردد و بالمشاکت  
 علاج آنچه از رسیدن هوا حادث شد اگر قلیل باشد فقط افیون بار و غن کچد حاکمه نمیکند نهاده پنبه بآن تر کرده در گوش نهاده یا  
 فقط پنبه در گوش نهاده تا از رسیدن هوا اندرون گوش منع گردد اگر ازین فایده حاصل نشود زیاده بقابل غصه و فاشک که بالای  
 راه گوش در خارج است یا زینر که گوش چسپانند اول بهتر است و سهل توی چسپان جلیپ و کلون بلکه سیرسل که درین کلون  
 بآن بیانیه که آن درین هم بسیار رفیع است زیرا که آنچه آب از عروق بر آمده و درم پاید میکند آنرا کلون از خروج مانع میشود و آنچه از

فصل دوم در گوش



عرق بیرون آمده و گوش جمع شده آنرا اندر ریه تقویت عروق جذب میکند که از آن هم نریزید و ضحاک بلا دونا و یا گویا عصب الشلب  
بسیار ساینده و مفید است چه بلا دونا بحدی که عروق عرق خون که در گام با بیدار و جمع شده جاری میسازد که از آن هم بر طرف میشود  
و کلون و دیگرین همراه بلا دونا که هشتم صدمه گرین باشد بعد چهار ساعت خوابیدن بعد از تقیه بسیار مفید است و اگر از نیمه هم  
نریزید و بایکدی که در جمع شود و هم پیدا کرده این وقت از تخم گمان پوشش مست کرده یا از بختب الشلب بستر بر تمام گوشینند  
چون بخت شود و ملائیم کرد و شتر هم بیرون سان که ازین صحت خواهد شد آنچه ازین هم اندرون ثقبه بود و درجات انهم مختلف  
میباشد و علامتش آنست که از شروع مرض دران از آواز گستاخ و از طبعم موافق درجات و هم محسوس میشود و در ظاهر هم نمیداشد  
سبب تمام صورت مذکور نیست که حرکت خون شریکان در این هم قوی میشود بسبب قوت خود محسوس میگردد و چنانکه در حالت  
هم بگاه انگشت در گوش نهند بسبب آن سدن هوای خارجی تا غشائی مفروش بند شود و آنرا مان این حرکت بخوبی محسوس شود  
لیکن وقت آن را این هم احساس یاده میگردد و درین هم راه رفتن از درین بوسوی گوش است مسدود میشود بسبب هم  
اندرونی و در درون گوش یاده محسوس شود و نسبت دردی که در هم خارج گوش بود مثلاً هرگاه هر دو هم در جا  
مسدود بود و در درون گوش یاده بود و این هم اندرون ثقبه گاهی گاهی غشائی مان رسد این وقت علامات سرسام هم  
در درشتی جمعی فشیان اختلال حواس میآید و علامتش آنست که سسل قوی دهند و صد گیرند بحسب علامات موجوده و  
کلون ضرور دهند تا که درین گوش کنند یعنی همراه ایون هت که از آن یک نیم بدر گوش سرسام هر دو حال میشود و اکثر درین هم  
هم پیدا میشود غشائی مفروش بر ثقبه که گفته ایم از آن خارج گوش و خروج هم اگر چه علاج و هم اندرونی است لیکن سماع از آن  
ثقبه مان هر چند در این وقت بایکدی از آب گرم همیشه گوش اندر ریه زانو صاف است باشند و هم بند نکند الا با زوم اندرونی محسوس  
و غشائی مان و هم پیدا کرده و دردی قابل طاقت خواهد شد و با بر تقیه میل تعدیم اگر کار بولک ایستد بار غن بخشین منجیه قدری  
در گوش نازند باینست بلکه موجب سعال و سعال است چون هم خارج شده و قوت شود بهتر است بدانکه چون هم غشاک  
اندرونی ثقبه گوش که آن یک کس میبرد است از سیکس میبردین پس پیداشد آنجا ز قهیم پیوسته از آن گاهی پرده گوش  
که غشائی بیرونی ثقبه است هم تداک گفته میشود برای خروج مایه بعد از کافتن غشائی مذکور همراه هم عظام باشد که پس ثقبه گوش  
هم خارج میشوند قبل کافتن پرده گوش و در نیم میشود از غشاک که از اندرون ثقبه افتد صورت پرده مذکور هم تغییر کرد و در صورت آن حال  
صحت سطح مستوی است بر ثقبه و در حال افتادن هم پس ثقبه گوش قدری کعب میگردد پس از جای خود قدری پیش آمده و  
محسوس میشود با کماله چون شمار پیدا شدن هم پس ثقبه ظاهر شوند آله و سوم ایست که قدری بر قوت قیف میباشد از آن شنی در گوش  
رساید باینکه شنی مذکور پرده گوش را بخوبی می بینند و گوش داخل کرده و بینند هرگاه ثابت شود که در آن هم افتاد و این وقت  
بایکدی که در نیم وجود بود و لیکن سخنان نباشد از شتر و قیق الماس پرده گوش را قدری شق کرده و بهتاریم بهر حال  
شود و ظاهر خود تغییر شدن آن نمایند چنانکه قدما بعد از این واسطی صبح هر گوش میگردد چه دران از شدت درد و زیاد پیدا شدن

انواع

ریح و از ماندن در گوش ذیبت عظیم نقصان استخوان سپردن این تمیز بلای یادنی و جمع و نقصان غشاء و استخوان مان حاصل  
 میشود و ریح بسبب علت خارج میگردد و آنچه درم بسبب هوای طبع حادث میشود در آن از اشیا یا بسبب تکیه بدست مثل اینکه  
 نمک سود گرم کرده بر گوش بنهند و آنچه ازین در گوش تابع عصب بود و علاج عصب است آنچه در گوش بسبب گرم  
 افتد که در گوش بسبب غم گوشت پیدایش باشد بهین سبب گرم در گوش پیدا میشوند و آنچه زیر که هرگاه زخم در گوشت گوش می افتد  
 و کس بر آن می نشیند موافق عادت خود بعضی بر آن گرم پیدا میشوند و آن رغن کار بولک یا لوت در گوش اندازد  
 که آن قاتل می داند است بعد از آب گرم ز راقه نماند تا گرم مرده بزرگ آن از گوش خارج شوند و گاهی در گوش بسبب سیدن  
 هوام و جانوران خرد و هوای مثل پشه در گوش افتد و علاجش قتل طایع است برای قتل آن قصابون آب گرم حکم کرده در گوش اندازد  
 و صاف کنند اگر ازین نمیرد رغن کار بولک یا لوت اندازند و بزرگ راقه آب گرم خارج آن کنند چنانچه گاهی از افتادن جسم صغیر  
 غریب در گوش در می شود علاجش آنست که از کلبین خرد و آنرا بیرون آرند یا صابون و آب گرم انداخته بر آن و اگر آن جسم بزرگ است  
 و مغز است باشد که بسبب طوبت گوش تنگی شده باشد آنرا از کار شکسته بیرون آرند و گاهی در گوش ترساید و عفون ندان میباشد  
 چه عصبیکه بسوی گوش افتد ریشیه آن بسوی دندان هم آمده هرگاه چنان باشد اول با صلاح دندان گوشش کنند چون از آن نبرد  
 دندان را ساقط کنند فصل سوم در طرش یعنی بلایان یا نقصان سمع و آنرا بلای انگلش کیش کیش میگویند که در گوش سکون فاد  
 و کس نو سکون بین میگویند و بسبب آن در چهار مقام گوش میباشد اول در فضای که از خارج تا ثقبه است دوم در غشاء و مغز  
 جوامع مابین و مقام خارج از ثقبه سوم در استخوانهای که پس ثقبه گوش اند چهارم در طریقی که از دهان تا اندرون گوش می کشند  
 هوا مخلوق شده و این گفته را به سبب طرش یافته میشود پس بدانکه آنچه طوبت بخرج زرد رنگ بود که خارج صماخ در گوش پیدا شود  
 و در تشیخ گوش که آن کرده شد این طوبت گاهی بسته و خشک شد و بقیه آن فروش بر صماخ می چسبند آنهم از خشکی این طوبت شک  
 میشود و بسبب خشکی هرگاه آواز هم از دهان سپرد از صدمه دهان خود حرکت میکنند و آن استخوان خرد را که اندرون ثقبه است حرکت  
 میدهد تا آواز سمع شود یا خود هم حرکت قلیل متحرک میشود و استخوان را هم تحریر میکند و حرکت میدهد و ازین سبب ایشیه های عصب  
 حساس سمع را خرد و ازین جهت بسیار میشنود و یا کمتر شنود و علاجش آنست که صابون و آب گرم حکم کرده بزرگ راقه آهسته آهسته در  
 گوش نیندازد تا چرک گوش نرم شود و بزرگ آب بیرون آید و اضافت دیگرین سودا کار نباشد با یکا لوس آب ساده حکم کرده از آن گوش شستن  
 بزرگ راقه در گوش نداشتن بسیار مفید است که بسبب آن چرک گوش بخوبی خارج میشود و لیکن نه آنکه این آب بقوت در گوش نماند  
 چه وقت خارج شدن چرک غشائی فروش عصب بسیار کمزور میشود و از آن صدمه ز راقه شکافته خواهد شد بجا خارج شدن چرک  
 رغن کنج گرم کرده یا پنبه آلوده در گوش نیندازند و پنبه با گلیرین تر کرده در گوش نیندازند گلیرین از رغن کنجد بهتر است گاهی در طریقی  
 درم میشود و از آن سیدن هوا بند میگردد یا سببیکه در در گوش مذکور شد و علاجش همان علاج مذکور است که در در گوش نوشته شد  
 و اگر درین فضا سبب نبود و در غشاء فروش بر صماخ باشد باید آنست که در آن هم بچینه و جو بودی آنکه از درم اندرون ثقبه که در گوش

فصل سوم در طرش

گفته شده این غشا شکافته شود و در آن اکثر مایع می آید و در آن لقمه است خارج میشود و آنکه سبب سیدن صدغه  
 ضرر یا سقطه با آواز غلیظ می آید غشا شکافته شود و این طرش سم لا علاج است لیکن بدانکه هرگاه سبب شکافتن غشا و مفروش  
 علی اصباح در کسی طرش یعنی کری پیدا شده باشد آن نیست میشود باینکه بعضی میگویند که اول از گوش من مایع خارج شده بود  
 من بعد طرش پیدا شد پس بعد از آن هرگاه آنکه اسپکلام در گوش دخل کرده می بینت ظاهر میشود که پرده گوش شق گشته ضایع شده و درین وقت  
 تدبیرش نیست که قدری مینجملوج را گرفته تو بر تو کرد و مثل فیتله ساخته در وسط آن شسته محکم شل شسته که بکار حیاطت می آید بر بندند  
 به فیتله مذکور را در سائنه و آب ساده یا در گلیسرین تر کرده بذریم پرورپ یا انگشت وقت ضرورت پیدا کردن سماعت مثل حضور  
 مجاس میجو قاصح رسانند و بند و شسته مذکور را تا خارج گوش دارند تا اگر بنیبه در ثقبه و دیاضورت سماعت فاقه شود و آنرا بند ثقبه  
 مذکور از گوش بیرون آنکه ازین تدبیر قدری سماعت پیدا میشود لیکن این تدبیر محتاج نیست که هر روز تازہ کرده شود سوم آنچه سبب بند  
 شدن راهی که از دهن بسوی گوش فته واقع شود و هرگاه این راه بند شود بکار می کشند و این سبب هم میباشد لیکن اگر  
 این هم با ورم گلو عارض شده هرگاه آن صحت یابد حاجت بعلاج خاص ندارد و لیکن اگر راه بند شد و با هم شل باشد پس بیکه در آن  
 میل از طرف بینی یا گوش سائند راه مذکور را صاف کشاده کرده و بین چنانکه او مثانه را در جیس البول میکشایند و الا خود بخوابد  
 چنانکه راه مثانه بعد با هم شدن خود کشاده نمیشود تا هوا بگوش سد ثقل سمع فزع گردد و چهارم آنچه در شیخانه های پس ثقبه میباشد  
 پس اکثر آنست که در اینجا ورم در عظام میشود و هم در آن جمع میگردد و حوض های که پس شیخانه های شله یافته شده اند و در آن مجمع  
 است و در آن آب ریشیه با می عصب حساس سمع میباشد درین صورت بیمار هیچ نمیشود زیرا که جرم عصب حساس در آن خراب  
 میشود و چون در کانون است مطلقا ادراک نمیکند و اینهم لا علاج است بدانکه گاهی در راه گوش گوشت پیدا میشود  
 و از آن راه سد میشود و آن خود کثیر میباشد لیکن اصل آن مثل اصل انگور بسیار صغیر بود و علاجش آنست که لحم مذکور را برید و اصل آن  
 اصل کاشک نقره نهند تا باز عود نکند و گاهی از زیاده خود کین هم شنیدن کم میشود و بیشتر در گوش مشور سمع شود بعد سماعت  
 کم گردد و علاجش ترک تعمال است فایده صاحب طرش در وقت کلام همیشه دهن را میکشاید تا هوا بگوش آن سد فصل چہم  
 در طینین و دومی این قسم صوت مذکور در خارج نباشد و سمع شوند و آوازیکه در خارج موجود نباشد و سمع گردد و آنرا بلغت  
 انگلش نامیدند و فتح نون و سکون الی کسری شانه تخانی و کسری مجادل و سکون ثانی نامند طینین خود مرض نیست لیکن امر اضری گیر  
 یافته شود مثلا در فصل پیش گفته اند که گوش میشود و با همی در در سر بود هم این علامت یافته میشود و علاجش همان صم است که در  
 در گوش گذشت هم هرگاه شریترین عروق مانع کمزوری بود یعنی خون کم فته باشد یا آهسته آهسته و دیانزد و فتن آن بند شده باشد  
 و سبب آن خون و رکت آواز غلیان آن سمع شد باشد این اصوات شنیده میشوند و هم هرگاه غشائی شران چربی زیادہ تولید شد  
 باشد و قوتش نیست که گاهی غشائی که بر شران است از کمزوری لاشی میشود و بجای آن چربی پدید می آید و دو علامتش آنست که درین  
 وقت اگر قریب طوق سفید موس میشود و از آن دانسته میشود که در قلب شران چربی زیادہ پیدا شده اثران اینجا ظاهر میشود و چون بر

ساده  
 قوله کای از  
 نباده فزون کنین از  
 بدانکه بعضی از این  
 شقی اگر در آنجا  
 ماض شد بدین  
 ماضی که در این  
 و قوتش در آن  
 کین در آن  
 سماعت مثل طینین  
 طینین در آن  
 جرم این سبب  
 در آن  
 گوش در آن  
 بیشتر خود  
 و فتنه در آن  
 و سبب این  
 و سبب این  
 و سبب این  
 و سبب این

نیز در فصل



هوای آب است در آن کنجایش جذب قبول این بخار و آب نیست چون جلال کار خاص خود را خارج نموده غیبه از خون است باقی میماند  
 و درین وقت یاده فضل میور که کرده خارج میشود و چون کرده هم از اخراج آن قاصر شود در درول سرخی ظاهر گردد و دانست شود  
 که کرده هم از فعل خود قاصر شد و در خون فضل کثیر که از راه مسام و کرده خارج میشود و محتاط و موجود اند و از ماندن آنما در خون  
 مرض پیدا میشود زیرا که درین وقت هوای سرد و بدن با خرابی خون یاده موثر میشود علامات آن اولی بود و دوم آنکه درین  
 درم در زیاده بود زیرا که ماده آن جمع المصل است که در آن فساد خون روست از مزه و جمع اند و ازین سبب ظاهر درم  
 بسیار شد الا که بسیار بود و سوم آنکه بیمار را از مس کردن هم تکلیف بسیار میشود چهارم آنکه از رسیدن هوای سرد علیل یاده و  
 میگردد و سبب قبض تکلیف آن هم در عضو باده تمرد و تنگ میشود و سبب آن در زیاده کرد و پنجم آنکه از رسیدن نهادن چیزی گرم  
 بر آن مرض را است یا بدو و سبب رخا عضو میشود و آن سبب تسکین معج است علاج اول سهل و پسندیده با صلاح کرده از وظایف  
 مدارات پرواز و اگر از مس پدید و زیاده شود و دوزخ و بل قابل غصه و شلست یا زرد و گوش نهند و در گوش شلست یا زرد و گوش نهند و در گوش شلست یا زرد و گوش نهند  
 اینون است یا فیون محلول باب با پخته تر کرده و در یک گرسین یا زرد و گوش نهند و در گوش شلست یا زرد و گوش نهند و در گوش شلست یا زرد و گوش نهند  
 با اکثر کثرت بلا و دنا که چهارم یا ششم گرسین باشد با هم آمیخته بعد چهار ساعت به یار خوراند تا صحت تامه حاصل شود و کثرت  
 بلا و دنا آب ساید و محلول درم نهادن سازند و پارچه شیمی یا سفید بطور تحت الحکام بستن هوای سرد و گوش نهند و در گوش شلست یا زرد و گوش نهند  
 و در این درم وقت شب یاده میشود و باید که وقت شب نمک طعام سوده آتش بر میان کرده و در خطی که در شلست یا زرد و گوش نهند و در گوش شلست یا زرد و گوش نهند  
 گوش نهاده اگر کم کنند اگر می آن چنان بود که بیمار تحمل آن باشد اگر بلا و دنا می نشود از برگ غنث الشلب بنهر ضا ساخته بروم بند  
 و حقیقا و نامینه که خشک نشود و بار بار بعد چن ساعت تبدیل فرمایند فصل هفتم در حرکت الاذن اکثر سبب خشک شدن  
 چرک گوش این مرض غرض میشود و همدان باید که پارچه آب گرم تر کرده گوش را از آن صاف کنند فصل هشتم در هر الاذن  
 من الاصوات العظیمه این مرض مشابه است با آنچه در امراض این من الغرض الشعاغ مذکور شد و اصل سبب در آن  
 کموری عصب حساس است و اکثر احوال در درم اندرون ثقیه حادث میشود خصوصا اگر گاه و درم مذکور بجای واقع شود که عصب  
 آنجا میماند و این درم با دانه ضعیف بود و در آن محسوس نشود زیرا که عصب حساس برای اصوات است نه برای اوجاع بلکه هر گاه  
 این درم زیاده شود و در عضای مجاوره آن بروز و ظهور کند آن زمان که عصب حساس اوجاع او را که آن کنند الم ظاهر شود و همین  
 سبب این درم نه تنها ضعیف میباشد بجز هر باب الاذن علامت دیگر ظاهر شود و علاج چونکه این درم بسیار ضعیف ضعیف است علاج  
 آن ضعیف مانده صاحب بحالت را باید که حای که اصوات عظیمه نشود و غلظت آنجا بوده باشد خود را از رفتن آن مقام باز دارد و همیشه  
 پنبه در گوش خود دارد و پس گوش پنبه از پیش گرس نهند تقویت علاج تندرستی مشغول باشد و برای تقویت کینین آب آب بخورند  
 فصل نهم در قلاع الاذن این شقاق است که پس زرد و گوش ظاهر شود و علاج آنست که از آب گرم صاف اند و از آب پیا  
 کار بناس بشویند و اکساید آن نماند و شستن یعنی مرهم اکساید آن نماند و شستن آن نماند و شستن آن نماند و شستن آن نماند و شستن آن نماند

فصل هفتم در حرکت الاذن

فصل هشتم در هر الاذن

فصل نهم در قلاع الاذن

در گوش

و غن کار بکلیه کلاه و مایه بدن بسیار مفید است تا آنچه ازین وقت بروز دندان اطفال عارض شود آنرا فقط از آب گرم حیات  
دارند و بتدریج بدن متعین گردد و الا ضرر خواهد شد **باب پنجم در امراض الف** و در آنهم چند فصل **فصل اول**  
در تشريح الف بدانکه الف هم مرکب است از اعضای متعدده مثل عظام غضاريف و عضلات غشائیه که میگویند میمیرن است جلده  
عصاب لیکن عظام آن پس بهفته اندکی از آن عظم مشایخ غشاش که از جانب خلی الف در ترکیب آن خلل شده و عظم مشایخ بالا  
عظم مشایخ غشاش آنست که است شوم استخوانیکه دقیق است از زیر استخوان مشاشی از وسط آن رشته بطور فاصل برده بین الف و خنجر تیغ خضوف  
متوسط بین الف و خنجر است بدان متصل شد و شش عظام کوچک تیغ که همه در صوت مثل سفینه اند و در هر پهلوی استخوان متوسط بین الف و  
رشته زان بر استخوان کوبلترن متصل اند بخوبی و بی برکت استخوان کوبلترن است و پشت کعب آن در فضای خنجر است و کیفیت  
اتصال از تصویر آنرا بخوبی واضح میشود و فواید بدن عظام مثلثه مذکوره بر این صوت متعین اند یکی آنکه بسبب آن مجری الف تنگ شود  
و حیوانات و غیره اشیای خارجی آنرا به سبب آن نرسد و حرکت نروند و هم هوای خارجی بر حرارت کیفیت خود نرود و دوم آنکه بسبب این ارتفاع و غشاش  
و تیغ میگویند میمیرن که در آن عصاب مشایخ منتشر میمانند یاده آید و از آن قوت شم قوی گردد و سوم آنکه چون در میوکس میمیرن مذکور عروقی  
زیاده میباشد از آن در آن خون یاده آید و از آن درین موضع گرمی پیاپی شود و در فصل بارد هوای مستنشقی گرم شد و در ریه رسد بر ضرر  
برود خنجر و در خون خلل نگردد و الا چون فصل گرم شود یا جوش خون گرمی آن پدید شد حاجت به تنگی بیشتر داعی گردد و درین وقت از زیاده  
کشیدن هوا و اکثر استنشاق میوکس میمیرن سست و سرد شد و برید هوای مستنشقی نماید از آن گرمی خون نرود و در استخوان کوبلترن  
یکی از جانب میمیرن دوم از جانب یسار از زیر چشم آمده و در ترکیب الف شامل شد و در استخوان قریب مجوف است که فصل آن استخوان پیشانی  
از خارج برآمده در طول خود با هم متصل شدند که بقدر افعال آنها صوت نصف انبوه پدید میشود و اینها در طول قریب یک مثلث است سیده اند  
بر تمامی آنها غضاريف شروع میشوند و هر دو استخوان کام از جانب بطن هر یک از آن بطور مایل رسیدند و الاضا و استخوان یکدیگر در خا  
چشم میمانند از جانب پهلوی بینی در ساخت آن شامل شدند و آنها را باخته گاش لکیر مل بون می نامند یعنی استخوان شک زیکه  
درین هر دو استخوان ثقیله است که از آن هر خنجر مجری شک را در خنجر می اندازد و اکنون بهفته عظام الف میشوند  
از آن عظم در هر دو خنجر مشایخ اند عظم مشایخ غشاش عظم مشاشی و استخوانیکه از عظم مشاشی برآمده در وسط الف نایک ثالث آن  
طولاً رسید و هفت هفت استخوان در خنجر جدا یافته میشوند و ده غضروف در خنجر پنج تا از جانب خارج موجود اند که در هر یک خنجر  
منحصر است که بر دو غضروف صغیر میباشد اینهمه در واقع اند و یک غضروف وسط خنجر در طول آنها آمده است چونکه غضاريف  
زیاده اند لذا بالائی آنها برای بط غضاريف عضلات کوچک پدید آمده شد تا با سبب آنها حرکت آنها در فضا تسهیل شود و الا  
جمله عضای الف در خارج جلده است چنانچه بر همه اعضا است در جانب خلی الف غشاشی منبسط است که آن میوکس میمیرن است یعنی  
مولد آب عصاب حسن حرکت در میوکس میمیرن منتشر شده اند و عصاب حساس و قوی قسمی که رواج طبعیه نموده و او را یک میگویند و این  
عصاب دماغ رسته و در عظم مشاشی برآمده اند یعنی در خنجر این صغیر دیگر در خنجر یک وج عصب یکگزین قدم دماغ رسته اند







فصل ششم در رومات

آتشک بران شاد بوند علاج عام نیست که کاشک نفقه محلول باب صامت ضعیف یا قوی موافق نجم بران نهند شاید زخم زکام کم  
 کافی باشد آنچه نسبت آتشک و علاج آتشک نماند بدین جوش کند لیکر جای که استخوان ان فاسد شد باشد تدبیر جوشش برین عمل نیاید  
 که برای فساد استخوان مفسرست بلکه درین وقت باید بود آتشک پاس همراه نفوق آتشک یا سار یا عریشه مغر سیست نبوشانند که این عمل  
 برای تقویت خون مفید میباشد اگر حاجت سهل بود سهل نوشانند فصل ششم در رومات یعنی جاری شدن خون زنی  
 از ابلهت گریک پس پاکش نیاسند یعنی هر بان خون از مینی اینجالت کاسی نافع و بطوست فراع عارض شود و زمانی بطوست مضر  
 مضر باشد مثلاً آنچه بطور بحر ان که لفظ مالودین است حادث شود علاجش تاخوت سقوط قوت نباید کرد و همچنین آنچه اگر کثرت و  
 جوش خون فدا دام که خفنه بر طبیعت جوع کند گران سبب این دفع نکرد و بپند کردن آن نگوشتند آنچه او گسستن غشی باغ  
 یا آورده و شکرین آن باشد این غیر ضرر و سقطه حادث نمیکرد این هم نمیکند الا آب سرد بر سر زنند یا بر و از خارج برداغ بند  
 تا از سردی آن خود بخود خون آمدن بند شود و دای مقوی عروق نوشانند ناگاهی بسبب صدمت وقت خون عاف حادث  
 میشود و علامتش کمزوری و خفافت لاغری بدن است و سفیدی اندرون لبها و چشم است و نبض ضعیف باشد این وقت باید که بزرگ  
 تدبیر پس خون برحل آرد و آن نیست که فوراً که دم چپ که سر باشد مثل قطعه آهن یا برن کوفته در شانه گوسفند پخته برطلول عروق  
 پس سر بر گردن بندند و دهنمای مریض را کشاده بسوی آسمان چنان بلند کنند که سفیدی مثل طلا شود و ازین تدبیر خبری  
 خون آمدن از مینی بند میشود و شاید بهین آن نیست که از ملاقات بارو بالفعل شخاع متاوی میگردد و از تادی آن باغ هم نشانی  
 و از اذیت داغ سوزی و لرزه در بدن حادث میشود و از ان در عروق انقباض پیدا شد خون بند میگردد و از بند شدن ششها خون ششها  
 می آید و دهنها از خون خالی میشوند پس طبیعت فوراً خون بسوی عروق خالی میگردد و از ان آنچه خون بسوی مینی میزنند از مین  
 باز ماند و رعات بند گردد و از آب آهن پارچه تر کرده در مینی نهند که از ان حجم بند میشود و همچنین ده پانزده قطره از آب آهن همراه یک لیس  
 آب تخم بعد پانزده پانزده و قیقه بیا نوشانند که ازین تدبیر هم بند شود پس از آن سفنج یا پارچه مینی را از طرف حلق بند بقیه میل  
 که برای اشکاف و ضوع است بپزند که از ان بالضرر رسد و خواهد شد و کیفیتش نیست که در دهن میل و موصوفت شده نهاده از طرف مینی  
 آورند چون تا اندرون حلق میرسد سر رشته را از فرا سب بگیرد و میل را بیرون آورده آن سفنج یا پارچه در رشته بسته بکشد تا مینی را  
 پر کند فقط و گاهی خون از گرده و کبیم صاعد شد از مینی دفع میشود و علامتش علامت مرض کرده و کبد است و ضعف نهاد اکثر این  
 بجانان قریب العمد بلوغ عوارت قریب العمد بدین عارض میشود و علاجش آنست که مینی را از پارچه پر کنند و علاج اصل مین  
 و تقویت کرده و کبد نمایند فقط فصل هفتم در تبهره خاص که در اعلی باطن مینی که در بعضی بلاد و طبعش کلکته و مرشاد آباد  
 میشود و علامتش آنست که اندرون مینی سرخ میشود و در مینی و ستر قریب بسیار شدید بود و پاتپ باشد و اگر ببردی آثارش میکنند  
 مودی بهلاکت میشود و علاجش آنست که بفرصت و آن در مختار نشتر یا آنچه حاد را سبب شد شکافته و در قطره خون پیون که از ان  
 فوراً در درجی خففت میشود بعد آب تر مینی بنوشانند که قریب از ان مهال شود و طبیعت همین گردد و بعد در ان بلاد آب بطورخ

فصل ششم در تبهره خاص

از سبب آن تر کرده بخوراند فصل هشتم در مرض منی که بطور خاص بلاد شل دلی و سینه عارض شود و آن دانه ایست که خارج  
 منی ظاهر میشود و اول بسیار خرد باشد بعد بتدریج در عرض خود زیاده شود پس دل در جای از آن قدسی بلند شده منجم میشود  
 و جای که انفجا شد از آن قدری کم خارج شد آنجا فرو رود پس در جای دیگر از آن همین عنوان برآمدگی ظاهر شود و مگانه فرو رود  
 تا اینکه تمام جلد که متورم شده بود فاسد میشود و علاج در آن مفید نمیشود و صحت حاصل نگردد و مدتها بهرین طو فساد و خرابی  
 آن میماند تا اینکه محل سکونت را ترک کنند آگاه صحت میشود و سبب آن فساد آب شرب آن بلد میباشد علاج هرگاه این شکر  
 حادث شود فوراً از آنجا به بلد دیگر نقل اختیار کنند اگر قش ممکن نباشد اول اصل نایس سرسور را آب حل کرده بر بشویند و اگر در  
 زیاده بود در هم آمیزند و صفا کنند و آنچه شکایت دیگر در خارج یا سینه بجلج آن پردازند و هر چه تهی که در آن افیون بود بزرجم آن و  
 مفید میباشد و هر چه سبب است باید بزرجم نهادن روغن کاربوک و ایلوث هم باید در آن مفید است فصل نهم در  
 زیاده شدن گوشت منی که قریب رتبه گوشت زیاده میشود بسبب آنکه غذا زیاده اینجا برسد و این را بلفظ گریک لب  
 او نام منی زیاده شدن گوشت منی مینامند این مرض در خارج انف یافته میشود و علاجش آنست که آنرا از کاتق قطع  
 قطع فصل دهم در زیاده شدن گوشت اندرون منی که آنرا امبری بوا سیر لالاف و بلفظ گریک پاپی نامند پاپی در  
 شان منی زیاده و کثیر است پس منی بخل یعنی پاست چونکه درین مرض سلیمهای کثیر و از جای متعدده میوکس میبرن انف نیز  
 که اصل هر یک شل پابران قایم دیده میشود و آنرا قایما یا این هم موصوم ساختند باطله آن قسمی است که از میوکس میبرن منی و شکایت  
 خانه داران و از عروق و قاق پر از خون موهت میباشد که غشای مذکور عروق مذکور در میوکس میبرن داخل میشود چنان معلوم  
 میشود که یا در پاپی ریخی یا در طبقه بالای جلد است نزدیما حادث شد اند العلایات مرضی را چنان معلوم میشود که چیزی منخرد و احیا  
 منخرد است یا دهن پس برای دفع کردن آن بذر رتبه منی را با جلد میبندد بسبب این دفع قوی عینت گاه گاه رعات هم پیدا  
 میشود و توافق در جات یاقی و کمی این سلیمها متشاق نشیم و منخردات نقص باطل میشود و آدم که مرض صغیر قلیل است که کم تغییر  
 بهینست انف پیدا نمیشود اما هرگاه مقدار آن زیاده گردد پس منخردات پنهان و وسیع دیده میشود و در آنجا منی هم وسعت ظاهر میگردد و  
 بسبب غم کردن آن شک چشم که همیشه از جانب منی جاری میماند از جریان خود از آن باز مانده از گوشه چشم جاری میشود و از عدم  
 استشاق از انف که دم بوازی روح هم مدرک نمیشود من بعد چون طیب اندرون منی نظر میکند پاپی پس ظاهر میشود و گاهی  
 این سلیمها خود طول شد از منخردین می آیند العلایات اول آنکه اسکالیم منخردان خسته بهینند که اصل سلع کجا است پس هر جا که دیده  
 شود آنرا از منخردین که بر سر آن خشونت میباشد منخردین اگر قوه غمهای کثیر و بزند تا شکسته از جای خود بیرون آید لیکن درین کنندین  
 حتماً از آن ضرر است که شخانی از منخردانهای منی که با این سلع متعلق میباشد همراه سلع مذکور وقت کندیدن از جای خود  
 بیرون نیاید چون درین عمل غم کثیر خارج میشود و لهذا باید که سلیمها را یکبارنه بر کنند بلکه یکبارنه از آن بعد یک و هفتیه بکنند  
 و بعد کندیدن هوا حد پارچه آب شرب یاقی محلول تر کرده در منخردانها بسبب آن خون هم بند شود و هوای خارج منخردانها هم بند  
 شود

فصل نهم در مرض منی  
 در امراض انف  
 در امراض انف  
 در امراض انف

فصل نهم در زیاده شدن گوشت منی  
 فصل دهم در زیاده شدن گوشت

در امراض انف

فصل یازدهم در دروس تیرک

و چون گفته رفت جمله سلها کنند شوند و نخران آنها صاف شود و او به مقوی میوکس میسیرن مثل گالک ایست یا مان گالک ایست یا سنجو  
کینو یا سفوف کات سفید در نخر اندازند یا سلوشن سفید کات زنگ یا سلوشن شب یا فی بطور زرقه در بینی رسانند و اگر نخران  
المسح و تشرطه همراه آب ساده آبیخته روزانه دو سه بار بنوشانند و میگردانند از شکون و کور گرفته در یک انوش آب ساده حلقه از آن  
در نخران به زرقه رسانند نفع بود و اگر بجای آن به لیم را شراب و قافا استعمال آرند جایز است و غرض از تقویت میوکس میسیرن  
الف است که تا مرض باز نعود نکند و فصل یازدهم در دروس تیرک فی نخرانی بفتح و او سکون را می مملو و کسر میسیرن  
سین مملو و کسر سکون یای شناه تختانی ففتح زای مجوه سکون الف و کسر یای شناه تختانی یعنی کرم بینی است چه در نخر  
کرم و تیر زای یعنی بینی است و این مرض در بلاد بارده بسیار قلیل در ملک های کرم زیاد پیدا میشود خصوصاً در مرض وینا  
آن بضم الف و سکون او و کسر یای مجوه سکون یای شناه تختانی ففتح نو سکون الف است که بینی بسبب قبح فرو نشیند و آن  
ریم و طوبات جاری ماند و اکثر در او آخرو ضعیف است که بنده ای حالت پیدا میشود و همراه آن طوبیت فاسد فن از نخرین جاری  
و گاهی در اطفال نوزاد سال هم وقت بروز دندان از بینی ایشان طوبیت سفید بدوی عفونی می شود و لیکن ضرورت  
که در اینها هم در بینی باشد و این قسمی از افرینا است که بعضی اطفال یافته میشود باطله چون ای حالت پیدا میشود اکثر دیدن  
در الف پیدا میشوند السبب بیش نیست که هرگاه طوبیت عفونی از بینی جاری میشود کلس کلان نیلگون که آنرا بلو باطل فکلا  
بکسر یای موحده و هم لام سکون و او ففتح بای موحده و سکون الف کسری هندی و سکون لام ففتح فاولام و سکون الف  
و کسر یای شناه تختانی یعنی کلس هرگاه بول نیلویی باشد دنیا مندر که بلو یعنی نیلویی باطل یعنی بول ففای یعنی کلس است  
پنجرین در حال خواب یا غیر آن شسته بیضه با میسیرن طبع که در موضع عفون هیچ با ترشیت یا بند زنده مانده نشستن آن  
در نجایان اراده بود و برای خوردن طوبیت عفونی این کلس را در لفت لاسن ففک و اعمی ففک یا ففتح میسیرن سکون سین مملو ففتح کات  
سکون الف ففتح و او سکون الف و کسر میسیرن سکون یای شناه تختانی ففتح و میسیرن سکون او و کسر یای مملو ففتح یا  
شناه تختانی و سکون الف هم نامندی کسی که برقی که انسان اعمی آید بروی میسیرن باطله هرگاه این کلس بیضه با نخر میسیرن  
از آن بعضی همراه طوبیت نخرین خارج میشوند و بعضی از آن نذر ریه نفسان لایمیزند پس آنچه بالا رفت از آن چه با نودی بیرون  
آمده در میان هر دو بر و جانی که اصل الف است و آن مفصل عظم مقدم را می مفصل بر و است و اینجا اندرون آنخوان گوی ففته  
میشود درین گویان چه با میسیرن هم در عظم کاعلی که در آن دندان میباشد قریب بینی هم گوی هست در این گویان بین  
می مانند بعد از آنجا در محل خیم بینی بلکه در تمام گوشت بینی اینها داخل شود عام میشود و چنانکه در مفر شفتا لوی عفونی که مملو  
میشود همچنین گوشت بینی عفونی هم این کرم میمانند ازین لحم عفونی غذای خود گرفته کبیر میشوند آنکه گاهی در طولانی با نخر نیفت  
میشوند و در عرض شمن آنچه هست عدد داخل میشوند هرگاه این کرم را بعد بیرون آمدن از بینی در ظرفی پوشیده  
در آن دارند تا آنکه غذای خود گیرند بعد چند روز این کرمها کلس موسوم به بلو باطل ففای میشوند و علامات اول قبل



و در آن عصب و انداختن در همین مغز و در اثر این می آیند از ثقبه که در آخر سرهای استخوان که بطور مدور در لثه واقع اند افتد  
میشود چون مغز استخوان لثه و عصب متورم میشود و ریم بر می آید و لثه ضعیف و مسترخ گردود و در آن مشق و بیشه و پس از آنکه خون  
میشود از آن چیزی در لثه و ثقبه اند و فاسد شود و از آن در دندان هم فساد راه یابد پس بسبب فساد و تحریک گردد و آخر خود را از لثه  
و محتاج قطع کردن بعمل می آید باینکه لثه و شفتین پس آنکه لثه از سه ششمار که به است بالای همه که ظاهر است میگویند که  
میباشد زیر آن غشای خانه دار است که در آن اورد و در اثر این ریشه های عصب و ج خاص را می کشد که آنرا حسن انداز میگویند  
و زیر این هر دو غشائی است ریشه دار که بر جمیع عظام بدن محیط میباشد اما شفتین پس مرکب اند از غشیه و عضلات و اورد  
و شفتین شطایای عصبی آنچه ظاهر و در خارج بود غشای میگویند زیر آن غشائی خانه دار است که در آن عروق  
و شفتین اند و زیر آن عضله است و شفتین شل و صغیر و خون زیاده است و در هم آن برودی به میگردد و در آن ریشه های  
عصب و ج خاص و ماغی هر دو آمده اند که بسبب آنها احساس و حرکت از آنها صادر میشود و شفتین پیاده است  
فتد که فصل دوم در ضعف الاسنان و علل آنست که او به قویه سنونا و مضمضه با احتمال از پیش اینک که  
بیا از شراب مجتنب باشد مری را باب حاکمه مضمضه سازد و اگر مجتنب نباشد شکم مری بخت قطره را در آب حاکمه مضمضه  
ایضا شنب میانی دهه گرین باشد که یک لشن و حاکمه مضمضه سازد ایضا سما که صاف شمی گرین در آب ده که در لثه بود  
حاکمه مضمضه سازد و اگر هر سه دارا با هم تخمه مضمضه سازد و اقوی میباشد فصل سوم در و د الاسنان باید است  
که در کتب طبیه و غیره این اسم نوشته اند لیکن نقول اوصاف است چنانچه شرح سابق دانسته میشود که در دندان خاص لیاقت  
شدن که مری نیست چنانچه مرکب است از جنم جامی و استخوان لیکن آنچه اطباء را در غلط انداخته نیست که گاهی در مغز استخوان دندان و  
و م پیدا میشود و بسبب آن لثه هم تورم میگردد و در دندان در عظیم پیدا میشود و بعد از آنکه راه لثه و دندان بر می آید و بسبب  
و دندان ثقبه حادث میشود و ریشه های ریم از آن ثقبه که بر می آیند از سر و مان دیدند و گمان بردند که مری افتاده بودند از  
ثقبه دندان و صورت ریشه ریم غلطی افتادند لیکن در تشریح تحقیق ثابت نشد فصل چهارم در ضررهای الاسنان  
اینهاست اصل مرض دندان نیست بلکه از علامات امراض است اکثر اطفال را وقتیکه در شکم ایشان که مری پیدا شد یا بد  
بود یا که مری مرض شکم بود این حالت عارض میشود و همچنین وقت بروز دندان اطفال و هرگاه و م و غشائی و ماغ ایشان بود  
یا در طفل آب کثیر پیدا شد یا شکر و می آن غیر شد یا این حالت عارض میگردد و بجهت این حالت عارض میشود علاج اول بدریافتن  
کوشن بعد از آنکه آن مشغول شود و فصل پنجم در ضرر الاسنان آنهایی است که بدلائلک موضوعات غیره از دندان عارض  
میشود و آن یا خارجی بود که از خوردن اشیائی ماکوله و مشرب عارض شود یا داخلی مثل آنکه از آمدن فی حامض پیدا شود  
اول ترک استعمال آن ضرر و در ثانی اقرار ازین فی بحسب مکان ضرر است آنچه موضوعت معده را دفع کند بنوشانیدن  
سودا یا سنگ نشیا یا پاپاس یا آبکه در آن طین قهوه یا راه حله ده باشند صاف کرده بنوشانند و شکم شمی حامض پیدا نشود و بکار

فصل پنجم در و د الاسنان فصل ششم در و د الاسنان فصل هفتم در و د الاسنان







در آن سو دا کار بناس یا پناس کار بناس حکم کرده باشند مفید میشود لیکن باید که ده پانزده گریز ازین هر واحد بایک نوش آب ساده  
حکمرده مضاعف نمایند فصل نهم در خضر و تغییر لون انسانان باید دانست که بمقابل گوش غده هست بزرگ عارض  
بزرگ است علی و از آن جاری میشود رسته اند مجری کلان زبان زاندر و آن خضار و دهان تا دندان که از انبساط منتهی شد و آن  
غلاب را از خود بسوی بان میریزد چنانچه اکثر اوقات هرگاه انسان خوردن طعام شروع میکند در فک علی حساس جمع میکند  
و چون و سته لقمه خوردن در دفع میشود بیش نیست که هرگاه طعام در دهان میرسد موضع شروع کنند خوردن و در دفع طعام نیز  
میشود و آب که در آن مجتمع است در آن مجری میریزد و چون آب آن مجری یا نوشود بسبب امتداد حصول تمدد در آن در و پدید میشود  
و چون آب مذکور از آن در دهان نخته میشود مجری خالی گردد و در بر طرف میشود بالکل ازین آب غده بود که در دهان می آید خضر دهان  
میشود و چون باین آب قریب و دندان اجد که در فک است و اندر یاده مکتب میکند ازین سبب آن دندان خضر زیاده پیدا میشود و چون  
در خضر ناسفت آن لایم ماده است این همان آب وجود است که از غده موصوف در دهان می آید و آن غذای جمیع را از خون میکند  
و ممکن نیست که این غذا بزرگ و خیزد خون جدا شود و اندر اسوای آنچه گفته شد منسوب بسوی سبب دیگر میشود آن شد این جسم که موصوف  
بعضی است گاهی چنان کشیده میشود که سبب آن کم ذاتی میگردد و دندان را از فک خارج و متحرک گشته ساقط میشود و عارض است  
و دندان اضا فکند این جسم از آن جدا گشته بعد از آن که ازین فک ایدر باشد تا آنکه پدید آید و سبب است که صفت گریز بایک نوش  
آب حکمرده از آن مضاعف نمایند و این مضاعف می شود که سبب آن که در دهان است بسیار مفید است تغییر لون دندان بسبب کشیدن  
خوردن تنباکو و بزرگ تبدیل خصوصاً هرگاه با آب یک تیر خورده شود نیز پدید آید که در دهان از تیر می حدت آب که بجز جسم جامی بر دندان است  
زوده میشود و بخوان آن ظاهر میشود آن را گریز و علاج سبب منخیر را ترک گشته برای دفع کردن رنگ بر دندان آن طریق قوی است  
و کافور بود و در آب یک و از پارچه بایک سفت بیرون آورده بر دندان مالند از غل چنانکه کوفل است بایک سوده بر دندان مالند  
فصل دهم در بجزر یعنی بدبوی دهان و آنهم با سیاب کشی می افتد از گرسنگی نه خوردن طعام از بدبوی طعام هرگاه  
زیاده خوردن و گرسنگی زده و سیاه و دوده شود و سبب آن طعام متعفن گردد و حاد میشود و از زیاده خوردن شیرینی هم پدید آید  
و خلقی هم میباشد چنانکه بعضی بوی عرق متعفن بود و از خوردن سیاه گاه و دهان بوی متعفن حاد شود و هرگاه در لثه زخم شود و متعفن  
و همچنین هرگاه در طبع زخم باشد هم حاد شود و هرگاه در مرض تشنجان بینی خراب و متعفن گردد و در گلوز جمیع باشد که از آن  
سیوکی سبب آن فساد و متعفن میشود این مرض حاد میگردد و سبب که تشنجان بینی متعفن فاسد شود و بجزر پدید آید و گاهی از مرض کشنده که  
در دهان پدید آید و از زخم سیاه و فساد و متعفن شدن خواه در بعضی یا در کل راه یافته باشد بجزر حاد میشود علامت آنچه از فاقه بود در گرسنگی  
دلیل است بعد خوردن طعام فحش میشود و آنچه بسبب بدبوی طعام است در آن آروغ ترش عرق اذیت معده و گرمی شکم آید  
و به حال شاهد بود و آنچه از خوردن شیرینی باشد زخم سبب است بهر حال و آنچه خلقی بود از اول لادت باشد همیشه دندانها از خوردن  
سیاه بود و بران جوش آن آنچه از زخم شده بود بر آن زخم شده و آنچه از زخم کلا و بان خلق متعفن فساد تشنجان بینی باشد نتیجه آن است



سفیدی از دهن بر طرف شود جهت نفع ساختن سرخی دهن چهار گریں کاشک نقره در یک لیس آب حل کرده و عینک طفل بکشد  
دین کشاید در دهن از قلم سوسن آلوده کنند اگر زخم ناگلو باشد تا اینجا این دوا را رسانند و هیچ خوف نکند و در باره طفل احتیاط نمایند  
که شیر غیر مادر را نخورد و اگر یک حصه آب کاک و دو حصه شکر گاو یا بر با هم آمیخته بنوشانند برای دفع ترشی معده مفید خواهد بود  
لیکن این قوی لاین است که شیر حیوانات نشید باشد اگر فقط شیر مادر یا شیر مریض نوشیده باشد با وجود آن هم ترشی و معده زیاده بود  
گاه آب کاک قوی قدی بنوشانند و علاج جوانان پیران تقویت خون نمایند از آب کهنکین خصوصاً گاه در آن مهال بسبب حمه آن معده و اسهال  
نشاید این قوی قوی و برب یکم در دوا و آب ساده حل کرده بنوشانند و در برب میگذرند شیا همراه سوذا یا اگر گریس بود بر  
سفوفت گریس همراه آب صاف بنوشانند و کمین هر گاه برای حبس اسهال هند مقدار خوراکی زده گریس تابست گریں برای جمیع این  
معتدل الحاقه باشد اگر برای آوردن اسهال هند از یک رام تا یک نیم رام بعد چهار ساعت بنوشانند و چون قلع کبار  
باز جیر جمع شود و گریں کین سه گریں بمهر صبح و بقیه شام بخوراند و کلو لید آف پلاس ده گریں آب حل کرده روزانه بنوشد  
نوشانند چون که درین مرض غذا مضطرب میشود لهذا باید که غذای سبک سهل لا نهضام خوراند از خوردن غذای سخت میکوس  
مینبرین و دهن معده را کافیت خیم و آب سید پس شیر آب فروج کرده بنوشانند و اگر دانه و خیره اغذیه که ملائم و سبک  
خوراند و شور بای سبک هند و دهن مرض چون سبب اسهال است لهذا تبدیل هوا ضرورت است در هوای صاف و باران و در  
سلوشن کاشک نقره قوی که گریں کاشک نقره در یک لیس آب صاف حل کرده باشند در دهن طلا کنند و صیل کاشک نقره  
بششم گریں یا مغز نان پاویا آرد گندم باب خمیر کرده حسب بسته وقت غلای معده بخوراند تا که میکوس میبرین معده اش کاشک  
نقره برسد همراه ستمال کاشک نقره کاک معده نرسانند و الا اثر کاشک نقره ضایع خواهد شد آنچه در کتب عربیه در علاج قلع  
گرفتن فصد نوشته اند غیر صحیح و بگزینا سبب نیست زیرا که بر کوفی خون زیاده معین خواهد شد و قند کرفصل دوا و دهم قلع الاسنان  
بیشتر نوشته شده که هر گاه در دندان افضل شیش فساد پیدا کند و بیخ آن کم میشود حتی که بسیار قلیل و لحم نشه میاند آن زمان دندان چنان  
و همچنین هر گاه نشه شود و از آن بیخ دندان بیرون آید دندان ساقط میشود و صیل یکبار هر گاه دندان اغذای خوش ترسین آن ستر  
میشود و دندان می افتد هر گاه فساد و دندان نشه چنان باشد که برای آن قلع دندان ضرورت میشود این وقت از کلبتین برای  
هر دندان جدا جدا برای سهولت قلع ساخته شد قلع کنند و از دوا و از قلع دندان نمایند که میکوس میبرین آن ضرر میدهد فصل  
سیم در دهم در دوا و دهم قلع الاسنان این مرض بخوردن اشیای صلیحه و نشه و همچنین ز قطع کردن اشیای صلیحه از دندان  
پیدا کرده و زیاده آبداری دندان با عیات میزد و از خوردن آب که هم همراه بتبول هم پیدا میشود زیرا که او جسم جامی را که بر دند  
سیر باید و ز قند ز قند هم مردم را عارض میشود که آبداری کم میشود علاج و شوار است اما ترک سبب جیب است فصل چهارم و دهم  
سیلان لعاب دهن و دهن اکثر اطفال را وقت شروع بروز دندان عارض میشود و از خوردن سیاه هم پیکر دود و هر گاه  
گلو قفل میشن و دهم شود و سبب آن از دوا و رطوبات دهن بنگرد و دهم این حالت عارض میشود و از خواب گران و قیل هم پیدا

فصل دوازدهم در قلع الاسنان

فصل چهارم در سیلان لعاب دهن

نکته

میگردد و درین وقت هم از در او سو قوت میشود و هرگاه بیوشی در امراض و این شیش سر ساقم لقوه عارض گردد و سیلان دشت میشود  
و هم درین بیماری ایحالت عارض میشود و هرگاه در کرم گرم پیاپی عارض گردد و لکین این خواب اکثر وقت شیش شد علاج حسب سبب  
کمند حاصل پانزدهم در تشنگی الشفت یعنی ترکیدن لباز هوای سرد و خشک یا ده این مرض عارض میشود و گاهی از ترشی رسد  
و اند خورد و لب از قند چنانکه در کام مری و برکناره نخر افتد و گاهی در مرض تشنگ میشود علاج انچه از هوای سرد باشد آن کافور  
یا سرم کافور بر لبان یا کلبه سرن یا نند و اگر ازین نشو کاسک تقوی بطو سلوشن یا ج کزده بر آن نهند گاهی در وسط شفته سفید گاه  
برینتهای هر دو شفته برین شکافنگی پیاپی شود علاجش آنست که وقت شیب برین نختن ریش از پارچه زرد آورده اندرون خم پر کرده خوابند  
که صبح صحت حاصل خواهد شد فصل شانزدهم در ورم الشفت گاهی در شفته سفلی ورم زیاد میشود و پیش آنست که در زیر  
که ریش بریدست نخل شیش عارض میشود و سبب آن در لب و دومت بعضی خبرائی تره اوست میگوید پس برای اخراج آن جسم فاسد  
بیت طبیعت هم پیدا میکند خون یا ده جمع میشود و سه چهار جاد لب شکافته ریم خارج میشود چنانکه در سرطان از مقامات کثیر و ریم  
خارج میگردد و او ادم که این فساد بر طرف نشود صحت حاصل نمیشود و گاهی بسبب بعضی معاد پیدایش آن ترشی در آن این مرض  
پیدا میشود دیگر خفیف بود و هرگاه دندان بر لب افتد و از آن لب نمی گردد هم در لب ورم پیدا میشود و هرگاه مرض کثیر در لب افتد  
بهم در لب پیاپی شود علاج سواقی سبب باز آن کوشند فصل هفتم در پاره و شکستگی است و آن بفتح بای مو حذافه  
و سکون الف و هم رای جمله سکون او و قبح نای است بی سکون یای شناه تختانی و کسری هندی سکون سین مملو یعنی مملو  
پیرا و میگرد گلائیست یعنی غده مولد ضایع درین این غده هستند که در ورم پیدای میکنند و هرگاه در این غده کرم باشد که در  
صغار اند اول پیرا و میگرد گلائیست بای مو حذافه فارسی و سکون ای مملو و هم الف و سکون او و کسری هندی و سکون یای شناه  
تختانی و سکون ال هندی و آن قریب گوش در ضایع است لهذا یابین چشم کرم کرده شده چنانکه درین غرض گوش است یا بعضی وقت  
است و مملو از آن قریب گوش است دوم از آن غده موسوم به سبب الی بفتح سین مملو سکون بای مو حذافه و قبح مملو سکون الف  
و کاف و کسری سین مملو سکون لام فتح الف کسری مملو سکون یای شناه تختانی است و سبب بعضی زیرین کسری مملو سکون الف  
زیر فک سفلی یافته شد و انهم دو تا هستند که در آن نخان فک سفلی یک غده است یعنی شناه و هم از آن موسوم به سبب لنگو است بفتح  
سین مملو سکون بای مو حذافه و کسری سکون الف کاف فارسی و فتح و سکون الف و سبب یعنی تحت است و لنگو یعنی زبان است  
و این غده هم دو تا هستند زیر زبان و در رخ یافته میشوند جای که در فصل در فک سفلی دیده میشود این غده باب در ورم پانزدهم  
میریزانند که غده قریب گوش طوبیت خود را قریب غرض اول که متصل نواهد است میریزانند باریجه قری که خوراک از چهاری صغار است شیش  
و غده که قریب نخان فک سفلی است آن یافته میشود زیر زبان در هر دو پهلوی آن از مجری واحد طوبیت خود را میریزانند و غده که در  
پس نخان فک سفلی زیر زبان واقع است طوبیت خود را جای که بر زبان باشد دندان زیرین متصل میشود آنجا از دهن بای مجاری  
صغار خود که در عدد از هشت عدد تا بیست عدد باشند میریزانند و سبب حدت مجری در هر دو غده اول تختانی نیست که آن هر دو آب مملو

در تشنگی الشفت  
در تشنگی الشفت  
در تشنگی الشفت







نمونه جلگه بعد چهار ساعت نوشاند و آنچه بسبب ندران است و ندران هوایی را بشکنند یا اجزای آنرا که بسبب تیزی خود  
 بزبان اذیت میرسانند از سوپان آهنی چنان برابر کرده دهند که بزبان اذیت نرساند و آنچه از ترشی بعد است در آن شکر  
 کاربناس زده گرمین تا پانزده گرمین در آب جلگه یک دساعت بعد غذا یکبار بخوراند و اگر دوباره اعتدال بخوردن غذا باشد و باز  
 روز و شب همین زن بخوراند یا در سبب گرمین سوژا کاربناس گرمین بخوراند یا سیگنیشیا کاربناس گرمین در سبب با هم بخورند  
 بعد دو ساعت بخوردن غذا بخوراند اگر قبض شکم بود پل ریای کمپوئند پانزده گرمین بعد چهار ساعت بخوراند تا بجا  
 آید شود و همچنین صفوف جلیک کمپوئند از سی گرمین تا پهل گرمین بعد چهار ساعت بخوراند تا اجابت شود و آنچه از لری نری  
 بود در آن شکر کنیای صاف بتم حصه یک گرمین و پنجم اگر دکنیم یا بالائی که از شیر گریه کند یک یک حب بعد چهار چا  
 ساعت بخوراند یا عرق سم الفار بعد چهار ساعت و سه قطره همراه آب ساد بنوشاند یا بعد از هر گاه بعد استعمال آثار ضرر  
 آنرا که ظاهر شود و آثار این هستند که چشم سرخی ظاهر شود و در دساعت عرض اگر چنانکه در کام میباشند در بول سرخی ظاهر  
 گردد و در گره و مشانه سوزش پدید آید و گاه گاه هرسال پدید آید آن زمان تا زوال این آثار و اعراض استعمال عرق سم الفار  
 کنند لیکن چون اکثر همراه این مرض خشک میباشند اگر خشک بود و اگر غلیظی از استعمال سم الفار آید و آید شانس سازسار یا یا  
 نمونه عیدیل نوشاند و هر گاه آثار ضرر سم الفار بر طرف شوند باز حب عرق سم الفار بستمو سابق بعد غذا بنوشاند فصل سوم  
 در جفاف لسان این حالت فی الحقیقت علامت است خود مرض نیست اکثر حیات بسبب جوش خون عارض میشود زیرا که  
 در آن وقت میوکس میبرن طوبت خود پدید آید و چون بسبب گرمی در عروق بسرعت میرود و قرار نگیرد تا رطوبت از آن جدا  
 شود و خون هر گاه در عروق آهسته میرود و در آن جوش نبود میوکس میبرن طوبت یاده پیدا میکند و از خوردن نشسته قهیم هم  
 خشکی در زبان میشود و سبب آن جوش خون است و گاهی زبان عظیم شود و دهن بر آید از رسیدن هوای خارجی خشک شود  
 و از هوای گرم خشک یاده آمدن عرق بول و گرمی شکم هرسال قهیم خواهد بود و بفرغ خوردن سهول بود یا بطور مرض چنانکه در غصه  
 بود و زبان خشک میگردد زیرا که آب از خون جدا میشود و بالجملة بسبب که خشک زبان باشد تبدیل از آن ناپدید و تدبیر عام نیست  
 بر کونکه ممکن باشد زبان را تر دارد و آب تهر نهدی و آب آبی بخوراند بنوشاند و از آب بار بار مضغه کنند فصل چهارم  
 در شتر خای لسان گاهی غلیظی بود و سبب آن ماغی باشد این لاعلاج است و گاهی بسبب فالج عام بود و زمانی سبب  
 فالج خاص باشد آن چنان است که از جای که عصب حرکت آن برای غلیظی از داغ رسته است آن بعد عصب غلیظی و ملامت  
 شود و از آن عصب ضعیف و بیکار گردد و کار خود را ادا نکند و گاهی زیر زبان قریب آن آنچه میوکس میبرن مجتمع شده میباشد  
 و آن را حضان زبان میگویند آن از جای خود سبقت کرده زیر نوک زبان پیدا شود و این حالت در اطفال نوزاد و بزرگ  
 میشود و باین حالت طفل بیستان نگیرد و شیر نخورد و از این نشانه میشود که این طفل کلام فصیح نخواهد کرد و این پیش از مد میوکس  
 میبرن گاهی چنان یاده بود که طفل از شیر بیستان و خوردن شیر غریب بود و گاهی چنان کم باشد که مادام طفل بزرگ شود و نشانه

فصل سوم در جفاف لسان

فصل چهارم در شتر خای لسان





کافایه یعنی بان است دوم بسبب ورمیکه در زبان افتد و آن حمی سهم باشد سوم اینکه شل خراج و دمل که در جمیع اعضای بدن  
در آن هم این صم حادث شود و در هم پیدا کند آنرا پس آب تنگی یعنی دمل زبان مینامند علامت آنچو بسبب یا دمی لسان  
افتد گاهی اینقدر زیاد میشود که زبان از دهان بیرون می آید علاجش باد و غیر ممکن بلکه از کار گذشت آنرا نیز و کم کنند از آن رو  
دهان و در دقیقه قطع آن است که اول چند جاز سوزن خیطه در زبان انداخته بدارند بعد جاییکه خیطه است آنرا گذشتیم پیش نیست  
قطع کنند و بعد قطع آن خیطه را از زیر بالا با هم فرو کرده و چند خیم قطع بروی صحیح شود و آنچو غلظت لسان با همی بود و آن کثر از خون  
سیاه میشود و در لعاب یاده از دهن می آید کلام بر شواری میکند خوردن طعام و نوشیدن آب تسهیل باشد بلکه تنفس هم دشوار  
بود و بدو فکر کردن گلو مرید می اندرون مینگشاید علاجش آنست که آنچو خط مستطیل در وسط زبان است موازی آن در چین بسیار  
نشر زخم کنند و خط مستقیم بکین قندی عمیق تا زیر کس سیمین بان سکه از آن آب فوخرج شود و در دست و زبان هیچ غلظت  
و آنچو از بزرگدن خراج یا دمل بود و در آن فشرده یکم بر آن زرد و صم دفع شده صحت حاصل شود و غیر فصل ششم در ضعیف لسان  
و این را بر زبان لاشن ران قولا که غشی ضعیف نور و میگویند چه در آن بفتح رای مملو و سکون لغت و نون یعنی ضعیف دیولا بضم یاء ثانی  
تحتانی سکون او فتح لام سکون لغت یعنی کو چاک است آن غلظت زیادتی است که زیر زبان ظاهر شود و آن گاهی در هر دو طرف زمانی یک  
طرف نیز زبان می افتد و در سیکس سیمین معلوم میشود که آب غلیظه معلوم است این آب بسیار غلیظه و لرح میباشد و شش نیست که در دهان  
زبان که در دندان بولد صابان و تشرک آنرا در مرض پاریش بنیل امراض دهان مذکور شد که از آنجا آب دهان میزند چون  
جاری آنها نباشد و یکیک در دهان میخورند در همان جاری جمع میشود و آنرا وسیع و عظیم دیده میشوند علاجش آنست که از کار گذشتیم  
آب غلیظه از آن بر آرد و بعد شش کاغذ آب بیرون کردن اصل کاشک نقره و از خیم کشند تا در لب با همی خیم و صم پیدا شد با هم خیم  
رطوبت لزج که در آن است با هم چسبید خیم مندل بند کرد و چه اگر کاشک نقره کشند این خیم بند نشود چون این خیم وسیع است  
آب غده با آن این سو جاری خواهد ماند و بسوی سر اصل خود جاری نخواهد شد هر گاه باین معتاد شود بعد صحت تمام شود و خواهد کرد  
و چون از کشیدن کاشک نقره بند کرد میشود باز و می کشند و غیر فصل ششم در و داغ سپاه که آنرا پس گویند آنرا بلغ لاشن  
گویند و بیشتر این داغ از مادر در ولادی آید و بر جلد ظاهر میشود در هر جلد عضو که باشد پس هر گاه که بر زبان افتد و عظیم غلیظه گردد و لسان  
میدانند که در زبان من مرض است شادی میشود و سببش آنست که عروق جلد یاده وسیع شده رنگ خود از زیر جلد ظاهر میگردد  
علاجش آنست که چند طرف بزرگ سوزن خیطه بر آن انداخته و پنج آنرا تنگ کنند تا رسیدن غذا بآن موقوف گردد و از آن  
خود بخود آن داغ ساقط شود فصل ششم در برآمدگی گانیکه مشابیه مسته بر زبان افتد اکثر در مرض تشنگ زبان  
در جای است و متفرق بر لنگی باشد مسته بصورت مختلفه مدور و مثلث ظاهر شوند و در آن برآمدگی های کوس سیمین مثل انباش  
سفید خیز و هم رنگ ساکودانه پنجه معلوم میشود و از آن بیچاره را تکلیف میرسد و متضرر میگردد و لسان و علاجش تدبیر تصفیه خون کنند  
مثلاً ایواند چای سیم همراه سار یا پیر یا انقوع ختم نبوشانند اگر مرض نازل نشود سیاه نورانند لیکن از مرکبات سیاه درین صم سبک

فصل ششم در ضعیف لسان

فصل ششم در و داغ سپاه

فصل ششم در برآمدگی گانیکه مشابیه مسته بر زبان افتد



در خنق و انقباض عروق و قطع نخاع و درون نخاع زوال فقره اولی می شود و حیات با انقطاع نخاع ناممکن است  
فتک بچ و گاهی از زبادی ورم رخسار و گوش که اگر ایندگی کامل گوشت بخت انگیزی می پس بافت گریک رویش  
میگویند هم حادث میگردد و اکثر اطفال عارض میشود هرگاه بسیار زیاده شود هم از در و شو میگوید و یا جمله برای این هم عصبان  
که در سبب خناق نوشته شده در جات در زیادتی وکی میباشد پس مادام که بسیار زیاده نبوده تنفس تقصیر نخاع راه نیاید  
اما از دم قلیل هم در از در و شواری ظاهر شود زیرا که همین اعضا در از در و شواری می شود و تنفس حاجت باعث  
نیست دم آنکه آنچه خورده شود وقت از در و شواری بابت غلظت آن قدری خراش و غلظت و اعضا می شود و در از در و شواری  
می شود و غلظت بود اگر وقت کشیدن آن تنفس اش پیدا میشود و همچنین خوردن که هم شمی بارد و الفضل از پیشته زیاده میشود و از آن  
اجتناب و انقباض درین اعضا زیاده میشود بخلاف جوار الفضل که از آن تر خراشید میگوید و اما هرگاه از بیشترین متورم شود با هم شود  
و راه آمد و رفت هم را مانع شوند آنرا در تنفس هم دشواری ظاهر شود و عظام است هرگاه این هم زیاده گردد و هم عارض شود  
و در و شواری همیشه میماند اما وقت از در و شواری که در و شواری می شود و تنفس می شود و وقت از در و شواری که در و شواری  
محسوس شود و اگر زیاده نباشد فقط اندرون حلق محسوس شود و هرگاه این هم بسیار زیاده گردد در بان نسبی قدم نخاع  
درین فتح کند و لایع اسان رخ شود و آب درین نخاع و جاری گردد و بیمار برای کشیدن هوا درین کشاده دارد و این حالت  
خناق کلی گویند آن مهلک است علاج و این نیست که درین رخ فصد ندارد زیرا که زیاده از آن خون کمزور است و در  
زیادتی ورم خواهد شد و آنچه در گوش است برای اخراج و قلیل آن را به محل هم چسباند و بخار آب هم درین ساقه ها  
امر و این که بخار آب هم را بکشند که این را بسیار حال میشود و در دل بقدریک که در سبب آثار آب جوشانند و این صاف شود  
این آب طبع را در طرف کلان انداخته با پارا تا از نو در آن نشاند تا این موضع سرخ شوند و خون باین طرف جذب شود  
صراحت آب بقدر احتمال مریض باشد در اول مرض هرگاه شروع شود آب بکشد که اگر آب بکشد که در آب نیم گرم حلقه نوشانی کنند  
مفید است چنانچه کردن قلب ضعیف میشود و بسبب ضعف خود خون را که نسبی حلقه فی خواهد کرد و همچنین از کزین فی دفع  
میشود و از آن هم جوش از خون کم شود که بسبب آن نسبی حلقه فی در این رخ بر طرف شود و اگر باین تدابیر مرض نرود مسهل و سبب  
میکنند شیا سلفاس از یک هم تا نصف آنش همراه کینین که از پنج گرین تا ده گرین باشد بعد چهار ساعت نوشانی آنها  
شود و این درین قسمه مریض مسهل است اگر چه مسهل خواه از این مسهل داده باشند یا از دوائی مسهل که میکنند شیا سلفاس  
در ام با یک و گرین کینین را اند برای موقوف کردن جوش خون بسیار مفید است اگر ازین تدبیر هم ورم بر طرف نشود بدین شتر  
میگویند میبرن نوزدین شق کرده قدری خون بر آن بعد از آب گرم مضمضه کنند و بعد آن کاشک نقوه بر آن نهند این طور  
است گرین جمل کاشک نقوه در یک گوش آب قطره حلقه از قلم نهند و این هم نهند بعد سه گاه صاف یک هم با مسهل صاف  
حلقه در دهن انداخته که بخور نوشانی و یا شیر نرود و حلقه یک حصه آب شیرین مخرج کرده نوشانی و اگر هیچ حلقه غذا



آنست که غذا را وقت از در او بسوی قصبه نفوذ و چونکه در راه غذا در دهن سه مجری هستند یکی بسوی بینی و دیگری بسوی قصبه  
و سیم بسوی سینه و چون دوازده آن بنام کرده شد از آنحال غذا در مری که مجری سیمومی است خواهد رفت چنانکه در کتب طبیعه عریضه شده  
انکه لوات برای آنست که تا بنده بعد از بتدريج هوا برسد کباب بر سر و غلاف است زیرا که اصل فعل تنفس از بینی میشود چنانکه اصل خوردن  
طعام از دهان است و فعل بینی لوات را دخلی نیست اگر لوات برای اینکار بودی باید که بالای بینی بودی یا یکی در بینی و دیگری  
بالای شکم و حنجره بودی با کلمه شش خای آن البته سبب بیدار شدن بعد از صبح و صحت و مصلحت است چنانچه درین وقت یکس میمیرن دیگر عضلات  
حلق ضعیف میشوند و بعد از آن کاشم نزل حادث شود بسبب ناکور و قسمل و قی یعنی ضعف عضای حلق زیرا که زکام و نزل هم در مری  
ضعیف میوکس میمیرن است و سوم از کمزوری بدن هم پدید میشود علاج عام آنست که آنچه از آن لوات تنگ و قصبه شود و بل آرد مثل آب  
آهین یا شب یا نی محلول آب یا کاشک نقره محلول آب فرو فرود این ادویه را بران رسانند چون از ادویه قابضه فایده ظاهر  
نشود درین وقت از شکر مرغ سرخ یا از مطبوخ آن غرغره کنند این مفید میشود چنانچه حدت آن قدری هم تازه در لوات پدید میشود و چون  
تازه اکثر در آن می آید و بسبب آن ضعف سابق آن رفع شده در ریشه با و عضلات خورد آن قوت می آید و بسبب آن صحت  
میشود و قند آن اگر هیچ در او صحت نشود او را قطع کنند لیکن در قطع ملحوظ باشد که همان قدر بزرگ از آن ملاقات آن از زبان و حنجره  
موتون شود جمله را قطع کنند و درین صورت غنچه پدید خواهد شد باقی علاج کمزوری کنند چنانکه مکرر گفته شد و فقط فصل سوم  
و درم غده های حلق که آنرا بفت انگلش میگویند و نیز ضمیم کاف فارسی و سکون او و کسری هندی و فتح بای شناه تخمانی و سکون ای  
حمله نامند آن با خود است از لفظ که لغت لاشن است یعنی حلق و ایضا آنرا نیز و کاسیل ضمیم بای و حو و رای حمله و سکون او و فتح  
کاف و سکون لغت کسری و سکون بای شناه تخمانی و لاسم نام یعنی سکته بمقابل و قریب مجری هوای یعنی قصبه آریه یافته میشود  
و درین تسمیه قدری مساعدت است ولی تحقیق لغت غده های موسوم بر بان انگلش با ستم بای را باید گذاشت فتح بای شناه و سکون الف  
و کسری بای شناه تخمانی و فتح رای حمله و سکون لغت کسری بای شناه تخمانی و سکون ال هندی است این غده با از قسم غده های مسالک  
آنرا با بفت انگلش باید گذاشت کسری بای و حو و فتح لاسم و سکون ال هندی نامند چه بل و یعنی خون است این غده با مثل طحال و کلاه  
گروه اند که خون درینا پیدا یا صاف میشود و تا حال حقیقت فصل این غده با بخوبی واضح شد لیکن بن قدر ثابت است که اینها را هم  
کار تولد و صفاتی خون و طی است اینها را این هم موسوم میشود و این غده مستند که در جانب خارجی حلق یافته میشود و جای که خفیه و  
مرتفع شده و آن خفیه لفظ غین مع و قصبه است از آن قدری در جانب تحت باین نحو یافته میشود که یکی در جانب بین قصبه و دیگری در  
بسیار آن یکی در وسط هر دو بطوریکه متصل است از هر دو یافته میشود و صوت جمعی آنها شباهت است از صوت لفظ که بران انگلی  
نوشته میشود و غده های هر دو جانب در طول بقدر دو آنکه در عرض بقدر سه ربع آنکه میباشد اما غده جانب بین از غده جانب بسیار  
قدری دراز است غده متوسط بینا بهر دو متصل است آنرا بران انگلی نیز میگویند کسری و سکون سین حمله اول و فتح میم سکون سین  
حمله ثانی نامند چه این چیزی را گویند که واسطه اتصال دو موضع یا دو چیز باشد چنانکه عنق واسطه اتصال راس و بدن است این غده

فصل سوم در درم غده های حلق



موسوم به ششائی را که در زان و زانیک و شش دو آونش میباشد نسبت به شش خاص که بر صغیر در نسوانین غده باشد نسبت به جان کبر  
 میباشد و وقت قریب جنین و متراکم قریب البلوغ این غده ها اکثر کبر میشوند و این غده ها هم از غده های کثیره صغیره و صغیره و مرکب اند و درین  
 غده های صغیره غشای خانه دارند که غده های صغیره را یکجا متصل میدارد و بالای این غده ها غشای بسته دارند که مثل  
 خرطیه بالای آنها آمده و اینها اکثر در شاخ شریان که کثیر المقدار از هر دو جانب بطن بسیار بدن درین غده های آیند یکی از شریانیکه  
 برای تغذیه دراع بداع در جانبین کردن قوه و یکی از شریانیکه در هر دو دست برای تغذیه دست میرو پس این دو شاخ شریان  
 از جانبین دو شاخ اند جانب بسیار درین غده ها میروند و هر یک از این دو شاخ های هر دو جانب بطن بسیار بعد از درین غده ها  
 اول شاخ شاخ شده و شاخ کثیر شریان بشاخ شریان دیگر بعد از تغذیه متصل میشوند تا اینکه درین شاخ ها صوت شبکه پدید میشود  
 و این جرم مقدار این شاخ با چنان کبر میباشد که حرکت شریانی در آن با باقی میماند و بعد اتصال این شاخ با پیدا شدن صوت شبکه  
 شاخ های صغیره دیگر از اینها بطور عروق شعریه پدید میشوند و غشای خانه دارد در غده های صغیره که در جرم غده های کبایر داخل  
 میشوند و گاهی یک شاخ شریان از شریان عظمی سسته بمقابل قصبه آید و غده متوسطه داخل میشود و گاهی از شریان کبر هم شاخ پدید  
 پیدا شده درین غده متوسطی آید و درین وقت شریان قوت شریح درین غده پدید میدهد لیکن این امر بطور قدرت دیده میشود و با  
 دانست که شریان این غده همیشه نسبت مقدار غده ها کبر میباشد چنانکه درین غده ها دو شاخ شریان از هر دو جانب بدن آمده  
 شاخ ها که تا به هم متصل شده صوت شبکه پدید میآید همچنین در و درید و هر دو جانب این غده ها پیدا شده شاخ شاخ گشته باشد  
 یک دیگر متصل شده صوت شبکه دریدی پیدا کرده بعد عروق صغیره از آن پیدا شده در غده های صغیره داخل گشته خون سیاه از  
 آنها میبرند و هم درین غده ها مجاری طیف فیئیک یعنی آب برنگ کبرت میباشد آنچه آب از عروق و شریان این غده ها از بطن آمده و در  
 ثورامک و کت اندازند و عصاب که درین غده ها آمده اند ریش های نیوماگاسک و سمی میگویند میباشد که در آنها داخل میشوند و درین  
 گوئیم نیست که این غده ها شوشم و مراد از توهم این غده ها نسبت به مقدار جمله شریانی آن مثل غشای خانه دارد و هم شریانیکه  
 و طیف فیئیک عصاب غشائی ریش دار کبر غلیظ در آمده گرد و این مرض را بلغت میگویند که اینگونه میمانند و این هم گاهی در غده  
 جانبین و گاهی در غده جانب بسیار و گاهی در غده متوسطه میشود و گاهی در مجموع غده های ثلثه عام میشود و این هم در غده جانکین  
 زیاد دیده میشود و سبب حقیقی آن بخوبی تحقیق نشد لیکن قریب است که از رذات آب مشروب میباشد و ممکن است که فساد هوای  
 رطب غرض هم شریک آن بوده باشد و این مرض از امراض خفیه تمام خاص میباشد که در آنجا اکثر اشخاص از سکنه مقام مذکور را  
 عارض میشود و عام میگردد و این مرض عوارث را نسبت به جان زیاد عارض میشود و مثل جنین خاص که در سنگ آن کهنه پاره بود  
 مثل جنین کواون و اینها آنچه دریا که از جبل مذکور جاری میشود پس کسانی که برکناره آن میمانند مبتلا باین مرض میشوند و آنچه  
 در دیهات و غیره اشخاص که آب چاه نوشند این مرض عارض میشود غالباً پس آن بوده باشد که آب در آن چاه از همان در آمده  
 باشد که در آن کهنه پاره است ازین است که میشود که سبب آن فساد آب مشروب بوده باشد فساد هوای طبع عین آن شد باشد و گاهی



در اراضی جمیع اقسام حیض هم این مرض یاده میشود و چون بعد رفع شدن خون قلیل آب یاده از رحم جاری شود مقدار  
این مرض قلیل میگردد و از آن در آنست که پیشتر در میان رحم و این غده هم مشارکت است ایضا معین بر آن نیست که بعضی میگویند  
که وقت حمل در عورت این مرض یاده میشود و بعد وضع کم میگردد و اما اینکه در آب میشود که هم جزو سوله این مرض میباشد پس اکثر  
بمان هستند که درین آب آب میگویند و یا یاده میباشد این بخور که در سنگ و جنبل خاص گاهی آب میگویند یا یاده میباشد پس گاهی آن  
جودت یا آب کثیر باره و از آنجا سائل شد بجای میگیرد و درین وقت همراه آب مذکور این هر دو چیز در یاده می آیند و در بدن شارب آن  
و غل شارب و در مرض مذکور میشود بعضی میگویند که هرگاه در آب یودین از مقدار یک در سه یا چهار میباشند کم میشود از آن این مرض پیشتر  
و انقباض بر این قول از آن میگویند که از نوشیدن طلا کردن آب یودین درین مرض فاقه حاصل میشود العلما مات اول قدری زیاد  
به قدر بر نظام غده های مذکور ظاهر میشود که از آن قلیل اکثر اعلام دیگران میداند و سواي آن کدام کلفت ازین نمیدانند اما هرگاه  
مسکوک شود مقدارش یاده گردد درین وقت از ثقل هم مرض متاوی میشود و در او از آن قدر تشنج ظاهر گردد و گاهی خفقا و طبعش  
قلب ضربان و محل خاص هم غده پدید آید و همراه آن گاهی غشیا و بعضی هم سادش میشود خصوصا کسی که از عورت این مرض  
مرض اینیب او وقت خون هم باشد و گاهی این هم بعد از خود از زیاده ای بازماند چند ماه یا چند سال به قدر قلیل میماند من بعد  
و غده بار دیگر یاده میشود تا اینکه گاهی مطلق میرسد العلما اول مرض از مسکوک آن در سوزند تا سبب محدث رفع شود و الا اگر از  
طالع قدر تشنج شود باز سبب بقای سبب بود و مرض یادی پیدا خواهد شد من بعد این هم را طلا سازند صفتش اینست راجع بنایند  
سهم در چهار نیم تا شش گرم و نیم خوب ککره نگه دارند و وقت ضرورت از آن از یک گرم تا دو سه گرم بقدر صغیر که هم گرفته  
بذریقه قطعه چوبی این هم را بروم مذکور و سوزانند و وقت استعمال آن فصل سروا قرب طلوع شمس است بخورند و امر فرمایند که بعضی  
خود را بمقابل آفتاب کشاده و قدری بلند داشته قیام نمایند تا پنج ساعت بمرین خط باشد تا آبله محل هم پدید شود بعد بر پلنگ  
بستر است تا غسل سازند و بتر نشسته که پشورش ازین دور هم که از استعمال این پدید شود تا اگر آن ننمایند زیرا که مقصود از استعمال آن  
تجارب ازین است و آن در اینجا نافع است لیکن اگر کسی از خصوصیت فراخی درم و ازینت زیاد و پدید آید و که صبر بر آن نتوان کرد و درین وقت  
بپدید آید آن بکه کم دواي مسکوک میفید و بعضی درغن گل یا بتدایا همراه آب شاخ گیاه مخلوط کرده بر آن طلا سازند تا ازینت دور هم  
کم شود و هرگاه آبله مذکور خشک شود و جلد خلق بر حال صحت یا آن زمان متحان هم مذکور نمایند که یا رفع شد یا قاتی است اگر باقی باشد یا  
اعاده استعمال دواي سابق بواقی هدایت مرقومه نمایند ایضا هم آب یودین یک حصه سپر نیم حصه گلیسیرین نیم حصه سرکه را با هم  
بروم مذکور طلا کردن مفید است هم نوشانیدن یک کوبه یودین مفید است و گاهی شایند خج و ایو و این شانس بر نماید  
نافع است و کسیکه مرض قلب وقت خون اشتها باشد شکایت خفقا و ضراب محل هم نماید برای آن فیری یوداند همراه کدام  
بنوشانند یا سپر فیری یوداند یا نوشانند و ایضا نوشانیدن شکر شلیل همراه کنین کسی که شکایت قلبت هم داشته باشد فیکه  
کسی که شکایت قلبت هم چنان باشد او را یک کوبه شلیل با دو کاشن یا یود نوشانیدن بسیار مفید است و این مرض غده چینه نوشند

و این

و ایضا خورائیدن ارگت آت رای درین مرض جفا و منقذ و همچنین شایندن چرخان و کاترین رقیق از سلو شین یا نیکو شین در نفس غده  
متوم مفید است گاهی از یاد وید درین مرض فایده میشود و حاجت بسوی اعمال جراحی داعی میگردد و درین وقت بهترین لایه یکی است  
که عمل پیشین به حال آرند اما در آن احتیاط ضروریست ازین که نشتر برورید یا شیرین کبیر نرسد و آنکه و تار آهن گرفته عوض عمل  
درین غده غلاینه چند روز در آنجا دارند و هر روز حرکت داده باشند لیکن درین عمل همه حفاظت شریعتی آورده که با ضرورت است نه با  
نهی نشود و سوم آنکه جلده کردن که بالای غده ای متورمه است هم غشای ریشه را که بالای غده ای مذکوره بطور خطی است  
جدا کرده پنج شش ساعت کاشک نقره قوی بر آن نهند بعد کاشک را بر دشته جلده غشای ریشه را جدا کرده با سیم خسته بند  
یا از نهدون مرهم سوزنده بر حال حرکت کنند که بعد ازین تدابیر هم این مرض زایل میشود و ذکر فصل چهارم در ایکسینش  
نک گوئیم که ایکسین سکون بای شانه تثنائی و کاترین معلق الف سکون فافق تثنائی شانه سکون الف لام و کسیریم  
سکون کاترین و تثنائی آن بیرون آمدن چشم است چو ایکسین یعنی بیرون افتادن یک بعضی چشم است چون این مرض چنانجا ملاحظه میشود  
بان نام کرده شدنی اواقع اینهم قسمی از مرض فصل سابق است که در آنهم غده ای سو سوم پتای را که گانده متورم و کبیر المقدار میشوند  
را که گوئیم را بر و کاسیل و لغت نگاشتن که نیکو نیران ارد و بران اطلاق کرده میشود و در بیان سبب جفا و شین درین علت تفاوت است  
بعضی میگویند که چشم در خانه است یا در میشود و بعضی میگویند که آب غشای خانه دار که پس مقله است زاید میگردد و بعضی  
میدانند که خون در غده ای که پس مقله اند شل چشم غشای خانه دار زیاد میشود و شاید این قول اقرب باشد سبب این مرض تا  
حال مشخص نشده لیکن بالضرر سبب این قسم از یاد مقدار غده ای ثلثه مذکور میسبب قسم اول است زیرا که این حالت جفا و شین در بعضی  
قسم اول یافته میشود و هم از علاج قسم اول درین هم ضرر و نقصان ظاهر میشود و درین قسم اکثر انیمیا موجود میباشد و تقوین است این  
امراض عصبیه باشد که از باعث کمزیری و زوز نامند یعنی مرض عصبیه این مرض بسبب ازویت عصب پستی شیک پیدا میگردد  
و اکثر درین امراضی این مرض بر جان انسان عارض میشود لیکن نان نسبت زجان زاده حادث میگردد و خاصه وقتیکه در خارج  
شود و درین مرض مبتلا میگردد و از خوف شدید هم این مرض اید حادث میشود چنانکه یک کثیر صاحب کتاب خود شهادت مشاهده  
خود نقل کرده اند و یک صاحب نجف شته اند که یکین که حیض آن قریب جریان بوده بعدی کنایند این مرض پیدا شد که دفعه مقدر  
غده بعدی که پیش چشمهاش بیرون آمدند العلایات باید و نیست که علامت لازم و خاص درین مرض یافته میشود اول جفا و شین  
و هم بدو درین مقله چشم از آن شیء پیدا خوبی نمی بیند و گاهی جفا و شین بدرجه میرسد که وقت خفتن هم جفا و شین سائر چشم میشوند  
و مر لطف چشم کشا و منقبض و اکثر این جفا و شین در هر دو چشم برابر میباشد و گاهی در یک چشم زیاد بود علامت دیگر آنست که غده ای ثار اندک اندک  
و کبیر المقدار میشوند و زایدی مقدار غده جانبین یا در میباشد و فرایان شین که درین غده ای متورم اند و هم فرایان شین یکدیگر  
قریب ازین خود و میباشد محسوس میشود و اگر چه زیاد مقدار ندارد درین قسم هم گاهی کم و گاهی زیاد میباشد لیکن همیشه یادی کامل  
این قسم از زایدی کامل قسم اول کم میباشد علامت ثالث نیست که درین قسم خفگیان یعنی طیش قلب همیشه هم میباشد هرگاه دست و پایی

در این فصل  
چهارم در ایکسینش

حساس کنند حرکات قلب سریع میشوند و نبض در یک دقیقه از نو و مرتبه تا یک صدوی بار حرکت میکند و سوا می این علامات  
 از ریه مختصه گیر علامات هم یافته میشود مثل اینکه دوران سر غشیان در کسی گاه طریانی غشی بسبب لذت سمعی شیک میشود و در کلام  
 مریض غیظ و غضب و انفعال طبع زیاد پیدا میگردد تا اینکه از کسی خوش رنهی نمیداشد همیشه خلط بد مزاج میماند و کسی بضمی پیدا میشود  
 و کسی ششهای طعام زیاد و کسی ساقط مییابد و گاه گاه بخوابی عارض میشود و بسبب نهم این علامات که اکثر بسبب لذت سمعی شیک  
 میباشند این ضل از امراض عصب میشود و آنجا این مرض اکثر بصحت و سلامت میگردد اما گاهی از اجتماع آب و رطوبت مانع و پدید آمدن  
 سکنه میرود و گاهی از شدت ضعف هلاک میشود العلاج اول تبدیل هوا و ترس است لهذا بیمار را از جای که مریض شد بجای دیگر که  
 هوایش خنید باشد نقل کنند کسی که در شهر را و او اضع خفصه میماند اگر بر جبال نقل کنند شوند نفع است از ادویه نوشانیدن  
 لوجی شلیس بسیار مفید است خصوصاً و قنیه که خفقان حرکت قلب یاده بود چه زان نبض طبی میشود لیکن آهسته آهسته آنرا کمال احتیاط  
 نشانند و بر نوشانیدن آن مداومت و اکثر نکند بلکه چند روز نوشانیدن ترک کنند از سر آن در بدن مجتمع شد ضرر میرساند  
 همچنین باید در وسایک آنرا شلیس در مریض مفید است که سرعت حرکت قلب غشیان و در اضع میکند چونکه در مریض سمی غشیان  
 موجود میباشد لهذا برای آن خوردن این مرکبات آهسته آهسته میباشند که شرط استعمال آن اینست که هر گاه نبض یک دقیقه از ریه  
 کم حرکت کند آن زمان هندی الا بر گزیده نشود و اولی نیست که اول حرکت نبض از نوشانیدن لوجی شلیس باید رویشد سیانک  
 کم کرده بعد آن از مرکبات آهسته آهسته مناسب نشاند و ایضا برای مریض وای نافع جدید اگر گشت است که آنرا بطوریکه مناسب  
 دانند خواه بطور تنگی یا تنوع یا سفت و بقدر مناسب نشاند و هم اگر گشتار که جوهر اصل اگر گشت است بذریعہ از ریه سونی و در  
 مریض ساند چون اجتماع قلب شلیس عروق را که در مریض ضل رضعه سمعی شیک پیدا میشود با جادو شمع کم میکند اجتماع خون  
 که پس مقله چشم است دفع میسازد و هم قوی عصب مییابد و مریض بنامد اگر چطو او و مریض را کم میکند لیکن بعد آن شلیس را  
 بسیار مضر میشود و چون عین از یاده میسازد زیرا که خون را کم و در میسازد و از آن اینمیا زیاد پیدا میشود و تو لدر یک سبک را  
 در خون بدن کم میکند هم بسبب کمزوری خون پس مقله چشم اجتماع خون یاده میگرد و از آن جویز عین یاده میشود لهذا آنرا شلیس را  
 در مریض استعمال نیارند همچنین باید رویشد شلیس هم بر وایند شلیس را هم در مریض ضل نوشانند زیرا که مرض مریض است مادام که دوی  
 نافع را در امراض مریضه مدتها می درازند نوشانند فایده بر آن ظاهر میشود و چون این دویه تا مدت و از نوشانند شوند بالضرر و کمزوری  
 در خون پیدا میکنند و اخذ جبر مقوی در مریض بسیار بخوراند و نوشانیدن روغن جگر مای در مریض بسیار مفید است باقی آنچه  
 برای تندرستی و زیانی صحت علاج و تدابیر شود اندک به استمال آنرا چنانکه مناسب است تذکره باب نهم در امراض قصبه  
 ریه و ریه فصل اول در تشريح قصبه ریه و ریه بدانکه قصبه زبان گلش لیسنگن کس سلام و سکون بای تخانی و فتح را و  
 سکون نون و کاف فارسی وین جمله نام یعنی مجری آواز و دم کشی و آن مرکب است از اعشیه و غضار و عسل و انچه اندرون  
 قصبه از ریه بالا ظاهر است غشای سوس کس میبرن است و انچه اندرون قصبه فته است همانست که بزبان است در مری فته و زیر آن

فصل اول در تشريح قصبه ریه و ریه  
 باب نهم در امراض قصبه در ریه

شلیس

غشای خانه درست در اعلائی آن در غضروف کبیر شش صغیر میباشند و از هر دو غضروف کبیر یکی بصورت مثلث از پیش حلق دیده میشود و از آن و این در حلق ظاهر بود و از اندرون مثل و دیوار که برتهای خود متصل شوند از آن حرکت مثلث حاصل میشود و غضروف کبیر ثانی نیز اول جائیکه او تمام میشود موضوع است و شکل آن برهیت مدور است از جانب مقدم حلق فیما بین کبیر مذکورین اندکی فربه واقع است که آن مملو غشای ریشه در است این غشای آن فربه باشد که در است بنا برین بزرگتر ضرورت امر همین جای باید که ثقبه جداید برای آمد و رفت هوا پیدا کرده شود و از جانب خلف غضروف کبیر صغیر تر است و هر دو متصل ملاقی و جائیکه اول بالای ثانی متصل است سه است بخار و تدویر غضروف ثانی داخل واقع شد یعنی اندکی پهن و منبسط شود و قشری و از قشری و فایده این انبساط آنست که بسبب آن غضروف دیگر بر آن قائم نشسته اند که هر یک از آن شکل مثلث است که یک ساق آن برینا آن مقوس و تقوس آن جانب خلف شکل است بر بر این هر مثلث دو غضروف دیگر بسیار صغیر بصورت نقطه یافته میشود و اگر کنار آن مثلث غشای ریشه در است تا غضروف کبیر اول میرسد ازین اتصال چون از هر سو بند شود صورت اینو چنانست میشود و درین غشای ریشه در دو غضروف صغیر شکل سهم خط عربی پیدا شد میباشند بالای این عضلات این عضلات صغیر است تا نزدیکی عضله کبیر غضروف پیدا میشود و بر دیگر میسر شد بسبب آن حرکات پیدا میشود و هم عضلات همراه غشای ریشه در که از غضفاری این صغیر پیدا شد و غضروف اول کبیر بر سر پیدا شد بسبب این عضلات بنوعی صمغ و تنگ میشود و بسبب آن صورت غلیظ و دقیق و افقی آمده و کم وقت تکمیل میشود و حرکت قصبه یعنی کبیر ریشه عصب اینها گام شک است که از دماغ فرو آمده تا صدر رسد و شاخه این عصب از زیر ریشه این عظیم فیه بالیس بسوی قصبه فرو کرده اند و در فالج آن بحاله صحت عارض میشود و من بعد بر این عمل که محل صدور صوت است در وقت تشنج بسیار که در دوزخ اند و در آنها تمام نیست بلکه از جانب خلف کشاده اند و بر جای خالی از است در غشای ریشه در است که محل خالی از غضروف است و هر یک که اندرون قصبه غشای میوکس میبرن جزیران غشای خانه در است زیران عضلانی فاق مذکور و بالای عضلانی در جانب خارج لحم عضلات از جانب خلف مری صفا واقع است قصبه یا از آخر خود و شاخ کبیر که یک کبیر در جانب دیگر شاخ کبیر دیگر در جانب بسیار میرود و ازین شاخ کبیر در ریه شاخهای خورد بسیار پیدا شد و در جرم ریه شش شد و لیکن غضفاری در شاخهای خورد تا نصف سیاه میشود و من بعد شاخها ازین غضفاری خالی میباشد میوکس میبرن بالای غضفاری مذکور بوده باقی ماند و بالای آن یک غشاء دیگر یافته میشود و تا جائیکه غضفاری درین شاخها میرود همراه آن عضلات کو چاکس در جانب خلف شاخهای مسطوره که غضفاری یافته میشود که از تشنج آنها بعضی از سر فرو بر و پیدا میشود و این شاخها تشنج و منقبض میشوند و درین شاخهای خورد و هواد تمام ریه تا اطراف آن میرسد و بر کبیر چهار چیز است اول میوکس میبرن که در ریه پیدا میشود و در شاخهای قصبه در جبهه میوکس میبرن غشای ریشه در است که از آخر غضفاری که در مجاری هوا اندرون ریه یافته میشود و پیدا شده و این بسیار رقیق بود و در بر آن بعضی ریشه های عضلات هم میباشد که بسبب آن در آن مجاری انقباض پیدا میشود و تشنج آن آنها را چپا چپا میکند و بعد آن شریان آورده و عصب یافته میشود و بعد از آن یک غشای دیگر که بصورت غشای خانه در اول غلیظ است و در حلق

شروع میشود و بر شاخهای قصبه در بیشتر اندولای شریکین آورده و عصبان در میان آنها جمع آمده و در بیشتر شده که از انتشار آن قسم به بر عصبه باو خانه های متعدده منقسم میشود که هر عصبه از آن فی الحقیقت به است و حقیقت گوشت ریه بین میوکس میبین و در غشای ریه در او پنجه بر صورت غشای خانه دار است و آورده و شریکین عصبان ندریاده ازین کدام عضله در آن نیامده و بنا برین طم آن لاین و در بعضی بسیار شریک ششمان هر دو دست با پا در عصبه دو تا است یکی از آن در جانب بطن حدود دیگری در جانب بسیار عصبه میباشد و راه آمدن هوا در هر یک علیی است و اگر یکی از آن ناسد شود دیگر هوا از خارج میکشد تا کار بند نشود و انسان ندانند که یک شریک عظیم از جانب است قلب رسته و شاخ شده یکی بسوی ریه جانب بطن دیگر در ریه واقع جانب بسیار رسید و هر یک ازین شاخ در ریه منشعب بسوی شاخهای صغیر و کثیر گشته و این شاخهای کوچک در تمامی ریه منشعب شده تا آخر اطراف ریه میرسد و بزرگترین و قویترین خون سیاه از دل بسوی ریه می رود و در ریه رسیده از ملاقات هوای خارجی صاف و سرخ رنگ میشود و من بعد بزرگوار و دیگر ازین شریک پیدا شده در خارج ریه و در یک کثیر میشوند و کرده در گوش الیسترل میریزد و از شریان عظیم که در جانب بسیار قلب است و در آن سرخ برای تغذیه بدن جاری میشود و شریان سست یکی از آن در ریه جانب بسیار و دیگری در ریه جانب بطن می آید و بزرگترین و قویترین سنج برای غذای خاص ریه در ریه می آید و جای که شاخ قصبه ریه غشای ریه از ثانی و شریان عظیم از نزد خون سیاه و در ریه کثیر میشوند خون سرخ از ریه بدل شریان ساند خون سرخ در ریه برای غذای ریه جمع شود و در ریه خفیل میشوند و از اصل ریه میگویند و آن مقام حلقه خجری است و هم قدر که از ریه خفیل این مجموعه جسمان که در ریه می بیند و در بیشتر لاین میگردد و غشای ریه از ثانی و در ریه منشعب خانه دار است و درون ریه زنده در جسم آن خفیل منشعب شده است بسیار رفیق گشته بالای ریه هم آمده و منبسط شده بالای آن و شکاف آبدار است که از این بان انگشت بلور اسیمک و یک سراسی نامی در قسم اول و کون او قوح رای حمله و کون الف یعنی غشای ریه این غشای دو توست تومی از آن بر ریه یک توی آن بر ضلع آمده و باین سبب غشای ندر کوشل خریطه است و در امراض ریه در این غشای آب کثیر جمع میشود و فایده این غشای است که تا بسبب انبساط آن وقت حرکت منبسط خود در ریه تمام طاک خود با ضلع متناهی نشود و لیکن هرگاه درین غشای در ریه یا ذات الجنه دم عارض میشود این هر دو توی از دم متصل میشوند و از حرکت آن در دماغس میشود و ادامه که دم باقی است تا بعد اکل شدن دم پس این هر دو از ماده دم با هم منجم میشوند و بسبب آن حرکت ریه دشوار میگردد و در ریه بر پرده شکم واقع و بان متصل است بذریع غشای ریه در غشای پهلوی که آنرا پلورا گویند و بر پرده شکم منبسط و مرتبط است بر آن که هر دو غشای چنانکه بر پرده اند و چنان بر پرده شکم منبسط شوند و بسبب آن ممکن نیست ریه از آن جدا گردد و لهذا هرگاه پرده شکم بجانب بطن می آید ریه هم بر ریه می آید و چون پرده شکم بالا می رود ریه هم با علی میرسد و ریه جانب بطن منقسم بر سه حصه کثیر است و ریه جانب راست منقسم بر دو حصه کثیر است و ریه های عصب پشی شریک و عصب پشیو با کاشک در ریه می آید و بسبب آن حرکت ریه واقع میشود و قدر فصل دوم در ضیق نفس یعنی تشنگی آمدن هوا بنایان متناهی که میوکس میبین از ریه انقباض ریه متورم شد و حرکت این من شود و دم آنکه برین میوکس میبین قصبه غشای سفید پیدا شود و بسبب آن

فصل دوم در ضیق نفس

و در ریه





که تنخوان موصوف است اظهار در دو کلفت کند و بیافنس مشکبک مثل کسی میکشد که گلوئی آنرا کسی غم کرده باشد هرگاه سرفه آید معلوم  
شود که آواز سرفه بسیار ثقیل غلیظ بود مثل کسی که در دهن قرار وی خود نهاده سرفه کند از آن صدای غلیظ بر آید زیرا که بسبب  
میوس میبرین غلیظ میشود عضلات غیر همراه آن متورم شد غلیظ میشوند و از غلظ آنها صوت غلیظ میگردد و یا بجهت صوت تنخوان  
که طلقا آواز بسیار از هر که لب کلام کند بعد هرگاه تنخوان وسط حلق را که باز و نه میانی است غم کند از اجاد و معلوم گردد و چنانچه  
بپای سرفه میشود و کمی غرض گردد و جلد بدن گرم و یا پس بود یعنی غداوت و عرق بر آن نباشد و این علامات شروع مرض را تا  
هرگاه زیاده شود چنانچه بسیار سیاه گردد و لب های رنگگون شوند و در چشمان آثار تنور و بروز ظاهر باشد و بسیار قلق باشد یعنی از یک پهلو  
تا پهلوئی دیگر حرکت میکند و اگر درین وقت نزد وی تدبیر سازند که با بریه بکشد و تنور را بیمار پاک میشود و این علامات و تکالیف  
درین مرض گاهی زیاده و زمانی کم شود یعنی زیادتی و کمی در شداید یافته میشود و از آن دانسته میشود که همراه و تشنج هم میباشد  
شرکت عضلات زیرا که اگر شداید جنس بسبب هم می آید و در ندرت و کم نمیشود بلکه بر یک حال می ماندند علاج این قسم نیست که  
اگر درین جوان فرجه بود و بعضی قوی باشد شروع مرض را در آن که چنانچه در وقت تنفس که بیمار را هر چه در سیاهی و تنور که در وی  
نمایان شود و در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی  
نیز تر قوه مقابل محل هم یا پس گشتن بجای نفوذ گردون اگر پیشتر نرسیده بود در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی  
در دهن سازند بیمار را که در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی  
فردل در دست آثار آب جوشانند و صاف نموده باشند و هم آب ساده گرم کرده در حوض بپاشند در آن بیمار را نشاندند و کامل و دو  
گرمین یا ربع گرمین فیون خالص بعد دو ساعت بخوراند تا آب خشک شود و خون در عروق فرو رود و در هر طرف گردد و اگر تنگی در  
آن آثار جوش دهن یا بنفوذ نمایند آن موقوف کنند تا درین قسم سسمل قوی نشاندند مثل کلون جیلپا سهال نیا و شود و بیشتر  
خارج شود و در دفع گردد و اگر از کد امی و دوا تدبیر نماید ظاهر گردد و در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی  
آنکه خاصیتی بر شمر و کار است نه تنها در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی  
تا زه را کشاده دارند از صحت چهل شود و این تدبیر چنان مفید است که اگر در بعضیکه تدبیر سبب کمزوری و از آن زیاده و مرض ضعیف  
بظاهر کرده باشد قریب الی حد است و در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی  
و بهر ابریه و سینه آن سازند و در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی  
ظاهر نماید لیکن محل آوردن بجز در مفید پیدا کردن ثقبه نود شوار نیست و مثل است که شاید مفید افتد و سبب صحت  
حیات گردد پس بر آنهم این تدبیر را جاری ساختن بهتر است مگر نیست و آنچه در میوس میبرین بسبب جمع شدن آب حادث  
شده باشد و آنرا آواز آید که در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی  
نشود و در از در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی در وقت تنفس که بسیار تنگی

نور



و هرگاه میوکس میمرن را به بین معلوم شود که قدری ورم کرده است و لیکن آن سرخی نبود و ازین معلوم میشود که نفل بیش نیست که  
 در فم نفل بیش سرخی ضرورت بلکه بسبب کمزوری یا آمدن آب میوکس میمرن سرخی شد است وقت کشیدن هوا آن مجتمع و  
 منقبض میگردد و ازین جهت هنگام تنفس تکلیف اذیت پیدا میشود علاج درین هم کاشک نقره قوی که در آن اصل کاشک نقره است  
 گرین چهل گرین یک آن آب حل کرده باشد از قطعه عجم و نفوس گرفته بر سر آن سفنج بساز سلوشن کاشک نقره نمره اندرون قصبه  
 رسانند تا که میوکس میمرن بسبب آن قوی گردد و ورم دفع شود و همچنین آب آبله آب ساده آغشته بآن نقره غرغره نمایند و اگر شب بانه  
 ورمی در آب حل کرده از آن غرغره سازند و مان نک ایستد و اگر آب حل کرده آن غرغره ساختن مفید است آنچه مذکور  
 بدن در آن افتاده باشد برای دفع کردن آن آب آبله و سه قطره با کنین از یک گرین دو گرین آغشته بعد چهار چهار ساعت به بیمار  
 خوراند و روغن جگر برای نوشاندن و غذای جید خوراند و جمله علاج مولد و حافظه صحت بمل آن وقت که در آنجا از وقوع زخم در قصبه  
 بسبب تشنگ یا قهر خوریه که از اسهال گویند ضیق نفس حادث شود سببش نیست که اول در آن در میوکس میمرن نفل بیش سرخی  
 و در و حرارت پیدا میشود بعد در آن زخم میگردد و اگر در آن زخم نفل بیش یاده میشود میوکس میمرن غلیظ میگردد و از آن قصبه  
 تنگ میشود و این اکثرش آفت دیگر است بلخت گلش میگویند علامات اگر تشنگ است علامات تشنگ اگر اسهال است علامات  
 اسهال شاد برون لیکن جملة علامات زخم اینجا این هستند که وقت آمدن سرفه ملغم متفصّل خارج میشود و تب لازم بود و هرگاه بر شش  
 که در وسط حلق نمایان است غمگیند و در محسوس میگردد و در از او هم درین قسم در معلوم میشود چه هرگاه مری وقت از او بگذرد  
 ذاتی خود از قصبه اجتناب میکند و محل زخم از آن ذیبت و در و در محسوس میشود و آنچه از اسهال بود در آن فساد و نقصان برین ظاهر  
 ولیکن هرگاه از تشنگ باشد در آن یہ سالم باشد باقی علامات زخم و احداثا در علاج فرق است علاج آنچه از تشنگ بود در آن علاج  
 تشنگ کنند و پس گردن بر سینه از زنادن پلاستر کنند و درین قسم فایده ظاهر میشود و نوشانیدن و غرغره باقی سفید بود و آنچه  
 سل حادث شد باشد در آن آنچه در علاج سل نوشته خواهد شد بکار بند و علاج خاص زخم نیست که روغن جگر برای آب یک و سه  
 فیری ایودان که قسمی از کربات است یا بشربت نبات حل کرده نوشانند که سفید است و آنچه از ضیق که بسبب تول غشاشی سفید  
 میشود آن بر دو قسم است یکی آنکه بسبب آب میمرن پیدا شود و آن بر غشاشی حلق که ازین زبان کلمات غلظت پیدا میشود و آن  
 در مری قصبه میرو و در آن چنانکه در خناق گفته شد من حیث استسباب امراض و الاعلاج من حیث استسباب اینها هم توان فهمید  
 فایده هرگاه در ضیق نفس که از زخم تشنگ یا اسهال یا و پ میمرن یا جاذب میشود و از علاج خاص در آن فایده ظاهر نشود باید که در قصبه  
 جدید پیدا کرده و بهین چنانکه گفته شد فقط دوم آنکه بسبب کوب حادث شود و آن ایستد که اندرون قصبه غشاشی سفید پیدا  
 و تارید و تا سه قصبه بر سر قصبه هر دو مجری آنرا که هر دو نصفه سیاه شده اند پر کرده تنگ کنند این غشاشی است که بعضیهای  
 حلق اثرش ظاهر نباشد بلکه در قصبه زیر آن موضع که استخوان مثلث حلق نمایانست این غشاشی پیدا میشود بسبب هم میوکس میمرن  
 غشاشی خانه دار اندرون قصبه چنانکه گفته شد درین قسم در نفیس شوری بود اما در از او کلفتی نباشد زیرا که سبب مختص قصبه

است از مری سعه تعلقی ندارد و هرگاه این غشاء زیاده شود تا سه شصت قصبه که متصل بر ریه است و تار می رسد و از آن بیمار ملال میگوید  
و بعضی طبای و لاییت تفرقه در پیر یا کروب نمیکنند اما فرق در آن قدری ضرورت است این مرض در ولایت گلستان  
جبال باره و در بلاد دیگر بهر متخلفه مثل هوای شمالی باره و جنوبی حار در آن بسیار زیاده میشود و باطفال این مرض یا عارض  
میگردد و از بعد سه سال تا پانزده سال میشود علامت نیست که هرگاه طفل از هوای سرد می رسد تمام آن در صبح میماند اما وقتی که  
غشب بخواب میرود بعد سه چهار ساعت سرفه عارض گردد و از در سرفه غلیظ معلوم میشود چنانکه کسی در قمر نادین گذرشته سرفه کند  
و چون تادیر سرفه بعد از گلو از بنگی یعنی آواز کشیدن صوت سمیع میشود و در ولایت گلستان چون مادر این و از طفل خود  
رامی شنود و خائف شود طفل را بیدار میکند آن وقت می بیند که هر دو چشم طفل سرخ شده اند و از در بینی آب جاری میشود و تار  
رگام پیدا باشد و تب موجود بود پس اگر از علاج این علامات زایل نشوند زیاده میشوند و حسی ضیق نفس زیاده شوند و در او کجبه  
ظاهر شود و مریض بیوش گردد و تشنج عارض شود و در دوازده ساعت یا قدری زیاده میرود علاج اول آنرا آب گرم پخته و  
نشانند بعد چنان دادند که قی آورده اند اینکۀ مار یا میسک یک گرین از آن در یک آب حل کرده بعد هر پانزده دقیقه یک شاق  
خورد که از آن چائی بنوشند تا آمدن قی نشانند باشد و اگر از این فایده ظاهر نشود دست طفل را آب گرم نماده از عرقیکه بالای  
مشت دست نمایان میباشد فصد گیرند و خون از یک و نس تا پنج آونس فوق قوت عمر مریض بر آرد اگر بعد فصد هم ضرورت خارج  
دم باشد و چسپانند لیکن بر مقام مرض بلکه بر تفرقه یا در میان هر دو بخوان آن زیر که در تعلیق لوبجمل مرض و احتیاط اندکی آنرا گاه  
بر محل نشین و خود دم پیدا میشود و آن زیاده حمل مرض را غمر خواهد کرد و دوم آنکه گاهی زخم زود طفل بند میشود و خارج شدن کش  
ازین موضع مضرت و همچنین اگر محتاج ندادن پلاستر شوند بر محل مرض نهانند بلکه زیر تره بر سینه مقابل محل مرض بکشند  
بعد تا آن کرده به بینند که اگر از آن آمدن قی فایده نشود و دای مسهل خوانند اما بعد زوال اثر دای مقی بر طرقت شریع  
اول سه چهار گرین کلومل خوراند تا که اگر سهال کند بهتر اگر مضطرب شود دم را دفع خواهد کرد و غشای سفید اشکسته زیره ریزه کرد  
از میوکس میبین جراحی خواهد کرد و از آن اجزای غشای سفید سرفه همراه بلغم بیرون می آیند از آن امید حصول صحت می افتد  
بعد اگر از آن هم سهال نشود همراه کلومل جلیپ تخم خوراند تا سهال شود پس اگر ازین هم فایده ظاهر نشود برای آوردن قی  
دای مقی که گفته شده یعنی مار یا میسک شش تا نوزده قی آن غشاشکسته بیرون آید باز کلومل یک یک گرین بعد و دو ساعت  
نه نشانند و اگر ازین هم فایده ظاهر نشود امید خلاص از مرض نباشد بعضی طبای اینجا هم ایجاد ثقبه جدید و قصبه تجویر میکنند  
لیکن تجربه نیست بلکه ازین معالجات معالج نمود و ازین میگویند که طبیب نباید مارا کشت پس احتیاط از آن بهتر است  
و آنچه بسبب تشنج عضلات زبانه انگیزی هم آن اسپاز ماوک کروب است اسپاز که الف و کون سین جمله قیج بای فارسی سکون  
الف و زای منقوطه یعنی تشنج است ماوک نفیج هم سکون الف و هم ال چندی و کون کاف یعنی طرح و انداختن تشنج نهند  
کروب تحقیق تفسیر لفظ کروب و لاند کور شد درین مرض عضله قصبه پیچیده میشود اما بخار و سرفه اینجا نباشد این مرض فی الواقع

نوع زود طفل کابی نوزاد

تار مریض



ل  
دای لا کما یرتبه  
بیمه کما یرتبه  
نفس

که طفل را ز کام میشود با آن تب میکند از بینی آب جاری میشود و همه اطفالین بود که ز کام است و قدری سرفه هم آید لیکن ز بروز  
این سرفه زیاده میشود و در آواز سرفه چنان غلیظ بود که گویا در قناروی خود نموده سرفه میکند این بیان منتهی اول است بعد  
در جبهانی از مرض شروع شود و آن نیست که همراه سرفه تشنج عضله قصبه شروع گردد که از آن هوادر به نرو و متصل سرفه می آید و هوا  
از خلیه به خارج دفع میشود و هرگاه تشنج کم گردد و طفل نبرد و هوادر میکشد از آن صدای کبیان آن سابقا شنیده میشود باز  
بعد آن سرفه متصل نبرد می آید و آنچه قریب طفل بود آنرا طفل نبرد و میگردد تا اینکه چنان روی علیل نسخ میشود آنرا بلغم سفید رنگ  
بر می آید باقی می آید و بعد آن آرام میشود و در جبهانی آن نیست که این سرفه کم شود باین نحو که عذرات سرفه در روز و شب کم میشود  
و بلغم نرودی و سهولت میل نرودی و امس خارج شود و غلیظ القوم بود و از آن یک بر می آید کم شود یا موقوف گردد و از آن  
معلوم میشود که طفل صحیح خواهد شد اما همراه این مرض گاهی امراض گیریم و صدور فی غیره پیدا میشوند پس اگر دیگر امراض هم بودند  
علاج آن فرمایند علاج خاص آن حال نیست چنانکه برای همین علاج خاص است لیکن سسلی نه بر استی سسلی نفث  
اسکا کوانا و این اسکا کوانا و این خوراندن سسلی خوراندن برای قطع بلغم سفید است و هم گمان آب جوشانیده بطور  
مطلوب چای خطائی نوشانیدن سفید است و هم گمان بوداده ساید باشد یا شربت بنفشه سسلی بطور حقوق خوراندن انفع  
است همچنین سسلی نفث است به حال آرند و وقت شب طفل را دوا می خواب و در هفتاد و چهار ساعت آرام خواهد بود برای این  
یک قطره بحساب سال عمر طفل شکر آب می که از هم است در آب حل کرده و بطفل نوشانند از پنج قطره تا ده قطره نیز می تواند بود  
است یکبار در تمام شب بنوشانند این از لادن هم بهتر است برای طفل بعد از کلورل های دیرت بحساب فی سال عمر طفل یک گری  
بنوشانند که برای تشنج سفید است و دوا را هم میدهند و بر می آید و میوه بحساب فی سال یک گری بطفل نوشانند و این  
مرض سفید است همچنین بهیدر و سیانک اسید و لیمو از نیم قطره تا یک قطره بنوشانند لیکن هرگاه از نوشانیدن آن ضعف و دوران  
دعق بر بدن خصوصاً بر دست با طاهر شود ترک کنند و هرگاه تب مرض یاده شود آنرا آن وقت شب طفل را چند قطره آب گرم  
و شسته بعد لباس بپوشانند تا عرق آید و این فایده زیاده میشود و روزانه لباس گرم بپوشانیده باشد تا از رسیدن  
بر دست هوای سرد محفوظ باشد و دو سه قطره نایس میوراک اسید و لیمو همراه آب حل کرده بطفل نوشانیدن درین مرض بسیار  
سفید است و گالاسکوئیس درین مرض سفید است و غذا سیرج الهضم مثل شیر آب گوشت و برنج خنک و نان ملاخیم خفیف بخورند  
هرگاه مرض دفع شود علاج سولید کنند معنی کنین باب آسین بخوراندند هرگاه از آن خطا ط آن آید آن وقت تبدیل هوا بسیار  
سفید بود و در آن خیال دارند که جاییکه بیمار در آن علیل شد در هوای مخالف آن بلد و مقام بیمار را بفرستند که از آن صحیح گردد  
میسر گردد و آنچه از صرع و تشنج قصبه به حال شود و آن علاج صرع کافی است لیکن وقت تشنج آب سرد بر روی بیمار زنند و آنچه  
لباس در گلبی او بسته باشد آنرا بکشایند بیمار را بر پهلوی خوابانند تا زبان در حلق نشیند و نمی نشود و آنچه از خنثاق رحم افتد آن هم  
تدبیر خنثاق وقت تشنج تدبیر از تشنج نمایند خنثا کرد و آنچه از خنثاق نفس بسبب احتیاجت شرابان عظیم می افتد پیش است که عصب

بیمه کما یرتبه  
نفس





تکمله اول در امراض قصبه

بسیار اند و در بیان هر مرض از امراض سبعة مذکوره سباب و علامات و معالجات آنها با ستم کلمه نوشته میشوند و چون در بعضی امراض مورد قیقه مذکور میشوند طالب کمال باید که خوب فوض فکر و بین او درین باره چهل آرد و تکمله اول در امراض و آن نام اصل عسفس است که آنرا ربو میگویند بمندی و سه میمانند آن نیست که آنچه شاخهای قصبه یک در ربو رفته نشسته اند و اندرون آن هوای خارجی تا آخر آنها میرود و از آنجا اجزای هوای لطیف با خون مخلط میشوند آن شاخهای قصبه پنج منشع بسبب تشنج عضلات که در خل آنها بسیار دقیق موجود اند و سبب تشنج گاهی در دماغ و گاهی در نخاع میماند و این مرض گاهی خانقانی بود که بطور توارش از یکی به دیگری میسرده از امراض متوارش است و گاهی بسبب معذب بود از هر که امراض معذب و شکایت که باشد این مرض مردان را نسبت عورتان یاده عارض میشود زیرا که مردان به نسبت عورتان یاده بیرون تنگترند و با سرد گرم ملاقی میشوند بخلاف عورتان که آنها اکثر بانور خاکی شتغال دارند و هم این مرض در زمان کمولت بعد از قضا فی نصف عمر یاده میشود و بطهران پیران کم افتد و اگر قبل بود البته تاسن پیری میسر سازد زیرا که طفلان پیران هم کم از خجیرون می آیند اگر هم در سرد گرم ملاقی میشوند با جمل این مرض عجیب است گاهی از یاده خوردن از خوردن غذای ناسوا فیه هرگاه آن بخوبی بهضم نگردد عارض میشود زیرا که درین وقت عصبیکه از دماغ بسوی جفتانده متناوبی میشود و از تادی آن دماغ متناوبی شد تشنج عضلات پیدا میکند و گاهی از وزیدن ابویه مختلفه هرگاه گرم و سرد و او یکت و زیادت یک دور و زنده شود میشود زیرا که اکثر ابویه مختلفه بر جلد میسرده جلد از توار داضداد که دفعه باشد متناوبی میشود و اویت آن در دماغ رسید تشنج میگردد و گاهی همراه هوا غبار روی و دوفان بار و اوج منکوحی آمیز و از آن جن مرض پیدا میشود و گاهی از بوییدن پیکاکولان این مرض پیدا میگردد و در ولایت انگلستان هرگاه کاه طویل که برای غذای چار پایان آنرا از رع میکنند گل میکنند و کسی آنرا بسیار به بوی درین مرض مبتلا میشود و گاهی در مکان دو منزله هرگاه دو کس تشنج شوند کسیکه در منزل زیرین است باین مرض مبتلا میگردد کسی را از ماندن در شهر و در دیات و و باین مرض مریض میگردد و کسی را بالعکس است و نبات ازین میشود کسی که هوای رطوبت و در هوای یابس باین مرض میشود و کسی برعکس آن صحیح و مریض میگردد و کسی از خج این مرض پیدا میکند و سبب متناوبی شدن دماغ در این مرض چنان گاهی باد و از یاده و کم میشود چنانکه تپ لرز و در میماند و مراد از آن می است که بسبب رطوبت بین جانی است میشود و از آن دست میشود که سبب این مرض هم همان سبب جلدی مذکوره است و این مرض هرگاه تنها بود و بعد از تشنج زایل میشود و هرگاه با امراض ششکانه و کمر که آیند انتشار الله مذکور شود و نه نشد باشد سبب امراض مذکوره که باین مرض جمع شد باشد یا میماند علامات گاهی این مرض دفعه عارض میشود قبل آن اثری از علالت نباشد و گاهی اول بدن سست و ضعف قلب پیدا گردد و بیمار را خوردن طعام خوش نماید و آنچه خورد و خجی مضمض شود و یواح زیاده پیدا شوند و بعد آن غنودگی و ربوگی عارض شود که از آن بیمار را ممکن نبود که کاری کند بعد آن در سرد میشود و ضلالت تنگی محسوس گردد و هرگاه در کسیکه معاد این مرض است و از آن این علامات پیدا شوند و همان وقت علاج آن کرده شود





قسم اول که باکیوت وصف کرده میشود عبارت است از فصل ششیم که در شاخهای خرد و کلان قصیده یک که در هر دو  
منتشر شده اند واقع میشود و این مرض طفل پیران از یاده و جوانان را کمتر عارض میشود و گاهی در شاخهای کلان واقع شود  
به شاخهای خرد رسد و گاهی در یک جانب یه بود و در جانب دیگر نمیشاید اکثر عادت بر همین جاری است که دم میوکس میسرین  
قصیده هر دو طرفه عام بود و سبب آن اکثر رسیدن سرفه بود خواه بذر یه هوای سرد یا لباس طب سدا از خنثا است و گاهی  
در زمان قریب یه گرم و سرد و زرد پیدا میشود و گاهی بسیار خفیه مبتلا باشد که حی مذکور بسبب خرابی آب مشرب غیر سبب  
عارض شده باشد بعد از آن حی این مرض عارض میشود و گاهی در مرض سل هم این مرض میگیرد و بجزه نیوسونیا هم این مرض میشود  
و آن آینه مذکور خواهد شد از الله تعالی علامت در جات آن بحسب ائمه دم و شدت مختلف اند خفیف است که در  
شاخهای کلان باشد به شاخهای خرد رسد علامت آن تب است که سرفه بود و مجمل تنه او در محسوس شود و تب خفیف باشد  
و غالباً زکام هم میباشد و آنچه در زکام علامت یافته میشود که اول در بینی خشکی ظاهر میشود بعد بلغم سفید قیق می آید بعد بلغم  
غلیظ و زرد میشود همچنین بن سرفه اول خشکی باشد بعد بلغم قیق سفید سرفه دفع شود من بعد غلیظ و زرد دفع شود و جهت گز  
بلکه محتاج علاج هم نمیشوند و این قسم منبع احوال است و شدت آن نیست که درم تا شاخهای خرد و قصیده یه و در این وقت سرفه  
شدید و حی قوی حاد بود و در اضلاع تنگی محسوس شود و بیمار بر سریدیم ساس نقل نماید و در تنفس سخت و تواتر بود و نبض سریع  
و در ابتدای این قسم هم همان علامت شروع زکام یافته میشود و گاه گاه این ض چنان سخت میشود که از دم میوکس میسرین و جمع  
شدن بلغم در شاخهای خرد و هوا غلی رچی تا خون نرسد درین وقت دم کشیدن تکلیف آید و میشود سرفه شدید و کثیر بود و رنگ  
مائل بسیاهی و رنگ لب مائل بلغمی در داغ بیمار ظاهر بود و کلام مختل نماید سبب این موثر لایحه فساد خون بود زیرا که خون  
بسبب فتن هوا در ریه صاف نمیشود ازین جهت رنگ چهره و لب متغیر گردد و چون ازین خون داغ را هم غذای خوب و صفا  
نیرسد پس مانع هم مضر میشود و اگر اکات آن ناسد مختل شود بعد ازین بیایم میسرین و اگر مرض قابل صحت است پس اولاً بعد از نوشیدن  
عارض اول بخار کم میشود و در تنفس سهولت ظاهر گردد و گاه که خارج میشود و غلیظ و زرد شد و بسبب این دفع گردد و این گاهی  
ویرگاه ماند و در زمان کثیر از آن نجات و نقا حاصل شود چون بعد از آن سبب نکائیس کرانیک همین علت را نامند علاج او  
مسهل بنده از مثل کلومل و جلیپتا که بوش خون هم کم شود یا سنگی شیا سلفاس خوراند اگر در زایده بود و پیاپی سینه سینه سینه  
از ششم حصه که برین طبقه همراه آب بخوراند تا قی لید و زرد قلب بدن کم شود خون مسوی و دم کم رود و قوت دم کم گردد و لیکن  
تدبیر مرد قوی است اما اگر بیا ضعیف بود و عرض آن پیکان انا از دو گزین تا پنج گزین همراه آب گرم بنوشاند بعد آمدن فی شانزدهم  
حصه گزین از ششیم بایک گزین پیکان انا آنچه همراه آب بعد چهار ساعت بنوشاند تا قی نیاید و لیکن تهره باقی ماند که آن  
میوکس میسرین سرفه می شود و از آن غنم جدا شود دفع میگردد و ایضا پارچه فلان که از قسم لباس موئین است در آب گرم تر کرد  
فشرده روغن تارپین بر آن پاشد از آن بر سینه مرض نه بسیار خفیف میشود این نیز بنا بر آنست که اگر تهره روغن تارپین طلا

عادت زکام کلان است

بواسطه ایجاد سوزش و در دم جلد مضر خواهد شد و باین تدبیر از اضران ایمنی حاصل میشود و از نفع آن تضرع ممکن بود و بعد بر آن  
افراج بلفظ تنگی و تنگی شستن را با سیسم که گوشتیست نصف درهم همراه نایله که سیسم را شکسته و کافور حله که بخوراندند فایده این  
ترکیب آنست که کافور حله را بر سر نه سبب آنست که سرفه نمی آید و موقتیکه سیسم را بر آب اگر ده دفع کند از زمان سرفه خواهد آمد پس  
ترکیب نه بنیایه بنیایه بر سر نه سبب آنست که سرفه نمی آید و موقتیکه سیسم را بر آب اگر ده دفع کند از زمان سرفه خواهد آمد پس  
پس کافور حله را بر سر نه سبب آنست که سرفه نمی آید و موقتیکه سیسم را بر آب اگر ده دفع کند از زمان سرفه خواهد آمد پس  
ایسیاس ده گرم بر سر نه سبب آنست که سرفه نمی آید و موقتیکه سیسم را بر آب اگر ده دفع کند از زمان سرفه خواهد آمد پس  
که یک نیم آونس باشد حله که صاحب سرفه که از رنگ کاشی غیره باشد و از نه موافق این مقدار سه چهارم از بنوشانده صفت است  
که آنرا بر بان اگر نریزی که سرفه می کند و آنرا سبب آنست که سرفه نمی آید و موقتیکه سیسم را بر آب اگر ده دفع کند از زمان سرفه خواهد آمد پس  
بعد در سر که صاف و تند که شش پنبه باشد آن ترکیب چهار تا بود و بر آن هر پنبه بوزن ده پستانک میباشد که در ده پستانک  
چینی انداخته بر تیش ملائم مقدار بار با نظرت مذکور حرکت داده باشد تا بساعت چهار ساعت بر همین منوال بر تیش داشته باشد  
در پارچه سفید انداخته آب صافش بگیرند و بعد قطره آب صاف آنچه در حانی باقی ماند آنرا فشرده این سر که محفوظ دارند پس بعد  
سی آونس از این سر که سبب آنست که سرفه نمی آید و موقتیکه سیسم را بر آب اگر ده دفع کند از زمان سرفه خواهد آمد پس  
و شیشه با ظرف این کشاده زجاجی یا چینی نهاده نگه دارند و وقت ضرورت از این شربت سه کوئل که سه کوئل نام گرفته اند  
و فی الواقع آن سبب آنست که سرفه نمی آید و موقتیکه سیسم را بر آب اگر ده دفع کند از زمان سرفه خواهد آمد پس  
اتوی است بنوشانده صفت وین اپیکاکو انا بسبب قطره سپریه نایله که سیسم را شکسته و کافور حله که بخوراندند فایده این  
تا دو درهم همراه آب صغری یا نقوع سبب آنست که سرفه نمی آید و موقتیکه سیسم را بر آب اگر ده دفع کند از زمان سرفه خواهد آمد پس  
و خلط مرض بنوشانده و گدازند و زدن او و به سبب معالج حاذق را ضرورت که موافق عمر و قوت و ضعف مریض شد  
و خلط مرض معین فرایند هرگاه در مریض سبب کفری قوت حرکت سرفه هم ساقط شود درین وقت میوینا کار بناس پرینج گریز  
تا ده گرم همراه آب پودینه یا آب کافور سیسم بعد ده و یا سه که چهار ساعت موافق شدت خلط مرض بنوشانده و گدازند  
خورانند در آن لحظه باشد که سرفه سبب خلط خالی از شمع و تولید یارح خوراندند و آب مطبوخ گمان بنوشانند در اوایل قیسم  
افزون بنوشانند که سبب آنست که سرفه نمی آید و موقتیکه سیسم را بر آب اگر ده دفع کند از زمان سرفه خواهد آمد پس  
قدیمی از آن گمان است که بدینند و لا بگزینند و خصوصاً هرگاه رنگ چهره سیاه و لبها نیلگون و حواس مختل باشند درین وقت  
استعمال آن حرام است و تذکره دوم بر نکاشیدن که آنست که بنایان اکثر بقدم اول یعنی بر نکاشیدن کیوت حادث میشود و گاهی از مری  
یعنی زکام و سرفه فصلی پیدا میشود چنانکه در فصل شکال اکثر عرض آن بر همین منوال بود و این مرض از زمان دراز میماند و پیش از آن  
که از این مرض میگویند سبب دوم سرفه ضعیف و مستمر می میشود علامت آن سرفه می آید و گاهی سرفه با تشنج بود چنانکه

در

مرض استصفا میباشند این وقتی است که هوای سرد و میوکس میبرن که در قصبه شاخهای آن فته است برسد چه از هوای سرد و برین وقت  
 خالیست میماند و متضرر و متاخر میشود و ازین آن چون بدماغ رسد فته دماغ تشنج پیدا میکند بر سعال لیکه بی اراده می آید عموماً سبب آن  
 تشنج میباشد زیرا که دماغ برای دفع کردن ازیت هر قاع از مقامات بدن تشنج پیدا میکند و تنفس عبیر بود و بلغم و کف که درین قسم خارج میشود  
 زرد و غلیظ میباشد و گاهی باده شسته میشود چنانکه فرق بین دما و شوارد بود و همین اطباء میگویند تا نایان سل غیر حقیقی نامند و خرابین  
 قریه پیدا میکنند آن نقل میشود قبل از اثبات سل در آن جمعی نباشد و اما وقتیکه سل پیدا میکند تب خاص که سبب پیدا شدن آن است در سل  
 ضرور عارض خواهد شد و اما وقتیکه سل نشود و درین مرض خون باکیت نباشد لیکن پیران او درین مرض هرگاه بسبب کمزوری قوت دفع  
 بلغم و سرفه نماند و بسبب آن بلغم کثیر در سینه در لیه ایشان جمع شود البته ازین شدن تنفس باکیت است علاج درین مرض فاکتوریت  
 خون باید که درین امی آن آب گریین شانه غذای صالح مقوی نورانند و بدن از رواج همیشه گرم دارند و برای آن آب  
 فیصل لباس بقدر حال موائی فصل بوشانند باشد برای تقویت میوکس میبرن و نیز و این که میوند یا با لسم کو میا ازده قطره  
 قطره همراه شکر افیون یا افیون محلول آب منجیه بوشانند کیسکه محتسب شراب باشد و او را باید که بتدریج و کم یسند از پنج گریین  
 گریین همراه آب حلکده بنوشند که برای سعال بلغمی بسیار مفید است و گاهی درین مرض در سینه ازیت و در دیشوون قنار خربل بلغم  
 درست کرده بر سینه نهادن میونیا کلوراید از ده گریین پانزده گریین همراه آب حلکده نوشانیدن است و همیبل خرج بلغم قطع از جوت  
 این بلغم است اگر همراه امیونیا کلوراید اواید باشد شانس او در سرفه مزمن نشاند برای اخراج بلغم دفع ورم میوکس میبرن بسیار مفید  
 و هرگاه مرضی راضع کمزوری یافته شود و قوت تحریک سرفه باقی نماند امیونیا کاربناس از پنج گریین تا هشت گریین آب حلکده  
 چهار چهار ساعت بنوشانند هرگاه تشنج زیاده شود سرفه کلان فام نصف هم همراه آب نوشانیدن هم سیدد اگر اصل کلان فام  
 دهند تا پنج قطره کافیست گاهی این مرض بسبب عذر بود و در آن همراه سرفه بلغم قوی زیاده می آید و بخار نمیداشد لیکن تشنج  
 ظاهر بود مثل اینکه شتهای طعم نباشد از غرور و خفیف بدنام معده محسوس شود و در ضمن غذا نیک نباشد آب ترش اکثر از معده  
 و برین آید و گاه گاهی هم همراه سرفه می آید بلغم در قی خالاج میشود و در آن نیست و میوکس میبرن اندرون معده و خفیف عارض  
 میشود علاجش نسبت که اول مسهل خفیف مثل سینگنیسیا و روبرب یا سفوف یاس کمیونیک از چهل گریین یک هم باشد و خورانیست  
 راضع است که بعد از هشت پنج گریین کلنیای پنج گریین سوود از ده گریین تا هم منجیه قبل غذا بخوراند و بعد غذا هم هشت بعد چهار ساعت  
 از غذا پائی ریک سلاین یا عوض آن هر سلاین که باشد مثل سدنیر و یعنی سفوف ترکیب ده سدنیر صاحب نشاند این  
 بنابر نسبت که هر سه دوا می آید اول که قبل غذا امر بخوراند آن شامقوی معده و چون بعد غذا در معده ترشی و بلغم پیدا  
 و از آن معده را کلفت ضرر میرسد که از آن ضعف آن بر طرف نشود و اما برای اخراج فضل متولده تجویز کرده شد که باز دوا می  
 دهند تا این بلغم و ترشی که پیدا شد خارج شود و مخرب معده در معده باقی نماند و برای این سرفه اسپیکا کو اناده گریین از فیما چهار گریین  
 همراه سرفه ناییک که غیر خوراند و برای محتسب شراب این دوا را با کافور محلول آب که کافور سه چهار گریین یک و نسل آب حلکده باشد

در سعال ربو و تشنج دماغ

در تشنج دماغ و تشنج سینه







شخصی که با هم این مرض عرض شود و در آخر کمزوری زیاد کرده که از آن بر حرکت سر و دفع بلغم قادر نباشد و دشواری رود که از آن  
 آنرا هم این و انوشانیدن جایز است برای ازاله کمزوری و در غذائی این بلغم شور با می گوشت گاو یا بز یا مرغ حسب طاعت  
 و مناسب حال قدری قدسی بعد یک دو ساعت بنوشانند و چون عطش درین ضلایه میباشد اندام برای تشنگینش آنچه چمتو  
 نوشته خواهد شد استعمال آرند پس اگر سه روز مسکنات عطش تشنجی قوی آب گوشت تیار کرده بنوشانند بهتر است و بعد از آن مرض  
 علاج تندستی نمایند چنانکه اگر گفته شد که اگر اربع دیلو رسی و دیلو رسی است یعنی فصل شش است و دیلو رسی هم غشایی است  
 که مثل کسبه و تومست قوی از آن بر روی قلب قوی از آن بر اضلاع آمده و این هم همین غشاست که بر ضلع آمده و در کتب  
 طبیه عریقه باسم ذات الحجب موسوم است این ضل کثیر العروض است خصوصاً در فصل سر اکثر عارض میشود مکن است بعضی  
 غشائی مذکور یا کل آن یا در یک جانب یا هر دو جانب عرض شود اما آنچه بحسب تجربه دیده شد نیست که اکثر بجانب سمت عارض شود  
 و درین ضل میان غشای مستطیل اضلاع و غشای که بر روی آوده بریم که عبارت از بلغم مزاج است از دم غشائی مستطیل اضلاع  
 خارج شود جمع میشود و از آن غشائی که بر روی آوده بریم که عبارت از بلغم مزاج است از دم غشائی مستطیل اضلاع  
 ریزش فرق را به یالین همین علاج این ضل است و حاصل جمله علاج این ضل این است که بر روی غشائی مذکور بپسند هرگاه این ضل  
 بخوان قوی عارض شود بلغم مزاج و غلیظ و سرفه مزاجی آید و چون شخص ضعیف و کمزور عارض شود آوده قوی مثل بال الحجب که اکثر  
 خارج میشود و گاهی این آب که شایه الحجب است بریم میگرد و در آن فاسد و متعفن شدن این هم هوا پیدا میشود زیرا که درین بیم  
 کبریت میباشد و آن از تعفن فساد هوا میگردد و چون ثبوت این چهار سرد غشائی مذکور و جو جمیع میشوند آب هوا الاسباب  
 سبب این ضل و هم همانست که درین مونی یعنی ذات الحجب گفته شد یعنی از رسیدن هوای سرد و خفگی مقام سرد و طبع  
 پدید آمدن لباس طب از سردی و خارجی پیدا میشود و گاهی با ذات الحجب قوی همراه سل هرگاه ختم تا این غشا برسد میشود زمانی  
 وجع متعال این ضل پیدا میشود زیرا که غشایه متعال غشائی مانع و غشائی بالایی قیله این غشا همه یک قسم میباشد  
 گاهی در امراض کرده حادث میگردد بسبب خون که از ضعف گرده عارض میشود عللاً است اول در دشواری ضل میشود  
 مثل حیله که از نشتر زدن پیدا کرد و لیکن باید دانست که این مرض هر دو قسم است یکی قوی که در آن علامات بقوت شرت میباشد  
 آن اگر کوش بود یعنی حادث باشد که زمان نقصانی آن قریب بود و این جمع شد چنانچه همین است دوم ضعیف که علامات در آن  
 خفیفه قوی است این قسم که انیک یعنی مرض بود که زمان بقای مرض در آن طویل باشد و درین قسم در بسیار شد و نباشد  
 لیکن علامات دیگر که مختص این مرض مذکور میشود و چون بعد از سه سال بلغم مزاجی در پی عارض شود و لیکن خفیف بود و لیکن  
 نباشد و شکایت و بلغم مزاج نشود و هرگاه خواهد که دم در کشد از ریه و در تنفس کل مکن نبود بلکه قد قوی نفس اندر زنده میشود  
 ازین سبب نفس متواتر میگردد و نفس هم متواتر تلافی نماید هرگاه این هم برسد به زیر ترقوه باشد و دم بود زیرا که اکثر غشای  
 اینجا قلیل است هرگاه در دیلو یا محل سلسیف باشد در زیاد میشود و به حرکت غشائی اینجا زیاد است و هر قدر که انقباض

در این ضل  
 میان غشای  
 مستطیل  
 اضلاع و  
 غشای  
 که بر روی  
 آوده  
 بریم



زیاده شود از شدت حجاب در روز یا ده شود و هم هرگاه ورم بچکن شیف بود بسبب شدت جمع مشقه شود که ترش می رود و کبد است  
یا ذات الجنب فرق باین طور کرده میشود که اگر ذات الجنب باشد در بعضی بسوی جهت موافق مرض که هست در جهت مخالفی خفید  
بر آن ممکن نبود و بر جهت مخالف در می خفید بر آن جهت آرام یابد و اگر ورم کبد در ورم کبد بود درین وقت بر جهت مخالف مرض یعنی  
خفید بکن ممکن نباشد زیرا که هرگاه غشای کبد متورم میشود و دریم از آن خارج شد بر غشای کبد که بر کبد و حاد و طحال و اسهال اند  
میشود و از آن بر کبد می خفد بر جهت مخالف یعنی خفید کبد بسبب ثقل خود از غشای کبد که بر آن خفید است  
جدا میشود پس از ثقل ورم و آن در روز یا ده میگردد و ذات الجنب بر جهت موافق که در خط طحال در روز یا ده میشود سبب است  
که از این به پیش ورم متغیر میگردد و از ریه و ورم غشاء طحال واقع میشود و از آن اذیت یافته میشود و بعد از آن ظاهر میشود تا با بعد از  
این تب قطع میگردد و در وضع خفید صحت میشود و لیکن در تنفس شواری میماند بسبب جمع شدن آب غشاء چون نوبت با تب قطع  
آب درین غشاء رسد یا از جای خود حرکت کرده بسوی مقدار نظر بجانب صلب خود می رود و به تمام ضلع بر پهلوی راستی و برآمدگی و  
معلوم میشود و چون این آب یاده میشود پس اگر در جانب است بود کبد را هم فراموش کند و از آن کبد متغیر شد بر ریه و چنان ممکن  
شود که کبد متورم شده بر ریه بعد از این آب را هم فراموش میکند باین طور که اگر در جانب چپ بود دل را بسوی جانب است  
و اگر جانب است بود دل را بسوی جانب چپ میگردد و حرکت ضلع و ریه ناپدید شود و در غمزدن حرکت میکند و ضلع که  
در میان ضلع واقع است بیرون برآمده معلوم میشود و چون باین حد رسد ذات الجنب هم خوابیدن بر جانب صحیح دشوار و ممکن  
بود و درین وقت ثقل این آب بر جانب صحیح ریه و بر دل می افتد و از آن هر دو متاخری شوند لیکن بر جانب مرض میخوابد اما اگر بسیار  
زیاده شود خوابیدن بر که جهت ممکن نباشد و نشسته ماند و درین وقت تب نباشد لیکن اگر بعد از این حالت باز بخوابد در روز و شب  
دو سه بار زیاده بدن گرم شود و عرق زیاد از پشت شود و باز برین عنوان شدت کند پس باید دانست که ریم سپید است و جای که  
هوای متعفن شدن ریم سپید باشد هرگاه بر ورم نکشتند که از آن محل هوا مثل آن و از طبل بر خواهد آمد و جای که ریم آب باشد  
آواز آنجا آواز جسم صحت باشد که از وزن نکشت بر می آید و هرگاه آلهه قیاس صوت نماید بشنوند آواز ترش و آواز ریه می آید از آن  
معلوم میشود که هوا متورم است اما در ریه نمیرود و در نیست علاج اگر بعضی قوی باشد و مرض زیاده بود فصد گیرند و خون چندین  
بار بزنند غشی لیکن باید دانست که اگر در بعضی نشانیده فصد گیرند پس از خارج شدن قلیل هم بروی ضعف می آید غشی طاری  
میشود و اگر خوابانیده فصد گیرند بعد از خارج مقدار کشید از ورم غشی می آید و چون مقصود نیست غشی آید پس باید که نشانیده فصد  
خون بر آن نماند خون زیاده خارج نشود و مطلب حاصلی گردد و بعد از آنکه از غشی ببرد و چون با نماند نصف ساعت یا یک ساعت  
قوی تر نشد کلوا مل و جلد بعد از فراغ از سهال ده گرمین کلوا مل و یک گرمین فیون بخوراند و دیگر علاج نکند چه ازین واد عروق تو  
آید و خون از محل ورم جذب کنند این جمله تدبیر در سه ساعت در یک روزی در پی عمل نماند با قوال کسانیکه در فصد سهال حالت  
و ادن ایام تلاکلی ضروری می دانند و صفا کنند ازین فشار الله مرض دفع خواهد شد و اگر بعد از پنج ساعت باز مرض عود کند پس



و انقباض از آن زایل میگردد و این مرض پیدا میشود و هرگاه بزرگ کاشین اصل عرض شود پیش آن بود که چون بلغم در آن مرض  
و ششها جمع میشوند و از آن راه جریان هوا بند میگردد و پس از بند شدن هوا یا اینجا مکان یاده میشود یا شکافته گردد و گاهی این  
شکاف تکی بسبب ضربه و سقط هم حادث میشود و چون شکافته شود هوا از آن خارج شده و در غشای خانه و در بنسط گردد و از آن  
تمام ریه عظیم میشود و این هوا که از ششها قصبه بیرون آن جمع شده آن از دخول هوای خارجی مانع میگردد و و از آن با خون  
مخلوط نشود و خون در ریه کم میزد و زیرا که از غنای هوای معلوم راه دخول هوا و خون هر دو بند شد و علامت عتس نفس بسیار شد  
که هوا بیرون نرود و حرکت بنساطی تنفسی و انقباضی آن بطبیق و امتحان آن بذریعۀ آه قیاس الصوت بخوبی کرده  
میشود و در خوابیدن بیشتر و از شدن کشیدن هوا بسیار دشوار بود و این سبب بیمار نشسته دم میکشد از آن فی قصبه راه  
نفس شود و نفس میشود و اگر مضمی شود و از آن هوا اندرون معده پیدا گردد و آنگاه بسبب مزاحمت آن مرض یاده شود زیرا که  
آن صورت غیر ریویج و اگر برنگاشتن همراه آن موجود بود و سر نمی آید لیکن کفای زبانت زیاد بود و بلغم کم باشد زیرا که  
وزیر بسبب خروج هوا بشدت در ریه میشو و قلت بلغم بسبب آن میباشد که مرض میوکس میبین نیست هرگاه بیمار نشسته  
برای کشیدن هوا میکشد شش سینه قاع کوبه تر میسازد و چون اینجا حالت مشاهده کنند بقیمن آنست که سینه ضعیف است چون بیمار را می  
کشی سینه را بذریعۀ عضلات حرکت میدهد حرکت و اعلی و سفلی ظاهر شود و در قاع خلعت نباشد بالائی ترقوه در آخر گردن تنفس  
گوی می افتد و بیش نیست که چون سینه برای دخول هوا خالی کرده شد پس اگر آمد و رفت هوا سهل و ممکن دی و محل خالی هوا  
شدی چون هوا نمی رسد پس بسبب تناسخ خلا بعضی اجزای کفیه غیره میروی آن جذب میشوند و این سبب است در استقامت بیمار میشود  
و چون این مرض خون در ریه شکل قلع میسر سازد این سبب است که از ریه خونی در جانب راست آن یاده جمع میشود و از آن  
تخلیه میجوید بسبب آن هر که هم دراز میگردد و زیرا که در آن خون بدن کم میسر سازد و چنانچه زیاد میماند بسبب آن در سینه جمع میشود  
و به اطراف حرمی افتد و حال خلیل ششها تنفسی بود و چنانکه در ریه با آن میزد و همچنین از بالا یعنی از سر و چهره نیز معنی  
بدن فرو می آید و در سر و چهره زیاد میماند و از آن چنان و غشای تناسخ میشود و گاهی از ریه یاده شدن خون در دل آبگیر از آن  
جدا شود و کیه کیه پس نیست جمع میشود و آن مزاحمت بر دل میکند و آنرا غیر نمایان بسبب گاهی درین مرضی از جای خود حرکت  
کرده و چنانچه برین تا عظمی میروی می آید و درین قسمت غشای خونی حرکت آن محسوس میشود و درین وقت جانب پشت خود  
و در جانب سینه تقطع ظاهر گردد و در آخر این مرض بسیار و ناختمای مرضی رنگت لیمبی ظاهر شود و بسبب کفای فساد خون از ریه  
هوا بآن پیدا شده و هم آنکه تن از بالا یعنی آید با جلای این مرض قتل است و زنده زنده زیاد شده مودی با هلاک میگرد  
و علاج خاص آن نیست لیکن اسباب اوله آن را کم کرده باشند تا که آنچه ایام حیات از آن اذیت کم شود مثلاً بخوبی  
کنند که ریاح زیاد پیدا نشود و اگر برنگاشتن است علاج آن نمایند و اگر با سدی باشد ببلایش مشغول شوند و اگر بسبب  
ضربه یا سقط پیدا شد باشد بر سینه کم و آن از عصاره در حکم بریزند تا حرکت سینه بند گردد و بسبب آن نیم نای عظیم نشود

علامه ششم در تهایس

بعده بیمار را آرام تمام دارند و هرگاه برگردن در خسار و بدن ورم ظاهر شود از سوزن های خرد و محل ورم نقبه باید اگرده بیاچ  
 را بر بدن آنرا تا چون درین بایستد جلد پاک میشود و تا که تکمله ششم در تهایس سس یعنی سل آن نیست که چنانچه  
 سفید خورد و در غشای مثل گاو در و سفیدی مثل پنیر یا سفید و بیخه مرغ از خون جدا شده اندرون شاخهای قصبه میشود  
 و در آخر آن که محو مثل زایه است جمع گردد و خواه بر طبقه داخل یا بر جانب خارجی آن و بجا اجتماع این جسم کلان سخت میشود  
 از آن در سختی پیدا میشود و آمدن خون در آن بند میگردد و غشای ریش در که مثل غشای خانه دار آن محبت است فاسد و  
 میگردد و این جسم را در زبان نگریزی چون کل بضم جیم فارسی و سکون او و فتح بای موصده و سکون او فتح کاف و سکون لام میگویند  
 و معنی غذا یا عقده است بالجمله هرگاه این جسم غریب شاخهای قصبه جمع شود گرد آن ورم یعنی نفش میشین در ریه حادث میشود  
 و این خون برای تغذیه می آید و در غذای آن بسبب مانع صرف نمیشود و گرد شاخهای مذکوره زیاده جمع میگردد و چون کله بیضی  
 از خارج این جوهر غریب زور و شدت و تحریک عینت بعمل می آید ازین سبب گرد شاخها ورم پیدا میشود و در آن ورم جیم می آید  
 چه ورم موی حارید یا شد چون درین ورم جیم پیدا شود و همراه آن این جوهر سفید هم ریم شد و همراه ورم سیردن می آید و بعد دفع شدن  
 با ورم جیم گاه گاه دارد سفید صلب هم در سرفه دفع میشود که از آن است میشود که درین جوهر سفید رنگ هم دیدا شد اکثر این ضل و در  
 جانب علی که قریب قوه است پیدا میشود و این اجتماع در بخار اجزا گاهی تدریجی و گاهی بسرعت حادث شود و گاهی این بخارات  
 در از در ریه پنهان را ورم در ریه پیدا نمیشود و گاهی خسار و ورم در ریه بقوت و بسرعت حادث میشود و حاصل این بیان آنست که گاه  
 این مرض حادثی فزین باشد سبب آن از اسباب بعید توارث و خاندانی بودن مرض است و از اسباب قریب سیردن  
 هوای سرد یا اختلاف هوایا باشد و شام هوای بار و فطریه هوای حار یا یک روز در حار و روز دیگر هوا بار و روز  
 کشیدن خان گانجه چسرس و اکثریت مباشرت با عورت و همچنین از راه کار و صنعت که در آن شسته و سرنگون گرد کار کرده شود  
 جویای دانی هم عارض میشود چه درین صنعت با هم سر و سپیده انهم کرده کار میکنند که از آن هوا بخوبی صاف در ریه نمیرسد  
 از آن خون فاسد میگردد و ایضا در دانی سبب گیر نیست که مذاق آن در مکان بنام صناعت خود را میکنند تا پنجه زیاده در هوا  
 ضایع نشود و هم آنچه جزای خرد و چرک پنجه در هوا متصاعد میشود و در ریه هوا در ریه آن میرود و سفید خون میشود بالجمله  
 سبب آن ضعف و ضایع خون کمزوری یا دیدا شد و اکثر اینها گائیس که اینک یا در آخر ستهما عارض میشود بسبب صاف شدن  
 خون درین امراض علامت آن اکثر از دیدن بشمار و سحره علیل این مرض خوب یافته میشود زیرا که اکثر موهای پاک این بیمار را  
 بوند و سفیدی چشم آن مثل سفیدی مرادید بود و بسبب کمزوری خون ناخنهای مریض مقوس بودند و تنخرن وقت تنفس  
 متعجب میشوند و در ضلح علی سینه تقعر پیدا شود و وقت تنفس یاده بلند میشوند و بالای ترقوه برگردن وقت تنفس جانت بین  
 پینا گویی پیدا شود و شروع مرض اکثر ابتدا ریه بود لیکن این سرفه چنان خفیف خشک دیدا شد که بیمار را خود معلوم نمیشود که سرفه  
 میدارد چه وقت صبح یا بعد خواب قدری می آید اما هر قدر که مرض زیاده شود سرفه شداد نماید و غم زیاده خارج شود و اول سفید

نخه شش

نخ مثل سیدری به غشیه و گاه گاه لثیه خون در آن می آید یا قدری خون با بلغم پنجه خارج شود و بعد بلغم سفید مثل ریح می آید این  
وقتی است که هرگاه جوهر جوهری که می شود خارج می شود و لاغری اندام از ابتدا می خورده و غرض می شود هر قدر که مرض زیاد گردد لاغری اندام  
نیز زیاد می شود و حرارت خفیف هم از ابتدا می خورده و غرض می شود و لاغری اندام از ابتدا می خورده و غرض می شود و لاغری اندام از ابتدا می خورده و غرض می شود  
می شود و سبب می آید که هرگاه جوهر جوهری که می شود و لاغری اندام از ابتدا می خورده و غرض می شود و لاغری اندام از ابتدا می خورده و غرض می شود  
بعد سردی بدن گرم شود و بر چهره سرخی ظاهر گردد و هرگاه گرمی کم شود و در آن بیمار سبب سستی خواب و چون بیدار شود عرق بر بدن  
لباس خود مشاهده کند و گاهی در عالم خواب قیام کرده و گاهی در عالم بیداری آنکه تب ظاهر باشد و این حالت تا وقتی ماند که سال شروع گردد اما هرگاه  
سهال شروع شود آمدن عرق و جوی موقوف گردد و سبب سهال هم در آن وقت این جوهر قصبه است بسوی معالک از آن غده که  
در معالک علیها اندر نمی می شود و ضعیف شد بر سبب غذا قافله نشوند و چون سهال بند شود باز تب عرق آمدن شروع شود و حال  
برین منوال می ماند تا که رفته رفته مرض ضعیف لاغر شده و پاک شود و باید دانست که ابتدای این مرض بر یک نقطه نباشد اکثر است  
که گفته شد یعنی بفرست شروع کند و گاهی ابتدا از بطنی غذا می باشد که در بطن می ماند و گاهی ابتدا از معده می باشد که در معده می ماند و گاهی ابتدا از ریه می باشد که در ریه می ماند  
مرض لاغر ضعیف می گردد و از آن در وقتیکه می شود و جلد و جلد می کشد و بعد سر شروع می گردد و گاهی بدون آنکه علامتی  
ظاهر شود سبب بی توجهی از علامات خفیفه ابتدا به نفثه لاله می کشد و گاهی خون سرخ رنگ که آن نیز قهوه ای و آثاری آید و گاهی در آخر  
مرض خون کثیر آمده و بسیار پاک می شود زیرا که آنچه شریکین بالای نشانه های قصبه است که در آن خم شد و واقع اندازها گفته می شوند و گاهی  
در شروع مرض طبعش قلب سرعت حرکت آن عارض می شود و سبب آن عتس فرساده می شود زیرا که این وقت خون ریه زیاد می شود  
و هو اکم دخل می شود و کمتر خون می آید و پس اعتداج بسوی تریج زیاد می شود و داعی شود با جملیه هرگاه بپنجه که شخصی ضعیف و لاغر می شود و تب  
سرفه می آید و گاهی همراه سرفه قدری خون هم خارج می شود و در ریه بخار و عرق در روز و شب یک و بار می آید و همیشه بغل و سرفه  
می ماند و از آن وقت و شفقت مانده می شود و سبب آن عتس فرساده می شود و سبب آن عتس فرساده می شود و سبب آن عتس فرساده می شود  
شده من بعد دیگر علامات را تا بل قفقه و یونیا خیال گردد و این بعد حصول تعیین تشخیص مرض بعلاج آن مشغول شود و علاج باید دانست  
در علاج این مرض سه تدبیر عمیل و ردن ضرورت اول آنکه جوهر کل یاده متواند نشود تا که مرض جدی که رسید به است از آن یاده نشود  
دوم آنکه این جسم جوهری که پیدا شد از ریه بدر رود و منافع یا منجذب گردد و سوم آنکه هرگاه مرض قائم و بر باشد و شایسته و هرچند  
آن کم شوند و بیان هر یک کرده می شود و تدبیر اول آنست که عرق سیم الفایضی سکا یا از یک قطره تا پنج قطره همراه آب فائض پنجه روزی  
سه چهار بار بعد غذا بنوشانند اما وقتیکه شکم از غذا خالی باشد و نارندش اگر عرق نباش اصل سیم الفایضی سکا یا از یک قطره تا پنج قطره همراه آب فائض پنجه روزی  
چهار بار اینقدر آب حل کرده روزانه بعد غذا بنوشانند و این وقتی جایز است که اثر ضرر آن مثل سرفه چشم و حرارت هوا بینی و در  
نمای غشیان یا سهال یا در شکم بطور زحیر شروع نشود زیرا که سیم الفایضی سکا یا از یک قطره تا پنج قطره همراه آب فائض پنجه روزی  
می شود که می کشد می کشد چشم سوزش می کشد و در آن سوزش ظاهر شود و در سبب کس می کشد و در سبب کس می کشد و در سبب کس می کشد و در سبب کس می کشد



سهال عارض میشود و صورت ضعیف زایل میگردد و گاهی استعمال فیون هم معین بر تعریق میشود درین وقت بجای آن اکثر کشتن کلک  
 شکر کیسه از تدارک سهال هرگاه سهال عارض شود سفوف پلمبای شیش از رنگه گرین پنج گرین همراه یک گرین فیون باب صمغ  
 مخلول سرشته و در صباخته بعد شش شش ساعت اگر سهال کشید باشد دو دو حب نجور است و اگر قلیل بود یک یا دو بار دو دو حب نجور  
 موافق زیاتی یکی در شب شش گرین شیر حل کرده بنوشانند تا زخم معده انداخته اند و بیکه حابس سهال اند از آن خوارند  
 نوشانند از کشتن لدم ادا هم که نفث لدم قلیل باشد محتاج تدبیر نیست چنان شدت کم میشود و برای عمر نفس مفیدست  
 اما هرگاه زیاده شود که از آن نفث سفوف قوت و هلاکت بود بتدبیر حبس آن مشغول شوند باین نحو که یک یک لیسند پنج گرین همراه نصف  
 گرین یا یک گرین فیون باب حل کرده بنوشانند بعد چهار ساعت این دو را بخوراند تا آمدن نهن شود و حتی که در تدارک سها  
 نوسته شد آنرا اینچاهم خوراندین مفید باشد و اگر نفث لدم بسیار شدت کند و هیچ دوا نباشد و سفوف ارگ از دو گرین تا  
 پنج گرین بعد دو دو ساعت بخوراند یا آنکه ارگ از نصف رم تا یک گرم همراه آب بنوشانند یا بطور چای آب گرم  
 دم داده صاف میکنند بنوشانند و در وقت آمدن نوشانیدن و غن جگرهای هم مفیدست تدارک طبعش قلیچن طبعش ب  
 عارض شود و از آن بهایز زیاده متناهی گردد و عمر نفس بسبب آن یاده شود برای دفع آن دوی شلیس نجو یک طریقه سهال آن در تبر  
 اول نوشتن بنوشانند لیسند و سیاه کشتن لکیمون و قطره تا پنج قطره بعد یک یک دو دو ساعت بنوشانند تا از آن ظاهر شود  
 پس ترک کنند که دوی سمی و بسیار قوی است فتنه کر تکمله سابع در مایه فی القصبه من الاشیا الخارجیه است یعنی نجو سیاه  
 خارجیه و قصبه قدر آن چنان است که گاهی بعضی اجسام ماکوله و غیر ماکوله بسبب غفلت کم توجهی در قصبه می افتند و از آن فوراً  
 سرفه شد عارض میشود و هرگاه طبیعت دفع کردن آن نجو ایدزیر که قصبه جهت اعلی خود و فرخ و کشاده است و در جهت زیرین تنگ  
 است پس چیزی که داخل میشود در آن فرو نمی آید بسبب ضیق مجری و هم بسبب اهتمام طبیعت بدفع آن بنوعیه سعال غیره و درین وقت  
 از شدت سرفه تنفس غیر میشود و اگر در بر آمدن خیر شود بیمار مضطرب میگردد و در شک جاری میشوند و چشمان بر می آیند و گاهی طفل  
 در انقباضی خوردن طعام کم می کشد کیهی غلبه مثل آلوده و یا نجور و قبل از آن که از آن دندان شکسته زیره کند حسب طاعت طفلان  
 آنرا بلع میکنند و آن بسبب کبر جفته خود در اعلی مری معده رفته از صخره مجری راه نمی یابد در آنجا محبوس میشود و از آن مجیم مری معده  
 زیاده میگردد و مری قصبه را حجت و غیر میکند و از غیر حجت آن در قصبه شش عارض میشود و از آن تنفس ضیق و عارض گردد  
 و روی طفل سیاه میشود و چشمان بیرون آیند و مضطربید علاج درین وقت فوراً طفل را بر روی خوابانند و دست بگردن در میان  
 هر دو شان آن بقوت زنده تا شش بر طرف شود یا انگشت در حلق انداختن کنایه تا جسم نکور دقتی بر آید و اگر قی نیاید قریب باشد  
 از سر انگشت آن جسم سدا را غم کنند تا بفرود رود و در حجت خیمه و قصبه طرف شود تا شش ساکن گردد و تنفس سهل شود و اگر  
 رسائی انگشت آنجا نباشد از آنکه خاص برای انکسار وضع و موسوم بر پیر و بینگ است آن بصورت حرف میم عربی میباشد آنرا  
 در معده اندازند و طریقی نیست که وقت و حال برابر زبان نهند بعد زبان را از آن غم کرده فلاصق زبان در مجری مری

فصل پنجم  
 در امراض قصبه  
 و ریوی  
 و در برونش  
 و در تدارک  
 سهال  
 و در دفع  
 نفث  
 و در دفع  
 نفث  
 و در دفع  
 نفث

در دفع نفث



فیصل چهارم در نفس الانصباب

داخل کنند و اگر بدون غش لسان داخل خواهند کرد در قصبه داخل خواهد شد و ذکر فصل چهارم در نفس الانصباب که آنرا بلغم گویند بعضی ریه است نشسته یا قائم شد نفس گرفتن و آن نیست که بیمار را گردن خود راست نکند بسوی فوق نشسته یا قائم شد و دم نکشت تنفس ممکن نبود و این فی الواقع مرض نیست بلکه از علامات عرض است که در اکثر امراض یافت می شود مثل امراض لثون شکم لکین این علامت از علامات ویه است و هرگاه یافته شود کسی این حیات آن کم باشد زیرا که هرگاه ضیق یا غش نفس بسیار شده بود و آن زمان اینجا است پیدا می شود که از بیمار خوابیدن بر بستر خود ممکن نشود و نشسته یا ایستاده گردن خود را راست کرده و بسوی فوق بلند ساخته قاری دم میکشد و سبب آن نیست که هرگاه انسان می نپسندد و جگر و معده و غیره حیات بلند می شود و نفیس خود پرده شکم را غم می کند چه درین وقت این اعضا بسوی بالای آیند و از آن پرده شکم را زحمت می کنند و آن بسبب غم کردن اعضای مذکوره بالا می رود و از ریه مزاحمت می کنند و حرکت بنساطی او را تنگی حاصل میشود و تنفس عسیر میگردد و چون می نشیند یا ایستاده میشود و آن وقت این اعضا از قفل خود غم می گردند بر طرف میشود و احتشای بر می آیند و آنچه اذیت خاص مرض بوده باقی می ماند از این سبب تنفس استخوان مرض را بنسبت خسیب آید و ام می بود این وضع را بر خود پسند می کند هرگاه شکم آب یاده پیدا می شود مثل آن فرزان در محال یا استقامتی و از آن حجم شکم یاده میشود و درین وقت هم این آب قوت خوابیدن بر شکم را زحمت میکند و بسوی بالا آنرا غم و دفع می نماید از بالا رفتن آن بر دل ریه جایی حرکت آنها تنگ میشود و محتمل است که در خسیبیدن خون میاه در و ماغ غیما ند و بر ریه آید و از آن دل را تکلیف اذیت میرسد زیرا که آنچه خون که برای تغذیه ماغ در آن است از آن بیرون نمی آید و از این سبب ل مضطرب میگردد و چون می نشیند یا ایستاده میشود خون میاه از و ماغ غم بر می آید و آنچه برای تغذیه ماغ در دل موجود بود به بالا می رود و از دل کلفت سابق بر طرف میگوید و درین وقت این طبیعت مرض برای خود پسند می کند تا اذیت کم شود و علاج اصل علاج همانست که در مرض این علامت یافته شود و علاج آن پروازند و بیشتر از آن پیشینه نوشته شد و آن جوع نمایند و یک خاص صوت جتماع آب و شکم هرگاه اینجا عارض شود پس برای تفصیل اذیت علی شکم را بذر ریه نشسته بر آن تا تکلیف کم شود و مزاحمت بر طرف گردد و تنفس سهولت حاصل شود و ذکر فصل پنجم در حجه الصوت و آنرا بلغم گویند بعضی نقصان صوت میگویند این خود مرض نیست بلکه عرض است و در اکثر امراض یافته میشود و پنجم بالا بضمض امراض قصبه ریه مذکور شد پس در هر مرض که یافته شود علاجش همان مرض است لیکن گاه گاه یا سمن شکایت ظاهر میگردد معالج را و بدین پیما میسر نشود که مرض عرض را جلد کند درین وقت باید که بعلاج عام آن پروازند و آن نیست که شانس شراس و دو دم با ما و الشیر که هفت آتش شده باشد خالص یک و نس بود با هم تخم غره کنانند این و برای تخم و دم میگویند میبرن هر دو مفید است اگر فقط از دم میگویند میبرن باشد سفوف سرخ بست گرمین هشت و نس آب گرم تر کنند بعد سرد شدن آب صاف کرده و در آن نصف آتش شده نصف و نسجی مرکب نصف آتش کلاب حکرده به یک یا یک یا غره سازند و اگر مرض مجتب شربا شد و را باید که عرض یک گرمی نیم و دم گرمی

فصل پنجم در حجه الصوت

سفوف ساخته در دای مذکور خل ساخته غره نماید لیکن این دو اوقتی استعمال آرند که زخم در دگلون باشد و الا هرگز استعمال آن جایز نبود باقی بهر سبب که بجهت الصوت باشد معالج آن پردازند **فصل ششم** در سرفه و آنرا بلغم انگش کاف میگویند و این هم در حقیقت خود مرض نیست از قسم عرض علامت است که در اکثر امراض یافته میشود و این حرکت بطور اختیاری بی اختیار می باشد انسان عارض میشود و آهنگرگاه بطوری اختیار می بصورت مرض عارض شود پیش نیست که هرگاه که هم مودی در راه های هوا که می باشد میشود و متوسط اعصاب از آن مطلع و متاوی میشود و آن برای دفع مودی بذریعہ تشنج عضلات میخواهد که آنرا بیرون کشند و ل سینه و قصبه منقبض میشوند و تشنج در عضلات تنج و قصبه عضلات صد شکم ظاهر میشود و از آن این اعضا منقبض میشوند و ظاهر میگردد و پس کت سرفه مرکب است از حرکت انقباضی چنانکه حرکت عطاس هم مرکب است از این دو و فرق نیست که عطاس برای دفع از سینه یعنی انقباض میدارد و سرفه برای دفع از سینه و قصبه مخصوص است فصل غرض از این حرکت دفع کردن نفوی باشد هر جا که بود خواهد در قصبه یا در ریه این حرکتی شرکی میباشد مثلاً هرگاه سبب آن خاص ریه و قصبه حجاب صد بود صلی باشد و هرگاه سبب ریه بود بلکه در عضای مجاور مثل معده و کبد دل باشد آنرا سعال شرکی نامند و سباب سعال صلی بسیار اندک است و در هم میگویند سبب ریه زمانی از پیدا شدن غشا سفید قصبه و قوی از درازی استخوانها ملاتی شدن آن بار بار اصل زبان و سرفه عارض شود و گاهی از امراضیه چنان که کشش مرض از امراض آن در بحث نفوس که در رشد عارض میشود و سعال که در امراض معده و کبد امراض قصبه عارض میشود و برای حرکت سرفه قوت مرض ضرر است زیرا که دفع کردن مودی باین وقت که در هرگاه مرض ضعیف میشود و چنانچه در آخر بر گائیس میباشد پس این وقت بر میگویند سبب ریه بلغم زیاد و جمع میشود و از آن آه هوا بند شد بسیار ملاک میگردد و وقت موت همیشه از گوی این مرض آنرا در آخر حیات میگیرند که راه هوا از بلغم بند میشود و هوا بغیر اخت نمی آید بالجملة هرگاه علاجه منطوب باشد پس دل فحش شد که این علامت با کدام مرض عارض شده و سبب آن چیست پس هرگاه سبب معلوم گردد و مناسب نیست که اول تدبیر دفع سبب نماید که همان علاج است اصل اسهوس تخم کنان آب جو شایسته صاف نموده قدری نبات در آن انداخته و رب اسهوس حل کرده نیم گرم قندی قندی نشانیدن و چون اصل اسهوس نبات سفوف ساخته قدری قندی خوراندن رب اسهوس و این است که عاب آن فرو بردن در اکثر قهوام آن مفید میباشد و قدری فصل نفوذ نفوذ است و آن عبارت است از آمدن همراه براق سبب آن جایای متعده میباشد گاهی و آن مثل بان لسه و ماث آن نقل آبی بود و گاهی در بینی و آن تخماف می شود و گاهی در حلق و آن تخماف می شود و گاهی در حلق و آن بطوری می آید گاهی قصبه ریه میباشد آن اکثر بزرگ سرفه بر می آید گاهی هم بود و قیقه که حیض شود و سبب آن از درختن دفع میشود و این مختلف بود گاهی هم سرفه درانی همراه قی دفع میشود لیکن آنچه خون با سرفه آید آنرا بربان نگر نری میباشند پس بفتح های یوز و سکون یای تخماف و فتح میگویند الف فتح الف سکون بای موصوفه تاسی منقوطة و کسرین ل سکون سینه فی بعضی آه من با کوفه سینه است هرگاه خون باقی آید آنرا میباشند سبب منباشند فتح تاسی مبنی سکون یای تخماف و فتح میگویند کسرین جمله اول سکون سینه فی بعضی خون

فصل ششم در سرفه

فصل پنجم در نفوذ است

باقی آمدن اول یعنی آنچه خون را سر فرمایند این دو قسم است یکی آنکه خود مرض باشد و دم آنکه خود مرض نباشد بلکه بطور عرض و علامت  
در امراض گیر یافته شود و امر اضحی که در آن نفث الم بطور عرض علامت یافته میشود و هم نشد و زبان ر عاف و خیم قصبه و هم یعنی  
و سر فر و نبو ثو نیا و امراض قلب اجتماع آب در شکم قفسه زبانی آن مجدی سیر که فراموشت به کندیدیا باشند هرگاه از جناس حیض و کثرت  
جوش خون زبانی توین شدت حرکت آن عارض شود یا از ضایع شران عظیم که در قصبه به است یا شکافه شدن گیر عروق قصبه  
فقد اصل مرض است همچنین آنچاز تحذب طمعه زیاده سرنگون کرده کار کز مثل خیاطان غیور و شهنشاه و بوق نوازان که در ریاضات  
خون یاده جمع میشود یا جوانان را بسبب تعب و شغف و کشتی گیری می افتد آنهم اصل مرض بود و جوانان را بسبب کثرت و  
و کشتی گردن کثیر در یکس میبرد قصبه ریاضات جمع میشود و بسبب آن میوکس میبرد آن نه استوم شده بعض عروق مغفرا  
منقبض میشوند و آن خیم چنان خفیف بود که بعد تشنج هم بدقت تمام مشاهد میگردد و بلکه ثابت نمیشود و این مثل عرق یا خون حیض  
می آید یکس میوکس میبرد خون مجتمع میباشد علامت هرگاه آمدن خون از ریه قریب شود اول خراش صد و گلو هم در خفیف  
در سینه محسوس گردد بعد سرفه می آید و گاهی می آید و گاهی می آید بدون سرفه و این قوی بود که هرگاه خون از ریه  
میوکس میبرد آن در جمع شود و در ریه ای میوکس میبرد که بالای آن مثل شعاع خون مذکور است استهسته مثل جاروب کشتی  
بسوی قصبه دفع کنند هرگاه آن قصبه سیل جمع شود و قصبه در انخواه که از آن خالی و صاف کند بدو تشنج خفیف عضلات  
که توی بعد سرفه نشو خون مذکور را در دهان می اندازند و دفعه بیمار در یابد که چیزی از جانب قصبه آن فتاده چون بیرون  
اندازد می بیند که خون است لیکن قاع اکثر سینه همین است که خون به با سرفه کثیر دفع میشود باطله چون خون دهن آید بیمار نداند که  
خون است بلکه آنرا هم غمخ و اندازد اما هرگاه قاع کند و ملوحت آنرا یافته دفع کند می بیند که خون است و بیشتر ازین تب و گرانای سر  
و بدن سرخی چشمان سرخی رود و در قفسه سر و سینه یافته شوند اگر خون بسبب جوش زبانی خون آمده باشد آنچاز بند شدن  
حیض آید در آن در عانه تشنج عضلات ساقین قبل از آمدن آن اویست در علیل بود و بعد آمدن خون چند روز این شکایات  
کم شوند و خون ماه بام از دهان موافق عادت حیض می آید و آنچاز شکافتن شران عظیم بود و آن اول خون قلیل بعد بسیار  
کثیر بر آید و تشنج در باشد و آنچاز ضربه و سقطه بسبب شکافتن عروق می آید در آن تقدم ضربه و سقطه بر نفث الم شایع بود  
آنچاز تحذب طمعه سعال تشنجی تشنجی که غافریه باشد آمده باشند بسیار قلیل بود و آنچاز جوانان را بسبب ریاضت و این  
و مصارعت می آید آن به نسبت کمبیکه او را اجالت تحذب طمعه نفث الم شده باشد یا ده می آید و تقدم ریاضت بر نفث الم شایع  
باشد این خوان سرخ بود زیرا که در آن هوا یکس معنی سرخ کنند خون است مختلط باشد و چنین هر خون که از راه هوا بر می آید  
صاف باشد که آنیکه تا مدت در آن جمع شده و سعال سیاه شده بر آن خونیکه بعد از قوی می آید آن همیشه سیاه میباشد مختلط  
شدن تری معده هم بسبب اینکه قدری بعد حصول آن در معده اثر میبرد می در آن میشود و هم هوا یکس در معده است آن هوا  
کبریت است و آن سیاه کنند است برای آنکه در خون است با خون مختلط شده آنرا سیاه میکند و هوا یکس سرخ کنند برای آن

بآن نرسد ازین سبب همیشه سیاه میماند علاج عام این مرض آنست که هرگاه خون از دهن آید بسیار در مکان سرد و هوای سرد نشاند  
این بهیئت که سر و پر و شانهای غلیظ بلند بالا باشند درین حال سر را بر جمله اعضا داشته خوابیدن بر بستر دراز شدن نباید  
زیرا که باز یاقی نفث الدم در دهان و با بهیئت تنفس شوار میشود و چون سر و گردن پر و شانها رسیده نشیند  
تنفس سهل گردد و خون هم بالا کم می رود و ما دم که خون بکثرت آید نشسته و در بستر دراز شدن نباید بیهیئت که بالا گفته شد و هم  
بعلت اینکه در خسپیدن عضله گیر که موسوم به پرده شکم است بالا می رود و در تنفس محین نمیشود و در بهیئت نشستن تنفس یاده میگیرد  
که از آن به وقت بهیئت تنفس سهولت حاصل شود و اگر برفت و دستیاب شود قدری از آن در دهن بیمار گذارند و امر فرمایند که سینه را  
آنها فرو برد تا از سردی آن جوش خون کم شود آن خون بند شود و هم قطعه زبرفت بر سینه بیمار نهند منع کنند که بیمار از کسی کلام نکند  
و ساکت ماند و او را بایند نگذارد ابتدای مرض مسهل من اگر مرض قوی بود مسهل هم قوی نهند الا مستویا ضعیف و کمین  
و در بستر در میان پر و شانها زبر کردن حجامت فی شرط نهند خون جانب مخالفت جذب شود و بعد دوا می حاسب خون مثل آب  
ایستیاس پنج گریں یا نصف گریں فیون منجیه و حسب بندند و دو یا چهار چهار ساعت حسب یاقی کوی مرض خورانی باشد  
یا پلهبامی ایستیاس پنج گریں یا یکمک ایستیعنی جوهر سرکه خالص شش قطره یا پنجاه فیون یا فیون مخلول آب که از ده تا یا تیره  
قطره باشد در نصف آن آب حل کرده بعد دو یا چهار ساعت بنوشانند یا یکمک ایستیده گریں همراه قدری نبات که در نصف  
آب حل کرده باشند منجیه بنوشانند یا یکمک از پنج گریں ده گریں سفوف ساخته همراه آب بخوراند و بچهار بند شدن جوش باشد درین  
تدبیری که حیض بر آید یکبار بر نرد آن در علاج او در حیض خواهد آمد انشاء الله تعالی و آنچه از جوش خون نفث الدم افتد در آن طعم کام  
خوراند و فصد گیرند مسهل از ریگیشیا سلفا ش هندی بر سینه او چسبانند و همیشه تلین ملون بیمار واجب دانند تا بسبب خشکی برآورد  
تبریز محتاج بسوی تبریز دفع آن بزور قوت نفث شکم نشود و الا در آن بر ریخته خواهد افتاد و باز نفث الدم خواهد شد و هر نفث الدم که  
بسبب اشتقاق و فصد عروق بود که از رسیدن ضرب یا سقط افتاده باشد برای آن علاج خاص نیست لیکن آنچه در علاج کمین یا  
که بدترین اقسام بواسیر برای منع کردن بنساطریه و قتیقه از زخم رییه بوی پیدا شده باشد نوشته شده عمل آن در همه آنچه ادویه  
برای بند کردن نفث الدم در علاج عام نوشته شده اند آنها را هم خوراند و آنچه بسبب انصبغ شراب عظیم عارض شده باشد در آن  
علاج عام نماند همچنین آنچه از تحرب ظه و غیره از غماز سینه و رییه عارض شود در آن هم علاج عام کنند آنچه بچوانان از گشتی گیری یا بسبب  
مشقت و حرکت حین عارض میشود در آن هم علاج عام کنند و از حرکت و مشقت باز دارند و آنچه نفث الدم بطول عرض و علا  
در امراض دیگر عارض شود در آن علاج امراض صلیبه کافی بود که همان علاج عرض خواهد بود اما اگر زیاده شود پس علاج عام که نوشته شد  
نمانند فصد فی فصل هشتم فی العلق الناشئ فی الحلق ممکن است که شخصی همراه آب توکوچک را از غفلت بنوشد آن در حلق  
یا مری معده جای متخبط شده خون را حسب عادت خود قشر بکند از آن نفث الدم عارض شود علامت هرگاه از توکوچک  
بچسبید و از آن غم و کرب طلق عارض میشود و جای که چسبیده باشد زیاده آنجا ازین محسوس شود و معلوم کرد که چیزی آنجا متخبط

فصل هشتم فی العلق الناشئ فی الحلق



در دل جمع میشود و چونیکه از دماغ بر سر می آید بنا بر دخل شدن در دل فرود نمی آید و همچنین خون را بجز در معده و معده و از هر دو پاسبو  
قلب صعود نمیکند زیرا که دل خود متلی است ازین اسباب و از آن خون بند میگردد و از بند شدن حرکت خون بند میشود و حرکت دل رفعت  
کم میگردد و پیش از بند شدن حرکت قلب که تنفسش میشود زیرا که ریه سبب مجتمع شدن خون از حرکت این سبب است و تقاضای از میان دماغ  
اسباب غرق بلاک میشود و چونیکه تاکی اسید حیات غرق می شود و پیش از تدبیر حیات تنفس آن باید کرد پس بدانکه از وقتی که انسان آب غرق  
شود از آن وقت تقاضای نصف ساعت اسید حیات است و برای آن محنت باید کرد و اگر ازین مدت زیاد گشته باشد اسید خلاص  
نباید و پشت و لیکن تا پنج دقیقه اسید قوی میباشد بعد از آن هر قدر مدت که زیاد بگذرد اسید حیات کم میشود و آنکسی که پیوسته شود و غرق  
قسم اول غرق شد باشد آنکس تا چهل دقیقه بعد غرق میماند زیرا که حرکت قلب آن قبل از غرق شدن بند میشود و سبب غرقی  
آن که خراب شد بسبب دماغ نمیرود و در دل جمع میشود و غرقی حرکت قلبی میبندد و ازین سبب آن آب  
دماغ دفع نمیکند پس ضرر عضای ریه قسم دوم از خون دی خراب که برود ازین جهت برتر از میان دماغ است آنکه کم خیر و دفع غرق  
است پس باید دانست که آن دفع ضرر است هر گاه بخون سرد و از صاف کند خون موافق حرکت خود جاری گردد و از میان دفع  
میشود زیرا که هر گاه در آب هوا بخون نمیرسد جوش خون کم میشود و خون بند میگردد و چون بعد بیرون آمدن از آن هوا تا خون پیوسته  
در آن جوش بمیرد جاری میگردد و چهارم آنکه وقت تدبیر غرق کم کم است تا ضرر است پس باید دانست که هر گاه کسی غرق شد  
از آب بیرون آید باید که اول بخیر و در آن آن فوراً بر کنار آب تدبیر نماید تا نشسته میشود و بعد از آن را در او نقل آن بجای می گذارند  
انتظار نکنند زیرا که اگر نصف یا یک دقیقه نگردد بدن بر این حال بگذرد یقینی خواهد بود و دوم آنکه اگر بیمار مانعی از وصول هوا نباشد  
نباشد پنجم آنکه کم تدبیر برای غرق مفید تر است پس باید دانست که تدبیر در کتب طبیه عربیه و انگلیسیه مذکور اند لیکن آنچه از همه از روی  
قیاس تخمین بر سر بود نیست که فوراً اول غرق را بر روی شکم خوابانند و پشت دست چپ را از زیر پیشانی آن زند و قدری پا را بر سر شکم  
نهند تا زبان از دهان بیرون آید و یکبار شکم جمع شده از راه دهن منی خارج شود و درین حال جای پا بر پشت پهلوئی آن اند و دست  
کرده باشند لباس طب از بدن آن و کرده در گلیم یا لباس خشک بپوشانند و فوراً دست و پای غرق را با نلایک از حرارت  
مالیدن خون جاری شود و بنجد نگردد و بعد از یک نفر و دهن غرق را از دست خود بکن کرده معالج هوای خارجی را در دهن بکشند  
و در غیر دیگر غرق که کشاده است برود و کم کند اما وقت کم کردن این هوا حلقوم را بقدم عظم مثلث که برآمد است و آنرا از میان دهن  
گرفته میگویند و عظم را در عظم مری را از اجسامت کند سبب آن هوای منفی در معده نرود بلکه در شش داخل شود و اگر منفی کو چنانچه  
باشد از آن هوا آهسته آهسته در منفی صفت رسانند تا در ریه رسد و آهسته آهسته بنا بر آن داده شده که اگر هوا را بر نور و شدت رسانند  
و آن خوف شکافتن نهائی ضرر قصبه است بعد هر گاه سینه شکم ازین هوای منفی پر شود برای دفع آن خطای سینه را که بالای شکم  
و هم عضلات شکم را غرق کرده اگر از آنکه نفوذ این هوا بیرون آید همراه آن آنچه هوای خراب سینه باشد دفع شود پس اگر بعد از آن تنفسش  
بهره والا تا پانزده دقیقه تدبیر نکور را که در عجل آرد و مالیدن بدن در هر حال موقوف نگردد و اگر زبان اندرون حلق گشته باشد آنرا از



کتابتین کشیده بیرون آرند و مادام که حرکت تنفسی است شود بیرون این دارند و اگر ازین فایده ظاهر نشود غرق را بر پشت خوابانیده هر دو بازو را از قریب فک گرفته و یک آرنج را بر پهلوی پای آن برند و جلد جلد این عمل را آنکه سینه در یکشاده هوا می خارجی در آن دخل شود با جملگی سه چهار ساعت تا شش این تدبیر کرده باشند تا شاید غرق زنده شود و از وقتیکه این تدبیر شروع کنند و دایمی محطس و حاصل امونیا بویانند و برگ تنباکوئی خشک کاشند یا منفری شده در بینی بند و گاهی از عمل آوردن این تدبیر خود غرق بمیکشد ولیکن بعد چند تنفس بسبب ضعف شامخ و تنفس بند میشود پس اگر همچنین ظاهر آید از همین تدبیر شروع کنند و مادام که حرکت تنفسی است نشود این تدبیر را بعمل آورده باشند بعد جراحی تنفس را چند روز که مال عقاب و آرام رسانی دارند و الا خوف است که فساد رییه پیدا شود و از این تدبیر هم کرده و اکثر غرق شدن نیومونیا که در رییه است عارض میشود چون مرض مذکور بعد از عارض گردد و بعد از جمل پرواز چنانکه گفته شد فک فصل یازدهم در ذات الریه این مرض مع سباب علامات و معالجات ضمن نفس با سبب نیومونیا مذکور شد آنجا بعیند لیکن آنچه در کتب عربیه در مصلب رییه و رم غریبه را علی بن زینب حقیقتش نیست که اول در همین عیاض است چون ماده کثیره فی نفس این بخانه نصب جمیع میشود و چون بذریع نفث بلغم یا مده دفع گردد و ماده کم شود و رم لنیت و رخاوت ظاهر میگردد پس این هر دو صفات باعتبار مراتب ابتداء و تزیاد و منتهای و خطا در مریخ مختلف میشوند و انیکه فی الحقیقت هر دو جدا قسم مرض هستند بلکه از راه حقیقت هر دو واحد اند و علاج باعتبار مراتب ضعف شدت مرض میشود فصل پنجم در تبور و در کتب عربیه تبور رییه را علی بن زینب قرار داده نوشته اند و حال آنکه آن اول مرتبه مرض سل است یعنی هرگاه جوهر جوهر کل در رییه میریزد اول از آن دانه های خرد در رییه پیدا میشود و هر قدر که جوهر کل در رییه زیاد میشود مرض یاد میگردد و بعد دانه های مذکور بخت میخورند و بعد از آن در محل تبور هم ظاهر میگردد پس دیگر تبور بخت میخورند و منشا این حالت بخوبی قوی میشود که بعد مردن باید هرگاه رییه شکافته می بینی صاف ظاهر میشود و بعضی مقامات هم است بعضی تبور بخت اند و بعضی سخت و تبور مثل تبور ضربه این تبور همان هستند که هنوز از شرح تفصیل در آن راه نیافته پس اینهم بالذات مرض جداگانه غنی اند و فصل ششم در اجتماع آب در رییه و در کتب بید این را مرض مستقل نموده اند این حالت هم در آخر ذات الجنه گاه پیدا میشود و قیاس که آب ر حجاب سبطن ضلع در غشای رییه ریخته میجمع گردد و این آب سرفه همراه نفث خارج نمیشود و زیرا که هم راه خروج آن از طریق نیست پس اگر از خوراندن دوا چسپانیدن پلاستر اندیش گس فاع شود چنانکه در هدایت ذات الجنه آن گفته نمود و اولاً بخیر نشتر زن قرح کردن علاجه است فصل چهاردهم در ورم و جراحات قصبه رییه و بعضی کتب عربیه مثل مسیدی و امراض رییه ورم و جراحات قصبه را ذکر کرده اند اگر بخیل است چه ذکر آن در امراض طاق و قصبه رییه میشود با جملگی این هر دو در مرض تشنگی مرض سل پیدا میشوند و علاج تشنگی تشنگی است لیکن معالجه را باید که خوب تفحص غور کامل کرده سبب را همین از در بر که آنچه ورم و تشنگی پیدا میشود حسب علاج معایر و سبب این است و ورم و جراحی که از مرض سل بسبب بر کل پیدا میشود زیرا که خوراندن مرکبات سیاه و فصل پنجم در تبور خوراندن الفار و مرض تشنگی مفید نیست فصل پانزدهم در سح و مده که در رییه حادث میگردد

صلى الله عليه وسلم

فصل پنجم در بیان آداب تحصیل علم و کمال و در حدیث قدسیه

مجلس



این اصل مرض نیست در اصل سرفه دوم ریه یافته میشود و گاه با غمغمه مشابه برده خارج میگردد و گاهی چون سینه متعفن فاسد میشود و از آن بده و نفث خارج میگردد و هرگاه و بیاض جگر بسوی سینه بچرخد و هم بده و نفث خارج میگردد و با جگر هرگاه در مرض سل برکند و دیگر علامات مرض سل هم مثل حمی غیره که وقت افتادن عرق می آید بر آن موجود باشند هرگاه در آخر مرض سرفه آید مشابه برده بود لیکن بده نمیشد و آنچه در ریه سیبیه و عفون آن فتنه و بانفث برآید زیاد بدو بود و علامات آن آید بر آن موجود بود و آنچه از ریه بکند بود در آن محل کبکب سعال کندی بدو موجود بود و فقط فصل شانزدهم در ذات الجنب این ضعیف و سبب نفس را هم میگوید که کور شد آنجا بیند لیکن آنچه در کتب بیضیه در علامات ذات الجنب آمده است دلالت از نفث کور اندکی است چرا که ذات الجنب از راه نفث بر نمی آید و برای خروج آن از ریه سوراخی نیست بل هرگاه با ذات الجنب بکشد امراض مثل سرفه و جگر و سعال و سبب شریک شوند آن زمان داده امراض مذکوره همراه نفث بر می آید نه ماده ذات الجنب اکثر ذات الجنب مرض سل و بیاض کبکب میشود هرگاه ماده از ریه بکند و حجاب ضایع ریخته جمع شود و ذات الجنب غیر خالص قسمی از در ریه است و در امراض طرفیه انتشار از ریه رویش نموده نوشته خواهد شد که فصل هفتم در اصل و آنچه در تعریف آن است طبعه بریه قریحه فی الریه بلزقها حمی دقیقه نوشته فی الحقیقت آن تعریف در جملات نامی سرفه است و در آخر آن ضرورت است که این حالت یافته شود و گاهی در آخر نیومونیا یعنی ذات الجنب هم هرگاه ریه فاسد متعفن شود و بده و عفون بانفث برآید حالت مذکوره حادث میگردد و این ضعیف و غیر ضعیف یعنی تحقیق و غیر هم میباشد تحقیق آنست که در آخر تمامی نیومونیا حادث شود و تحقیق آنست که در سرفه مزمن که آنرا بر کاشش که آنرا سبک و یافته میشود و آن نیست که با غمغمه مشابه برده می آید و فرق با غمغمه و بده با این جوه ممکن است که آنچه در تمامی سرفه کف و نفث می آید و آن اصلی است اول بدو و غیره همیشه میباشد اما هرگاه در آب اندازند و مدتی بر آن منقضی شود و مقدار حجم آن باده میگردد و بعضی از این امری آن است بعضی متعلق بعضی طافی میباشد هرگاه آنرا حرکت دهند آب سفید میشود و چنان ظاهر شود که گویا قشری شیر در آن فروخته است ریشی ای باریک مثل رشته خراطمه در آب مشاهد شوند پس آن باده نشین و کسانیکه سرخ و سفید است میباشد بر خساره های شان مرنجی بقدر یک و پیه یا بیشتر آنی ظاهر میشود و لزوم حمی در این مرض ضرورت نیست بلکه در شروع مرض می خاص آن زیاد میباشد و کیفیت سبب آن در تمامی سرفه شده بعد هر قدر که بدن و خون ضعیف میشوند بخاکم میگردد زیرا که حمی بسبب پیداشدن هم میباشد هرگاه این مرض در تمامی سرفه عرض شود سبب آن فساد خون میباشد و علامتش بزرگی صلاح و تقویت خون ممکن است سواهی آن و امی پانجم بی توسط خون نمیرسد لهذا علاجه دشوار است و حرکت هم معین عدم اندام فقره میباشد و مادام که درین مرض حمی زیاد نباشد که هم غذا بهتر نشیر نیست پس اگر کسی را بسبب ضعیف مزاجی شیر ناموافق باشد باید که چیزی دیگر آن مخرج و مخلوط کرده بخوراند مثل آرد و روغن یا ساگو دانه یا بنج یا آب گرم و اگر آب زیاد باشد پس وقت که کامی غذا خوش نیاید باقی جمله علاج و تدبیر این مرض در تمامی سرفه شده آن رجوع میکنند فصل هجدهم در ذات الصدور آن فی الواقع ذات الجنب هم غشایی پهلوی است علاج آن علاج ذات الجنب است یعنی

فصل شانزدهم در ذات الجنب

فصل هفتم در اصل

فصل هجدهم در ذات الصدور

فصل هجدهم در ذات الصدور

فصل نهم در جمود الصدر فی فصل نهم و فی اشد

فصل نهم در جمود الصدر و آن قسمی از در و یکی است یعنی روست از مرست که بسبب یسدن هوای سرد یا بدن در وقت گرمی آن که از شفت و تب گرم شده باشد حادث میشود و آن مرض عضلات است چون این برودت خارجی بدن میرسد از آن مسام نه نشوند و آمدن عرق موقوف گردد و این حالت عارض میشود که مریض بکدم جانم حرکت نکند و تنفس از تنفس ممکن نباشد و علاجش اینست که در آب گرم نشاند و دوائی که عرق آور باشد مثل دود و رس پود و خوردند بعد آن طبع چای آب گرم بنوشاند و لباس گرم بپوشاند تا خوب عرق آید و برودت عضلات ایل شود و اگر نبض باشد مسهل مینهد و بهترین مسهل است که سنگین باشد سلفاس همراه طبع برگ سناری که نوشاند و در غن بپای نگیرد هم اگر مرض ضعیف بود جایز باشد فصل سیم در مایه رو و ثور کس نفق ای می بود و سکون العا و کسر ای شنه تثنای ضم وال مهندی رانی مملو سکون و ضم ای شنه و سکون و دفع رانی مملو سکون کاف وین مملو ملسدی یعنی مجتمع شدن آن غشائی پلورادین گاهی در اخراجات الجنب بسبب رنجش درین غشای درم حادث میشود و گاهی در امراض قلب مثل پیاوه شدن گوشت قلب یا اشاع وقت قلب هم در امراض کرده مثل برایش نیز در هم در انیمیا آب درین غشای جمع میشود و در امراض دل و کرده هم از پیدایش انیمیا آب از عروق درین غشای درین آب گاهی کم و گاهی یاده جمع میشود و آنرا به گاه زیاد جمع گردد که هیچ جادین خراطیه غشائی از آن خالی نماند و درین وقت سیه بجای غشای یادرست مخالف جانب علیی منفرشت ایل میشود و گاه قلب هم از سمت این غشائی پر آید جای خود در جانب دیگر منفرشت میاید میکند چنانکه در اپنا یا نشته خواهد شد العلامات هرگاه این مرض بعد ازات الجنب شد باشد مریض میگویی که مرا اول و پهلوی و سرفه و تنفس نمی بود و اکنون شکایت سرفه و تنفس با قیاد می و در دنیست هرگاه از امراض قلب یا کرده یا انیمیا این مرض پیدا شود درین وقت قبل پیدایش درین مرض که شکایت مرض صدر مریض احساس نمیکند بلکه قدری سرفه اول می آید زیرا که پلوریه بسبب مجتمع شدن آب پلورال منفرشت متنازی میگردد و از اذیت آن سرفه پیدا شود و هم تنفس تنگی و دشواری ظاهر گردد و این شکایت بنسبت سرفه زیاد و بیاض ضوفا و قلیکه ریه زیاد منفرشت شود و درین وقت یا در در اندام طان دشواری میگردد و آب قلیس باشد پهلوی علیی شکل طبیعی خود میماند و اگر آب یاده جمع شود چند آنکه ریه و دل منفرشت از جای خود در جانب دیگر منفرشت و درین وقت شکل پهلوی مخالف شکل طبیعی میگردد و شلاق قدری ارتفاع با استداره بر این پهلویافته میشود و عضلات که در میان ضلوع میباشد قدری از عظام ضلوع برآمده دیده شوند و چون بر آنرا سر انگشتان نهاده حساس کنند آب بر آنرا محسوس میگردد و چون انگشت بر پهلوی حساس صوت کشش اگر آب جانی قلیس باشد از حساسیت پهلوی جانی قلیس شینه میشود و اگر زیاد باشد از پهلوی او از جسم صحت می آید تا اینکه اگر در تمام خراطیه باشد در تمام پهلوی این آواز شنیده میشود و آواز جسم پر هوا که از داخل شدن هوا در ریه می آید سمع گردد و ایضا هرگاه آله قیاس الصوت که در زبان انگریزی شش کوب گویند بر محل ریه جایگاه آواز جسم از زدن انگشت آمده بود نهاده بشنوند پس اگر آب قلیس بوده باشد آواز داخل شدن هوا در مجرای صغیر محسوس میشود زیرا که از منفر کردن این آب سبیل های مجاری هوا و کمترین تنفر شد هوا در سبیل های مذکوره که در ریه بر مجاری صغیر هوای میباشد سمع

آواز جانی

اما در مجاری صفار هوائی که از حلاوت خود و اثر غیر قابل نگه داشته شده میان می رسد و از آن این آواز مسیح می گردد و در  
 اگر آب یا دهان جمع شده باشد درین وقت که کم آواز مسیح می نشنود و آواز دخول هوا در مجاری آنها و آواز که وقت تلفظ از ریه شنیده میشود  
 و دل هم از جای خود بجای دیگر می آید و در هر که آن در غیبه موضع می آید آن در یک می شود و همی درین ض مثل یکسان می باشد  
 العلاج هرگاه خلیل باشد و از دست جذب پیدا شده باشد و در آن تکلیف کم بود و در ایل می شود یا از نوا و یا درین گس که منسوب به پلاستر  
 کان ناز و دس است صحت حاصل میشود و این آب خون جذب می گردد و اما هرگاه آب یا دهان جمع باشد درین وقت بدشوار می خون جذب  
 پس درین وقت در غیبه که قوی باشد اصل سسمل نه از آنچرا اسهال انبساط میکند مثل سفوف سکا منی ایلا شیرم یا مینگیشیا سلفا  
 یا جلیپ میوئید یا عن حب اسلاطین انبساط در همال خارج شود و از آن آب مذکور را جذب کند زیرا که چون انبساط از خون  
 بدشوار می شود سسمل کم میشود آن غلیظ شده آب از بدن جای که سیاه می کشد تا خود بر قوام ایل آید و از این انبساط هم در خون  
 جذب میشود و اگر در بعضی ضعیف باشد بر نوشانیدن سدرات که کاه کرده بعد از آن ضماد و شمشیر یا پلاسترش گس بر محل پلونه اندازد  
 پیدا کرده آنرا چند روز جاری دارد تا انبساط خارج شود و هرگاه از هم ایل پلاستر مذکور خشک گردد و پیر او درین روزانه بر محل  
 مایه طلا کرده باشد و نوشانیدن یوئید یا سسپاس و در مناسب همراه آن طلا کردن چنانچه او درین بر محل مایه طلا کردن نافع است  
 لک نوشانیدن سرب فیری یا یوئید درین وقت مفید است که جامع تقویت و تخفیف و جذب است و هم نوشانیدن و تقویت  
 مثل شیرین کیکل نو یا ناکه سرب یا سسپاس یا کینین سلفاس نافع باشد و از سسپاس مقویات مذکوره و امثال آن هم گاهی  
 خون قوت می آید و آن سبب است خود آب مذکور را در خود جذب میکند همچنین نوشانیدن غذیه مقویه هم مفید است و چون هیچ  
 نفع در مرض ظاهر نشود و شکایت و اذیت نفس بحال خود باقی ماند چنانکه در امراض قلب کرده اکثر همین میشود و درین وقت مجرب است  
 آنکه در کار از جانب پشت بخاوات سسمل و آن کثیف میان ضلع می کشد و هم انداختن این آب بیرون آرند و درین وقت بسی حیات  
 درین نمایند که هوائی خارجی در زخم و در باطن محل اجتماع آب سسمل الایده و فساد از آن پیدا خواهد شد بنا برین وقت داخل کردن  
 شوره کارند بر شش صاحب و در علاج و دل نوشته خواهد شد و در استعمال و درون آب است بعد از آن غذیه مقویه خوراند و درین  
 و سسکی شراب بر اندازی برای کسیکه محتجب شراب نباشد اگر محتجب باشد ایونیا محلول آب ساده یا آب نمکی گوشت بر بار رخ  
 نوشتند و چنین کچک سسمل یا قوی بارک هم هر روز نوشاندند و در فصل سبب و حکم در انپا ایما بکسلف و کون نون قوی بای و خد  
 فارسی و کون لک کسلف و کون بای شانه ختانی و قوی سسمل و کون لک نمیدارند بریم در غشائی آب در پلاکه مسیحی پلور است  
 بدانکه خود مواد و از آن جهت محل هم جدا شده درین غشا ریخته اکثر سبب التصاق و چسبیدن این غشا میشود گاهی این مواد را  
 بریم میگرد و این انپا ایما حقیقی میگویند ناگو تیل مریم یا در کب پیدا شده و درینجه که در دوازان یکم حدین غشائی مذکور ریخته میشود  
 آنرا انپا ایما می گویند سبب حقیقی بر این می باشد این مواد که از دم در آن ریخته خوبی ظاهر نیست لیکن این غشا  
 که شاید کمتری خون یا رسیدن هوائی خارجی بر سسمل رشتل هم تریا و غیر بوده باشد بریم از دمل کب که این غشا باین نحو میرسد

و این سبب است که

چون کبر متورم شده تا پرده شکم میرسد درین وقت این پرده و عضو در دم کند است میشوند و اول بده جگر را شق کرده در پرده شکم داخل  
میشوند پس بعد از آن نفخ ساخته در این غشا میزنند و اینها ایستاقی ممکن است که در پرده و پهلو ی چپ است واقع شود لیکن اکثر نیست در جانب  
ایستاقی و مثل است لکن آنهم در جانب پسر اکثر واقع گردد و قسم غیر تحقیقی آن هم هرگاه بسبب تل یا به باشد ممکن است در هر جانب سینه  
پهلوی واقع شود لیکن آنچه از تل کبر و دانه در جانب است میشود زیرا که جگر هم درین جانب واقع است ایضا این پرده و قسم  
در رجا ج نسبت نسبت یافته پیدا میشوند علامات اول علامات ذات الجنب پیدا میشوند دوم آنکه از خنجر و اور و جاکه  
مجموع شود قدری ارتفاع درین جانب به نسبت جانب گیر دیده میشود خصوصاً در طفل و شبان نسوان چه جوان اینها  
پیدا شوند بخلاف مثلاً که از علامت عظام شان در اینها این ارتفاع بدرک نمیکرد و سوم آنکه تنفس شوری بی دردیافته میشود  
زیرا که از ارامت این غشائی بر بریم بریم و یقیناً در تنفس میگرد و در بخوبی هوا در آن نمیرسد و دم و حج نبایست که اکنون در این  
دم نه پس بسبب نبودن دم وقت اینها طریقه منبسط میشود چهارم آنکه هرگاه این هوا درین غشا نه یافته و جمع گردد و در این هم نمیکرد  
از جایی صلی در جایی دیگر که مخالف جهت علیل است مایل بسیار و بسبب آن در فعل خاص قلب تغییر نقصان ظاهر میشود مثل آنکه  
خفقا نمی آید و دوران خون بخوبی جاری نمیشود و از آن خففت و کمزوری و بدن پیدا شده و مرضی مالک میگردد و پنجم آنکه بیمار را  
مکن نباشد که بر خلاف جهت علیل که صحیح است اطعام نماید بلکه همیشه به جهت علیل مضطرب میگردد و زیرا که چون درین ض جانی علیل  
ضعیف شده و بیمار میشود جانب صحیح کار بر دو جهت میسر و در تنفس محض را عانت آن در دو تمام میگردد پس اگر بر جانب صحیح هم مضطرب  
بسبب افتادن باز هم بر این جهت هم متغیر شود از کار خود قاصر میشود و درین وقت تشنگی بار این هوا بر جانب صحیح می افتد  
اجتماع این هر دو سبب تل و غشائی از تنفس شدن بر جانب صحیح پیدا میشود ششم آنکه چون سینه و پهلو را بر سینه کرده بهینه بگو  
علیل در میان ضلاع برآمدگی ظاهر میشود چون سر انگشتان بر آن نهاده و سانس کنند ظاهر میشود که آن جمع است و چون  
انگشت بر این برآمدگی زده بشوند آواز هم می آید از آن می آید صدای جیم می آید که اینها لایق شنیدن است شنیدن میشود چون  
آنکه قیاس انقباض را بر آن نهاده بشوند آواز داخل شدن هوا در ریه چنین آواز که وقت تلفظ از ریه می آید و شنیدن میشود  
و ایضا چون این آواز بر سر آمدگی مذکور نهاده و ریه حرکت دهند و بشوند آواز که از ریه قطرات آب را بالا بریزد و طریقی که در آن  
قدری آب جمع باشد می شنید میشود و این صد را بر زبان نگزید می شناید و ششک است که سر و قمع نای بندی و کون و کون و کلام  
و کون و کسری بندی و کون نون و کات و کلام و کون نون و کات فارسی منیعنی آواز یک زردن شی معدنی مثل این  
و تقریباً آن پیدا شود چنانکه چیز را گویند که از قسم فلز است مثل آهن نفوذ باشد و سنگ سنگ و از صغیر را گویند که از زردن شی  
فلزی مثل آهن بشی دیگر فلزی که مثل آن باشد پیدا میشود و بعد از این صوت درین نسبت که آنچه وقت تحریک مرطوب  
آب بالا میرود بعد سکون حرکت باز قطره قطره کرده از آنجا بریزد و در غشائی مذکور میگرد و دم آنکه آنچه وقت تحریک و خصل شکو  
در آن جواب پیدا میشوند و بعد سکون کت آنها شکافته میشوند پس وقت شکافتن آنها این آواز پیدا میشود و ایضا باید و نسبت آنچه

نقصان



و ممکن است که در هر دو جانب میخالت یافته شود اما آنچه اکثر دیده شده آنست که در یک جانب خواه جانب بطن یا جانب یسار این ضلع  
پیدا میشود السبب سببهای از رسیدن صدمه خارجی با ضلع و شکسته شدن استخوان ضلع و خیلدن استخوان منکسر غشای مذکور شقی  
شدن آن از آن پیدا میشود و گاهی از رسیدن خم در پلور سبب که هم شقی حاد الراس مثل سنان یا تیر یا کار و غیره که کسی از آن خارج  
در پلور و سبب آن خم در آن پیدا شود هوای خارجی در آن آید و گاهی در ریه از تضییع جوهر کل و تل پیدا شود و بایک شقی این پلور  
غشای متصل و یک شقی متفرق میشود و یک شقی که متصل است به استخوان است و هم مانده پس این وقت سبب پیدا شدن ثقبه در ریه  
در توی این غشای هوای خارجی که در ریه قصبه جاری آن در ریه سیدرین غشای هم داخل میشود و از آن میخسبند و الی هذا  
اگر بعد رسیدن صدمه یا زخم پیدا شود و سبقت اینها گواه بود و اگر بعد از شکسته شدن بلایه حادث شود و سبقت بلایه بر این حالت باشد  
من بعد از سفره و قیصر و نفس پیدا میشود سبب متفرق و متناهی شدن و حرکت کشش هم بدشواری صادر میشود و از آن خفقان  
حادث گردد و قیصر است که در این وقت است بلایه آن ظاهر شوند و در این وقت آب هوا هر دو درین غشای جمع خواهند شد و در  
جانب که این اجتماع یافته شود در آن پلور تغییر در شکل پیدا گردد و مثل اینکه در پلوی علیل قدسی برآمدگی مستطیر پیدا شود و عضلات که  
در میان اضلاع اینجانب بودند در آنها هم برآمدگی ظاهر شود و چون بران انگشت زده آواز را بشنوند و از جسم طوار هوا شنیده شود  
و چون آن سبب کشش را بر آن نهاده بشنوند و از داخل شدن هوا در ریه سموع نشود بلکه آواز یکدوم که درون در میانی ضیق الراس  
میشود سموع میگردد و چون علیل کلام و تلفظ کند آنچه وقت تلفظ در ریه او پیدا میشود و بدین طریق که سموع میگردد و سمع بدین طریق که  
درین ضیق بعد سفره و از رفتن قطرات از بالا بر ریه ظرفی که در آن نفوذ آب باشد سموع میشود و بدین طریق که سمع است که اکثر  
سفره بالا برود و باز از آنجا چکه انعام بر می آید که هرگاه از شکستن استخوان یا زخم پیدا شدن زخم خارجی هوای خارجی در آن سبب  
درین وقت هم اگر چه خون باکست سبب رسیدن هوای خارجی و پیدا شدن ذات الشلیت یا ده است لیکن این هر دو صوت گاه گاه  
از آن جهت هم پیدا میشود که آنچه سبب رسیدن صدمه ظاهر شکستن استخوان باشد در آن هم در خارج نبود بلکه سر استخوان باطن غشای  
مذکور و در ریه هم پیدا میشود سبب آن هوای خارجی از ریه در آن میرسد پس این خم بعد پیدا شدن هم در غشای مذکور و باز از آن  
این سر استخوان بر جاش خود بند میشود و آنچه از زخم خارجی پیدا میشود در آن هم این خم بعد چندی از پیدا شدن هم بند میگردد و چون که درین سبب  
در دیگر نظری بعد جهت و امتداد قوت و بیاض ازین جهت است هم بعد آن میشود لیکن آنچه سبب پیدا شدن تل اندرون ریه و ضیق  
سبب پدید آمدن تل که در وقت در آن ضیق ظاهر میگردد و درین مدت دراز راه آمد و رفت هوا در آن غشای کشا و میماند یعنی مادامیکه درین  
سبب حدوث دم درین تل نمیخسبند و راه آمدن هوا کشا و میماند تا این مدت که بعد نفوذ تل از ریه و دم پیدا شود مرض هلاک  
میکردد و العلاج هرگاه سبب زخم ظاهر از شکستن استخوان در ریه پیدا شود باشد پارچه غرض طویل بطور بندش بر پلور و باند تپلور  
از خود سبب شدن ندهد و زخم را بند کند این سبب را آنچه سبب سبب پیدا میشود هم مانع می آید زیرا که از تنگ ساختن پلور هوا و غشای  
مذکور که داخل میشود و آنچه قصار ازین سبب نفس می آید که سبب آن ضیق در آن پیدا میشود و بدین طریق سموع بطول شکم تدارک آن

بجای

صفيح کوچک کاغذی در تشريح قلب

من بعد علاج ذات الجنب نمائند که آن اینجا هم پیدا شد و چون از کرامت تدبیر نفع ظاهر نشود پس گاهی وقت شدت ذیبتش اینجا هم شود و کارهای که برای او خال آن در بایستد و شود و کس اینها باید این شد موافق آن داخل کرده این چهار را از خریطه غشائی معلوم بیرون می آید و از آن راحت به بیمار حاصل میشود لیکن این آخر علاج است که وقت مجبوری بر آن قدامت توان کرد و بدون ضرورت شدید جتناب از آن بهتر است زیرا که ازین هم زخم تازه پیدا میشود که آنهم سبب میرش این مرض است **تذکره باب دهم در امراض قلب**

**فصل اول در تشريح قلب** بدانکه قلب عضوی است لحمی یعنی عضله که هیئت آن صنوبری و مخروطی است راس آن بجانب سينه و ضلع خاص سادس علی السفل فاعده ان علی بسوی فوق نقار ظمیر بالای آن و غشا است یکی دقیق لمصق بحسب آن حکیم علی کیلانی از بعض اطباء نقل کرده که آن غشا تا نصف قلب سیده ولیکن مشابیه ثابت شده که بر تمام قلب آمده است دوم غلیظه و آن خریطه و غلاف قلب است از قلب است فایده جدائی آن از قلب اینست که چون این غشا مثل اولی از کرم لطیف بود بلکه غلیظه و سفت است پس اگر شل غشائی اول لمصق ماس بودی قلب تحت حرکت بنسب علی خود وسعت نیافتی و کاریکه برای دفع کردن خون از آن صادر میگردد که وقت مثلا جگر آن باده وسیع میشود وقت دفع کردن خون بسوی بدن صغیر میگردد و صدورش مستعد و دشوار شدی غشائی مذکور فقط بر قاعه از قلب متصل است طبقه ظاهری این غشا در پشت طبقه غشائی آن اس و آبادر همچنین ظاهر غشائی اول آبادر است وقت حرکت طاکاک ل اذیت نرسد و در آن چهار منفذ دارد و منفذ بواسطه هر دو شرابان که از هر دو طرف آن سته بر برای خالی کردن آن از خون دو منفذ در هر دو گوش آن هستند که از آن خون دل میرود و در دل دو منفذ بالائی هر دو طرف این میسر میباشد آن لحمی بود و لحم مذکور مثل غشای قلب است و گویا آن هر دو هم بمنزله دریائی هستند در دور آن خون که بدل میرسد اول در هر دو گوش آن میریزد و بعد از آن در هر دو طرف آن دل و بطین اندکی بجانب این این زیاد و وسیع است حکم آن دقیق است گیر بجانب بسیار و آن نسبت اول دقیق است لیکن جسم اینجا غلیظه است فایده غلیظه اینجا است که چون خونی ازین جعبه در کمال قوت شدت میرود و لذا لحم این بطین غلیظه و صلب خلق کرده شد تا وقت در وقت شکافتن و از هر طرف آن شرابی سته چنانچه شرابان غلیظه که از بطین این سته کارش نیست که آنچه خون سیاه اند جگر و ستر غیر آمده در آن جمع میشود و آنرا دل تبویط شرابان مذکور برای تصفیه بر میفرستد و این شرابان چون زود و میشود و شاخ میگردد و وازان یکی بسوی پا و شش که جانبین صدر است و یکی بسوی پاره آن که جانب بسیار صدر است می چسبند خون که در بطین این قلب بوده بر میسران و اینجا چون بسبب اختلاط هوا صاف منجمد و گوش جانب بسیار قلب میریزد و از آن بطین میفرود و وازا چنانچه سینه شرابان غلیظه این ستر بدن میرود تا باید دانست که در هر طرف قریب منفذ دخول غشیه فیض لیسه دار میباشد که آن بطور آب هستند چنانچه بطین این که وسیع و گیر است سده تا غشا هستند و بطین این که صغیر است و غشا میباشد فایده این غشیه اینست که هرگاه دل نوزاد از خون خالی میگردد و قوت وافع خود از هر دو طرف آن بسوی یک یا بدن میفرستد و در دفع میکند این غشیه بر منفذ دخول خون بطور وازان که سینه راه مذکور شد میکند لایحه بسوی شریان خون جاری میشود و اگر این غشیه نبود می پس یا از راه هر دو گوش یا از منافذ از بعض خون خارج میشد



و مورت آفات دیگر و فی الواقع که از بهاری شدن در شریان حاصل میشود و نهایت میشود و سواي این غشای غشائی دیگر اندرون بطون ل  
 و بطون گوش آن متصل با غشای مذکور و پس پدید آید که غشای قلب است چنانکه بالائی آن غشائی نازک و صلب آن است نام غشای خارجی پری  
 کار و سیم است یعنی غشای محیطی و پیل فتیج باي فارسی که ستری جمله و کون باي تحتانی و فتح کاف و کون الف را می خوانند که در آن است  
 فتح باي تحتانی و کون سیم و این سیم برانچه محیط بدل است هاتر می آید نام غشائی اولی قلب است و کار و سیم است یعنی غشای داخلی آن  
 که الف و کون آن هم دال بندی و کون او یعنی اندرون بود و باید دانست که طبقه داخلی شریان عظیمی است سفلی است قابل برآ  
 انبساط و انقباض است یعنی هرگاه آنرا بکشند و در آن کشاده میشود و هرگاه باز بجایش گذارند بر مقدار خود می آید و درین مقدار  
 هم قریب مبداء شریان غشای اندرون آن بطور دروازه است که هرگاه قلب فتح خود خون را از خود در شریان فتح میکند تجربه یک قری  
 قلب ناکشاده میشود و بسبب کشادگی آنها خون در شریان می آید و چون بسبب غشائی شدن از خون در آن حرکت و دفع باز ماند  
 آنها بند میشوند اگر چنان نبودی باز خون افتد در شریان قلب بخت و برید و بدن نمی رفت باید دانست که هرگاه خون را در شریان  
 میکند در اینجا صدای قش پیدا میشود چون حرکت قش قطع شود غشائی مذکور بند گردد و خون در فروع باز بر آن غشای قش  
 گیر و آواز دیگر که از سابق قش برآید و پس از این که از اول غشای مذکور آواز دیگر صغیر باشد زیرا که اول بسبب فاعل آن  
 قوی است آواز ثانی بسبب انقباض شریان عظیم هرگاه بعد از انبساط خود انقباض میکند و پس از انقباض در وقت انبساط شریان از خون  
 که در آن آمده بسبب انقباض شدن آن مقدار که از خون کوشش می رود و بعضی از آن را بالا می برد و در دروازه نماند و پس از این  
 میزد و پس از افتادن آن اینجا صدای دیگر صغیر و خفیف از صدای اول پیدا میشود و حرکت انبساطی شریان این است که از حرکت کردن  
 که برای دفع ساختن خون از خود در شریان عظیم یکدیگر را می کشد و در هر دو حرکت انبساطی است که شریان تجربه یک قلب را در هر دو سیم می کشد  
 و حرکت انقباضی آن است که از انقباض شریان است میشود و درین حرکت شریان از جانب محیط اسوی مکرر میزد و این حرکت اکثر بر  
 محسوس نیست زیرا که درین حرکت شریان از زیر انبساط فرو میزد و الا گاهی در بعضی امراض شریان مثل نیوزم البته محسوس میگردد و این حرکت  
 حرکت در شریان برای جریان خون در بدن پیدا میشود و بعضی این است آنچه اطباء می نامند یونانین میگویند که حرکت قلب  
 و انقباضی شریان برای تحویل روح چند کبریا که در سیم و دفع ساختن خون آن واقع میشود زیرا که بعد از اول نمیرسد آنجا کاری با بدو است  
 و نه برای تحویل روح است زیرا که آنچه با خون آنچه از زیر سیم و میزد و اگر بخواهد و قلب و در هر دو حرکت باک است چنانکه سیم شریان  
 که در ولادت خون کثیر باشد و شستن بوی از کمی خون باشد هرگاه که سیم از زیر سیمش گرفته خون اندر سیم را در هر دو حرکت تحویل میدهد  
 پس اگر درین سیمهای کثیر در رگ نخل شود و در رگهای خون نخلی در رگ نخلی یاده هوا میزد و فوراً مالک میشود و بعد از شستن در رگ  
 کف زیاده مشاهده میشود و این انقباض میشود که حاجت سیمی هوا در دل نیست آنجا فقط تو لید تقسیم خون است که در فصل دوم  
 در بیان امراض قلب بالا جمال و چون تشریح قلب مثل آن بیان کرده شد اکنون باید دانست که در قلب هم امراض طبعی  
 شرکی عارض میشوند و اینجا امراض طبعی آن نوشته میشود و پوشیده نماند که آنچه در قانون شرح آن امراض قلبیه بعد از آن علامت

فصل دوم در بیان امراض قلب با اجمال

در شریان

و مرض اصلی و سرکی مختلط اند چنانچه ففقا ان امراض مستقل نوشته اند و آن علامت است که در اکثر امراض قلبیه یافته میشود و زیرا که ففقا  
 عبارت است از حرکت آن که بطور خفاج حادث میشود برای دفع موزی چنانکه این تفریح در کتب بدیهه موجود است پس هرگاه که افیت بل  
 خواهد بود پس هر مرضی باشد بنا بر بقوله شان قلبی می دفع موزی این حرکت خواهد کرد و در تجربه و مشاهداتیم ثابت شد که این حالت اکثر امراض  
 قلبیه یافته میشود پس علامت قرار دادن آن ولی است از اینکه خود مرض گفته شود و ففقا ان بلغت انگاشتن یا آل پیشین معنی توی زیاده شدن  
 حرکت قلب مینامند اگر چه این قول خلاف صدای مالوف گوش اکثر طبایای تابعین ما نیست و به باشد اما اقرب بحق و صواب است اکنون  
 امراض صلیقه قلبیه بیان کرده میشود و اکثر آن این علامت یافته میشود و بعد از آن بجز در کتب طیبیه عربیه با ستم امراض قلب نیز نوشته خواهد شد  
 انشاء الله و اول امراض اصلیه مذکوره و هم غشائی خارجی قلب بود و آنرا بر بان لاشن پری کار و ایشتل منفتح بای فارسی کسر  
 رای مملو سکون بای تختانی و فتح کاف و سکون لفت رای مملو وال بند می فتح الف و سکون بای شناه تختانی و فتح نای بند می  
 سکون سین مملو یعنی هم غشائی خارجی علم ازینکه غشائی ملصق بدل متورم شود یا غلاف آن تورم از آن هم لطم قلب است آنرا گاو  
 ایشتل می نامند و فتح کاف و سکون لفت رای مملو و سکون ال بند می کسر لفت و سکون لای تختانی و کسری بند می و سکون سین مملو  
 یعنی هم گوشه شل تورم و هم غشائی داخلی قلب و آنرا اند و کار و ایشتل منفتح کسر لفت و سکون نون و هم وال بند می و سکون و فتح  
 کاف و سکون لفت رای مملو وال بند می فتح الف و سکون بای تختانی و کسری بند می و سکون سین مملو معنی غشائی داخلی قلب  
 است چهارم زیاده شدن گوشه قلب است از قسمی یا قتی مقدار چنانکه در دیگر عضلات هم این عرض میشود و آنرا بای پری  
 مینامند و فتح بای پوز و سکون لفت کسر بای تختانی و فتح بای پری و سکون ای مملو و فتح نای بند می و سکون بای مملو و کسر و سکون  
 تختانی معنی زیاده شدن مقدار است چنانکه زیاده وسیع شود و گوشه آن بقیق تنگ گردد و انیر اول میشتل بکسر ال بند می و  
 سکون هم فتح الف کسری بند می و سکون بای تختانی و فتح شین معجمه سکون نون میگویند یعنی وسیع شدن لای رفیق شدن لطم آن  
 ششم آنکه دل صغیر کوچک شود و مقدار آن کم گردد و این صغیر یا قتی و غلظ قلب است این را اثر فی بفتح الف و سکون ای بند می و فتح  
 رای مملو و کسر و سکون بای تختانی می نمایند صغیر المقدار معجمه آنکه چنانچه غلظت قلب در وازه واقع اند غلیظه و صلب شود  
 و از آن بچه کار خاص آنرا بوده ناقص یا بطل گردد و ششم آنکه در گوشه شل هم پید شود یعنی ریشهای لطم اندونی پدید شوند و هم آنکه منفذ  
 که در حال بودن طفل در بطن در فیما بین هر دو گوشه شل میباشد بعد از ادات بند میشود و آنرا بای سر و ایشتل مینامند و فتح هم  
 و سکون لفت رای مملو و فتح بای مملو و سکون سین مملو و سکون ال بند می و سکون و کسر لطم و فتح بای تختانی  
 و سکون سین مملو یعنی مرض آسمانی رنگ بیا نش نیست که مادام جنین در بطن در میباشد در هر دو گوشه شل آن منفذی میباشد که بعینه  
 آن خونیکه از جگر و داغ و دستها در گوشه بطن این می آید بی آنکه در بطن این نبرد بخط مستقیم گوشه این گوشه ایست و از آن بطن  
 ایست و نخته بدیده شریان عظیم در بدن میرود و چه غرض از رفتن خون در بطن این است که تا به وسط شریان در ریه رود و آنجا بسبب هوای  
 که در نفس کشیده میشود صاف و سرخ گردد و چون چنین شکم در بطن ریه میماند و ریه آن را به هوای خارجی خالی میباشد ازین سبب

ضرورت فتن آن در طین امین نیست بلکه خون چنین از طوی که در شیمیه بود صاف و منج شده توسط جگر و عروق در گوش امین قلب می آید و از آنجا در گوش ایستاده و مستند می نماید که فیما بین هر دو بود و میرسد به گاه طفل از شکم مادر بر آید از ریه خود تنفس شروع کرد آن منفذ بسته شود چنانکه کشاده ماند آن ضرر نماید زیرا که خون چنین در شیمیه صاف شد می آید که خون صاف شدن منحصراً است اینک خون در طین جمع شود و از آنجا در ریه رود و بند ریه عروق در تمام ریه منتشر شود و با هواست مشفق مخلط شد و صاف گردید و بعد در گوش و طین داخل شود و چون این منفذ که فیما بین هر دو گوش بوده باقی ماند و بنفشه و لاجاله خون سیاه که صاف نشد پیش از این که صاف شود در گوش و طین ایستاد و خواهد شد از آن صفا پیدا خواهد شد و هم آنکه در دل در پیدایش و آنرا انجمنیا پیکر است منج الف و سکون و سکون بای تخیالی و فتح خون و سکون الف و کسه بای موحه فارسی و سکون الف و فتح تخیالی و فتح ریه و سکون بای مملعه یعنی از دست صد است این امراض که گانه اصلی از خاصه امراض قلبیه اند از دهم است که فعل غلص قلب جگر که نماندن خون ریه بدست ناقص شود لیکن سبب خاص آن در دل نبود بلکه در عضلای دیگر باشد چنانکه مذکور خواهد شد و اما فصل سوم در بیان پری کار دایس که آنرا در کتب میوه غشا القلبی گفته اند و توضیح کرده اند که مراد در اینجا غشا غیر غشای است که آن غلاف و خریطه قلب است لیکن در حقیقت پری کار دایس عام است غشای حماس قلب از غشای غلاف دل است بالجمله گاهی در غشای خارجی هم پیدایش شود و پری کار دایس همین است چون در شروع این مرض بیمار ریه و و شریح کثر به بین غشای مذکور گلابی رنگ غلیظ بود و بسبب اینکه در آن ورم بود و خون یاده جمع میشود و هم ماده ریم از عروق بر آید بر آن مجتمع میگردد و که از آن غلظ آن زیاد میشود و چون بعد از آن بتدویر و تشریح کرده شود غشای مذکور بسیار منج میباشد زیرا که عروق صغیر بسبب نفوذ شدن زیاد و وسیع میشوند و خون کثیر در آن جمع میگردد و همچون این عروق ماده از ج منفصل شد و زیاد غشا میزد و ازین سبب غشای مذکور زیاد غلیظ میگردد این غشای حماس قلب بسبب ماده لزج چسبند که از عروق صغیر بر آید بر آن جمع شد از طبقه داخلی غشای که غلاف حماس است می چسبند گاهی از عروق مذکور آب قیق خارج شد و غلاف حماس میشود و از آن بعد از غلاف دل عظیم میگردد و دو گاهی بر آن ماده قریق ریم میشود بالجمله گاهی در تشریح این حالات در بیامان جراحی و تشریح ظاهر میشود مثلاً گاهی بتدویر و کوی وقت تریا میرود پس موافق وقت نفس مشابیه حالات کرده شود اما کسیکه بعد از آن مرض مرده باشد بعد تشریح در آن جمله حالات مشابیه میشود مثلاً غشای مذکور جامی گلابی رنگ غلیظ میباشد جامی بسیار سوراخ و غلیظ بود و جامی با طبقه داخلی غلاف حماس چسبیده بود و گاهی بر آن ریم جمع باشد جامی در غلاف آل با قیق جمع بود و از آن ثابت شود که این همه حالات بتدریج در آن پیدایش شوند و زمانی ازین هم غشا ورم در طم قلب هم پیدا میگردد و انجام این مرض بتدریج شش میشود اول نیکه مرض پیدا شود و زایل گردد و بعد از آن حال شود و دوم اینکه بعد حدوث مرض صحت نشود و غشای مذکور با طبقه داخلی غلاف حماس چسبیده شود و غلاف حماس از آن غلظت عظیم و وسیع گردد و بسیار مرض اکثر سبب حدوث آن و موت از مرقع شود یعنی جوهر حاصل خون زیاد متولد شد و هم پیدا کند بان بخانم

فصل سوم در بیان پری کار دایس

باشد و گاهی مرض کرده هم سبب تولد آن واقع شود و وقتی از ذات الجنب هم این مرض پیدا شود زیرا که حجاب مستطیل ضلع  
 جانب ایستاده نزول قریب ملحق است پس هرگاه بسبب نفوذ بیش جوش خون آن پیدا شود از آن در غشائی لیم گرمی حادث  
 گردد و از آن در غشای نفوذ بیش پیدا میشود و گاهی بسبب سیدن صدمه ضربت خیم از خارج هم این هم غشای پیدا میشود علامات  
 اول بخار حادث شود خواه کم یا زیاد لیکن هرگاه باحمی و وسطه از قریب ضلوع شروع شود تب بسیار تیز بود و چون تب پدید آید شوخقان  
 پیدا میگردد و تا آخر مرض میماند بطور علامت از مرض گاهی کم و گاهی پدید آید زیرا که درین وقت و سبب جوش خون جمع میشود و در وقت  
 و درم غشائی قلب و آنرا که در جانب ایستاده مقابل ضلع خیم شکم جایی است قلب است در وقت شروع میشود از اینجا بسوی بالا  
 گرد قلب سینه متصاعده شد تا مفصل عضد تر قوه میرسد از آنجا در جانب نشی دست چپ تا مفصل رسد بسبب شتاب  
 عصب جایی که در تمام عضای صدمه شکم منتشر شد و هر جا رسید است سوم آنکه ضیق صدمه عارض شود و از تنفس سرفه یا غلیظ  
 که از آن در زیاده میگردد چهارم آنکه بیمار را خوابیدن بر کمر یا بر پهلو یا بر قفا ممکن نباشد زیرا که یا بر جانب ایستاده یا بر  
 کرده و سرنگون ساخته می نشیند یا سرنگون ساخته می شود یا در انداخته می نشیند تا که پاره شکم حرکت نکند که از آن بدل ازیت میرسد  
 پنجم آنکه همیشه منقبض و با قلیق میباشد شکم آنکه بر روی علیل سفیدی ظاهر میشود بسبب آنکه خون کمتر بالا میرود و نفیتم آنکه چون بر محل  
 سر اشیدف ضلع بالا جانب ایستاده شکم کندن در زیاده میشود و ششم آنکه نبض بسیار سریع باشد چنانکه در یک دقیقه یکصد ضربت با حرکت  
 کند لیکن این مرض نبض یکسان نبود بلکه مختلف باشد گاهی درسی عظیم و درسی صغیر و گاهی متساوی و قتی غیر متساوی و درسی تو  
 و درسی ضعیف موافق حالات مختلف حالات بود و نهم آنکه گاهی اختلال حواسین منض می شود مثل سر سیم سبب آن جوش  
 خون بود و پوشیده نمائید که در این منض مثل آدن در در خانه باشد یعنی در اول مرض علامات بنقده ضعیف میباشد که تشخیص منض شود  
 بود چنانکه در چنین استگی می آید کسی آواز پائی آنرا می شنود و هرگاه این منض با ذات الجنب جانب ایستاده جوش پدید آید  
 و حقیقت اکثر از ذات الجنب هم غشائی قلب پیدا میشود و هم آنکه هرگاه درین مرض از مقیاس الصوت بر قلب نماند و آواز قلب ایشانند  
 سوای هر دو صوت که ذکر کردیم تشیخ قلب شد که آن هر دو آواز خون بودند صدای ثالث که از صدمه شکم غشیه پیدا میشود و سیم که در غشای  
 هرگاه غشائی متورم از غلاف قلب بسبب صدمه از جرح چسپند که از عروق صغار بزرگ شریخته چسپیدن آن غاز کند پس این وقت از صدمه شکم  
 زیاده جوش جوش چون غشیه چسپیدن آن و از بند شود و گرد آن آواز مذکور محسوس میگردد و چون ماده قیون ورم غشای خارج شده در یک غلاف  
 قلب است جمع میشود و از آن غلاف قلب عظیم میشود و خارج بدن بمقابل آن یادتی نمائید که محسوس گردد و در بروی آن در ضلع  
 مقابل آن حرکت یافته ظاهر میشود زیرا که از مزاحمت خریطه قلب ضلع مذکور زیاده نمایان میشود و ازین سبب حرکت نمایانجا  
 زیاده محسوس گردد و یازدهم آنکه هرگاه انگشت بمقابل آن حسینه زده ادر اک صوت نمایند و از هم صدمت زیاده محسوس شود زیرا که خریطه  
 ملحو از آب شد و در یازدهم آن از روی دل دور زفته اکنون هواد آنجا نماند لیکن پوشیده نمائید که این هم آواز ذات الجنب است  
 هرگاه آب قیون در فضای که فیما بین حجاب مستطیل ضلع است جمع میشود و ازین سبب پشیر نوشته شده که فرق در میان هر دو

ع  
 قریب ملحق  
 جایی است که در  
 حجاب مستطیل  
 است  
 منصفه

است اما این نحو تفرقه باید کرد که هرگاه این آواز از ذات الجنب بود تا پشت میخیزد و از مستمر محسوس شود زیر که پرده پهلوی آنجا رسیده  
و جمله پر آب خواهد بود و در دم غشا قلب فقط بمقابل قلب این آواز خواهد بود و گردان جایگزین است و از جسمی مخلوط خواهد باشد  
خواهد آمد و از دم چون آب در حریطه زیاده مجتمع شود دل ضعیف گردد و در تنفس یاده و شوری آید یا بد چنانکه در مرض برونش  
زیر که هرگاه دل ز دم غشا منضبط میشود خون در آن از ریه کمتر میرود و ریه متلی از خون نماند پس این سبب کشیدن هوا قاعده نباشد  
سینه دم آنکه بهای میخیزد نیلگون میشوند چهار دم آنکه روی آن میخیزد میشود و پانزدهم آنکه بدن سرد میشود و شانزدهم آنکه در دم پیرایا  
بیمار در دم پیدا میشود بعد از آن فتنه میرسد علاج این ض نیست بیمار قوی میشود و مختلف میباشد پس اگر مرض قوی باشد باید که اول  
فصل گیرند و تاده یا دوازده آونس خون کیمیا برارند و اگر ازین فایده حاصل نگردد بمقابل آن آونس چنان باشد که از آن  
تاده آونس خون بر آورده شود بعد کلول دو گریز فیون از ربع گریز نصف گریز با هم آمیخته حبس بخوراند بعد دو ساعت  
تا اینکه در دم دفع شود یا اثر آن در قلب هر شود مثل اینکه میوس میمیزد برین قوی سرخ گردد یا علاج همین تاده پیدا کند پس این مان  
خورانیدن آن ترک کنند چون ثابت شود که آب در غلاف دل مجتمع است پلاستر زینش گس زنند بعد از او به مدره مثل پلاسیر شیا س  
ده گریز یا پلاسیر شراس تا پنج گریز بعد چهار ساعت همراه آب ساده بنوشانند تاده یا دار دفع شود و چون در دین علت شد  
کند پس علاوه آنچه همراه کلول فیون بخوراند فیون سیاه هم بخوراند که از آن در دفع آرام حاصل میشود و اول باید که یک گریز بخوراند  
اگر از آن حقوق نشود بعد دو ساعت دیگر بخوراند همچنین تا آنکه در آرام پذیرد یا اثر ضرر فیون ظاهر شود مثل اینکه عصبیه  
گرد و خشکی در دین بسیار زیاد شود پس استعمال آن ترک کنند چون درین مرض بسیار ضعیف میشود و وقت تیز دفع کردن بران  
بزر و وقت خود ممکن نبود و لذا باید که هر روز دوا می ملین داده باشند تا بهر ازین وقت دفع کردن آن محتاج بسوی قوت نشود  
و اگر عوض سهل حقیقه کیمیا از آب گرم و تخم بیه بخیر یا آنچه استعمال آن نبرد طبیب با هر مناسبت داده باشند بهتر خواهد بود و غذا  
بسیار خفیف مثل تخم می مار الحوم آرد و آب گلاب یا ماء الشبیر بخوراند هرگاه ضعف کفوری در بیمار ندریعه ملاحظه نمیشد هر شود در آن  
وقت که اقم مل از شراب مثل شراب براندنی غیر از یک آونس و آونس بعد دو یا چهار ساعت بنوشانند حسب قلب  
کثریت ضعف اگر بیمار از شراب شراب محتاط بود یا میوینا کار بناس بجای شراب پنج گریز ده گریز همراه آب ملکرو بنوشانند و چون  
این مرض شخص ضعیف گردد و عارض شود هرگز نصف نگیرد و تو هم بسیار کم بمقابل قلب چنانکه در عوض آن حجامت بی خطر بمقابل  
قلب کار بر بند تا خون گوشت جذب شود و بسوی دم کم رود و بعد کلول یک گریز فیون ربع گریز بعد چهار ساعت بخوراند  
تا که اثر آن در قلب هر شود پس آن مان ترک کنند اگر بعد استعمال کلول فیون بسبب اذتی در محتاج بخورون فیون ساده شوند  
حسب ضرورت بخوراند تا که از دوا مان شود و آنچه از آب قیق در غشای قلب مجتمع شد باشد برای جذب آن پلاستر زینش گس زنند  
و برای در اوردن تاده مذکور در علاج قوی بنوشانند و حقه هر روز داده باشند لیکن اینجا چون فیض توان محتاج تقویت است پس  
باید که غذا کمی کثیر اندازد و خفیف سهل الهضم مقوی بود مثل شور با می لحم یا حنظلین نیمه شربت بخوراند و خلاص اول که قوی است

آنجا تقلیل غذا و تلطیف تدبیر تصدیق و چون ضعف در بیمار زیاد معلوم شود و ملا حظ نبض درین وقت که قسم هم در سر  
 مثل شراب براندازی غیر با ایمنی کار نباشد همراه آب نوشانند بعد ساعت یا چهار ساعت موافق زیادتی و کمی ضعف تا هرگاه  
 مجتمع شود و غلات قلب خواه در نفس قوی یا بیمار ضعیف از نمادن پلا شمشیر گس نوشانیدن مدرات خارج نشود پس این وقت  
 آنکه تنی شود کار این آب بیرون راندن این طور که در میان ضلع پنجم و ششم باشد این هر دو ضلع استخوان قص متصل شدند و بناله را که  
 حتی با قدری خل کرده باز بیرون آرند و به بینی که آب خارج میشود یا اگر آب بر آید بهتر و الا با قدری یاده دخل کرده به بینی  
 آهسته خل کرده باشند تا اینکه آب جاری شود و زخم بدل نرسد فصل چهارم در مردم قلب که اندک از شش بیستی منتهی  
 اول و دوم در گوشه شل عارض شود و از آن با غشی آن خواه غشای خارجی و یا داخلی آن منتهی شود و گاهی از مردم غشای خارجی پیدا  
 میشود چنانکه گفته شد و گاهی از مردم غشای که شل غشای ربی در باطن قلب است این مردم پیدا میشود با جمله مردم هم قلب نهان  
 بلکه ضرر است که با مردم غشای ربی یا داخلی بودند اگر با مردم غشای خارجی قلب بود معالج آن پر از چنانکه نوشته شد و اگر با مردم  
 غشای ربی بود پس آنچه فصل پنجم در امراض قلب است چنانکه در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که  
 در امراض ربی چنانکه در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که  
 است چنانکه در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که  
 اندک از شش بیستی منتهی در غشای ربی در باطن قلب است چنانکه در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که  
 موسوم اند عارض میشود بعد شش ربی غشای ربی در باطن قلب است چنانکه در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که  
 که از مردم ربی آید بر غشای محسوس میگردد و کمین نسبت غشای ربی بسیار کم میباشد زیرا که این دهان یا اجزای خون را در بیرون میبرد  
 لیکن بر دروازه قلب ده مذکور جمع میباشد که این دهان یا اجزای خون را در بیرون میبرد و گاهی این دهان یا اجزای خون را در بیرون میبرد  
 مختلط گردد و بسوی و ماخ میبرد و در اجزای ربی در باطن قلب است چنانکه در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که  
 و متورم گردد در کار خاص خود قاصر میشود و شلای دروازه بند میگردد یا بسبب جمع شدن با خود یا چسبیدن شوند و درین وقت امراض  
 قلبی دیگر از آن پیدا میشوند مثل آنکه گوشه شل یاده و غلیظ میشود یا در سینه کشته رفیق و تنگ میگردد و در هرگاه دروازه قلب کار خود قاصر  
 شود آن زمان وقتی که خون دل از خود بزرگ شریان عظیم بسوی ربی یا بدن رفیع میگردد آن زمان بسبب بند شدن منفذ گوش دل جلوه خون  
 بسوی شریان نرود بلکه بعضی بسوی شریان بعضی گوشه شل صاعد میشود و قلب را مشقت عظیم در دفع کردن آن می افروزد و گاهی  
 مشقت دفع چون دروازه شریان بند نمیشود این خون فته در شریان باز پس آمده از شریان دل میریزد و درین کثرت مشقت بسیار  
 قوی هم قلب غلیظ میگردد و چنانکه در اجزای در مشقت غلیظ میشود و بعد مشقت یزدل ضعیف و کمزور میشود و از کمزوری خود قوت  
 میگردد و زیاد و وسیع میشود و اگر کمزوری پیدا نشود قوی ماند غلیظ نشود غلیظ خود باقی ماند و ازین نقصان حضرت باری دیگر بریه و اگر  
 میرسد که در مذکور خوانند انشاء الله تعالی بسبب این مرض و است که در مذکور خوانند انشاء الله تعالی بسبب این مرض و است که در مذکور خوانند

فصل پنجم در امراض قلب که در غشای ربی در باطن قلب است چنانکه در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که در پیش ازین گفته شد و بعد از آن که

پیدا میشود که آن جمع سفال و اوجاع عضلات است و در همین مرض این هم غشائی غلیظ پیدا میشود علامات اول حسی و حرکتی  
 بود و چون این ضعیف شود و مجاز زیاد گردد و بمقام دل در دوقل محسوس شود و ضربات قلب و خفقان زیاد بود و بعضی است  
 مرض سریع و قوی میباشد در آخر آن هرگاه فعل و ازاره قلب ناقص گردد و خفقان حرکت قلب خارج زیاد محسوس شود بلکه بعضی  
 میباشد زیرا که درین وقت بسبب فعل و ازاره قلب خون شریان کم می شود و این غشیه بر پشت خوش آید بر پهلوی دیگر ضعیف  
 آرام نیاید و هرگاه که مقیاس الصوت بر دل نهاده بشوند آواز جدید از دل مثل آواز منفوخه مسجع شود و این صوت جدید  
 آواز عظیم که وقت خارج شدن خون از دل در حال صحت بر می آید یافته میشود و این علامت شمع مرض است و هم که فعل و ازاره باقی  
 است یعنی بند کشاده میشود اما فقط از غلیظ شدن غشائی در ازاره قلب خون بر و روشد خارج میشود بسبب آن صدای منفوخه  
 پیدا میگردد لیکن هرگاه فعل غشای ناقص یعنی در ازاره دل بند نگردد آن زمان آن وقت گشتن خون حال صحت و از غلیظ شدن  
 که آن از بند شدن در ازاره و آواز گرفته خون بر آن بود هم همراه آن آواز منفوخه پیدا شود حال نیکو وقت نقصان فعل در ازاره آواز  
 ناز منفوخه از قلب همراه بر و آواز عظیم صغیر یعنی آن که صدای منع و بازگشت خون است سمع میگردد و درین حال این آواز از دل  
 هر جا که آن را نهاده بشوند سمع میشود زیرا که شریان عظیم سافت از رسیدن آواز در ازاره آنهم آواز شنیده میشود بخلاف و هم غشائی خارج  
 که صدای آن عمل سمع میشود لهذا هرگاه صدای جدید و صغیر از دل دور تر تا قوه بشنوند یقین کنند که هم و هم غشائی اندرونی  
 دل آه یافته و گاهی علامات این هم چنان خفیف میباشد که تشخیص ضعیف شور بود و اما حال مرض میباشد لهذا واجب است که هرگاه  
 شخصی را در عضای مبتلا شود که آنرا تب و مست و میگویند فوراً با مقیاس الصوت و ازاره قلب و را بشنوند چون از صدای که  
 با آواز منفوخه باشد ثابت شود که هم غشائی داخل قلب شروع شده فوراً بعلاج مشغول شوند چنانکه گفته میشود علاج اگر بیمار  
 باشد و صد گیند خون قریب آئوس بر آرد و اگر ازین حاصل نشود و زود بمقابل چسپانند بعد کامل و در گریں همراه ربع نصف  
 گریں فیون بخورند بعد و دو یا چهار چهار ساعت تا که سرخی در دهن پیدا شود و این انبرودی بعمل آرد و یکدram هم سیاه  
 بمقام بیضی کشان و در غلظت اندا برود و در دهن سرخی پیدا شود که از آن هم غشائی قلب دفع خواهد شد غذا این بیضی را که در  
 مدام که علامات هم دفع شوند بعد بلای بخنداب ده و دو یا دو آینه پلاس زنجیر گریں ده گریں نبوشا تند سرپ فیری بود و آب  
 یا آب بن همراه آب نبوشا تند بیمار را و در آنرا افمالیش کرده دهند که در آرام و راحت اند و از شفت محنت شمع خبر که شستن زیاد  
 خوشی زیاد هم باشد محفوظ دارند و اگر این شخص ضعیف اند خون از و بنیارد بلکه عضل آن بر نهادن حجامت بی شرط بمقام  
 آنکه کنند و دیگر علاج بتخلیل زن موافق برداشت علی بن مسعود دارند قوی ضعیف هر و بعضی بنده بقیه قنده زهره مایع مرض  
 و حصول قوت تلزم نمایند که یکبار سهال آورده باشند چنین غلظی بخورند که از آن یاج پیدا نشوند و الا سحر و پاره هم فرست  
 با قلب کرده اوست خواهند ساینده ششم در زیاد شدن گوشت قلب و آنرا بنیان بخشای می پرشانی می باشد  
 و نیست که چون که در هم عضله است عضلات بدن پس چنانکه دیگر عضلات بدن زیاد را یا خست عظیم غلیظ میشوند و این

حکم ششم در زیاد شدن گوشت قلب







سبب آن همانست که سبب یاده شدن مقدار گوشت دل است یعنی ثبوت ریاضت لیکن هرگاه راه فتنه نهن بسبب نقصان و از ده دل بند میگردد و دل را در اخراج خون از خود زیاده مشقت ریاضت میشود پس اگر شخصی است آنرا مرض یاقی مقدار گوشت دل عارض میگردد و اگر ضعیف است از زیاده مشقت ضعیف میشود و چون گوشت دل ضعیف گردد بطون قلبت سمع میشوند و دیوارهای آن قیق و تنگ میگردد و در مرض بجم که آنرا استهما نامند بطون گوشت این بطون خاص دل سمع و دیوارهای آن قیق میشوند هرگاه گوشت دل همیشه در آن وقت هم بطون دل سمع میگردد و این سبب کثرتی بوجود است این قسم وشی و به پیران کثر عارض میشود علامات هرگاه بیمار قدری مشقت میکند ففقا دوران سر عارض میشود و نبض این ضعیف میباشد کثرت هم برق درین موهب بود و بیش نیست که چون مرض بخون بطون این یاده مجتمع میانند این سبب آنچه خون جگر و معا و پا با بسوی دل میرفت کم میزد و درین اعضا زیاده مجتمع ماند بهمین سبب جمله اعضا متورم و زیاده مقدار میشود لیکن چون پا با در جانب سفلی واقع اندک اندک متورم در آن نیروی پیش از همه میشود و چون روی علیل و برگردد چشمتها تبخیر محسوس شود زیرا که خون از سر و چهره کم بر میرد و کمرهای طویل یاقی نیلنجی بوزیر که خون بسبب اجتماع در آن موضع سیاه میشود و دریدی که در گلو هر دو جانب یکسان بسیار است متلی از خون میماند و کثرت شریان و گلو بالای تر قوه زیاده محسوس شود و حرکت قلب از خارج صد محسوس میشود و قوی نمیشد لیکن عرض مسافت مثل ضرب زیادتی مقدار کم قلبت یاده محسوس شود زیرا که بطون یاده و سمع شد اندک پس بقدر زیاده شدن سمع یاده محسوس میگردد و او دل غلیظ میباشد لیکن صاف بود زیرا که دیوارهای آن قیق اند بخلاف زیادتی مقدار کم که در آن گوشت قلب غلیظ بود و ازین آواز دل صاف نمیشد علاج عام درین مرض نیست که بیمار را در راحت آرام دارند و از امواته منفرد و منفرد از جمله کات بدنی و نفسانی و از تیرا لاف و من از جماع و باطله از هر چیز که حرکت قلب زیاده کند باز دارند و در غذا اخذیه صفا تخفیف که مولد ریاخ باشد خوراند چنانکه از ریاخ و معده درین ضل و نیست ضرر حاصل میشود و تقویت قلبت باید بخوراند و آن آب بن یا سرپ صیری ابو و آیدند هرگاه درم بر و شکم و اطراف ظاهر شود مدرات نوشا تا مایست کم شود و قبل نشاندن مدرات سهل بند باد و سهله که اخراج آید کنند یاده قیق بر می زنند و بهترین سهلات اینجاست که بگریز سفوف همگامی سفوف جلیک یک سفت گریز تخمین کلول هر یک گریز همیه آمیخته یکبار بخوراند و در یک هفته سه بار و افق این نسخه بفاصله یکیک و سه سطل بند و در ایام خالی از سه سطل بعد آن شش شاس شاس ایسی شاس یک پنج گریز شاس یا ش شاس است گریز با هم سخته یا علی علی ش آب تخم نهوشانند و برگردان سه سطل کردن غلیظ است و در خانه هوا دار که هواش صاف باشد بیمار را دارند فصل ششم در قلع مقدار دل که آنرا نربان عربی میگویند و نربان انگلیش اثرنی گویند و چون در شریج دل این مرضی است یعنی بخورده و دیگر مرض یافته نمیشود چنان معلوم میگردد که گویا دل طفل را برآورده و در سینه جوان نهاده اند و اکثر این مرضی زفا کشتی یا از کم خوردن یا از خوردن غذای رده و از زیاده خوردن انهن پیدا میشود و قیقین این مرضی چون بدن بیمار کم پیدا میشود و از قلع خون دل ضعیف میگردد و علامات هرگاه نربان کثرت دل و از دل میشوند آواز صاف از ریه آتی یکبار در دل و از سینه از ریه که از منفر قلبت به بالای دل می آید بر ریه ضلع صده میباشد دل سیرم و سیرم و ازین

در قلع مقدار دل

آواز دل برمی آید و مسدود میشود و همچنین حرکت دل از خارج محسوس نمیشود و در هرگاه دست بمقابل قلب برسد نهاده حساس نشود  
 آن زمان هم حرکت قلب محسوس نمیکرد و یا بسیار قلیل محسوس میشود و هرگاه آنکه قیاس الصوت انداده آواز دل را بشنودند مسجع نشود  
 یا قلیل مسجع گردد و چون نبض این بیندیشی ضعیف و خفیه بود که یا تا محسوس باشد اما جراح علاج خاص آن هیچ نیست خبر اینکه تدریجاً برآید که بپایان  
 خون گرفته شود مثل اینکه غذای خوش خوراندند و در هوای نیکو سازند آب این نبوشانند و آنچه از زیاده خوردن فیون عارض شده باشد  
 روزه آنرا ترک کنند فصل نهم در صلابت غشاء غشیه قلب بطور دروازه واقع اند و آنرا البت لا ان کائنات  
 و الف کائنات بلغت کائنات زیر آفت باره که الف کائنات یعنی متغیر شدن در بخشش آفت یعنی دروازه ای قلب است به سبب آن  
 همانست که پیشتر نوشته شد که هرگاه غشای داخلی قلب متورم میشود چرا که آن بن غشیه یازده گانه هم متورم میشود و این ضعیف میشود  
 سبب دوم محدثان گاهی جوانی و شبانته و زیر که روست از غشیه بدکن با همی بود در سن جوانی خاص عارض میشود  
 و در سن پیری هم این عارض میشود و کمین این وقت فعل میشد نباید باشد بلکه از رسیدن غذای خوش این غشاء اسحق غلیظه مثل  
 میشود و گاهی در آن استخوان پیدا میگردد و گاهی در زمان خویش این غشاء خشک شد سخت غلیظه میشود و چنانکه هرگاه برگ خشک  
 گردد سخت میشود یا جلد بدن پیران سخت درشت غلیظه میشود و این ضعیف غشای گاهی در سید و شریان عظیم که از بطون لسته اند و در  
 بطون گوشائی دل عارض میشود اما اکثر تشنگی در بطون ایسر یا بطون این تنها بود و گاهی فقط در دروازه شریان عظیم پیدا شد و تحصیل احوال این  
 مرض غشای نیست که گاهی این غشاء فقط غلیظه شد و وقت قفس خون فراحت میکند لیکن چون این قوی بود و این تشنگی شدن خون  
 در دل یا داتی لحم و قلب عارض شود و سبب آن اخف قلبی که گرد خون این و روت خود بسوی بیرون نفع کند اما هرگاه این غشیه با خط  
 چسبیده شود آن زمان ذیبت و تکلیف زیاده عاید الی قلب گردد و خون بیشتر در دل متجمع گردد و از آن بادی نفقا  
 و دیگر عوارض در مرض عظیم شدن ل نهشته شد از وجود باشد هرگاه این غشاء غروف یا استخوان گردد و در آن غشی یاده عارض گردد  
 و بطون این مسجع میشود زیرا که درین وقت آنچه خون از دل بسوی بیرون بالار و بیرون دل می آید پس اگر در این بین بود خون  
 کمتر رود و در گوش این یاده متجمع ماند و گوش این یاده متجمع گردد و آنچه خون از جگر بدلی می رود و او را دیگر رسانند خون از جگر بدلی متجمع  
 و از آن تشنج و درم در شکم اطراف ظاهر گردد و درین صورت با تضر قلب جگر هم متضر شود و هرگاه بطون ایسر بود خون بسوی بدن کم رود  
 و از شریان بانیس که در گوش ایسر متجمع شود و آن گوش وسیع گردد و غروف و او را دیگر خون را از ریه بانیس می دروند مثل مانت بطون این هم  
 منتهی ماند و درین صورت با تضر قلب هم متضر شود و گاه گاه درین صورت خاص غشای هم عارض شود و سبب تشنج شدن ریه  
 اجتماع خون علامات درین ض هم علامات در تشنج مرض بسیار غشی میباشد که از آن تشخیص مرضی شوار بود و هرگاه بسبب روست از مرض  
 این مرض پیدا شد علامات آن قبل از حدت مرض موجود بود و تشنج شواری نباشد لیکن هرگاه از سبب دیگر بود درین وقت البته  
 تشخیص شوار میشود بلکه در ابتدای این ض گاهی در خفیه بمقابل محسوس شود و هم در مفصل عضله بجانب نبشی بازو چنانکه در  
 کلان فر آمده تا خضر برسد سبب این در معلوم میشود لیکن گاهی مفصل مرفق سید بازو گاهی نداشت دست میرسد زانوی

فصل نهم در صلابت غشاء غشیه و افادات

بر و طراف خنصر و اطراف انسی بنصر میرسد زیرا که عصب کورتا انجا میرسد پس جای که عصب سینه است وقت ذیبت آن بها بخار و  
محسوس میشود و لیکن پوشیده نماید که این گاهی در بدنی معده هم یافته میشود و از هر گاه این در دایقه شود نگاه او از دل را شنید و تفرقه  
کنند پس اگر او از دل بدستور صحت باشد در مذکور از علامات مرض معده ای اند و اگر او از دل بخلاف از صحت حال یا بنده چنانکه مذکور  
شده از علامت مذکور بداند که مرض قلبی است ایضا از علامات این مرض آنست که بیمار از آبی تعب مشقت و خفقان مبتلا میشود  
و در تنفس سخت و معرق و تواتر راه یا بدلیل کسیکه در مرض بدو مبتلا باشد باز آید و می دود و از آن در تنفس سختی تواتر راه یا بدلیل سبب  
فساد و تغیر در تنفس آنست که دل در کار خود که دفع کردن خون است تعجیل میکند و در اینجا گاهی خون همراه نفث خارج میشود زیرا که هر گاه  
گوش آید قلب از خون بی نیشتو سبب تنگ شدن ای که در میان آن و بطون میرسد پس خونیکه از ریه می آید آن می یابد آنرا فیکید و  
آن خون باز بر می رود و در دل از بطون این برود و قوت خود خون آبوی ریه میفرستد از آن متلی میماند و هوا را بقوت میکشد و درین نور  
و قوت میوکس میبرن آن شکافته میشود و از آن خون همراه نفث خارج میگردد و از خارج شدن خون فی الجمله ریه را راحت نمیشود  
و طبیب جاهل این مرض را سبب اندکین آن سبب ض قلبی بود و همچنین این سبب تنفس هم بسبب قلب و در هر گاه در درازن بطون  
این قلب فساد مذکور عارض شود و از آن خون در معده و جگر و معاد اطراف مجتمع ماند پس گاه گاه درین وقت خون از معده همراه قی هم  
میشود و سبب آن همان باشد که گفته شد و هر گاه بسبب این فساد و درازن قلب یا دقتی مقدار گوشه دل یا وسیع شدن بطون آن درین  
مرض عارض شود پس علامات آنهم درین مرض موجود بود و منضم باینهم همان باشد که در فحیم مذکورین نوشته شد علاج آن  
که زیادتی مقدار دل یا وسیع شدن بطون قلب پیدا نشود باشد علا جش همین است که بیمار را در آرام و راحت دارند و از محنت و مشقت  
باز دارند تا دل غلیظ و وسیع نشود و امر که ورث زیاده شدن حرکت قلب است مثل فکر و غم و غیره آنرا از بیمار دور دارند باقی علاج همان  
که علاج زیادتی مقدار قلب و وسعت بطون آن نوشته شد فصل دهم در بیان تولد شکر در قلب این بر دو قسم است یکی که از عروق  
قلب شکر میسرید میشود چنانکه در جمله بدن گاهی بالائی عضلات زیاده پیدا میگردد و دوم آنکه لحم قلب خود شکر میپماید و اصل مرض همین است  
و سبب قسم اول زیاده متولد شدن ماده شحمیه در تمام بدن از آن بر دل هم چربی پیدا میشود و ضرر آن چنین قدر است که صورت نه صفت  
خفقان میشود بسبب مانع شدن برائی حرکت قلب صاحب شحم قلبیه انباشت کردن از زیر بال از قطن شوار بود و علا شش آنست که  
ضعیف بود و دوران سر عارض شود بسبب آنکه خون بدماغ کم میرسد از آن و باغ ضعیف میگردد و هم هر گاه او از دل را بشنود و از  
ضعیف از دل سمع میشود و هر گاه نگشت بر محل دل ده حساس کنند از جسم صحت زیاده و مسافت مثل آواری که در زیادتی مقدار  
لحم قلب سمع میشود اینجا هم سمع گردد زیرا که از زیاده شدن شحم هم مقدار دل زیاده شد ازین جهت هر قدر که دل در مسافت و مقدار  
زیاده شد همان قدر در مسافت آید آواز آن سمع شود علاج مادام که چربی بر دل زیاده ماند از مشقت و دیدن و از زیر بال از قطن  
چنینا ط نمایند که از آن تکلیف زیاده خواهد شد و طبیعت لیس دار نمک از قبض هم تکلیف میشود چنان تدبیر کنند که آینه چربی پیدا نشود  
آنچه بر دل و معده و غیره پیدا شد آهسته آهسته بطرف و منجذب گردد و برای آن دل ضرر است که آنچه شحم از غده اند مثل قسم شحمی

فصل در بیان دل شکر و قلب

در خون زرد و سیاه و زرد و چربی گوشت و آنچه لعابدار باشد مثل برنج و آلوداروی و اگر روت و ساگودانه و نشانشده و رتالو و غیره از آن  
 چنانکه گفتند همچنین از تمام تره با احتیاط نمایند و گوشت که خالی از شحم باشد و نان گندم و ترشی لیمو و تمر بندوی دال مونگ و ال و هر چه  
 روشن بلا مصالح حاره بخورند و چون ازین شحم جدید پیدا نخواهد شد درین وقت آنچه شحم بالایی ل بوده آنرا خون برای گرم داشتن خود  
 در خود خوابد کشید بعد آن یا خست نفیض مثل سواری سبب عمل آید و گرم شدن بدن عرق آید و درون خواهد پذیرد هم گرم بود یا بوجه دیگر  
 مفید است و چون بدن لاغر شود آن وقت یا خست قوی عمل آید و نقطه و قسم ثانی که ریشهای لحم قلب شحم میشوند و چنان میباشند چنانکه  
 ریشه لحم مثل خط و بعضی است در آن مثل نقاط چربی بطور دانه دانه حاد میشود و در خارج حد و ثانی بحسب قلت و کثرت مختلف میباشند  
 و بعد شرح معلوم میشود که درین ضم که اصل قلب تغیر میگردد و چربی سرخی آن کم شود و چون دست گرفته حساس میگردد پس بطن پس بزرگ میشود  
 که دل لایم شود و از درخت شدن آن جوهر شحمی ثابت میشود و شکرستن هم آن لحم بوسید میباشند و بهر علت شکسته شود و هر چند این ضم طفولیت  
 و جوانی و پیری همه اوقات حیات مکن العوض است لیکن اکثر نیست که بعد از شستن پنجاه سال از عمر عارض میگردد و گاهی تنها خود باشد  
 و گاهی با مرض دیگر عارض شود هرگاه خون سفید گردد و هم هرگاه به سبب ضعیف شدن شکر اینکه غذای قلب شکران عظیم بسوی قلب می آرند  
 غذا بقلب سدید کمتر رسانند و این ضم پیدا میشود زیرا که این وقت خون جوهر قلب کم میگردد و با جمله سبب اصل آن کمزوری آن است  
 اسباب آن بسیارند و انشاء الله در امراض موفیه فیصل آن گفته خواهد شد علل مات درین ضم ضعف کمزوری علیل یاده میباشند چنان  
 بادی مشقت بیمار مانده میشود و طپش قلب یاده بود و این حرکت قلب که ضعیف میباشند و مقابل عظم خوری معلوم میشود چنانکه کمزوری  
 دل وسیع میگردد و بطن بسیار ضعیف بود خواه طبعی باشد یا سیرج و بطور نفیض قوی باشد که بیمار ساکن در آن بود و سرعت نفیض زمانی محسوس  
 شود که حرکت کند و در نفیض او در آن سر اکثر عارض میشود و گاه گاهی شحم افتد و سبب آن کم رسیدن خون بدماغ باشد و در نفیض شحم  
 راه یا بسبب گاه گاه نفیض ضعیف و سریع گردد و سبب یاده ماندن خون در ریه و گاهی بهر سواری هم در کشنده چنانکه وسیع شدن درین وقت قوی  
 گوشت آن بود و درین ضم گرد قریه حلقه سفید حاد میشود و سبب آن شحم است که در ریشهای قریه از کمزوری خون فساد غذا پس میشود با جمله  
 هرگاه این حلقه سفید با کمزوری و ضعف قلب یا بند بمانند که این مرض پیدا شود و درین وقت چون و از دل را بشنود ضعیف کمزور بود و چون  
 درین ضم بطون او وسیع شوند پس چنانکه در آن به مقابل او آواز جسم صحت شنیده میشود و درین ضم شمع شنیده خواهد شد و تمام مرض این ضم  
 بسته اکثر شمی میشود که آنکه بیمار دفعه غشی کرده و میرود و پیش آنست که در غشی حرکت قلب بند میشود و بعد افتادن هرگاه خون از شریان عظم  
 بسوی دماغ میرود و از دل حرکت میکند اگر بسوی دماغ نرود و میرود و دم آنکه از ریاضت و مشقت کردن دفعه شگافه شود و چون  
 از بطون آن بیرون آید و غشائی قلب جمع شود و از آن حرکت قلب بند گردد و میرود و دم آنکه بسته است به علیل بسبب ضعف و تحلل شحم  
 و درین صورت قبل از موت اکثر بیماران اند علل خاص برای این مرض نیست از و درین ضم کمتر فایده ظاهر شود و شکران زیاد  
 باز میماند اگر مرض پیش از این میگذشت که بیمار در سترانش تعلیم نمیدادند که حرکت قوی مثل مصارعه یا دویدن  
 بعمل نیارود و الا یا غشی یا از شگافتن قلب و الهک خواهد شد و بلای تقویت قلب غذای خوش خوانند و آب آید و کندن نهوشانند

ن





مرض قریب قریب شوند و شدت مرض زیاد گردد و او را سلیع شوند چنانکه دل را عادت این مرض میشود در آن وقت غشی گردد و گاهی در دوره اول سیمیه بسبب شدت در لکین اکثری حال این مرض همانست که نوشته شد علاج هر چند علاج خاص آن نیست لیکن هرگاه متحقق شود که وجع القلب است پس بایز افه نمایند و بیکه آنچه حرکت دل را بنفشاند مثل دیدن جماع و از زیر بالافتن یا خوشی غم فطران خود را بازدارد و چنان غذا بخورد که از آن بهضم نمی شود و در یخ افزاینده وقت و در بیمار را بیکه گرم کار نام بر پاشد پاشد و دراز درین بیتی در هوا دشت بویانند تا بدیدوشی نیار و وقت حس کم شود و کار که استمر بیکه نام بنوشانند کسی که ز شراب مجتنب باشد آنرا لا بیکه ایمنیا یا ایمنیا کار بناس همراه آب حل کرده بنوشانند سلفیو که ایمنیا بنوشانند تا ریاح دفع کند لیکن با استعمال لایقو ایمنیا و نیار همراه آن نهند که فایده آن طبل میشود و برای تقویت دل و جی شلیس بنوشانند و درین مرض ادویه سهله که حار محلی تیاج باشد بدین دل یابی که پوندیکس برای فارسی قول که معنی حب است و پلور یابی که پوندیکس برای فارسی قول که معنی نفوذ است هر دو بهتر از ثانی از اول هم بهتر است پس یابی را ناده گرین بخوراند سفوف یابی را تا بیکه نام بنوشانند و حقه وادون را دو مناسبه درین مرض بهتر از مسهل مشرب است و بهتر است که از روغن بیدجید و روغن تارپین حلیت خفکان سازند فصل ششم در نقصان فعل قلب که بر اثری خون مسبوکی ریه و بدست بی آنکه خاص سبب آن در خاص قلب باشد این نقصان بعرضه حرکت قلب است و آن چنانست که حرکت سلیع میشود و با سرعت فتره بود و گاهی برای فتره نظام باشد مثل اینکه بعد از حرکت سکون کند یا با نظام پوشل اینکه گاهی بعد چهار حرکت یا شش حرکت و گاهی بعد سه یا ده حرکت سکون کند و گاهی فقط سرعت بود و ثبوت حرکت کند و فتره نباشد یا بجملة هرگاه ایخالت عارض شود و سبب آن دل نباشد بلکه در عضو دیگر بود و از آن در حرکت دل تغییر نقصان راه یابد و از آن در اجزای خون نقصان ظاهر شود و این تفسیر قلب گاهی از بعضی معذوزانی از قبض شکم خصوصاً هرگاه آن یاج زیاد پیدا شوند و زمانی از امراض جسمی هر مرض جوی که باشد و گاهی بسبب ن هرگاه زیاد شود یا غلیظ گردد یا سفید قیق شود و گاهی از امراض عصبی قتیکه عصب کم و شود پیدا میگردد و در حقیقت این مرض نیست بلکه از علامات است که در امراض نوروپاتی میشود لیکن چنانکه این حالت خفکان یا ده ظاهر شود و می باشد که از آن عللی مناسب مقام معلوم شد تا که علاجتش کرده بیمار را راحت رسانند علامات خفکان پیش قلب بین بسیار بود لیکن حرکت قلب درین خفکان شرکی میباشد مخالفت بود از حرکت قلب خفکان اصلی که در زیادتی هم قلب وسیع شدن بطون قلب عارض شود زیرا که در خفکان اصلی با بساط و تقباض قلب بجائی خود زیاد محسوس میشود و بسبب این باده شدن مقدار دل درین خفکان شرکی حرکت چنان باشد که گویا دل در جهته قدیم پیش آمده صدمه میرساند و اثر قریح و صدمه آن در وسط ضلع خاص سادوس محسوس میشود و گاهی این حرکت قلب چنان قوی میشود که بیماری اندیشد به حرکت دل بالا رود یا نیز بکشد از دست خود را بر روی بر محل دل نند عضای ظاهره مقابل دل را بقوت دست بگیرد و در آن وقت بیمار بتمام دل نفس کلفت احساس کند نفس سلیع شود زیرا که دوران خون درین وقت سلیع میگردد و در گوش بیمار گاهی از غلیظ و گاهی در پیش بوق غلیظ و وقت خون می رود و در آن سر عارض شود لیکن باید دانست که اینجا دوران سر بسبب یادی خون باشد هرگاه در

فصل ششم در نقصان فعل قلب

بیش

بر دل نهاده بین حرکت دل زیاده و صدسه و نه در محسوس شود و هرگاه آنکه مقیاس الصوت انما ده اواز دل را بشنود پس اگر خون صاف بود و او از خون غلیظ و غریب در عالم صحت می آید شنیده شود اما اگر خون قریق شود و پیش میان آواز غلیظ و غریب صدسه و گرشل صدای منفی محسوس و سموع شود لیکن این آواز خون قریق میباشد فرق فیما بین این خفقان شرکی و خفقان اصلی که سابقا ذکر شد در آنست که این خفقان گاه گاه با امراض مذکوره میباشد همیشه میماند زیرا که الباع امراض گریست که در عضا می گیرند بخلاف اصلی که همیشه میباشد و هم آنکه این خفقان شرکی در احوال آرام پیدا شود و از حرکت و شفت بر طرف گردد و بخلاف اصلی که سبب آن دل بود و بکریاضت و شفت زیاده شود و از راحت و آرام ساکن گردد و هم بحسب محل حرکت هم فقره میتوان کرد چه در اصلی دل بجای خود حرکت میکند و در خفقان شرکی دل از جای خود پیش آمده صدسه میدهد و سوزی را دفع میکند چه امرا اینک در خفقان شرکی تحلیف ازین نسبت اصلی زیاده بود و یا اینکه گاه قدری ریاح دفع شوند یا سبب آن دفع گردد و فوراً خفقان میشود بخلاف اصلی که در آن زوال فوری ممکن نیست و از بودن این خفقان با امراض مذکوره در شفران عانت کامل حاصل میشود شرکی بودن آن مثلاً هرگاه بعضی قبض خفقان بود و از آنکه مقیاس الصوت و علامات دیگر دریافت کنند که در دل که امی سبب نقصان نیست پس بالیقین دانسته شود که خفقان شرکی است علاج اول سبب خفقان او را یافته علاج سبب خاص آن که گاه با دامم خفقان موجود باشد برای آن سپریش ایم و نیایر و مشک نیم درام بعد پانزده پانزده دقیقه برای کسیکه محضت از شراب بود عوض آن ایمو نیایا کار بناس از پنج گریتن هشت گریتن بنوشانند و اگر کار کارک سیم هم همراه آن نیم درام بنوشانند و بنفشه بود و او بخانه او و قلیبه مناسب حال در پیش خوانند تا بهر باشد تا که طبعش قلب طرف شود و بیمار صحت یابد حاصل چهارده غشی و این غشی فی الحقیقت در اکثر امراض دفع میشود غشی چهارت است ازینکه حرکت دل ریه بند شود و بیمار میبوش گردد و آنرا بخت که یک سنگولی میگویند و این حالت گاهی فقه و گاهی بتدریج عارض میشود و اما هرگاه بتدریج عارض شود و آن اول مقام دل سده و غشی محسوس میشود و آن قبل بلند شد تا گلو میرسد پس دوران سر شده حواس کم شوند و پیش چشم خیالات معلوم میشوند از آنکه قریق خون بوی سرد و گاهی سرد سفید گردد و سبب اندرون قریق طراف سرد میشوند بعد بهیاری افت و میبوش میگردد و در اصل سبب غشی که بسوی آن نسبت اکثر سباب ظاهر و صریح میشود قشر عصبانی شیک باید دانست دلیل بر این آنست که اکثر غشی از رسیدن صدسه ضرر و قسطه یا او باغ و ازین معذور هم و کلیه عارض میشود بلکه هر دو که زیاده شود از آن حد و غشی ممکن است زیرا که از ازین ایام حضور و توسط غشی متضرر و متاثر میشود و اما این سبب خفی است که بسوی آن رجوع اکثر سباب میشود و لیکن سباب ظاهر پس بسیارند و چنانچه از زیاده محنت و شفت زیاده استاده ماندن و از خوف و از دین خون راه رفتن هوای گرم و قیام کردن در حمام گرم و میسران بگو حاد و نیز بسیار بود و از خارج شدن خون کثیر از بدن چنانکه در ولادت و زخمی شدن گاهی اتفاق می افتد و از زیاده آمدن اسهال و از بد غشی معذور و اگر هم از امراض قلبیه چنانکه بالا گذشت و از امراض شراب چنانکه آینه می آید و غشی به غشریب انشاء الله تعالی امراض داخیه از امراض حیه از در زایر جدا که در بدن باشد و از بهر سبب که بود و از غشوری خون یعنی هرگاه خون قریق و سفید شود

اصل چهارده غشی

[illegible]

فصل پنجم در امراض سر باطنی





است و در بعضی طولی شل گوی دراز و در بقای انسان در انداختن با رحم مشابهت است چه انسان از رحم پیدا میشود و از شری  
 اعتقاد کنند برورش باید و این عضو هم کم و زیاد میشود چنانچه قبل بلوغ و از و دواج کم میباشد و بعد آن یافه میشود و هم در حال حمل زیاد  
 و بعد تولد جنین در ایام رضاع کم میشود و بعد فطام صغیر میگردد و نشود در مردان زنان هر دو میباشد و مردان صغیر و زنان  
 بنسبت مردان همیشه غالباً کم میباشد و شری جانب ایسر همیشه بنسبت ایمن کم بود و بالای آن غشائی خارج ریشه در صغیر و بزرگ  
 است این غشائی مثل غشائی تخم است و همین غشای بواسطه غم غمندی ندر و ندر شری فته از آن خانه است و بعد جدا جدا پیدا میشود  
 در هر یک از آن شلترین خون سرخ از دل گرفته و داخل در آن خانه میشود و در آن بعد شلترین صفرا که شاخ های همان شریان داخل  
 اندازان شده و قریب میشود پس همین غشای ماده شیر از خونیکه در شاخ های کوچک شریان است خود جذب میکنند و بعد شاخ های  
 خرد و کوره خون باقی مانده را که سیاه شده در یک گشته اند شری بیرون می آیند و بعد بیرون شدن شری همه آنها یک جا میشوند و  
 کم میشود و در بطن ایمن قلب میسرانند پس شریان آن خانه داخل میشود و درید از آن نا خارج میشود و بعد غشائی که ماده شیر  
 که جذب کرده است در خانه های موصوفه میسرانند و از آن طوالت شیر پیدا میشود چنانکه یکس میسران آن طوالت میسران در شری نیر  
 و از آن براق پیدا میشود پس فی الحقیقه نه خون در شری نیر و نه لیس از خون پیدا میشود بلکه غشائی موله شیر طوبت مذکوره را که  
 تولد لیس است از خون شلترین صفرا کشیده و نفس خود از آن شیر پیدا میکنند شل غده جلگه ماده تولد صفرا را از خون نفوذ کشیده از آن  
 صفرا پیدا میکنند و ایضا باید نیست که جلگه این خانه با بطور و در جمیع شد از وسط پستان بیرون اندازد و آنرا حلقه می گویند و آن  
 صورت قدری طولانی و در و در آن غشائی است رنگین گان آن مختلف میباشد چنانچه قبل از و دواج قلیل الصبغ و در وقت حامله  
 شدن آن بسیار میشود و آنرا قدرت حمل سیاهی آن زیاد میگردد و همچنین آن کثرت رضاع طول آن زیاد میشود و بر سر آن  
 مثل دانه های خرد و اندک در غیر ایام حمل رضاع چون آنرا غم غمندی آنرا بر می یابد و ایام رضاع شیر از آن بر می آید  
 و گردان و طول عضله های خرد و اندک بسبب آن این حلقه قوی است است میشود و فی الواقع شری برای طفل شل قمع پراز شیر است  
 و حلقه شل لوله است که آنرا در دهن گرفته شیر می مکند و اعتقاد اینست که بعد از آن که شری در دهن افتد و در دهن شری در دهن  
 نیران گرانگه ای و بیامی و بیامی در و پستان میگویند اکثر عوارض را در و شری رض میشود شل در و شری سبب حاصل آن شری  
 نباشد و گاهی شری هم همراه این حج میباشد هرگاه قریب و در حقیقت باشد این مرض اکثر از مشارکت رحم پیدا میشود و نیز عصب شری  
 چنانکه در مرض شریان عظیم شیر گفته شده که شطایای این عصب جلگه بدن میزنند و بواسطه آن از درد و اذیت یک عضو تغیر در جلگه  
 بدن پیدا میشود و گاهی این حج بسبب کمزوری خون ضعف عارض میشود و علامتش قشست که مرضه غریب و قلیقه اغیار باشد  
 یعنی در اصل غذا کم خورد چنانکه اکثر از شریان نرک اندام است گاهی از نیرادی قوت عصب ثبوت شری رض میشود و علامتش شری است  
 که مرضه از دانی منفرد و خرد از کمتر تن فخرج زیاده خایف باشد و گاهی از رسیدن سردی هم این درد عارض میشود و این حج  
 گاهی در یک پستان بود و هم زمانی در جانب ایمن قوی در جانب ایسر شل شری شری عصبیه یا عصابه و گاهی عام در هر دو پستان باشد هم

فصل دوم در وجع الشری



گاهی این دروازستان مفصل عقد در جانبی باری باز و فرو آمده باشد دست میرسد علاجش آنست که هرگاه از مشارکه چشم  
پس اول مرضی را در یافت گفت بعد علاج خاص آن که در امراض چشم نوشته خواهد شد انشاء الله تعالی فرمایند و هرگاه از  
کمر و ریه ضعیف و قوتش باشد پیوسته بخون قوی عمل آن چنانکه مکرر نوشته شد و آنچه از قوت مرصعه و زیاده حق است  
در آن سهل و متناقصی ضعیف بدو کم شود و بهترین مهمل این وقت آنست که میگفتنیا سلفاس از ششم در امراض چهارم با آنکه  
که از ششم حشره گری تا چهارم حصه آن باشد یا هم آخته بخوراند و هرگاه از ریه بود علاج عام بعمل آرند و آن آنست که بلا دوا  
یا گلبهرین حشره برندی بماند و اگر ازین در دو طرف نشود پیکر کو نایست یک در امراض و یک آب حشره پاره زدن آن  
بر دستان نهند و کسکه از شراب مجتنب باشد بزی آن شیش سفید در آب باکی ایمی عرق یا روغن حشره بر دستان طلا سازند  
لیکن باید که مقدار بیش بسیار قلیل باشد مثل خردله یا تخم و تخم پیراخیون برای محتاط از شراب فیون محلول آب یا گلبهرین  
بر محل درد مالند فصل سوم در عقده که در شری حادث شود و آنرا چهرای میگوند و این چهار قسم است اول اینکه قریب بلوغ  
و در حقیقت در پستان مروان و زنان پیدا میشود و آن بعد از دواج خود زایل میگردد و لیکن اگر در دوران پیدا شود و آنچه علاج  
برای در دستان شده در اینجا هم عمل آرند و دوم آنکه بعد بلوغ و آمدن حیض نسوان پیدا میشود و زایل میگردد و این قسم اول  
عمر تا آخر آن کل مدت است و سوم آنکه غرض از این ارضاع طفل پیدا میشود و آنچه میگویند و آنرا از زبان نهدی تهنیه  
چهارم آنکه بعد از ایم ارضاع پیدا میگردد و در آن عقد بسیار بوزن و آنچه میگویند بلکه هرگاه زیاده مقدار یک کمال شد شکافته میشود  
و داده فاسد از آن بر می آید بسیار ملاک میگردد و این مرض بعد چهل سال از گذشتن عمر انسانی عارض میشود و قبل از آن این مرض  
در نسوان جوان پیدا میشود و سیاه گاهی از رسیدن حدیض ضربت سقوط و گاهی از بقیه سختی دل که بعد حجت آن مانده باشند  
زیاده شد عقد میگردد و وقتی از اجتماع بدن عارض شود و آنچه ازین عقد تا سن سی سال عارض شود و لایق علاج و سیاه حجت  
است علامت هرگاه عقد واقع میشود در آن دوختی میباشد هرگاه در غیر ایم ارضاع شود تا مدت و از صغیر میباشد و آنچه  
آهسته آهسته زیاد شود و در آن درد و کلفت کم بود و هرگاه آنرا از دست حرکت نهند از تحریکات سله حرکت کند و آنچه در ایم ارضاع  
طفل پیدا میشود در آن در دوختی زیاد میباشد از تحریک دست حرکت نهند و آنچه از رسیدن شری پیدا میشود در آن هم حرکت نهند  
و در آن کم بود و آنچه بعد چهل سال پیدا میشود و آنرا از زبان نهدی آنکه بیل گویند عقد در آن فی الواقع به شکل فضاقتش شکل  
فضاقتش شکل میباشد در ششم در شرح مرض قدی حرکت میباشد لیکن مقدار آن در هر روز زیاد میشود تا اینکه از جل دستان  
متصل میگردد و در پنج آن پیدا شد سخت قوی میگردد و سرخ میشود و در آن نیش پیدا اگر شکافته شود و زخم حادث گردد و در  
زخم روز بروز زیاد شود و گوشت فاسد یاده گردد و آنچه مواد که از آن بر آید فاسد و متعفن میگردد و آنچه میباشد در آن خاص است  
و این در مصلی نابغل میرسد و عقود و نابغل همراه درم ظاهر شوند و این علامت آن مرض است و خون در آن خراب میشود و همیشه حرارت  
میباشد و در روز بروز وضعت زیاد میشود تا که بیمار ملاک گردد و علاج عام در همه قسم آنست که پاره پاره بلغم را در گلوانداخته بران

فصل سوم در عقده

نشان





سازند که از ان مخرج و مخرج هر دو را فایده صحت حاصل خواهد شد و اگر ازین تدبیر پیشو پس باید که مخرج ثانی خود را از مخرج اول در  
 تر شدن طایفه نماید پس در طفل محفوظ دارد و باین نحو که پستان حیوان شش کرده بر حلقه خود پوشانده و طفل شیر نخورد و از اجابت  
 غلاف طریقه دست کشاید بر حلقه خود پوشانده و پستان چرمی بر پستان خود کشاید پس آن شیر طفل را چون این طفل شلین را کشاید  
 شد به باله پاره پاره پس آن بچم می زند چون بدانند که بچم پیدا شد پس از شش با احتیاط تمام کشاده یکم بر آرد و حیاطه و شش را  
 بست که از طرف طایفه شش را فایده در طول پستان کشاید قطع کنند در عرض آن شش را بپزند و الا خانه های بچم خراب خواهد شد  
 بسبب قطع شدن غشائی که ذکر آن در تشريح شد و هم این بچم شش را بخوابد و همیشه شیر ازین سو پیران خواهد آمد و بعد از این  
 یکم برای تقویت مخرج اخذ می شود و غوره و تاقوت برودی عود کنند پس کم نشود و فصل پنجم در قلت لیمین سبب آن گاهی می شود  
 باشد که در آن شیر زیاده پیدا نشود و این را علاج است و گاهی از کمتری و قلت خون شیر کم پدید آید و درین صورت غذائی خوش  
 و موثر خون خوراند و بر پستان مالش کنند تا خون یاده جذب شود و بار بار شیر را بکشند تا طبیعت احوال بر تودیه لیمین زیاده شود  
**فصل در امراض معدیه و مری فصل اول در تشريح معده و مری** هر گاه که در  
 سده را واقع اندکی بسوی بینی بالا رفته و دیگر بسوی قفسه سینه و بسوی معده جاری شود و این جره و دهن را که از ان سده رفته اند  
 فیکس بکند و اسکون یا سی قحطانی و کسبانی است که در کف و دهن و بطن گریک میگویند و برای که از ان غذا بمعده میرود و آن  
 بعضی مری میگویند یا بطن است و این فاکس میانه مری عضوی است مرکب از چهار غشاء که آنچه از ان از تهیست بطن است و بطن  
 است و بالا آن غشائی ریشتر از شش پیران بر دوشه شش پیران آمده و بالای این هر سه غشائی غلیظ مثل جرم قهوه میباشند و غشای  
 از جانب پیران که عضله از جانب بسیار گلو باین ترتیب است مری شش اند و عضله اولی از آخر عضله خسار و آنرا عظم کباب سفلی شروع شد  
 و اتفاقا عرق رسیده کی از جانب پیران بسیار و هر دو مقابل وسط فقا متصل میشوند و عضله ثانیه از استخوان اول قفسه  
 که بشکل فن خطی است از هر طرف شش شروع میشود و تا فقا عرق رسیده مقابل وسط فقا متصل میشوند و عضله ثالثه از هر دو پهلوی  
 استخوانی که در گلو در جبهه قد ام واقع است و شش گریک عظم استخوانی بوده میباشند شروع میشود کی از پیران کی از بسیار و این هر دو هم  
 فقا عرق رسیده مقابل استخوانی که در گلو در جبهه قد ام واقع است و شش گریک عظم استخوانی بوده میباشند شروع میشود کی از پیران کی از بسیار و این هر دو هم  
 و فایده این اتصال است که تا بعد تمام شدن اولی ثانیه همان را بالا میبرد یعنی نماید این عضلات همیشه کشاده میباشند  
 اما هر گاه طعام در دهن آرد میشود و زبان را بسوی حلق بار آورده از او دفع میکند و نگاه کار این عضلات شروع میشود و کار اینها  
 که در اول تا اینجا میرسد اینها باز ریخته و دفع آنرا بسوی مری میسر میماند چون مری غذا داخل میشود عضلات مری باز ریخته و  
 دفع بسوی سفلی معده میسر میماند و عضلات ثالثه مری واقع است شش پیران آورده صفار بندید و غشائی ریشتر از مری پیدا شد  
 و یک شاخ از روج هشتم عصبانی مری پیدا و آن قوت در آن می آرد و یک رشته همپنی شکست ای آوردن قوت حرکت  
 مری آید و مری از آخر حلق شروع میشود تا به مری و معده و میان مری و معده ای صفار واقع شد و فی الحقیقه اینهم است

فصل پنجم در تشريح معده و مری  
 فایده این اتصال  
 است که تا بعد تمام شدن  
 اولی ثانیه همان را بالا  
 میبرد یعنی نماید این  
 عضلات همیشه کشاده  
 میباشند اما هر گاه  
 طعام در دهن آرد  
 میشود و زبان را بسوی  
 حلق بار آورده از او  
 دفع میکند و نگاه کار  
 این عضلات شروع  
 میشود و کار اینها  
 که در اول تا اینجا  
 میرسد اینها باز  
 ریخته و دفع آنرا  
 بسوی مری میسر  
 میماند چون مری  
 غذا داخل میشود  
 عضلات مری باز  
 ریخته و دفع  
 بسوی سفلی  
 معده میسر  
 میماند و عضلات  
 ثالثه مری  
 واقع است  
 شش پیران  
 آورده صفار  
 بندید و غشائی  
 ریشتر از مری  
 پیدا شد و یک  
 شاخ از روج  
 هشتم عصبانی  
 مری پیدا و آن  
 قوت در آن می  
 آرد و یک رشته  
 همپنی شکست  
 ای آوردن قوت  
 حرکت مری  
 آید و مری از  
 آخر حلق  
 شروع میشود  
 تا به مری و  
 معده و میان  
 مری و معده  
 ای صفار  
 واقع شد و  
 فی الحقیقه  
 اینهم است



ترشی غیر پیدا میکنند و چون این تولید همیشه میشود پس هرگاه مجاری مسطوره از آن پرمیشوند از قوت این باری بلغم و ترشی بخیه  
 هر یک کس میبیند جمع میشود و با غذای ماکول می آمیزد و بسبب آن طعام مضخم میشود و در جرم معده پنج تا شش این ماده اندازد و ترشی  
 جگر و دوازده این طعام که پس حساب پنج بار یا از معده برآمده و در جگر و دوازده طعام میبرد و بسبب این ترشی آن آورده راه انداخته  
 خون در میان معده و جگر طعام است لیکن گاهی خون معده زیاده میبرد و در جگر و دوازده طعام کم میبرد و آن وقتی است که در معده طعام کم میبرد  
 زیرا که در این وقت میوکس میبیند برای بلغم طعام محتاج بسوی تولید بلغم و ترشی یاده میشود زیرا که هرگاه طعام در معده میبرد و آن  
 میوکس میبرد و ترشی میگوید و ترشی دفع کردن از معده و بلغم از مجاری مسطوره برآمده بر سطح میوکس میبیند و بسبب این که بسبب است  
 آن از وقت میوکس میبیند کم میشود پس بعد برای مضخم طعام ترشی می آمیزد و این مضخم طعام مفید است برای بلغم قاطع است  
 این بلغم را قطع میکنند و بلغم و ترشی هر دو با غذای می آمیزد و بسبب آن مضخم غذا برود و میشود باز بلغم از دهان مجاری می آید  
 و بر سطح میوکس میبیند و بسبب این که در مجاری خود ترشی قطع بلغم کرده هر دو باز با غذا اختلط میشوند پس برای اینکار  
 ضرورتی وجود خون باید و معده وقت مضخم میباشند و هم چون آب و طعام در معده زیاد جمع میشود و از این وقت ضرورت است که خون  
 کثیر و عروق و ترشی می آید که آنرا اوین سبب گرداند تا میوکس آن خنل شود و با خون اختلط گردد و هرگاه مضخم معده تمام میشود کار مضخم جگر  
 و طعام شرح میگرداند از این وقت خون در معده کثرت میبرد و جگر و دوازده میبرد و معده معده از داغ آمده یکی روج به شش میوکس  
 بنیو ماگاشاک و دیگر روج سببی میوکس دل قوت چسب از داغ معده می رود و هر چه در معده واقع میشود خبر آن داغ میسراند و از آن داغ  
 آرام یا از وقت میبرد و می قوت است و در معده میباشند و شش میباشند که در معده بالای غشای رسته است بر آنهم از ایوان معده  
 واقع اند لیکن چنانچه غشای معده در بعضی مواضع طویل و در بعضی قوت و در بعضی با مورب عضله مذکوره بند ریخته همین ایوان  
 و چین منقبض و منبسط میشود و بسبب همین حرکت با سببی می آمیزد و باقی مضخم طعام در آن منقلب میگردد و از این گردش طعام بلغم و تر  
 بان می آمیزد و بسبب آن طعام برود و مضخم میگرد و این عضله درانی معده که قریب محم نیست غلیظ و محکم است زیرا که فعل مضخم اینجا  
 باید که قوی باشد چنانچه غذا غلیظ و سخت میسرند و غلیظ و سفت است خود موجود میباشد بخلاف قعر و آخر آن که قریب میباشند و  
 استخوان مضخم شد و قوت گشته میسرند پس حرکت آنی موجب غلظت آن در می گردید تا بسبب یا قوتی کمیت حرارت آنجا زیاده باشد  
 فندک فصل دوم در ورم معده و آنرا بلغم لاشن فانیج ایشین یعنی روم فیکس من این قوتی است که در کلو قریب من باشد  
 و هم این فانیج ایشین یعنی ورم معده من این قوتی است که ورم در معده از ریح و قریب معده پیدا شود بدانکه گاهی در میوکس میبیند  
 مری از جای که در حلق شروع شده ورم پیدا میشود چنانکه در وکیل غشای معده میگرد و بسبب آن که رسیدن مری بود و گاهی خون  
 سموم هم پیدا میشود مثل تنیک کسی از اتفاقات که می آید که تیز تر است و آب گرم را که زیاده گرم بود و نوشد و گاهی از ورم معده  
 هم این غشای معده میشود و اکثر راه و تب میسر یا هم این هم حادث میگردد و گاهی با ورم لوتین هرگاه ورم آن قوی و شدید بود  
 ورم پیدا میشود علامت اول از همه دراز در آب و طعام در معده می شود و در حلق سوزش محال گردد و خصوصاً از خوردن

فصل دوم در ورم معده

کلیه

طعام می که در آن نمک و سرخ زیاد بود و سوزش در حلق زیاد محسوس میشود و از غم کردن بر عضلات گلو که بالای مری آمده اند در  
 تشنج آن مذکور شدند در محسوس میشود و اکثر تپ حرارت خفیف میباشد و گاهی زیاد هم میگردد لیکن کمزوری زیاد میباشد و صفو  
 هرگاه با مرض دُوب سیر یا مجتمع شود و گاهی هم از مری تا بعد هم میرسد این وقتی هست که در مری اندر رسیدن سردی یا نوشیدن نیز آب  
 یا کد اشی حاد و ترهید و آب گرم فکاده باشد درین وقت درد از مری شرح میشود و تا معده میرسد چون بن مرض اکتشاده و بخ  
 راز انگشتان غم کرده به بیند میگویند میبهرن متوهم و سرخ معلوم میشود چون بن شد کثیر بود و میگویند میبهرن جابجا در جاک  
 صغیر بر سرخی سیاهی محسوس میشود و بعد چند روز این سیاهی بزرگ خاکستری مایل میگردد و چون با چند ساین سیاهی جدا گردد  
 و بجای آن زخم پیدا میشود و گاهی نه های سفید مثل قلاع ابض اطفال بر میگویند میبهرن معلوم میشود علاج اول صل کاشک نقره  
 از ده گریز تا بست گریز موافق خفشت شدت مرض در یک نوش آب ساده صغیفی حل کرده از قلم مو بین یا اسفنج یا پنجه معلق بر قلم بست  
 میگویند میبهرن حلق و دهان طلا نمایند بقدر کثیر بن بعد مفرمانید بیمار را که از ابلع کند در مری برسد و میگویند میبهرن آن منبسط  
 شد تا شیر کند و اگر حاجت مهمل باشد مهمل هم دهند لیکن چون که درین مرض ضعف کمزوری زیاد میباشد اندر روزانه سه بار و یا  
 کاربناس پنج گریز بآب حل کرده اول کینین خورانید بعد امیو یا محلول آبغی شانند ماء الشعیر مطبوخ و آب کتان مطبوخ بطور دو و ابکه  
 بجائی آب نیم گرم نوشانند زیرا که وقت نوشیدن آب خصوصاً از آب سرد ادیت زیاد میشود و ازین آب مطبوخ ادیت هم کم شود  
 و از سه حال آن میگویند میبهرن ملام شد بلغم زیاد پیدا خواهد کرد که از دفع شدن آن صحت خواهد شد این مرض را هم مثل صاب  
 ز کام تا زانو برود و پایش در آب مطبوخ خردل انداخته پاشوی نایشد بن را گرم دارند و غذای جید لطیف سیرج البضم مثل شیر آب  
 یغنی گوشت بز نوشانند چون هم خفیف شود لیکن سفیدی میگویند میبهرن ظاهر باشد سگ که صاف یک درام در ده اولش آب حل کرده  
 نیم گرم بن آن تغیر فرمایند چون شور ابض متعفن شوند و بوی بد از ده بن بد لا یکره شپاس پرینگناس که بطور آب و لایتن گلستان  
 می بداز نصف تا یک نوشل زان در ده اولش آب ساده حل کرده آن غرغره سازند و اگر لا یکره موجود نباشد صل شپاس پرینگناس  
 که یک درام باشد در شربت نوشل آب ساده حل کرده از آن غرغره فرمایند فصل سوم در زخم مری گاهی در مری زخم می افتد و آب  
 گاهی زنی کردن میگویند میبهرن شکافه میشود و گاهی از جیباس شی موزی مثل خار یا بنی زخم می افتد و گاهی از انفجار دمل زخم پیدا  
 میشود و تا زمان طویل بعد دفع شدن بل میماند و گاهی در مرض تشنج هم در مری پیدا میشود چنانکه در دهان حلق می افتد و گاهی از زخم  
 زخم دهان می افتد علامات هرگاه زخم در علی مری بود آگاه هرگاه زبان را غم کرده به بیند معلوم میشود چون در وسط و آخر آن باشد  
 در آن اندر موضع و زیادتی در سوزش وقت از دوا طعام توان شناخت زیرا که آنچه در دوزخ زخم بود و از خوردن طعام خفیه  
 و مالط و حامض که در آن نمک و سرکه بود زیاد میشود و اگر چنانچه خورده شود و اگر غذای دسم تغیر نکند و گوشت کبر باشد لیکن از آب  
 به نسبت طعام حاد کم بود بخلاف ورم که در آن زخم کینه یزیت زیاد میشود و از لقمه خورده کم میشود و علاجهش به انست که در علاج نفش  
 نوشته شد و فصل چهارم در دمل مری باید دانست که گاهی در غشا و پیشه مری حاد میشود و بعد آن در آن زخم می افتد

فصل دوم در زخم مری

فصل چهارم در دمل مری



باشند غشای بعضی از ظاهر هم پیدا میشود بسبب آن جسم متجمع و تنقبض میگردد و تنگی دراز در او ظاهر میشود و گاهی در مری درم  
کنکریل که قسمی از سرطانست پیدا میشود و از آن ضیق دراز در او هم پیدا میگردد و گاهی بسبب تشنج که در مری افتد چنانکه در کزاز و خنثاق رحم  
گذیدن سنگ یا نود کور یا و گاهی پس یعنی شخمی در مری دراز در او تنگی حاصل میشود علامات آنچنانکه در مری غشای ریشه از پشت  
در آن هرگاه در کشاید پنج زبان از انگشتان غمگیده پنبه بر آید و زیادتى در اعلى مری محسوس میشود و چون سرنگشت آنجا  
حساس کند شخمی محسوس شود بخلاف آنکه در آن ملاحت میباشد این شخمی روز بروز زیاد میگردد و وقتى آن ضیق دراز درم  
بپذیرد و فی الحقیقت این هم قسمی از سرطانست انجام آن انجام سرطانست آنچه بسبب م قصبه پیدا شد در مری هم در او این بیماری غلط  
یا بجهت صوت ظاهر بود یعنی موافق کمی زیادتى در مری و از تنگی از حال صحت باشد مثلاً اگر مری خفیف تقلیل است فقط غلط در او بود  
و اگر مری زیاد و شدید بود بجهت صوت عارض خواهد شد مری در مری هم سر پیدا باشد دیگر علامات مری قصبه که نوشته شد اند و موجود بود  
و آنچه از دل عضلات خارج گلو فتد در آن خود در مری ظاهر و دل شاید بود و آنچه از مری شدن لحم غده گردان افتاده باشد آن هم  
لحم مذکور به گواه بود و آنچه اینوزم افتد در آن علامات اینوزم که در امراض قلبیه نوشته شده اند و خواهین بود و آنچه در مری  
جسم موزی مثل خارهای در مری افتد در آن در موضع و قدم اکل مری غیر ضیق از او دلالت نموده کرد و این در که از خود در مری  
پیدا شود بعد از درون خاتم هفت هفته عشراتی میماند همیشه یا شکایت آن میکند که از خلیه خاتم پیدا شود و مادام که شخمی کند در آن  
ماند و آنچه از مری که از نوشیدن تیر آب افتاده باشد در آن هم تقدم اکل تیر آب بر حد ضیق از او شاید بود و آنچه از حد  
سرطان موسوم به کنکریل در مری افتد در آن هم برگردن قریب قوه ظاهر شود و این ضیق هم بتدریج بمورایام زیاد میگردد و این علامت  
در مری که از نوشیدن تیر آب افتد هم یافته میشود و هرگاه علامت مشترک باشد پس رقی ضرورت و فقره باین نحو توان کرد که  
آنکه در مری انداخته تا مل کنند آنچه بسبب کنکریل است در آن مزاحمت جسم غلیظ با آن مذکور محسوس خواهد شد هم هرگاه آنکه اینوزم  
از اندامی هم بآن مختلط و آلوده خواهد بود بخلاف مری مذکور که این هر دو در آن محسوس نخواهند شد زیرا که در مری غشای ریشه  
نیست با آن مزاحمت کند و هم ضیق قوی در آن پیدا میشود که بجای خرم میوکس همیرن غشای ریشه از پیدایمید و از آن می متجمع میشود  
و درین وقت خرم صمغ شد باشد چیزی از قسم مذکور باز در آب آنجا نباشد که بر آید آلوده شود و آنچه بسبب تشنج بود در آن علامات تشنج خواهند بود  
لیکن هرگاه بسبب کزاز باشد مری بود و چون بسبب خنثاق رحم بود باد و از سوراخ و در وقت خنثاق رحم عارض خواهد شد پس گاهی بود  
و گاهی نبود و آنچه با دیگر قسم تشنج عارض شود در آن خود امراض مذکور با علامات خود موجود خواهند بود و علامت آنچنانکه در مری غشای  
سخت سرطانى که در غشای ریشه از پیدایش افتاده باشد لا علاج است آنچه از مری قصبه پیدا شود علامت آن است که در مری  
قصبه پیدا شود و آنچه از دل عضلات گلو فتد آنرا از نشتر کشاید لیکن باید که خرم بواسطه شریکین و آورده دهنه یعنی هر جا که شریان  
در طول است آنجا خرم هم در طول و پند که اگر در عرض خرم خواهند کرد شریان قطع خواهد شد و چنانکه برآمد که در مری زیاد بود و آنچه  
کشاید صاف کنند و نشتر بسته بسته بندند مثلاً اول جلد را کشانند بعد غشای ریشه را قدری شکافتند و پنبه بر گاه عضله نمایان



شود و آن مشهور است که میل جوهر است در غشاء انداخته نشود در جوف آن نهاده بخط مستقیم عضله رسانند و دل ابرازند و آنچه از دهم در معده غلیظه  
افتد بذر بیه دستکار کامل عالم تشریح بود این غده را بر آرد زیر که از استعمال ادویه خارجی در آن امید منفعت نیست هر جا که بسبب  
اینوزم بود عیلاج اینوزم چنانکه در امراض قلبیه شسته شده ملاحظه کرده بعمل آید آنچه از احتباس جسم موزنی مثل خارهای دومی بود  
در آن دل بتند که اگر قریب نیم مری در علی آن باشد که از غرساں ظاهر بود آنرا درین کشاده زبان را نگهستان است غم کرده جسم مذکور را از  
کلبه گین قه از مری بر آرد اگر در وسط یا آخر مری بود در آن دل تقه کبیر طمان غلیظه خوانند امراض را بینه که برود قوت از در انداخته تا بمرقه  
از جای خود در شسته در معده افتد اگر از این هم کار بر نیاید پس قدسی که امشی حاصل بنوشته از آن بوسید و گداخته کرد و در  
خارهای از ترشی بوسید و مذاب میشود چون باین تدابیر کار بر نیاید که پرو باگ مری انداخته و از آن جدا کرده در معده اندازند و آنچه از  
روئیدن غشای ایشه در بجای میوکس میبرن سی بعد حصول زخم در آن از تیراب غیر می افتد لا علاج است لیکن هرگاه که بیاید  
شود و آنرا بیل صغی کار گیرند باین نحو که از دهم مری خصل کرده تا معده رسانند چون تا معده رسد از آن قدسی مری کشاده شود و بینه  
ز را قه شیشه بخی و آب معده اندازند هم از راه معده احقاقا غذا در شکم رسانند هرگاه هیچ تدبیر مفید نیافت معده را بذر بیه دستکار کامل کشاده  
در آن غده رسانند که از این هم امید حیات چند روزه است لیکن انجام این ص خوب نیست بسیار لاک میشود و آنچه از نکبیل در مری  
پیدا شد با شلرین ض حادث شود آنهم لا علاج است لیکن آنهم همین آید که پیشتر در تون غشای ریشم از نوشته شد بیل از شانه  
از قسم ششم پیدا شود در آن علاج هر قسم خاص که در امراض این شسته شده بعمل آید و لیکن آنچه در ختناق جسم می افتد در قسم خاص  
بلاد و ناراجلق جای که عضلات مری شروع میشوند و تشریح آن شسته شد باب حلقه طلا سازند و حلیت یک و گریه تا دگر برین اند  
مفید است هم درین قسم شش پرو باگ مری اندازند تا معده رسانند که از آن این تشنج بر طرف خوابد چون باز خود کند بر بینه گویند که  
پرو باگ داخل کرده میشود زیرا که از خوف ذیبت و خال پرو باگ بینه خود را از واقع شدن تشنج محفوظ خواند و شست چه سابقا نوشته  
که در مری ض بینه اختیار بی اختیار میباشد لیکن عقل کم میشود باقی آنچه در ختناق جسم نوشته شد کار بر بینه قسم که زیاد و ماند از  
ماند در آن علاج عام آن که بوسیدن کار تمام است نمایند که از آن فوراً تشنج کم میشود که فصل ششم در دهم معده و آنرا بلفت  
کاشه ایشین بنیاسند این دو قسم است کیوت یعنی حا و کرا نیک یعنی مری ض خفیف الاعراض تا قسم اول پس بدانکه گاهی نقل ششین یعنی  
حادثی معده از خوردن سموم قتاله مثل سم الفار و سیکو طراض میشود و از آن میوکس میبرن معده سرخ و متوم میگردد و گاهی با دهم در مری  
مثل بخرم نرم میشود و اثر سم الفار بر میوکس میبرن معده و از آن مری تا غشای ریشم از میرسد فرق دهم الفار و سیکو طراض است که از خوردن  
ریکو طراضی مری و سرخی از خوردن سم الفار میشود هم جابجا میوکس میبرن پیدا میشود و جای که در آن حجم افتاده از آنجا نقل ششین  
غشای ریشم از غشای عضلی غشای آ با از هم میرسد بجهت معده و آن عام میباشد زیرا که سیکو طراض پیداکند زخم فاسد کننده  
میوکس میبرن و غشای حلقه اعضا است اما این مورد تشریح نیست منکشف میشود لیکن قبل تشریح علامتیکه درین مری ض یافته میشود  
از آنجمله در دهم و شش است که در معده بعد خوردن سم الفار پیدا میشود من بعد در دگر و تالگو میرسد از آن بعد غشای عارض گردونی

فصل ششم در امراض غده و مری



که مضر معدیه بودند یا نوشیدن شراب زاید و گاهی بعد دفع شدن بهیضه گاهی از رسیدن روستا از طریق در دهم ضایعترین از  
 انتقال خاص نفوس که در شش و است هرگاه بسوی معدیه منتقل شوند این هم پیدا میشود علامت آنچه در علم اول نوشته شد اینها  
 میباشد که غفقت از نسبت سابق و کمین از انتقال و اعضا انتقال شدن در خاص نفوس افتد و آن سوا می علامت باقیه تعدیم  
 روستا از مفراف نفوس بعد آن حال او جلع مذکور داشت و این ضعیف پیدا شدن در دست و شایه پیدا شد از این انشئه میشود که در مذکور  
 منتقل بسوی معدیه علاج اول سینه لیس بود یا ایفر و سینگ رفت باب حاکم ده نوشاند که از آن قوی کم می یابد لیکن این در دهم  
 بقا اگر شیر بار بار بجای آب بعد یکیک و دو ساعت نوشاندت پیر که قوی درین صفت را برای آید و آنچه بنوشد بی خارج میشود تا که  
 سهال شود و در اعراض غفقت ظاهر گردد و هر آنچه باین مریض نشانند باید که سرد باشد و این هم گریز نایک گریز باب حاکم ده بعد  
 چهار ساعت نشاند باشد در دهم شود که بعد غفقت گیر اعراض شکایت در دهم زیاد و دهم باشد که بر معدیه پنج عدد داده عدد  
 ضرورت چسباند اگر از شدت حال دویسه سهله مذکور خود سهال نشود و متعاقبات تقیه نمایند آنچه در دهم اول گفته شد و سهال شود و در دهم  
 قوی دادن این مرض جایز نبود و الا میگویم میبیند یاد مضر خورده شد بجای غذا اول شجوه آب برنج مطبوخ نوشاند چون غیثان  
 و قوی در دهم شود شیراده گاؤ یا آب یک تخمه بنوشاند هرگاه این هم بخوبی مفهم شود بعد آن شوی باسی لحم برنج پخته یا کچوری ال نمک  
 مقشطر بطور شله پخته بخوراند و قوت که و اما قسمی پس بدانکه گاهی در مریض که قوی الاعراض نبودیم در مریض معدیه عارض شود  
 و این گاهی بعد نقل میشد یعنی در حاد معدیه حادث میگردد و هرگاه از آن حرارت کم شود و اکثر نیست که خود این هم اول حادث میشود  
 و این اگر انیک گاسٹریتیس یعنی در مریض که اعراض آن مثل سابق قوی نباشند و اسباب کثر از خوردن غذایه ویرا اکثر  
 شرب شراب پیدا میگردد و گاهی هوای نفس مولد پش لریزه این را هم مورت میشود و گاهی از فاقه و ترک طعام پیدا میگردد و در دهم  
 گاهی از فاقه ترشی در معدیه پیدا میشود بسبب آن میگویم مریض نشود و مریض که در دهم مریض است این فصل عارض میشود و گاهی  
 بار و دست از مریض عارض گاهی از خاص نفوس پیدا میشود اکثر در وقت بروز دندان با طفل عارض میگردد و علامت هرگاه این  
 مرض خود عارض شود یعنی بسبب انتقال در حاد معدیه باشد پس وقت اعراض آن بسیار خفیف و ضعیف و قوی میباشد که ششخص آن  
 دشوار بود و آنکه اول بعد غذا قدری ذیبت بیمار را محسوس میشود یا قدری غیثان پیدا شود و تمام ساقها کمر و دل بسیار خورده طعام  
 راغب نباشد اگر طعام خورد بعد آن سوس در معدیه و کثرت یاح پیدا میشود و گاهی بعد خوردن غذا آب کثیر از دهن بر می آید که بیمار  
 آنرا میداند که از معدیه آید یا می آید لیکن فی الحقیقت بسبب ریه حاد این آب زرد و مولد لعاب همین که در دهم در دهم سواره قوی گشتند  
 می آید و قدری در دهم محسوس شود و خصوصاً بعد طعام و هم در تمام بدن ماندگی قدری در دهم چنانکه بعد رسیدن هوای سرد بدن  
 عارض میشود محسوس گردد و در معدیه بطور حاکم خراش و گاهی نخس محسوس میشود و این در دهم غلظت خجری از تر کردن است و  
 محسوس میشود و گاهی این در دهم معدیه تا شریعت جانب لیس گاهی از آنجا که فقط در گاهی فرق دست جانب لیس گاهی تا خنصر  
 بنظر دست لیسری میسر لیکن این در دهم یک حال میباشد بلکه گاهی زیاده و گاهی کم و گاهی ساکن بود و در این در دهم بسبب



و درین مرض سهل دادن جای نیست لیکن حتماً تا فروز تنقیه نمایند تا که مایه از فضول برآید صاف شوند و او در وقت همان پنجه در فلفل  
 معده با بقا نوشته شده اند جمله اینها هم استعمال آرند و اگر در معده تخلیف ازیت کم بود و در سبب میگدیشیا کار بناس با هم تنجیه بخورند  
 و چونکه اکثر این مرض جگر و دل و ریه و کمره هم امراض پیدا میشوند پس اگر چنان طفل بود که بعد حصول صحت در ورم معده علامت امراض  
 اعضای مذکوره با پنجه مختص به یک است نمایند طبعاً گفته اند که درین مرض از مشغول ساختن دل تبدیل برآوردن و گردانیدن بسیار  
 در بواسی صاف از خوشی ناید حاصل میشود پس باید که بقدر امکان مشغول ساختن دل زیاد کردن فرحت و خوشی نماید تا این پنجه با طبعاً  
 عارض میشود و علامت آنست که اول گفتا بنوشا نیند آب پاک نمایند که همان کافی است و اگر کافی نشود میگدیشیا کار بناس  
 یک و گریس آب حل کرده نوشتا اند اگر دست نیاید یا بنهرنگ آید و آبی سرخ نوشتا اند از این گفتا بنوشا نیند و اگر گاهی با دوده و خوش  
 بنشیند و در وقت صفت کردن فوکه با صفت گریس آب حل کرده یا قدری نبات بنوشا اند وقت شام بر آبی رام سانی دماغ قاری  
 کلواکای شیرین با اندکی سدر اسهال آب حل کرده نوشتا اند اگر دشواری نبات نشان ظاهر شود از نیکه طفل بار بار دست خود را در دهن  
 اندازد و زیاده گیر کند و لعاب را در بالشت نهد جاری بود پس درین وقت قدری خون از لثه طفل بنزید یعنی شکر یکم و شکر برای تنجیه  
 البته است بر آن تا آرام شود فقط فصل هفتم در جراثیم معده و جراثیم معده را که شکر را که شکر بخت بخت بنیامند با نکه گاه  
 در مریکس میبین معده خرم حاد میشود و این خرم گاهی بقدر نصف از حد رس یا کمرش کو چاک گاهی بقدر شش آبی بزرگ میباش  
 و بعد ازین تشیخ معده میت ظاهر میشود که این خرم گاهی میشود چنانچه مال خرم و معده یافته میشود و گاهی منابل نمیکرد و الا سبب آن  
 سبب هم معده خرم اند یعنی سبب این مرض میباشد و گاهی با جراثیم معده یا بنویا و امراض حمیه هم یارید باشند لیکن معلوم  
 نمیشود که جراثیم مولد امراض کوره است یا امراض کوره مولد خرم سبب اند و گاهی خود ورم مزمن و سبب این جراثیم میشود علامت  
 آنچه در ورم مزمن معده علامات نوشته شده اند جلوه وجود و علاوه از آن درین جنس در درجای صغیر از حد و غده مغز محسوس میگردد  
 از آن صغیر که خرم ثابت میشود و هم در یک پهلوی فقط از طرف و شقیل محسوس میگردد و وقتی در خرم معده خوردن طعام زیاده می آید و نوشتا  
 هر گاه که اشمی حاد تر است که در آن نمک مرچ سرخ یا سیاه زیاده بود و خورده شود و آنچه در قی خارج میشود مختلط با هم سیاه بود و بعد از  
 طعام تنها جسم سیاه مثل مرد کافی برقی آید فی الحقیقت آن خون است که در معده بنشیند و با ترشی گوگرد معده پنجه سیاه گشته و بعد  
 عمل کیمیایی این مر ثابت کرده میشود که جسم مذکور خون است سود نیست چنانکه تا بعین یونانین میداند و چون خرم عمیق شود و بد  
 یا شریان کبیر میرسد از آن رگ شکافته گردد و درین وقت خون زیاده می آید بسیار بی آن کم بود زیرا که سبب یادتی خون فعل مضارع  
 در آن بقوت جاری نمیشود و گاهی این خرم چنان عمیق میگردد که معده می شکافد و غذا از آن برآورد و شکم میریزد و درین وقت فوراً  
 بیمار را غشی عارض میشود چنان معلوم کند که گوا کسی او را مضرب یا تنه غلیل بسیار ضعیف میشود و در قی لرزه براندش غالب آید  
 و در شکم در ورم عظیم پیدا میشود بسبب اینکه غشائی ابد که در تمام شکم بر جمیع اعضای بطین مثل معده و جگر و معاو کرده محیط است در آن  
 ورم پیدا میشود که از این برای تن شش بلغم لایم میگویند و شکم زیاده می شود و تنب می شود و تنب شد عارض میگردد و فوکه با عقل و زبان میبینی

فصل هفتم در جراثیم معده  
 قلم دوی پنج  
 معده و عارض  
 سی طبعی با کار بناس  
 و در ورم مزمن  
 این سبب  
 عصاره بنشین  
 و در وقت صفت کردن  
 فوکه با صفت گریس  
 آب حل کرده یا قدری  
 نبات بنوشا اند  
 وقت شام بر آبی  
 رام سانی دماغ قاری  
 کلواکای شیرین با  
 اندکی سدر اسهال  
 آب حل کرده نوشتا  
 اند اگر دشواری  
 نبات نشان  
 ظاهر شود از نیکه  
 طفل بار بار  
 دست خود را در  
 دهن اندازد و  
 زیاده گیر کند  
 و لعاب را در  
 بالشت نهد  
 جاری بود پس  
 درین وقت  
 قدری خون  
 از لثه طفل  
 بنزید یعنی  
 شکر یکم و  
 شکر برای  
 تنجیه  
 البته است  
 بر آن تا  
 آرام شود  
 فقط فصل  
 هفتم در  
 جراثیم  
 معده و  
 جراثیم  
 معده را  
 که شکر  
 را که شکر  
 بخت بخت  
 بنیامند  
 با نکه  
 گاه  
 در مریکس  
 میبین  
 معده  
 خرم  
 حاد  
 میشود  
 و این  
 خرم  
 گاهی  
 بقدر  
 نصف  
 از حد  
 رس یا  
 کمرش  
 کو چاک  
 گاهی  
 بقدر  
 شش  
 آبی  
 بزرگ  
 میباش  
 و بعد  
 ازین  
 تشیخ  
 معده  
 میت  
 ظاهر  
 میشود  
 که این  
 خرم  
 گاهی  
 میشود  
 چنانچه  
 مال  
 خرم  
 و معده  
 یافته  
 میشود  
 و گاهی  
 منابل  
 نمیکرد  
 و الا  
 سبب  
 آن  
 سبب  
 هم  
 معده  
 خرم  
 اند  
 یعنی  
 سبب  
 این  
 مرض  
 میباشد  
 و گاهی  
 با  
 جراثیم  
 معده  
 یا بنویا  
 و امراض  
 حمیه  
 هم  
 یارید  
 باشند  
 لیکن  
 معلوم  
 نمیشود  
 که  
 جراثیم  
 مولد  
 امراض  
 کوره  
 است  
 یا  
 امراض  
 کوره  
 مولد  
 خرم  
 سبب  
 اند  
 و گاهی  
 خود  
 ورم  
 مزمن  
 و سبب  
 این  
 جراثیم  
 میشود  
 علامت  
 آنچه  
 در  
 ورم  
 مزمن  
 معده  
 علامات  
 نوشته  
 شده  
 اند  
 جلوه  
 وجود  
 و علاوه  
 از آن  
 درین  
 جنس  
 در  
 درجای  
 صغیر  
 از حد  
 و غده  
 مغز  
 محسوس  
 میگردد  
 از آن  
 صغیر  
 که  
 خرم  
 ثابت  
 میشود  
 و هم  
 در یک  
 پهلوی  
 فقط  
 از طرف  
 و شقیل  
 محسوس  
 میگردد  
 و وقتی  
 در خرم  
 معده  
 خوردن  
 طعام  
 زیاده  
 می آید  
 و نوشتا  
 هر گاه  
 که  
 اشمی  
 حاد  
 تر است  
 که  
 در آن  
 نمک  
 مرچ  
 سرخ  
 یا سیاه  
 زیاده  
 بود  
 و خورده  
 شود  
 و آنچه  
 در قی  
 خارج  
 میشود  
 مختلط  
 با هم  
 سیاه  
 بود  
 و بعد  
 از  
 طعام  
 تنها  
 جسم  
 سیاه  
 مثل  
 مرد  
 کافی  
 برقی  
 آید  
 فی الحقیقت  
 آن  
 خون  
 است  
 که  
 در معده  
 بنشیند  
 و با ترشی  
 گوگرد  
 معده  
 پنجه  
 سیاه  
 گشته  
 و بعد  
 عمل  
 کیمیایی  
 این  
 مر  
 ثابت  
 کرده  
 میشود  
 که  
 جسم  
 مذکور  
 خون  
 است  
 سود  
 نیست  
 چنانکه  
 تا بعین  
 یونانین  
 میداند  
 و چون  
 خرم  
 عمیق  
 شود  
 و بد  
 یا شریان  
 کبیر  
 میرسد  
 از آن  
 رگ  
 شکافته  
 گردد  
 و درین  
 وقت  
 خون  
 زیاده  
 می آید  
 بسیار  
 بی آن  
 کم  
 بود  
 زیرا  
 که  
 سبب  
 یادتی  
 خون  
 فعل  
 مضارع  
 در آن  
 بقوت  
 جاری  
 نمیشود  
 و گاهی  
 این  
 خرم  
 چنان  
 عمیق  
 میگردد  
 که  
 معده  
 می شکافد  
 و غذا  
 از آن  
 برآورد  
 و شکم  
 میریزد  
 و درین  
 وقت  
 فوراً  
 بیمار  
 را غشی  
 عارض  
 میشود  
 چنان  
 معلوم  
 کند  
 که  
 گوا کسی  
 او را  
 مضرب  
 یا تنه  
 غلیل  
 بسیار  
 ضعیف  
 میشود  
 و در قی  
 لرزه  
 براندش  
 غالب  
 آید  
 و در شکم  
 در ورم  
 عظیم  
 پیدا  
 میشود  
 بسبب  
 اینکه  
 غشائی  
 ابد  
 که  
 در تمام  
 شکم  
 بر جمیع  
 اعضای  
 بطین  
 مثل  
 معده  
 و جگر  
 و معاو  
 کرده  
 محیط  
 است  
 در آن  
 ورم  
 پیدا  
 میشود  
 که  
 از این  
 برای  
 تن  
 شش  
 بلغم  
 لایم  
 میگویند  
 و شکم  
 زیاده  
 می شود  
 و تنب  
 می شود  
 و تنب  
 شد  
 عارض  
 میگردد  
 و فوکه  
 با عقل  
 و زبان  
 میبینی

و در شکم

عارض میشود و بعد از آن میمید و بعد از این حالت تمامی مدت حیات تا پنج ساعت تا دو سه ساعت علاج تدبیر درین مرض همان عمل  
آنست که در علاج ورم معده فرغ نمیشد بلکه چونکه در اینجا خاص در معده نرم است پس اگر غذا را در معده نپذیرد سبب مهم و مؤثر  
بر نرم خراش اذیت یاده خواهد شد و اظهار خواهد شد بنا برین باید که هشت روز از زبان نوشیدن خوردن آب طعام ترک کرد  
از راه معده احتقان آب غذا در بدن ساند چون شریان یا ورید کشاده و شکافته شد باشد از آن خون کثیر در قی بدترین وقت  
بند کردن آن عمل آنست که برای آن یک پاره از پانزده قطره تا بیست قطره و یا آب آبنابن از سه قطره پنج قطره کاکا لیس یا کاکا لیس از پنج  
گرمین تاده گرمین نوشاند و اگر اگر گشت دو گرمین خوراندند بعد از یک روز شش روز در ورید و شریان خوراندن آن بدن بند میکنند و استعمال گشت  
برای حبس خون علاج جدید است این را ضرورتی نیست که در این استعمال سه گاه هر گاه نوبت اینست که معده شکافته طعام در شکم  
افتاده باشد پس لایق علاج نیست بلکه نه اندام معده و نه اخراج طعام میکند و گاه که تمام معده بزرگ است و بزرگ است  
علیل کمالات خوراندن که کلوین هم کم میکند و سبب کم شدن هم در درم خواهد شد و چون سبب تخلف تسکین هم خواهد کرد  
هم در بحالت مافیایا فیون آب حل کرده همراه کلوین یا شکر ریخته که پانزده است گرمین بود یا اندکی سودا آستخینه بنوشاند فصل  
هشتم در سرطان معده و آنرا کنه گسترش می نامند گاهی در معده سرطان سخت و گاهی در سرطان نرم و زبانی سرطان سیاه  
بر قسم بیاض میشود و گاهی این سرطان قریب فم معده بود جای که معده متصل با مری است و گاهی قریب بان خزان که متصل  
صفیه است عادت میشود و در صورت اولی و دهن معده چنان تنگ میشود که طعام از مری در آن نپذیرد و در صورت ثانیه دهن آن خزان چنان  
ضیق میشود که فضول غذای از معده با سعا نپذیرد و گاهی در جمیع معده عام بود و درین وقت نه از مری معده و نه از معده با سعا نپذیرد  
طعام ممکن باشد درین مرض گاهی مقدار معده ضعیف میشود و گاهی مقدار آن عظیم میگردد و الاسباب سبب آن بخوبی متحقق نیست  
غلب است که فساد خون از اثر خاندان شاید نورش این مرض شد باشد چنانکه در مرض سل بود پس این خون فاسد در معده و آن  
سرطانی پیدا میشود و علامات آنچه علامات ورم معده فرغ شده اند همه موجود و سواي آن خاص درین مرض هر گاه  
سرطان در دهن علی آن که متصل مری است افتاده باشد نیست که آنچه خوردن در مری داخل میشود لیکن فم معده رسیده باز پس می آید  
و قی خارج میگردد و هر گاه در معده غیر و از آن مقدار معده وجود آن ضعیف شود و چون در جمیع اجزای معده بود جوف و وسعت  
کم میگردد و لیکن مقدار آن کم میشود و زیاد محسوس میگردد و سبب هم خود چون در دهن بزرگ آن که متصل با معده است پیدا شود و درین وقت  
عرض طول آن یاده میشود قی بعد خوردن طعام هر گاه دو سه ساعت بگذرد قی یاده و در معده طعام نیمه شش خارج میشود لیکن  
زیاده با طعام میباشد آنچه خارج میشود بوی آن بوی نیمه ترش میباشد بر ظاهر معده صلابت و برآمدگی محسوس شود و این صلابت  
دوم روز به روز زیاد میگردد و گاه گاه عارض میشود ضعف و کمزوری در بیمار زیاد میگردد و هر گاه بر فم علی معده سرطان بود  
شترهای طعام چنان بیایم تا وی میباشد که بهر آن نتوان کرد زیرا که طعام در معده نفوذ و تقاضای اعضای بدن برای غذا  
باقی میماند و بیمار روز به روز لاغر و ضعیف میشود تا اینکه ببرد علاج آن شوا است اما ممکن باشد علاج ورم معده فرغ نماید

فصل نهم در سرطان معده  
و آنرا کنه گسترش می نامند







تشریح میست دیده شده که اجامی افت در مقدار وضع اعضا یافته نمیشود لیکن کار محده که مضمغم غذا است البته نقصان یا بطلان راهی یابد و این مرض گاهی حاد قوی و گاهی نرم تعلیل میباشد از اسباب سبب آن گاهی از طرف غذا بود مثل آنکه زیاد خورده شود یا رومی لجه بود یا خام باشد یا با مزاج خاص خورده ناموافق بود اگر چه دیگر آن را موافق باشد و بسبب ناموافق مزاجی مضطرب و مضمغم گردد و یا از طرف بدن بود که خورنده بعد مشقت کثیره وضعیف شدن بدن عضلات خورد یا بعد جوع کثیر طول بسیار نود شود و بسبب ضعف بدن کمزوری اعضا مضمغم گردد و لکن از کثرت مشقت جماع کردن بعد خوردن طعام یا مضمغمی پیدا میشود و گاهی بسبب نفسانی بود چنانکه وقت شدت غم مضمغم ضعیف میگردد و علامات بعد خوردن طعام ثقل متلا قریب ضلع ایمنه مقابل معده یا محسوس میشود و در آروغ کمی یا ترشی و گاهی مخی معلوم میشوند بعد تنوع و غشایان رخ گردد و در سردی بدن قدری درد جابجا محسوس میشود و بزبان سفیدی و کدورت ظاهر میگردد و من بعد قی می آید و در آن اول آنچه خورده است با ترشی و مخی دفع میشود و چون طعام غیر مضمغم دفع شود طبیعت صحیح میگردد لیکن معده البته آناضع چند ثانی مثل نیکه شتهای طعام کم میگردد و غذا باقی مقدار صحت خورده نمیشود و علاجهش آنست که اگر قوی خود بخورند یا عانت کرده قوی رند مثل نیکه اسپکا و انا از پنج گریتن پانزده گریتن هر آب گرم نوشانند قی کنند بعد حصول نقا معده از غذا سلفیوک ایستد و ایلوٹ زیانزده تا بست قطره همراه و آوٹ آب ساده حل گردد بنوشانند و وقت شتهای طعام بسک مثل شور با می لحم نوشانند و کسکه اور از زیاده مشقت گریتن مضمغمی شتاب باشد و زیاده که اول نصف ساعت قبل از طعام آرام کند و خوابین بعد غذا بخورد و کسکه اور از کثرت مشقت جماع کردن بعد غذا به ترشی مخی رض شود و او را باید که بعد غذا تا یک ساعت نخوابد آرام کند من بعد مشغول بکار خود شود و قی حاصل مضمغمی است که با سهال و قی کثیر پیدا شود بسبب آن از جانب غذا نبود بلکه بدنی باشد مثل نیکه وقت تغیر حصول هرگاه گرمی مفری در اوقات ثقله مرمو یافته میشود و بسبب آن قی و جگر جمع میگردد و بسبب یاد قی آن در کبد بزرگتر نیکه از جگر معده آید و در معده هم زیاده میرسد و در کس میپرن معده زیاده میشود و بسبب آن ثقل معده مضمغم است ضعیف شدن این مرض حادث میگردد و همین تخمه نامند و علامات آن همان است که مذکور شد و زیاده بران سهال است که عارض میشود و بسبب آن تشنگی پیدا میگردد و علامات آن قمرین علامات مرض هیمه ربانی درین وقت عارض میشود و علاجهش آنست که هرگاه قی بعد خارج شدن طعام از معده افراط کند پلا شتر از خردل درست کرده بر معده نهند تا آنچه خون در معده زیاده است آنرا بسوی جلد جذب کنند و بسبب آن قی هم ساکن میشود و بعد آن سلفیوک ایستد و ایلوٹ آب حل گردد بنوشانند و هرگاه تشنگی غالب شود همین نوشانند و کمر دهند که تا قی باز در وقت تقویت معده کنند که از آن موضوع معده کم پیدا شود و بزرگ جمع قی و کس میپرن خون از معده دفع کند و اگر کباب گریتن فیون همراه سلفیوک ایستد و ایلوٹ آب ساو حل گردد یک و بار نوشانند برای خمس سهال بسیار ضعیف است و چون سهال بند شود تو حبه بسوی کبد فرمایند زیرا که در وقت زیاد قی خون در جگر کثرت دارد و کثیف خون از پیا کردن صغیر است بانی مانند این سبب در جگر جمع میان میس بلغمی آن که کبد صغیر از آن خون پیدا کند خون کم شود و جاری گردد و هیچ گریتن پل با نیکه راجع یعنی بلوچ همراه اکساکث ترا کسی کم که گریتن باشد نتیجه در صحت بسته

وقت شب بخورند که به احتمال این داکتر صفرا را از خون جدا کرده در معده و خواب در سینه و چون که صفرا در معده و ششها عسری به احتمال آن جمع  
خواهد شد لذا برای اخراج آن وقت صبح بلای کمی بپزند و گرین و دو حبس به بخورند یا سبب زینر بود یا ایفروسینگ و افست نوشتا  
تا آنچه در معده جمع شده است دفع گردد و درین بعضی تخمه تا وقتیکه مرض صحیح قوی نشود غذا بسیار قلیل و خفیف خورند تا این که ازین مرض  
بطور مریض خفیف لا اعراض عارض میشود و آن خاص معده ضعیف میباشد خواه عضای دیگر قوی باشند یا به تبع معده ضعیف  
الاسباب اسباب آن بسیار اند و لیکن اینچنان که اکثر بطور سبب خاص اند پس آن زیاد خوردن طعام است ازین بهر منتهی نیکو نه حادث میشود  
که هرگاه طعام زیاد خورده میشود و از آن معده متملی میگردد و بطور باتیکه در معده برای هضم طعام میباشد شکل ازین طعام مخلوط میشوند  
زیر که سبب اکثریت مقدار غذا اتطیلت گردد و اندین این طعام در معده حرکت معده ممکن نبود و از آن بهر زیاد پیدا میشود و معده  
متنفخ میگردد و متناذی میشود پس روغ ترش یا محترق می آید و بعد برای دفع کردن ذیست خود معده آنرا بقوی دفع میکند پس  
معمای باز در دوازدهان هم منضم یا غیر منضم غذا با سهال دفع میشود و چنانکه در بعضی موارد میشود لیکن بآن قوت و کثرت در اینجا نمیباشد  
و هم از آن خوردن غذای موافق و روغی بوجهی مثل اینکه کسی روغن یا چربی زیاد از معده و خورده یا غذای سخت غله رومی خورده و چون  
روغن در معده منضم میشود و هر قدر که زیاد خورده میشود زیاد در معده میماند پس بطول مکث خود در معده متنفخ میگردد و دوازدهان هوا  
کبرتری بدو پیدا میشود و از آن روغ که نمی یکمال بدو ثل بدو ی گوشت متنفخ می آید و گاهی این روغن متنفص با معاری سید سهال میکنند  
چهار دوازدهان متضرر و متناذی شد از دفع میکند و هم از آن بهر عسرت طعام خوردن است که نجوی در آن اثر متفص و هضم در دوازدهان  
واقع نشود و پیش آنست که اول خیرای طعام مذکور دقیق بباریک نمیشوند و هم نجوی بالعاب من میانمیرند و از آن دو نقصان  
عارض میشود اول اینکه سبب کبر خیرای غذای طویات معده با طراف آن های سید یا غذا تمام متخرج و قسلا طازان طویات حاصل  
نمیشود و سبب آن غذا تا مدت دراز در معده میماند و هم منضم گردد و هم آنکه در هضم آن شکر پیدا میشود و آنچه آنست که در لعاب منتهی  
از جانب حکیم علی الاطلاق موعود است که چون با غذا در دوازدهان میماند و در غذا خیرای نشاسته بعد متخرج بر طویات و همین  
بسوی شکر که در خون ضرورت آنست میشود و سبب آن هرگاه غذا مخلوط بشکر در معده میرسد و صفرا آن فوراً در میکس میسوزد  
معده و روغ صفرا آن داخل شد و خون میرود و اگر در دوازدهان شکر پیدا نشود پس معده پیدا نمیکرد و زیرا که رطوبات معده مولد  
شکر نمیشوند و چون شکر پیدا نشود غذا در معده زیاد مکث میکند سبب آن خود ترش میگردد و دوازدهان روغ ترش می آید و بهر از آن  
زیاده نشسته که اگر خون است چنانکه محرر آن و کاتبان میکنند یا زیاد شسته و شسته بدنی یا نفسانی است مثل آنکه کسی زیاد غذا  
کند یا زیاد فکر و امری نماید یا غم و هم زیاد کند یا زیاد غیظ و غضب یا زیاد وقت خوردن طعام مقبل گردد و چنانکه در ایام صیام  
میشود یا کسی وقت طعام خوردن اعیان نکند یا اثر اکل زیاد کند یا بار بار بخورد یا آب سرد زیاد نوشد که سبب آن معده متضرر  
شود و خصوصاً آن که اگر در دوازدهان نوشیدن طبع چای و گاهی آنرا در کشیدن و با کوبیدن پس پیدا گردد و بهر که بهر معده و روغن  
و سبب از آن متناذی و ضعیف شد و دوازدهان معده را ضعیف میسوزد اطفال او قوت بروز دندان هم بهر منتهی طعام پیدا میشود

هرگاه شیر مادر خود را نیابد و شیر حیوانات یا شیر روی نوشند هم از امراض قلبی امراض دیگر طعام کم میخورد و گاهی خود حرکت میدهد  
ضعیف میگردد و بسبب ضعف عضله حرکت خود و چون ضروری در معده نیست که همیشه بعد از خوردن غذا مشغول در تحریک تقلیب غذا باشد  
یعنی غذا را زیر و بالا منقلب کرده باشد تا اثر و فایده طعام در معده بماند و چنانکه طبایخ طعام اگر فکیر طعام را در پاتیل بار بار حرکت  
میدهند و زیر و بالا میکنند تا آن سطح پاتیل تمام شود طبعی کامل حاصل سازد و لیکن این یکسانی عارض میشود که نشسته کار میکند و گاهی  
ترشی در معده کم پیدا میشود و بسبب آن طعام بعد از دردت و زاری میخورد و این یکسانی عارض میشود که زیاد فکیر میکند و یا مشغول  
چاشنی کافی زیاد مینوشد و از آن محسوس میشود و از آن خاص معده ضعف پیدا میشود و گاهی از کمزوری خوان میشود  
میشود و علامات مرض عموماً گاهی اشتها درین یاده بود و این وقت از آب و میوه مندرین وقت خواهش غذا زیاد بود و زیاد میشود  
اما معده بخوبی نمیکند و گاهی اشتها قلیل میباشد گاهی سقوط اشتها بود و لیکن هر دو حال عوض اشتها بعمل میآید که بعضی معده یکسبب فساد  
معده مثل اینکه فی الجمله غذا غایت محسوس شود و چنان معلوم گردد که گویا معده فرو میرود و از آن متناوی میشود و اگر درین حال طعام نخورد  
بعد خوردن طعام از بیت و معده محسوس میشود و معده شتغ میگرد و این از بیت گاهی فرخنده یاده میشود که بعد از این معده را درین  
اکال لا فاع میباشد و گاهی در وقت معده در وقت میباشد که با پیچ بود و همراه درد و سوزش لطن خصوصاً قریب سر استخوان ضلع ایستاده  
محسوس میشود و این درد را کثرت رجوع الفواد میگویند زیرا که سر معده چون قریب قلب واقع است ازین سبب مریض میدانند که در دل درد میشود  
و لیکن فی الحقیقت آن در فهم معده است این سوزش گاهی در مری می آید و بعد از آن لعاب کثیر از دهان بیرون میآید و این در وقت  
موسوم رجوع الفواد است گاهی در وقت موجودی طعام در معده و گاهی وقت خلاصه معده عارض میشود و در آروغ دهان یاده خارج میشود و آروغ  
که می آید گاهی حرق با سوزش و گاهی حامض بود و تریح و غیثان میماند آخرتی میشود و گاهی فواق عارض میشود و گاهی درین فساد معده  
فساد در اعضا می گیریم پیدا میشود مثل درد سرد و دران سرد و گوش آوازهای گوناگون سمع میشوند و پیش چشم خیالات شاذه مثل پیش  
کس می میگردد و در بعضی اوقات تنگی زیاد میگردد و بسبب آن بادی سبب غیظ و غضب یاده میکند و مریض هر بار در حال خود میگوید میماند  
که در امراض کثیر مثل امراض ماغ و صد مثلاً است و حال خود را بشروح و تبصیر نماید و بیان میکند مبالغه و اظهار حال زیاد میکند و در  
خواب هم فساد ظاهر میشود مثل اینکه گاهی خواب کم آید و گاهی بنیاید تا هرگاه خواب می آید خواب هولناک یده و در کابوس مبتلا میشود و میماند  
و گاهی درین حالت مبتلا بخفقان و طبعش قلب میشود و حرکت دل سریع و قوی میگردد پس هرگاه آثار خفقان ظاهر شود باید که از آن قیاس گرفته  
حرکت قلب دریافت کنند که اگر از حرکت نهیای نهیاضی هر دو چیز بوده باشند باید دانست که خفقان بهشارت معده بوده و اگر در سرد  
آواز فرنی یافته شود باید دانست که سبب خفقان دل است و خفقان اصل است شری نیست این اتهام تشخیص بنا بر نیست که اکثر امراض  
معده تابع امراض قلبیه میباشد و اکثر دریه هم فساد این مرض میرسد پس ثقل در معده و محسوس میشود و گاه سرنه آواز غلیظ می آید  
گاهی ازین مرض جگر هم فساد راه می یابد ثقل محسوس میشود و صراط کم یاده پیدا میکند و طبع گاهی قبض و گاهی شل میباشد زیرا که  
هرگاه صفرا زیاد از جگر در معده آید نیست طبع پیدا میشود و اگر که طبع قبض میگردد و گاهی بر زبان در مریض سفیدی و کدورت و



محلول آب حلکوه نوشانند و این نفوذ برای جسم اسهال پیشین هم بسیار مفید است یکسوم سیریناقوت میدهد و بسبب آن  
کثر نشادی میشود و هرگاه قوی زیاده آید بلا شکر از خردل درست کرده بر معده گذارند و باینکه در سیاهکند آید و لکوت سه قطره و سودا سفید  
گریناقون نیم گریں آب حلکوه بنوشانند و اگر ازین هم قوی باز نماند باینکه لکوت که قسمی از روغن است که از قطران بسیار از یک قطره تا سه  
قطره همراه مغز انجربسته بخوراند و اوقات خلای معده این و اخوراند و هرگاه در وقت خلای معده در معده در پیداشود درین وقت  
قدری لاکریمونیای قوی از سه قطره پنج قطره آب حلکوه یا سیریناقونیا از سه قطره تا شش قطره آب حلکوه بنوشاند و برای جهت  
از شراب لیونیای کاربناس پنج گریں آب حلکوه بنوشانند و ازین تدریج فرمایند در دساکن میشود و هرگاه از این جهتی طعام در کبد  
رسیده باشد درین وقت پل باینکه راج یا بود و فلن بخوراند و بعد گیر پل باینکه راج دو گریں بود و فلن ششیم حصه گریں پل ریائی بکشود  
گریں همراه اکشک شکر کسی کم بقدر ضرورت بخورد و حسب است وقت شب بخوراند و صبح سید لیز بود یا سنگینشیا کاربناس نصف  
درام همراه سنگینشیا سلفاش از دو درام تا سه درام در دو آونس آب حلکوه بنوشانند تا پنجم احتمال حبث شبنم در معده و اسهال حبث  
شده احتمال دوی صبح خاج گردد و هرگاه قبض شکم محسوس شود پل ریائی کمی بپوشد و گریں بخوراند ریال کالوسنت کمی بپوشد و ششیم  
مختل است از پنج گریں تا هشت گریں بخوراند و هرگاه درین مرض اعراض قویاتی باشند و سوزش معده در دوا آن موجود بود و سوزش  
شیرماده گاؤ و آب آبک غذای دیگر نرسند و هرگاه اسهال معده رفع شود بتدریج غذا بنیزایند و تا مقدار غذای معتاد رسد تا لیکن  
در احتمال غذا و شرط ضروری و از اول اینکه غذای خوراند که مقدار قلیل آن غذای کثیر و مثل زرده بیضه مرغ تا قلیل باشد  
و دوم اینکه محض فلفله قوت خوردن فرمایند و در بواسی صاف بیمار را گردانند و بقدر قوت آنرا فرمایند که مشقت نکند مثلاً اگر  
بود بگردان سپی سوار شود و اگر قوی بود بر سرپ سوار شود یا پیاده راه رود و دل مریض را شغول سازند تا صبح مریض ضرورت است  
دور ساختن اسباب غم و هم فکر و غیظ و غضب واجب است و الا نفی بر علاج مترتب خواهد شد و اگر بیمار را غسل کنند و اگر چوبل  
آب سرد قوی بدن معده است لیکن کسیکه متحمل او نیست آن نباشد و اثر بر دیر اندام و لمبای آن ظاهر شود مثل آنکه بعد غسل کردن آب سرد  
از زرد بر اندامش رنگ نیلگون برپایش پیدا شود و او را از آب نیم گرم برای غسل شارت فرمایند و آنچه طفل را بعد غمی از زرد و دندان  
عارض میشود در آن شربت را از نشکر خاص برای اینکار موصوع است کشایند و اگر شیر جوان نوشیده باشد همراه آن آب یک بیاضین  
ایضا بید راج مکک شیا از نصف گریں تا دو گریں با هموزن آن سودا کاربناس آب حلکوه بنوشانند و دوی صبح بنوشانند و برای کم  
کردن جن طفل که اصل سبب آن ازیت عصب است کلورل باینکه ریال یک گریں تا سه گریں موافق عمر طفل آب حلکوه بنوشانند  
و اگر ازیت زیاده بود برای کم سن بهم تا سه گریں نوشانند کلورل باینکه ریال جایز است چون طفل از نو نشیند شیر شیر جوان  
بدرستی عارض شد باید مقرر کنند که شیر لسان نوشیده صحت یابد و اگر بعد امراض سخت بدیهی عارض میشود درین وقت این  
بسیار نافع میشود بارک ده گریں و بر پنج گریں سودا کاربناس از سه گریں تا پنج گریں پیر و دینک بود و از یک گریں تا دو گریں هم  
یکی بکرده همراه آب ساده بنوشانند و در اطفال زن بر نصف یا ربع کرده بنوشانند و اگر اسهال هم با مقدار رو بسبب اسهال



که حافظ تعایج معاست و آنرا بلفظ گلشن سمنشری گویند و تومر می شود این مرض پیدا می گردد و همچنان معلوم می شود که هرگاه حسن  
میوکس می بیند معده و حرکت معده از طریق طبیعی خود زیاده می شود و هم این حالت عارض می گردد و گاهی از فساد شکل معده و گاهی از مرض  
صرع و کفلی و دیوانگی این مرض پیدا می شود و علامات اول از همه زیاده خوردن است از عادت طبیعی خود دوم اینکه مقدار معده  
شکم وسیع و کبیر می شود سوم عرق کثیر نشستن اکثر وقت خواب این مرض را می یابد علاج هر سبب که باشد آنرا دفع کنند مثلاً اگر از  
زیادتی حموضت باشد سودا کار بناس یا بناس کار بناس نشانند تا حموضت موجوده را بشکند برای پیدا شدن حموضت آئینه  
وقت خلای معده سلفیوک لیس را همراه آب نوشانند که مانع تولد حموضت در معده می شود و تقویت معده نماید و هرگاه به سبب زرد  
نور درون طعام و نه مضغ کردن آن بوده باشد بیمار را امر فرمایند که غلاف آن بعمل آرد یعنی طعام را برود و زردی ز خورد و خوب مضغ نماید  
و بعد خوردن طعام امر نمایند که تنها کوزه زیاده خورد و دو آن زیاده کشند که این هر دو داشته ای طعام کم می کنند هرگاه از زیاده شدن  
حسن و حرکت معده افتاده باشد درین وقت آنچه غدی که کثرت آنها در معده زیاده بینا شد مثل غذای کثیر الی این پنج خوراندند قدری افزون  
خورانند تا که حسن میوکس می بیند حرکت معده را کم کنند هم خورانند که کثرت کفینس اندک درین مرض وقت خلای معده مفید است  
و نوشانیدن مسهل درین مرض بهتر نیست الا حرکت معده زیاده خواهد شد و از خالی شدن معده طعام زیاده طلب خواهد کرد  
بلکه آنچه قبض پیدا کند غذا را زیاده در معده دارد بخوراندند که کثرت فصل پانزدهم در جوع البقری و آنهم قسمی انور که بسیار است  
و آن نیست که اعضا محتاج غذا باشند و معده نیز تنگتر از غذا باشد و این حالت از اعراض علامت است که در امراض یافته می شود و چون  
نیست اکثر در آخر بویوس هم در زخم معده و اسعایانته می شود و گاهی هرگاه قندی صفرا در معده مجتمع می شود و تنگتر از غذا با و صفت تهائی  
اعضا پیدا می شود علاج آنچه در بویوس تجمع معده بود علامتش مذکور شد و آنچه از اجتماع صفرا افتد در آن مسهل صفرا نوشانند بعد از  
برای تقویت معده سلفیوک لیس را یلوک باب ساده حل کرده بنوشانند و غذا اول ملائم و کم خورانیده بعد بتدریج بنفیرایت  
فصل شانزدهم در عطش و آنرا بلفظ گلشن تهرست میگویند و آن عبارت است از تنگه خون اعضائی بدن با طلب کنند  
بذریعه عصاب طمویان ذیبت اشتداد در بدن و خلق میشود چنانکه تهائی طعام در معده ظاهر میگردد و این در نهته میشود و اینکه اکثر عطش  
از آب هرگاه غرغره می سازند یعنی در دهن حلق آن تری ظاهر میشود لیکن عطش دفع نمیکردد و لک صاحب بهض آب کثیر می نوشد و آب در  
معده هم می رود و قوی دفع میشود لیکن چونکه بسبب تشنج عروق عصاب خون اعضا نمی رود عطش ساکن نمی گردد پس وضع تشنج که عطش طلب  
کردن خون اعضای بدن برای آب است عطش در حال مرض و صحت هر دو پیدا می شود و الاسباب سبب آن کمی خون بود چنانکه هرگاه  
از بدن کمی خون کثیر خارج شود و خواه بسبب سیدن زخم یا پیداشدن طفیل یا دریهال موسی یا آب کثیر از خون خارج شود  
چنانکه دریهال صناعی یا مرضی میشود و بسبب آن تأیید کثیر از خون جدا می گردد و پس درین وقت خون از اعضا طو بات را جدا  
میکنند و چون اعضا خالی میشوند و آب را طلب میکنند این حالت عطش میگویند و بسبب تشنجی غالب میشود و لک از مرض یا بسبب  
آب کثیر در آن هم اگر دره در بطن خارج میشود عطش پیدا می گردد و هم هرگاه دوای معرق نوشانند و آب کثیر از جلد خارج شود عطش

فصل شانزدهم در عطش  
فصل پانزدهم در جوع البقری





معدیه از حرکت خود تقویت نموده فواق را که تشنج است دفع کند ایضا نافع محرب پیپرمنت یک دو قطره همراه آب ساده یا قلیل منجنیق  
 بطور متخاص بنوشند یا بر نبات سفید انداخته مضغ کرده بلع کنند ایضا کچر کینفر ساده از نیم درام تا یک درام یا کافور ساده سه  
 چهار گرمین همراه آب ساده بنوشانند ایضا که کلار نام چند قطره بر روی مال انداخته بنویانند یا سه چهار قطره آن بر نبات سفید یا شیره  
 یا همراه آب ساده حل کرده بنوشانند و اگر از نوشیدن شراب مجتنب نباشد سپید کلار نام از نیم درام تا یک درام همراه آب ساده  
 بنوشانند ایضا که مار فیا آب حل کرده بدریغ زرافه سوزنی زیر جلد رسانند چون طفل را فواق عارض شود پس گرازیاده خوردن  
 شیر با شقی کنانند یا بنطوره انگشت در دهن شان انداخته قدری بجای لعلات دغدغه پیدا کنند تا قی آید و فواق بر طرف شود و  
 اگر از پیداشدن جوضت باشطین قیو لیا می محلول آب آب آبک یا سو دایا پیاس کار بناس نوشانند لیکن بی قی هست که کثیر قی  
 و الا خود دفع خواهد شد و آنچه در او از امراض حاده می افتد اگر چه لا علاج است مابرا نقییل ازیت بیمار پلاستر از خود در دست کرد  
 بر معدیه نهد و آنچه بسبب تشنای رحم بود در آن تدبیر کیه ششیر و امراض رس در بحث تشنج نوشته شد اندکجا بر تدبیری لطیف  
 دفع کردن فواق نیست که بیمار را رست ایستاده گیلاسی که در آن آب ساده زیاده از نصف گیلاس باشد یعنی قدری خالی بود  
 در دست راست آن و بپندام فرمانند که تا حد رکع خمیده شود آهسته آهسته و چون سر تا زانو خم شود نگاه ام فرمایند که آب از گیلا  
 مذکور از جانب گیلاس که متصل بجانب انگشت سبابه است بنوشد که این تدبیر در دو دقیقه فواق بر طرف میشود و قدر حاصل میشود  
 در قی و آنرا بلغمات انگشت شصت انگشت میانی می کردن می نامند آن هم از علامات و اعراض است که در امراض کثیره یافته شود چنانچه  
 در او رام معدیه و زخم میوکس میبرن معدیه و بر مضمی طعم نوشته شد و این قی عارض میشود که حرکت معدیه منقلب غیر طبیعی گردد  
 از جانب یمن بسوی یسار حرکت کند ازین سبب یمن معدیه متصل بمری است کشاده گردد و دهن آن که متصل بمعده است بشود  
 و غذا بسوی بالا صعود کند از راه دهن بیرون آید برخلاف حرکت طبیعی که آن از جانب یسار بسوی یمن است که سبب آن دهن  
 متصل بمری بند میشود و فهم متصل بمعده کشاده میگردد و سبب آن غذا در مفضل بسوی معامیر و دهن بر این حرکت منقلب پرده شکم  
 هر دو عضله که بالای معده و طول اندامین میشوند معده را غم می کشند چنانکه این حرکت غیر طبیعی است لهذا در آن زیاده و شواری بسیار  
 و کسی قی با شواری کسی را سهولت می آید لیکن از عقیدت آندان قی سهل میشود و اسباب سبب آن گاهی در معدیه میباشد و گاهی  
 اعضائی دیگر و اکثر سباب معدیه در بعضی دیگر امراض معدیه که کور شدند اما سباب دیگر پس از آنجمله نیست که گاهی از قلت خون می آید  
 خواه قلت خون بسبب زیاده خارج شدن خون از بدن باشد چنانکه بعد رسیدن جراحت یا تولد فرزند یا بواسیر خونی یا هسل خونی  
 میباشد یا از زیاده خارج شدن آب از بدن یا از لخته همال باشد چه دهن حرکت هم خون در بدن کم میشود چنانچه در بعضی علل  
 میگردد و گاهی از زیاده متلی شدن باغ از خون میباشد چنانکه در غشائی باغ هرگاه در باغ غم کرده میشود افتد و گاهی در  
 ابتدائی ورم ریه یا حمی جدی حصیه از جوش خون می افتد و هم درم جگر بسبب جوش خون زیاده متبع شدن خون معدیه بسبب  
 ورم جگر میباشد چه هرگاه در جگر ورم حادث میگردد و خون در آن بخوبی جاری نمیشود و معدیه زیاده می ماند پس زان معدیه متا

باصح شفا فی الامراض کما مرکبه

باصح شفا فی الامراض کما مرکبه

میشود و از آنهم قی عارض میگردد چنانکه فواق عارض میشود و گاهی از خوردن و کشیدن و دو تنباکو و قوی از درشتی که در بدن پدید  
 در عارضه که باشد قی حادث میشود بسبب ذیبت عصب گاهی در قی که هرگاه راه معانی شود هم قی پیدا میگردد و گاهی سوزی  
 چهار روزی از شستن و معنی از جویند و صفا آنچه موم است بهیند و له و هم از بدن بدوشل بوی گویشت عرق گاهی از بدن  
 خون ترسیدن گاهی از تخمیل قی و از ششای مستقره طعام مثل گیس هم قی عارض میشود و اکثر بجا گرفتن نصایع عرق صفا  
 قی می آید علاج اول تفحص اسباب کرده آنچه سبب آمدن قی بوده باشد بریزد آن فرمایند و اگر گرمی موزی در معده بود  
 برای دفع کردن آن اول اسپیکاکو انا از ده گریز تا بست گریز در آب نیم گرم حل کرده نوشانیده قی گناتند و اگر بعد آن قی بند نشود  
 بایند و سیانک ایستد و ایلوت و سودا کار بناس چنگر افیون یا افیون محلول بآب نوشانند یا سندنیر بود و همراه آب حل کرده نوشانند یا  
 سلفیوکل ایستد و ایلوت پانزده بست قی و آب حل کرده نوشانند و اگر کلاک تیر و ضعف و آرام همراه دو آونس آب حل کرده نوشانیدن برای  
 بند کردن قی مجرب است و پلاست از خوردن بر معده نهادن قی فراطی بسیار ضعیف است اگر از خارج شدن خون کثیر آب کثیر از  
 بدن قی عارض شد باشد درین وقت چنگر افیون یا افیون محلول بآب همراه ایلونیا کار بناس آب پودینه بنفشه نوشانند و اگر  
 محتسب شرب بناشنرا شرب بر آید سی آب حل کرده نوشانند و اگر از قی و انس و امعا عارض شد باشد در آن احتیاطا تنقیه  
 بهار اصاف کنند تا آنچه در آن از قسم سده است خارج شود و راه معاشایند آنچه از درشتی که در بدن پیدایش را باشد افتاده باشد در آن  
 قدری افیون مار فیا خوراند و قدری کلا رغام بویانند و سلفیوکل ایستد و ایلوت بآب ساده سرد بچین نوشانیدن برای دفع کردن  
 جملة اقسام قی مفید است قی که حاصل قی و هم در قی الامم این را بلخت گریز یک میگویند و این هم مثل اول از جمله  
 اعراض علامات است و گاهی در امراض معده پیش از این معده یا زخم میوکس میبرن معده و سرطان معده عارض میشود  
 گاهی از زخم جگر یا گاه جگر زیاد ضعیف شود و خون از راه آن بدل کثیر و بدشواری رسد چنانکه در بر روستن یعنی ضعیف شدن جگر  
 پیدا میگردد و در بیان آن انشاء الله در امراض کبدی میبینیم پیدایش و گاهی زکوری خون فساد و خرابی آنهم قی الامم می آید و گاهی  
 از حباس حقیقی زمانی از اینوزم که مرض شریاست هم از انصاع عروق معده بخواه بسبب ضرب بود یا از زیادتی و جوش  
 خون باشد هم قی الامم عارض میشود علامات اول غشیان طاری میشود و معده اشتلا و تشل محسوس میگردد پس ضعف  
 کرد و سی لاحتی گردد و دوران سردی یکیش چشم پیدایش و چنانکه قبل صدور غشی عارض میگردد و درین وقت بیمار کم می بیند بعد  
 قی و موی می آید و در قی خون که می آید گاهی بسیار سرخ مثل خونیکه در شتر اکین دور میکند و گاهی زان سیاه و غلیظ بر می آید چنانکه  
 در ورید میباشند و گاهی بسیار سیاه مثل درو کانی که مردمان آنرا خون میگویند و درین وقت آنچه از راه برا می آید آن هم سیاه میباشد  
 زیرا که آنچه از خون در معده مضطرب و سیاه گشته در امعا میرود و باز از سیاه میکند و چون آنچه خون در قی از معده می آید همراه آن سرد و کثیف  
 شکایت از جانب امراض صد نمیداشد آنچه از زیر می آید در آن شکایت امراض به وجود بود و هم خونیکه از زیر می آید همراه سرد می آید  
 با خون کثیف نمیشود و کاین علامات قی الامم معده قی الامم که از انصاع عروق می آید قی تفرقه میکند لیکن هرگاه خون از زیر می آید

فصل نوزدهم در قی الامم

دفع شود که قدری اندر او دهن دفع شود و قدری اندر او دفع شود و بعد قدری در معده مضطرب شده بطور قوی دفع شود و تقریر در  
 و شواش شود لیکن درین وقت هم غمخوار کند اگر آفت در ریه صد یافته شود و خون با سرفه و کف خارج گردد و توان نیست که قی الدم بهر آن  
 برپیداشد است علاج اول تخصیص سبب کننده و آنچه سبب محدث قی الدم بود تدریج دفع کردن آن محل آنرا پس اگر از سبب اشتداد  
 درین وقت چنانکه در امراض معدیه نوشته شده بآن علاج فرمایند و اگر بشمار که و فساد و جگر عارض شد باشد آنچه در امراض جگر مختص  
 نوشته خواهد شد انشاء الله تعالی بوقایع آن محل آنرا و آنچه از کفر و قی فساد خون بود در آن غذای جید و تازه خوردند و خون از شل  
 آهین گشتن قوت دهند و علاج عام قی الدم که برای جمیع اقسام آن مفید است محل آنرا و آن اینست که وقت آمدن قی قدری آب سرد  
 نوشانند یا قطعه بریت در دهن بیاورند و اگر خون زیاد آمده باشد بریت بر معده بیاورند و از عصاره محکم بنزد آنرا و عصاره  
 اثر آن در باطن معده رسد و آنچه در مویس میبین معده جمع و قبض پیدا میکند از او به آنرا خوردند و شل پایی ایستاس یا کالکلیت  
 و مانک ایش و سلفینوک ایش و ایلوش آب حل کرده نوشانند بسیار مفید است اگر در معده بود و نیز بهر معده چسبناک  
 مفید است قندکر فصل هشتم در نفخه شکم که آنرا اطمیان میگویند بخت انگیزی بکتری هندی و سکون نیم و فتح بای موه و فارسی سکون  
 الفت و خون فتح الفت و سکون بای شانه تخمائی و کثر تائی هندی و سکون سین مملع یعنی آواز دهل که وقت زدن انگشت بر آن می یازند  
 و چونکه این آواز و تیکه بهر معده و معازر یاده شود و از آن یواز شکم وسیع و بگردد و غشای بالاسی شکم قیق شود و پیدا میگردد و از آن  
 باین هم موهوم ساخته اند و نفخه شکم بهر دو قسم است قیقی و غیر قیقی قیقی آن نیست که از اجتماع و زیادتی هوا در معده و معازر پیدا شود و  
 غیر قیقی آنست که هوا در طریق غشائی آید و شکم یاده و مجتمع شود از آن نفخه شکم پیدا شود چنانکه در بعضی امراض حادث میشود و بیانش در  
 سبابین مرض کرده خواهد شد انشاء الله السبب سبب قیقی آن اکثر بطنی طعام میباشد خواه بسبب فساد جوهر طعام یا از زیاده  
 مقدار آن باشد یا غلظت آن باشد که از این خورده شود و آن در معده غیر منضغ مانده بعضی گردد و بهر دو هم از بروزت معده پیدا میشود و اگر  
 باوام حرارت در معده چنان باشد که در الک مقیاس حرارت از آن سبب در جبهه و پنج صاعده شود و طعام را معده منضم میکند چون از آن شکم  
 چنانکه بدید که نوشیدن آب سرد این حرارت کم میگردد و درین وقت طعام منضم نمیشود و از آن ریح پیدا میگردد و بهر دو هم از نوشیدن شراب حلوا  
 و خوردن غذای شیرین هم این حالت پیدا میشود و همچنین از زیاده خوردن طعام بعد کثرت شفت بدنی و هم از زیاده خوردن غذا و زیاده خالی ماندن  
 شکم و بعد از آن میخورند طعام اینحال پیدا میشود و بسبب ضعف عصب هم از غیظ و غضب کردن بعد خوردن طعام و هم از زیاده خوردن  
 یا زیاده کشیدن تنباکوی قوی در قلیان غیره در غلای سعه اینحال حادث میشود بسبب ذیت میوگس میبرن معده هم اندر رسیدن سردی  
 از خارج به شکم خصوصاً که بعد خوردن غذا غلیظ باشد و هم از قبض شکم و توان هم اندر داخل شدن معده و جوف خود و هم بسبب ضعف عصب  
 چنانکه در مرض میسیر یا ویده میشود نفخه شکم پیدا میگردد و اقسام غیر قیقی آن پس سبب آن اکثر داخل شدن هوا در غشای آید و شکم پیدا میشود  
 انیکه آنچه مواد از روم این غشاء و پیوار پرل فیور در طریق آن میریزد و هم میگردد و از آن ریح پیدا میشود و هم در اینها چنان حالت گاهی پیدا  
 و هم هرگاه در معده و معازر سوراخ در روم آنها پیدا شود و از آن مواد در غشائی آید و نیز در این مواد هم زیاده هوا پیدا میگردد و دو کک چون بر آن

استخوان در غلظت  
 طایفه طایفه در غلظت  
 کون آنرا غلظت در غلظت  
 در معده و جوف خود  
 خارج و چنانچه  
 کرده و میخورند

عضوا بسبب پیداشدن نفخه در آنها خارج شده درین غشای سرد از آنها درین فریطه غشای ریح مجتمع و پدید می آید و گاهی هم در نفس یا در شکم  
 بهم نفخ شکم غیر حقیقی پیدا میشود و علامات عمدتاً سه است اول متقی آن بادتی و نفخ شکم است که بسبب آن درین متناوبی بسیار شود  
 و تنفس آن قدری ازیت بود و چون انگشت شکم زن را از دهن بیاید و چون از دهن شکم علی الاعمال نکند صلابت سختی در آن پیدا  
 بلکه شکم در پیروان برنگشتان محسوس میشود و گاهی وقت غم شکم از حرکت هیچ پیدا و مسجع میگردد و چون هوا در معده یا معاز یا ده جمع  
 شود در جای خاص شکم محل معده و قولون برآمدگی خاص ظاهر میشود که از آن شکل قولون محسوس گردد و چون جفا آید از آن شکم  
 نفع در زیادتی شکم و اذیت آن پیدا میشود و درین مرض گاهی مطلقاً قبول محسوس میگردد و از کرده در مثانه نمی آید و پیدا میشود تا آنکه از  
 داخل کردن قنایط هم جاری نمیکردد و در قسم غیر حقیقی آن علامات هم غشای ابدار مثل در دومی موجود باشد و در فریطه غشای مذکور آنچه  
 آب از دم جدا گشته جمع ماند بالاسی آن بودی باشد و هم معاشی قولون بالاسی این آب یافته میشود و باین دو وجه هم نفخ شکم درین  
 پیدا میگردد و در هرگاه از ریح ارحم پیدا شد باشد علامات آن موجود میباشد و العلاج اول نفخ سبب نیدن بعد از آن است  
 شکم اگر از خوردن غذائی ردی یا ثقیل یا از زیاده خوردن بود از قی کنانیدن فایده حاصل میشود همچنین نفخ سبب کرده نفخ کردن سبب  
 کوشش سازند و علاج عام نیست که در حقیقی آن از نوشانیدن سیلیو که ایستد همراه آب ساوه یا عرق بادیان یا عرق نیسون یا عطر نیسون  
 نفع ظاهر میشود و گاهی بعد از ساعت بر خوردن غذا نفخ شکم پیدا میشود بسبب بادتی ترشی در معده چنانکه معده متناوبی شد و تشنگی  
 و بسبب تشنگی آن خروج ریح از آن مجتنب میشود و از آن نفخ پیدا میگردد و درین وقت از نوشانیدن پیاس های کار بناس فایده میشود زیرا که  
 این دو اثر ترشی را دفع میسازد و از آن بعد از ارام سپید شدن تشنگی آن دفع میگردد و بسبب آن یاج بخوبی خارج میشود و از آن نفخ شکم برطرف  
 گردد و کک گرگرس پودر زوراییدن در این حال مفید است که آن نفوی معده و قاتل حموضت و محلل ریح است و هرگاه از زور ری عصب  
 باشد سپر بیامونیا یا و میثک یا یونیا کار بناس همراه آب پودر زوراییدن مفید است و هرگاه از مشارکت سببی شکم باشد بلا دراصل  
 کاشک فقره زوراییدن فایده است هرگاه بسبب سیدن سردی باشد یا گرمی مثل فلفل بر معده بستن بر برتر گرم بر معده بستن فایده  
 مفید است که ازین نیز ریح از معده خارج میشود و یا محلول سببی که گریز فانی میگردد و هم از ایدن شکم در جانب چپ بسیار بالاسی قولون فایده  
 حاصل میشود و ایضا فلفل در آب گرم تر کرده فشرده درون تارپین بر آن پاشیده شکم بستن فایده است و لیکن گاهی زکام دو او و جهت  
 نمیشود و درین وقت مجری چربی دقیق را توسط مقعر در معده انداخته تا قولون میرساند که از آن درین وقت هوای کثیر خارج شود نفخ  
 شکم برطرف میشود و گاهی ازین هم کار بر نیاید پس لاچار درین وقت جایکه اجتماع ریح در شکم زیاده و برآمدگی آنجا ظاهر بود و در گاهی که  
 آنجا انداخته اخراج ریح سازند زیرا که چون یاج در معده و معاز یا ده مجتمع و غلیظ میباشد درین وقت ممکن نمیشود اما معایده را که  
 مجتمع شد هوا را از خود دفع کنند اما هرگاه بذریعه و تمکاری مذکور قدری یاج از آنها کم کرده شوند درین وقت معده و معاز بر قدری تنبها  
 و انقباض ممکن میشوند و بعد از اجتماع خود هم این یاج را از خود دفع میکنند لیکن این نیز در قسم حقیقی نفخ بعد از جله تریه وقت مجبوری محل را از قسم  
 غیر حقیقی آن آنچه بسبب غشای آید شکم میشود و در آن سوا می بیند و از این دیگر فایده ظاهر میشود و لیکن آنچه از ریح ارحم حادث میشود و آن

فصل ششم در نفخ شکم  
 در این فصل از امراض معده  
 و شکم که بسبب نفخ  
 شکم می آید و در این  
 فصل از امراض معده  
 و شکم که بسبب نفخ  
 شکم می آید و در این

فصل ششم در امراض کبد

باب سیزدهم در امراض کبد

فصل اول در تشیع کبد

بهرنج خوبناست نیست که تین سیر العجل زند و در آن داخل کردن مجری مجری در معده هم در آن  
 نفع ترش نیست زیرا که در آن یاج در رحم پیدا شدند و معالجه در آن آنچه تدابیر در علاجش نوشته خواهند شد آنرا از امراض مهم یا عجل آن نوشته  
**فصل بیست و یکم در پایی کوفت و زرقع بای مودعه فارسی و سکون البه کسر بای شناه محتانی و هم راسی مملکه و سکون**  
 و او کسر زانمی مجله اول و سکون ثانی یعنی حالتی است که در آن در معده حرقت و سوزش محسوس میشود و بهرگاه این حرقت و سوزش  
 مثل آب صاف از معده جاری میشود و قبل از آن اذیت در معده و قندی تهوع پیدا میگردد و بعد از آن آب صاف که بی مزه  
 بی رنگ بود از معده بطور سیلان عاید از زمین جاری میشود و این حالت قوت پیدا شدن بعضی مهم قوت باردار شدن زن از این  
 تا ماه سوم و چهارم و هم در سرطان کبد سرطان کبد یعنی سرطان لیلیه پیدا میشود و سبب آن اذیت سیمی میثک میباشد و این  
 مرض اکثر در زنان بیشتر مردان زیاد پیدا میشود و ایضا در رجال و نسوان هر دو اکثر بعد از گذشتن پنجاه یا شصت سال از عمر  
 میشود و العلاج علاج این حالت در ذیل علاج بعضی فرغ نوشته شده و وقت ضرورت آن جمع نمایند و زیاده از آن نیست که هرگاه  
 در آن وقت آمدن قی در ذائقه ترشی مدرک شود درین وقت او را که از قسم کما ربونا مثل سودا کار بناس یا بناس کار بناس کار بناس  
 آن لذت و غیره نشانند و هرگاه در قی ترشی نباشد از آن استنشود که بعضی بسبب نبودن ترشی در معده است درین وقت شش حاض  
 مثل میور انک ایستد الیوت یا نایس میور انک ایستد الیوت بنوشانند و قد که **باب سیزدهم در امراض کبد**  
 و آنهم مثل بر چند فصل است **فصل اول در تشیع کبد** بداند که جگر المفت گشاید و میگوید آن لحم خود جسم غدی است که در بدن  
 انسان از آن عظیمتر کدای غده نیست و دروزان از پنجاه تا شصت آنوس میباشد و محل آن پهلوی چپ است بدن است  
 از آنجا تا زیر قلب و پهلوی چپ سید است بالای آن پرده شکم است که از زیر قلب ریه ترشح شده بالای معده و جگر آمده که سبب آن  
 شکم در طول برد و حقه منقسم شد در یک حقه اعلی آن قلب ریه است در حقه زیرین معده و جگر و امعاء و در شانه و غیره واقع اند  
 باطله جگر در جانب محراب خود که بطرف ضلع است چون قوت تشیع دیده میشود بر دو حقه منقسم محسوس میگردد و یک حقه در جانب  
 یک حقه در جانب دیگر حقه جانبین عظیم است حقه جانب دیگر صغیر است جانب اعلی آن که منقسم پرده شکم است که عصب مقفوس بود  
 یعنی کناره آن برآمده اند مثل کمان جانب اعلی آن مقعر است یعنی کناره آن فرو رفته است مثل لال و ازین جانب برین جگر قرار  
 بر معده و قدری بشروع معای اثناعشری جای که او متصل بعد است و قدری بر معای قولون متصل است و همین جهت است  
 معده و امعاء با امراض کبد مشتهر میشوند و این سبب هرگاه در جگر و میله پیدا میشود و هم آن در برابر از راه امعاء خارج میگردد و یک کناره  
 جانب برین جگر تا کرده رسیده است و همین سبب کاهی در جگر باد و گرده و در گرده باد و جگر مشتهر میشود و همین اتصال بوده  
 جگر از راه بول دفع میشود و جگر بر جای خود از جانب اعلی با پرده شکم بر میخیزد و ربط بسته است تا از جایی خود بسبب زدن و نقل و حرکت  
 نیافتد چنانچه هرگاه پرده شکم همواره و قوت نفس بر و بالای آید و میرود پس اگر از اعلی خود بسته نباشد و بر جری افتادی بالای جگر و غشا  
 محیط اندکی غشائی آید که بر پرده غشا مثل معده و امعاء منبسط است همچنین بر کبد هم منبسط است و در غشائی ریشه دارد که آن اندک





خون در او را و یکدیگر را بین معده و جگر واقع اند میباش از نبات خالی بود و خونیکه از جگر بپای میرود در آن نبات میباشد و ازین صحت  
 ظاهرست که نبات هم در جگر پیدا میشود و این نبات چون در ریه میرود بعضی از آن بسوی حوضت تجیل میشود و بعضی از آن بر حال خود باقی  
 میماند و همراه خون سرخ رنگ جمیع اعضا میرسد از آن در اعضا جری پیدا میشود و پس هر شد که جگر و دوازده میبندد یکی طبع و هم که در خون میکند  
 تولید اخراج صفرا از خون پس از مضع و صفی غرضست لیکن مراره پس آنهم که باز رسد غشا است یکی غشا غشی رچی که آن آبدارست آن مثل  
 همان غشای آبدارست که بر تمامی حشا آمده است دوم غشای ریشه دارست که در آن ریشه های عضلات هم در طول عرض آن در آن  
 درها هم همین نوع است و سوم غشا غشی که یکس میبین یعنی غشای آبدارست آنهم مثل یکس میبین معاینه است این هم قدر طول است پیدا میکند  
 که آن بصرفه ای میرود و کار مراره نیست که صفرا میخورد و آن محظوظ میدارد و ادامه که ضرورت آن می شود و اما هرگاه غذا در معای  
 اثنا عشری که متصل بعد است میرسد برای هم کردن غذا در آن ضرورت بسوی صفرا می افتد از آن این صفرا میخورد هم در  
 اسما بد ریه مجری صفرا آورده از کبدی آید و درین وقت توسط و اعانت عضلات که در طول عرض مراره آورده اند مراره بجزکت  
 ذاتی خود هم صفرا را از خود بسوی معاف میبندد و مجری مراره که با مجری صفرا آورده از کبد هم متصل است این هر دو هم از غشا  
 مرکب اند چنانکه مراره از غشا مرکب است لیکن این هر دو مجری که در ریه عضله نیامده است متذکر فصل دوم در نقل و حرکت  
 یعنی در رم حاد و کبد این را از زبان لاثن چپ است پیش کبد بسوی هوز و فتح بای مودعه فارسی و سکون لغت نامی هندی و الکفر  
 و سکون بای تختانی و کستری هندی و سکون سیدن همله یعنی هم حاد قوی دنیا مندرین هم اکثر و تمام جگر واقع نمیشود بلکه بعض  
 اجزای آن حاد میگردد و مثلاً در حصه جانب چپین یا در حصه جانب بسیار پیدا میشود و دگای در جانب محدد آن در غشا نشسته  
 می افتد و گاهی در نفس جرم کبد پیدا میشود و اسباب اکثر از رسیدن سردی مثل انیکه هوای سرد و سخت ببدن سدی کسی لباس  
 نادره باشد حادث میشود و گاهی از خندان یعنی از رسیدن هوای بسیار گرم ببدن یا از ششی کردن در آفتاب گرم پیدا میگردد و در  
 هر دو قسم سبب غرض یا قوی خون جگر میباشد چه در صورت اولی بسبب بر د خارجی خون در جگر زیاد می شود و در صورت ثانی در خون  
 جوش پیدا میگردد و از آن در کبد خون یاده شود و هم پیدا میکند گاهی از هوای رطب خراکت از آن تپنده لیزه و هم طحال پیدا میشود  
 هم این هم حادث میگردد و دگای در مراره سنگ پیدا میشود و از آن جگر این هم حادث میگردد و دریکه درین صورت اول مراره هم  
 میشود و من بعد از هم آن کبد هم میگردد و گاهی بسبب چیر چیش کبد هم میشود و گاهی از زیاد نوشیدن شراب از عادت هم این  
 پیدا میگردد و دگای بسبب سیدن ضرر با ضلاع هرگاه ضلع بشکند پاره از آن در جگر خلد یا صده آن بکبد رسد هم این هم پیدا میشود  
 و گاهی از رسیدن زخم از خارج جگر مثل اینکه از کدام آله از آلات حربیه خیم جگر رسد هم این هم پیدا میشود و علامت بالجماع  
 جگر تورم گردد و از علامت خاصه آن اول نیست که بخار عارض میشود و در محل جگر درد محسوس میگردد و این درد و قتیکه جگر از  
 غیر کتیدان نفس که کشنده یاده میشود پس اگر در حصه چپین باشد در شانه است و اگر در حصه بسیار بود در شانه چپین در و در  
 چون این رم در جانب محدد کبد باشد پرده شکم را فرا حمت کنند در تنفس شوری ظاهر گردد و تنفس بلیغ و ضعیف و تواتر میشود و غشا

قول کله بیک  
 در ریه و جگر  
 غشا و غشا  
 هم در معده  
 مثل کله  
 و شش و غشا  
 لیکن هر دو  
 شده و در حوضه  
 میبیند و در حوضه  
 بیک کبد و ریه  
 در حوضه  
 بیان اندر  
 حصه چپین  
 بسیار آن در بط  
 آن در جانب  
 بسیار بدن اند  
 نهاد وقت موم  
 شدن هر دو در آن  
 در و در همان جا  
 میشود و در آن وقت  
 نادره آن جانب  
 میباش و در آن  
 منتهی غشی

فصل دوم در نقل و حرکت

بطریق خصوصاً اعضا طویل جانب است شکم صلب سخت میشود و گاهی در ورم جگر بر قاع شکم عارض میگردد و در سینه هم می آید چون در جانب متعصب باشد و بسبب آن معده و معالیه شاعشی را غمزد و راحت کند از آن تهنوع و قوی و فواق عارض میشود چون درین ورم بیمار خواهد که بجانب مخالف ورم که بجانب بسیار است بخسبید قرار نگیرد و متاد می شود پس یا بر تفرغ بخسبید یا بر روی خود خیمه آرام نماید زیرا که بروقت خوابیدن بر بلوی چپ بطوریکه بسبب ثقل جگر متوم زیاده کشیده میشوند و بسبب آن لذیت و در زیاده میشوند و این ناخوش بود یعنی بیمار را چنان معلوم میشود که گاهی را در شکم میخالتد و هرگاه اجتماع این علامات میشود که سوزی تنفس سرفه و در ناخوش یافتن شوند و چون این علامات در ذات الجنب هم از علامات خاصه آن هستند پس اگر از این ضلالت الجنب تبس نشود درین وقت تفرغ یا بنه طویل باید کرد که در اول ذات الجنب دوم که آب کثیر در غشای پهلوی غشود بیمار را خفیدن بر جانب مخالف مرض ممکن میباشد و چنانچه از اول مرض خفیدن بر پهلوی چپ ممکن نبود و بیمار از آن بسیار متاد می شود و نیز اگر اینجا بسبب آب کثیر غشای کبده یا در متاد می شود و انجام این ضلالت که یا از علاج صحت شود یا نچسبید و بیله گردد یا بسوی ورم فرس که کبده آنرا درم بارد گویند متقل شود یا جگر عظیم یا صغیر گردد و علاج اگر در صحت قوی بود اول فصد گیرند پس بعد کول ده گیرند و پیکا کوا ناد و گرسن افیون اصل یک گرسن باهم میخورند و خوراندند فایده خوراندن این وقت نیست که کاول صفت از زیاده پیدا میکنند و هر قدر که صفت از زیاده پیدا خواهد شد از خون اگر در مقدار خون کم خواهد شد و از آن ورم کم میشود و ورم ایستاده و در طو بات ازین ورم کبده بر معده میریزد آنرا دفع خواهد کرد و در عرضی از کبده خواهد فرستاد سوم آنکه کول خود مسهل است و پیکا کوا نادا هم صفت از زیاده پیدا میکنند و افیون را بر آن شرب یک کرده میشود که چون کاول مسهل است پس هرگاه مقدار کثیر از آن متعل شود بروی سهال کرده خود هم خارج خواهد شد و درین صورت آنچه فایده است همان آن مقصود از اصل تخفیف شد چون بافیون خوراندند و بسبب آن در معده از این کوا نادا برین ترتیب خواهد شد و بسبب سهال افیون لذت در دم میشود و باطله چون بر خوراندن آن سه چهار ساعت بگذرد باید که مسهل قوی که خروج آب را شکم را بشویند و در بهترین همه تنگنیشیا سلفاس است که از شش و رام تا یک و شش همراه آب مطبوع سنا که دو سه آونس باشد بنوشانند و ترکیب سنا نیست که برگ سنای کلی یک نیم و رام در شش و شش آب تر کرده بپوشانند چون سه آونس آب باقی ماند صاف نموده و آنرا بقدر حاجت بنوشانند اگر هشتیم حصه گیرین ثارثرا میسک هم آنرا نیز بنوشانند و بعد ازین و از او ششیدن و دو سه آونس آب ساده سهال بکثرت فراغت میشود پس اگر بعد سهال هم از غمزدن است محل کبده در محسوس شود از زیاده عدد تا به است عدد بقدر ضرورت بر محل در چپانند اگر قی غشایان نباشد درین وقت ثارثرا میسک هشتیم حصه گیرین همراه شپاس زهر کش از پنج گیرین تا هشت گیرین باشد و آب حل کرده بعد یک یک ساعت بنوشانند تا تهنوع و غشایان پیدا شود و لیکن باید خبر رسد که قی آید و چون تهنوع پیدا شود بنوشانند این دو را ترک کنند تا اینکه تهنوع ساکن شود و چون ساکن گردد باز از این و انوشانند تا که تهنوع پیدا شود زیرا که ازین علاج حرکت قلب بطی میشود و چون جگر که محل است کم میبرد و این علاج تا وقتی باقی دارد که در لذت جگر متوقفت شود و این و از آنکه کثرت میجو می مند با هم کثرت و احاطه کبده اکثر کبده این را بخوند و چون خون آنرا در نیم زانو بند شود و پشش از شکم کسان میجو

ترتیب طبخ سنا



گاهی در حصه جانبی سارکن می افتد و اسباب گاهی سبب آن درم حاد کبد بود که مذکور شد و گاهی با درم خفیه و پیش و گاهی  
 از درم قولون بهائی که کوچک متصل است و این را نیز بان گریک پری لقب لائی شس فتیح بائی موحده فارسی که  
 رای حمله و کون بائی تختانی و کشتی هندی و کونانی فتح لاه و کونان لغت و کسر بائی تختانی فتح نامی هندی و کونان حمله یعنی  
 درم که قولون مندر است و سبب حد و سبب آن از درم قولون نیست که درین هر دو مرض زخم درم کونان همین میباشد  
 و سبب آن که در زخم نقل میشن پیدا میگردد و پس گاهی این درم بذریعه ویدیکه سیدانجا نقل میشن پیدا میکند و گاهی درم این زخم  
 بذریعه ویدیکه سبب سبب آن در کبد هم نقل میشن پیدا میشود و پس سبب دیگر درم کونان که آنرا نیز بان گریک پری لقب لاه و کونان  
 فتح و ال هندی و کونان لغت کشتی هندی و کونان لغت هندی می نامند و جگر و بالائی آن پیدا میشود و پس حمله نقل و این کرم  
 هرگاه زیاد پیدا شود جگر متغیر گاهی از کشتی آنها هرگاه از زهر آنها در کبد سبب پیدا میشود و در آن ریخته و گاهی بخوبی سبب  
 کبد از اظهار بسیار ثابت نمیشود لیکن اینقدر از علامات موجوده معلوم میگردد که درم جگر و درم در آن است و گاهی بعد موت و وقت  
 تشییع در جگر یافته میشود و در حال حیات از اظهار علیل که درم شکایت درم جگر و علامت آن محسوس معلوم نگردد و علامات آنچ  
 وقت پیدا شدن درم یافته میشود نیست که دفعه لوزه عارض شود بعد از آن بخار ظاهر گردد و پس عرق آید و بعد از آن عرق بخار و  
 شود چنانکه در مرض سل میباشد هرگاه دل بعد از درم حاد کبد پیدا شود از آنکه این بخار علامات سابقه با درم حاد کبد بود و مثل  
 حمی لازم و در جگر هم ایل میشود و نیز لکه بخار معلوم از پیدا شدن درم عارض میشود و چون درم پیدا گردد و در کبد ساکن شود و حمی  
 پیچ در درم کبد هم بود و زایل گردد و یا قدری باقی ماند و باز در ششها افتد و لوزه یکبار وقت تشییع متغیر میگردد و اما اگر درم زیاد پیدا  
 این تنگ لوزه و نافض و زانه و سینه با رخی بد و قدی سرفه نسبت سرفه سابق که در درم حاد کبد بوده زیاد میشود و نیز کافیه  
 از زیانی و درم پیر و شکم متغیر میگردد و آن باریخ است یکبار گاهی یاقی و درم در جانب است شکم از زیان محسوس شود و گاهی پچ  
 گشت بر آن زنده آید از جای درم مثل آواز صدای جسم صمد آید و بعد از آن پیدا گردد و آنچه در آن خارج شود بسیار است  
 میباشد و این روز بروز ضعیف لاغر میگردد و این بیان سبب کبد است و قتی که جاد و قوی بود اما هرگاه ضعیف فرمون باشد پس  
 در آن لوزه آید و تب قلیل میباشد و درم کم بود و کین قدری سرفه می آید و مریض لاغر میشود و درم جگر ظاهر بود و در قبض  
 و اینست که تفاوت باشد مثلاً یک و سه مال شود و روز دیگر قبض شکم عارض گردد و وقت شام قدری سردی محسوس شود و این  
 حمی ظاهر گردد اما تب پس میباشد و نیز ظاهر میشود که درم جگر پیدا شده و این سبب گاهی می شکافد و درم آن شکم بر غشائی آید  
 میریزد و از آن غشائی مذکور متورم میگردد و آنرا نیز بان گریک پری لقب لاه و کونان فتح بائی موحده فارسی و کشتی هندی و کونان  
 یا تختانی و هم نامی هندی و کونان فتح الف و کونان یا تختانی و کشتی هندی و کونان حمله یعنی درم غشائی  
 آید و لطن می نامند و درین وقت هیچ حیات نباشد و گاهی این سبب با درم متصل و کفات گشته و پخته شکاف و از آن درم جگر  
 ریخته در معال خارج میشود و درین وقت علامات ذات الجنب است که درم پیدا میشوند و درم کمال شوری بسفر بیرون می آید



یا بعد از هر پنج پیش فرزند پیدا میشود و کسانیکه مقدار پتک لرزه در هر سال یا شش تا هفت بار این مرض میشوند و از زیاد نوشیدن شراب  
و از زیاده گرمی مزاج خواه از فصلان با زقرن حادث شد باشد شورش جوش خون گردد پیدا میشود علامات علامتیکه در مردم خان  
که غرض شده اند بجهت موجود باشند لکن قوی نبوده بخت میباشد مثلاً قدری پتک در محل جگر و بعضی طعام موجود بود و صفر اکرم پیدا شود  
ازین سبب شکم اکثر پیدایش آنچه در هر سال خارج شود برنگا گشتی بود و گاهی شکم عظیم میگردد آب شکم پیدا میشود علائم چشم آفت که  
حتی اوسع سبب خاص دریافت آنرا منع کنند مثلاً اگر از ریه و پیش بود بعلاج آن پردازند و اگر سبب پتک لرزه بود علاج پتک نماید و  
تبدیل مقام سکونت و هوادرین قسم ضرورت میرسد که پتک لرزه اکثر از خرابی هوا پیدا میشود و چنانچه بیرون فرمایند که صفر اسپد اشود و  
رفع گردد و برای اینکه کار بهتر است که بود و فلان هشتم حصه چهار حصه گیرند پس الیای مزاج دو گیرند و کسی کم و دسته گرین بایل یابی کمیونیکه  
شش گرین باشد بخجته دوحسب بسته وقت شب بخوراند و وقت صبح سه لیتر بپزد یا سنگینت یا سفاس همراه آب بنوشانند چون نوشید  
این و اجابت بغرغث شود بعد آن ایستد شیر و میوه کاف الیوت همراه آب حل کرده بنوشانند بجگزینند چنانکه فصل سابق نوشته شد  
و برای تعلیل مقدار دوم جگر و دو ابسیار مفید اول ایودائیس پیاس که آنرا از ده گرین پانزده گرین باب حل کرده نوشانند دوم  
ایونیامیور اس اتنا یا همراه ایستد میوراک الیوت و اکثر اکثر شکم یا اکثر اکثر شکم خوردانند و گاه گاه بلا شش زدنش یکس جگر  
نهاد هم مفید است و دیگر ایودین یا هم ایودین محلی بگردان هم بهتر است و هرگاه آب شکم مجتمع شود و شاید ازین آبیر که نگردد و ادویه  
در مثل پیاس کار نیاس پیاس شر اس پیاس ایستد نشاند و اگر ازین هم فایده نماند حاصل نشود و ازیت بدستور باقی ماند  
یعنی تنفس ناش از نشتر و کار آب از شکم بیرون روند و غذا درین جن سهل الانضمام حیث قوی بدن تحلیل المقدار دهند و خوبی هم  
فصل پنجم در خطیم یعنی کشیدن مقدار جگر و این را بائی تر مرغی آفتاب میگویند این گاهی در طول خود بسوی بالا که جانب صدر  
و ریست زیاده میشود و گاهی بسوی زیرین که جانب مهاست زیاده و دراز میگردد و گاهی در طول عرض هر دو کشیده شود حتی که نصف شکم  
جانب هست مثل میگرد و چنانکه طحال بقطعم خود بوضع شکم جانب چپ متصل میشود و هرگاه مقدار جگر زیاده گردد و بر آن انگشت زر  
آواز صد شکم را دریافت کنند جائیکه دراز شده رسیده باشد آنجا او جسم صمت مسجع میشود و درین جن جمی و در لازم مرض نیست  
زیرا که نفعل مشین حین نیست لا سباب اینجا که گاهی بعد از هر حادث و فرزند پیدا میشود و اکثر در امراض یوق قلب مقدار کبر زیاده میشود  
زیرا که درین وقت خون نجوبی باین اعضا میرود و از زیاده نوشیدن شراب سردی حرارت مزاج خواه بسبب گرمی فصل یا بسبب کارد  
قرب نیاز زیاده شد باشد هم این ض پیدا میشود و از هوای خراب آنرا طیر یا گویند هم مقدار کبر زیاده میشود زیرا که در حالت لرزه و نا  
خون نظام بدن بسوی باطن بر مرکب کرده و جگر زیاده میشود و از آن مقدار آن زیاد میگردد و هم هرگاه خون کمزور میشود و چنانکه در وقت  
خون در حوض سفیدی آید هم مقدار جگر زیاده میگردد و هم هرگاه کرم موسوم به باد مذکور جگر زیاده تولید شود یا هرگاه خرطیه پر آب در کبد  
پیدا گردد و این را بزبان نگلش منهل است یعنی خلص خرطیه پر آب منهای چنانکه در دیگر کرم و عضای پیدا میشود و جگر هم پیدا میکند  
و چون پیدا شود هر جا که باشد خواهد در حصه جانب یمن یا حصه جانب یسار درین هر دو حصه هم خواه در جانب چپ یا مقصری قسمت

در قضاوت استیضاحی

سید محمد علی



لیکن آنچنان در حده جانب بسیار افتد مسلم است باطله نیز بطریق دیگر که زیاده میشود بسبب یاقی آن مقدار کبدم زیاده میگردد و در  
بروز شل و سیله نیز بطریق هم زیاده میشود و بر می آید و بلند میگردد تا آنکه تشنگا فو مثل بیم و سیله آب آن در جابای معلومه می افتد خارج  
میشود و بعد خارج شدن آب یقین میگردد که خراطیر پر آب بوده یا وسیله از دیگر علامات فیما بین هر دو تقریر توان کرد شل آنکه در بطریق  
در دو تب غیبا شد و اگر بود خفیف بود و تب مین ض یا نوبه غلی یا چنانکه وقت پیدا شدن بیم از وسیله می علامت در جانب  
شکم نقل بود و ازیت که قریب تب در دو محسوس میشود و این ازیت از محل جگر تا شانه دست است میرسد اگر تب مضی طعام میباشد  
و شتهای طعام ساقط میگردد و رنگ و عیال مایل بر روی بود زیرا که خون خراب میشود و جگر خفرا از خون کم پیدا میکند و کم آن  
بینمای و از آن میرش آن و باقی ماندن آن خون ن خراب میشود و رنگ چشمان هم مایل بر روی میباشد و گاهی ترقان هم در مین غاض  
گردد و بسیار ضعیف و کم و در میشود و همیشه دل تنگ و عبوس و مبتلا نعم سوخته شل ابتدای یا فو یلایماند بخام این مرض است که بهای ششین  
نقل میشن کبدا پیدا شود خواه حاد یا مزمن یا بهین منوال مبتلا ماندا بصحت باید علاج اول تفحص سبب کرده آنرا رفع سازند و علاج  
اینست که مسهل دهند یا دویه که تاثیر آنرا در جگر میشود شل کلوب دو گرین پل شراج دو گرین بود و فلوین چهارم گرین یا پل یا گین  
که آتش گرین ده گرین باشد سخته خوب ساخته بخوراند و بعد دیگر کلوب دو گرین و سفوف جلیپ کپوئند چل گرین هر دو را سخته بخورند  
لیکن این علاج مرض قوی است اما کسیکه ضعیف بود آنرا کلوب و پل شراج بخوراند و فلوین پل یا ی کپوئند اگر کسی کم  
بایستیم سخته بخوراند بعد از فراغ از مسهل برای تسهیل مقدار کبدا یوئید شاس خوراند و ایوینیا میوراس تنهایا یا بشید میوراس اگر  
نوشانند و نایم میوراس کبدا یوئید نوشانند جگر ندر ریجه سفنج یا پارچه کپاس نهادن مفید است و غذا تحلیل المقدار و سال الانضام  
شل شیر و شوربای لحم خوراند فصل ششم در صفت کلب یعنی کوچک شدن جگر و این را سرور و زربان گرک مینامند این مرض اکثر  
وقتی پیدا میشود که در شکم آب کثیر مجتمع شود و از آن رطوبت که در پیش نیست که غشائی یشه دار که از خارج کبد اندرون آن فته است  
میشود و هر قدر که سبب هم تنگ میگردد بسبب آن کبد کوچک گردد و بعد شرح ثابت میشود که جگر ضعیف شد و جابا بالائی جگر بقدر فلوین  
یا از آن کوچک تر برآمدگی با ظاهری میباشد زیرا که اجزای غشائی مذکور متورم شدند از اندرون جگر بسوی خارج آن بروز میکنند از آن  
در جگر این برآمدگی ها محسوس میشوند الا سباب که سبب هم کبد یا مزمن پیدا میشود خواه این هم موجود باشد یا قبل ضعیف شدن جگر  
صحیح شد باشد از نوشیدن شراب تیز مثل براندی یا جن قشقی شراب تیز است هم پیدا میشود وقتی که آنرا بدن سختتر آب نوشیده باشند  
و در ولایت گلستان هم این مرض که نهاده اند ترجمه اش نیست که مرض نوش کتده شراب جن است لیکن این لازم نیست زیرا که باطفال هم  
این مرض حادث میشود علامات اول نیست که هرگاه انگشت بر محل جگر زده حساس کنند از آن جسم صمت هر قدر که در حال صحت ششیده  
از آن کمتر محسوس میشود و تنها کم میگردد و غذا نخوبی مضطرب میشود و عطش زیاده میباشد زیرا که آب در مین ض در خون کم میرسد بسبب هم کبد  
چرا در مین آن راه درید تنگ میشود و آبیکه در آن با خون سخته در دل میرفت کمتر میرسد پس کبد و خراطیر غشائی آبدار که بالائی سده و جابا  
است یعنی پری نونیم آب جمع میشود و از آن ض ششین یعنی قبا ع آب در شکم حادث میگردد و در آخر مرض هم بر پا بای مرضی ظاهر میشود و اکثر

۴۱  
مجلس شورای اسلامی  
تاریخ و زمانه  
چهارم  
مجلس شورای اسلامی  
تاریخ و زمانه  
چهارم



ویرا که خون از کبد بجوی در دل نمیرود پس معده هم متلی ماند و طعام کم میخورد و رنگ بیمار زردی یابلی بود ویرقان عارض میشود  
 و در قی و همال خون بر می آید زیرا که سبب صفه کبد یاده خون در معده مجتمع میان ازین سبب قی و همال خارج میشود و شکم آب یاز  
 مجتمع میشود و از جمیع آن کلفت اویست یاده میباشند زیرا که هر عضو از آن متغیر میشوند خصوصاً از تنها پرده شکم متغیر میشود  
 و بدن لاغر میگردد و از انجم این ضاقت که بیمار میبرد خواه دفعه نبشی یا آهسته آهسته بسبیل تخلی ذبول علاج این ضاقت شوار است  
 لیکن هرگاه آب کثیر در شکم جمع شود و از استعمال مدایت نفع ظاهر نگردد و باد خال نشسته و موم به شود و کار آب را بر آرد و این عمل را مکرر  
 تا بقای حیات هرگاه آب کثیر در شکم جمع شود عمل آرد و از آن تخلیفت اویست مریض را کم کرده باشند و ذکر فصل نهم در تولد دیدان  
 و خریطه پر آب و کبد بانه گاهی در حکم دیدان پیدا میشود و از قسام آن اکثر آنکه که حقیقت آن در حکم کبد زرد کور شد پیدا میشود  
 و گاهی کرم طویل قیق که مثل شسته سفید میباشند و آنرا در کتب عربیه باسم عرق دنی موسوم میسازند و بندری نار و گویند و بلیخت  
 آن را در آب را رنگین و پس یا غلیظ نماید و آنرا زمانه چنانکه در دیگر اعضا پیدا میشود در حکم دیدان پیدا میشود و گاهی کبار که آنرا بصرف حیات  
 گویند و در معده پیدا میشود و هم اندرون جرم کبد در تشریح یافته میشود و سبب نیست که این کرم از محتوی متوسط جری صفا آنرا بگویند  
 بهار کبد میبرد و همچنین خریطه پر آب هم که آنرا اسمیل سبب یعنی خالص خریطه پر آب گویند و کبد پیدا میشود و الاسباب سبب که در جرم کبد  
 است و قیاسی معلوم میشود که اینها پیدا میشوند و مورث امراض معلومه میگردد علامات مادام که دیدان خریطه یاده نشوند علامات  
 هیچ ثابت نمیشود و کلامی علامت ظاهر بود اما هرگاه زیاده شود در محل جگر تعلق ورم ظاهر میشود و چون جگر بسوی ریه دراز شود و  
 و عسقر نفس ظاهر میگردد و علامات ذات الریه و ذات الطنب موجود میباشند هرگاه بطرف سفلی که جانب معاست عظیم گشته متخرق گردد  
 و آب یا کرم نچر و جگر باشد از آن خارج شده و شکم می افتد سبب آن ورم در غشای آبدار الطنب ظاهر میشود و گاهی در معده و گاهی  
 قولون می افتد و تخرق مواد جگر و قولون هم است و سبب از همه نیست که مثل بیم و بیلاین آب و کرم هم از راه جلد بدن بسوی خارج بدن  
 دفع شوند علاج این ضاقت حصول علاج نیست زیرا که هر دو در غشای میباشند راه رسیدن و با آنها مسدود است لیکن گاهی این آنچه  
 خشک میشود و بزرگ شود و خورده و خشک شده و جگر میماند و مریض هیچ میشود و هرگاه بعد از آن در زپس مردن بیمار تشریح کرده می بیند  
 پراکنده خشک یافته میشود و گاهی بصورت آبک محسوس میگردد و فصل هشتم در سرطان کبد که آن گیشتر است و سبب گاهی در  
 کبد هم مرض کینسر پیدا میشود چنانکه این هم سخت و دیگر اعضا هم یافته میشود و الاسباب سبب آن اکثر از اثر خاندان بود و علامات  
 آنچه در ورم مزمن کبد نوشته شد از قسم حرارت خفیف و در سردی و بی قی و یرقان اینجا هم میباشند لیکن هرگاه ورم زیاد شود  
 بعد احساس کردن خفایات سختی و صلابت محسوس موضع ورم یافته میشود مثل اینکه بعضی موضع صلابت متعین بود و بعضی جاها  
 از کبد صلابت متعین بود چنانکه در کنگریل غده و شکل مختلف مقلوب مختلف میباشند پس هرگاه این علامت را در یابند بدانند که مرض  
 کینسر پیدا شده علاج این ضاقت علاج است لیکن برای راحت سانی بیمار علاج اعراض ممانکن نمایند مثلاً اگر قبض باشد مسهل دهند  
 اگر در زیاده بود افیون یا مار فیا خوراند و برای درون خواب قه شب کلورل بایند ریخت خوراندند و غذای قلیل المقدار کثیر افزا

فصل نهم در تولد دیدان و خریطه پر آب دید

فصل هشتم در سرطان کبد



العت و تون و کسر ال پندری و سکون بین جماله یعنی زردی رنگ بدن و این نیست که صفرا با خون آمیخته ظاهر جلد بدن را زرد  
 گرداند و تعین سبب بعید حادث این مرض اطباء اختلاف است چنانچه راسی بیکف و نیست که جگه ضعیف شده صفرا کم پس میکند و  
 بسبب آن در خون پاره صفرا میماند و با عضله میزند چون جلد رفیق ظاهر است آن رنگ آن ظاهر شود و طایفه دیگری گویند که صفرا  
 موافق معتاد پیدا میشود لیکن این صفرا که در کبد پیدا میگردد و در طریق جاری خارج شدن آن از جگه که مجری صفرا آرنده بسوی معده  
 و مراره است بند میشود بهر سبب که باشد مثل ورم کبد یا جوش خون که در عروق بود و بسبب آن عروق متعطل و عظیم شده مجری کور  
 شود و کشتن از آن مجری منسد شود و چون صفرا از جگه خارج نگردد و در جگه ماند باز در عروق جذب میشود و با خون مختلط شد با غضا  
 و ظاهر جلد را رنگین میسازد و حق نیست که هر دو سبب این ضایع میشوند لیکن علت تولید صفرا پس آن وقتی حادث میشود که جگر  
 ورم پیدا شود بهر سبب که باشد بسبب آن مجری صفرا آرنده منضبط نشد و عدم خروج و جریان صفرا از کبد وقتی پیشتر  
 که مجری صفرا آرنده با معا و مراره بکدم سبب بند شد و مثل اینکه مجری مجری پیدا شود و اسباب گاهی از ورم و گاهی از زیاد  
 قی کون این مرض پیدا شود زیرا که درین وقت هم که تغیر میشود و از زیادتی حرارت مزاج هم برقان پیدا میشود و خواه حرارت از زیاد  
 حرارت فصل حاصل شد باشد یا از سباب دیگر و هم از قبض شکم مثل اینکه در قی و لون سده عظیم سخت پیدا شود و آن مجری صفرا آرنده  
 منضبط نشد هم از ورم معای شناعشری هم از ورم بلبله پیدا میشود و در عوارض که در وقت حامله شدن این مرض حادث میشود زیرا که درین  
 معای بالا میروند و کبد در غلظت کثرت هم قبض شکم درین وقت پاره میماند و گاهی خود از صفرا طوبیت کم میشود و آن غلیظ و لزج میگردد  
 و شاید این حالت در ابتدای تکون مجری باشد بسبب غلظت و لزجیت آن راه خروج صفرا بند میگردد و از آن برقان حادث میشود و  
 گاهی بسبب پیداشدن مل و گاهی از توتد مجری مراره و این مجری خواه در مراره مانع دخول صفرا از کبد خروج آن از مراره بسوی معده  
 یا از مراره بیرون آمدن و مجری صفرا آرنده بسوی معده میماند بسبب آن نازک کبد صفرا را مجری و نه در مراره میبرد و در کبد  
 محدث برقان میشود و گاهی حرکات نفسانیة مثل غلیظ و غضب و فرغ سبب محدث این ضایع میشوند و گاهی از گزیدن بعض حیوانات  
 زهر و از مثل عقرب جزاره که در دم خود راه رفتن بر زمین میکشد و بعض قهاسم فاعی و زنا پیر هم حادث میشود و گاهی طفلان و بزرگان  
 تا که شستن روز بروز و لادت برقان ضایع میشود و خود بخود زایل میگردد و علامات گاهی برقان فتنه عارض میشود که قبل آن کدک  
 نجات نبود و گاهی بتدریج عارض گردد مثل اینکه قبل ظهور آن سستی اعضا و انضاج قلب هم میجوید پیدا میشود و من بعد زردی بر سبب  
 چشمان بعد بر رخسار صفرا پیدا میشود و من بعد تمام رنگان زرد میگردد و گاهی زردی کم و گاهی زیاد میباشد اکثر غشیان این  
 ماند و گاهی هم قی زیادتی خارج میگردد بسیار ترش بود و بول برنگ زرد آید و اوام که صفرا کم با خون مختلط شد باشد یا هرگاه غلظت  
 و در خون زیاد شود بول سیاه رنگ می آید و چون پارچه درین بول سیاه رنگت کمتر زرد رنگ میشود و چون بول سیاه را گرفته  
 با آب مخلوط سازند رنگ آن تیره گردد و در هرگاه شنباه واقع شود درین که سیاهی بول بسبب فتنه یا بسبب صفرا درین وقت باشد  
 که قدری از آن بول سیاه گرفته بر آن سفید کوب ایستد چنانچه قطره اندازند و بعد از آن قطره نمایند اگر سیاهی از صفرا بود اول رنگ آن سفید شود

من بعد رنگ بادنجانی اگر چه اکثر قبض شکم می اند و آنچه بر آن می رسد رنگ طخا کستری رنگ می یابد و این وقتی است که مطلقا  
 صفرا بسوی معانیاید و گاهی بر از بر لون طبیعی خود باشد این وقتی باشد که قری صفرا بسوی معاد دفع شود و گاهی در بن  
 سهال هم میباشد این وقتی بود که در سیکس میبهرن معاکد ام مرض بود و آنچه عرق درین صخلج میشود و رنگ میباشد و بر  
 ظاهر بدن اکثر حکاک خارش بود که ام مرض درین صخلج هر چیز از رومی بدین سبب نیست که بعضی گاهی چشمان از خون صفرا  
 متلی شد که بر سیکر و در چون این عروق قریب خریطه پیچیده و نجایه می رسند و طوبات مذکور ازین عروق آب میکشد و آبیکه ازین عروق  
 بر طوبات می رسد زرد میباشد این طوبات مذکور هم زرد میشوند و آنچه می بیند زرد محسوس گردد و چنانچه هر که عنینک زرد و چشم زرد  
 اشیا از رومی بدین لیکن بان آب برین صخلج برنگ اصلی خود میباشد زرد نمیشوند اما کام بسیار زرد میشود چنانچه اگر از دیدن چشمان  
 شبهه در برقان باشد باید که کام را به پیش از آن امر برقان منکشف خواهد شد که ام مرض را بخوبی درین مرض عارض میشود و بر  
 کسی یاده خواباری میگردد لیکن این می است و در آن سرمانند و تشنگی ریاضت مرض قادر نبود و بدن بسیار لاغر و ضعیف  
 میشود و او ام که صفرا برنگ اصلی خود باشد رنگ بیمار مایل زردی ماند و موافق رنگ اصلی اختلاف در زردی بود مثلا گیسکه سفید  
 رنگ اصلی است در آن زردی برنگ زردی پوست و گوشتها غازی بود و کسبیکه گش سرخ و سفید بوده در آن زردی مثل زردی  
 نارنگی باشد کسی که رنگ اصلی آن سیاه است در آن زردی با سیاهی مختلط بود و اما هرگاه صفرا سبز شود چنانکه در مراره رنگان سبز میباشد  
 اینک گاهی در مرض سبزی مایل و سیاهی مایل بحسب اختلاف الوان اصلی میباشد این امر قان هوو بلغث عرب بلغث انگلش  
 بلیکات جاندرش یعنی برقان سیاه مینامند این قسم می است در کبد در برقان لازم نیست اما هرگاه بسبب هم حاد و کب بویا هرگاه  
 سنگ از مجری صفرا آرنده خارج شد بسوی معای اثنا عشری رود و نگاه در زردی می شود و این در دو تالیع خروج و حرکت حجت  
 بسیار شدیدی می باشد و با نوبت مثل تب لرزه عارض میشود و غرض از مماثلت تب لرزه نه آنست که یک روز در میان یکبار مثل نوبت  
 بتدوین می کند و باز ساکن میشود و باز شروع میگردد و شدت و خفت در آن ظاهر میشود زیرا که سبب حدوث آن تشنج بود و گاه  
 این در شروع میشود و غشیان پیدا میگردد و از شدت ذیت عرق در بدن بیایمی آید و چون حجت از مجری مذکور حرکت کرده در معا  
 اثنا عشری قند فوراً از ذیت و کلفت بر طرف میشود و فقره درین درد و محروم یک سبب ورم کبد پیدا میشود نیست که همراه این درد  
 میباشد چنانکه در ورم حاد و کب بود و هم این درد از غم کردن بدست کم شود و از غم کردن بدین جهت یا بدیخلاف در تالیع ورم که آن  
 از غم کردن لذت زیاد میگردد و از این تاب میشود که ورم و جوش خون نیست بسبب خروج حجت و تشنج لیکن گاهی از ذیت و درد  
 این سنگ نقل میشود و حجت از آن قوت جمعی هم عارض گردد و این هم تا کب میرسد از آن هم حاد یا دبیله در کب رسیده و علاج  
 هرگاه بر محل کبد در دوازدهم کردن بدست ظاهر و زیاد شود درین وقت که موافق مقدار ورم چسپانند و سسل سسل از مثل سنگینت یا  
 سلفاس غیره از آنچه سهال قیق کنند تا مانیت خارج شود و اگر بعد از نیم در خوابی ماند بران از پیش گس پلاشت نرند چنانکه در ورم  
 غرض کب نوشته شد و اگر در سبب حرکت کردن سنگ مجری صفرا از قیاد مراره باشد از علامات خاص آن که پیشتر نوشته شده اند

در برقان زردی که در کبد و صفرا  
 در برقان زردی که در کبد و صفرا

غایت شو که در سبب سنگ است درین وقت ندرت سبب که حج بعل آرند مثل آنکه چون نورانند یا بنطور که اگر بار دق نباشد  
افزون آرد آب حاکمه ده نوشانند و اگر قتی بهم آمده باشد افیون حب بستانند تا دق بر نیاید و هرگاه در و بسیار زیاد شود کلا را  
بویانند که اگر نفع ضعیف باشد کلا را فام مناسب بنود که او قلب ضعیف میکند بلکه بجای آن ایستر فیورک بویانند که از افیون  
تخذیر و تقویت قوت هر دو حاصل میشوند و اگر کلاول بایندریت ادر آب حاکمه ده بطور حتمقان شکم ساند بهتر بود که افیون شایند  
این و امناسب نیست زیرا که گاهی از نوشیدن این و اخی یا ایضا صابون چندی دو آونش آب حاکمه ده از آن حتمقان قوت  
شدت حج معین از لاق مجرب شود پس اگر در حتمقان از این و اقدری منفعت ظاهر شود مگر از این سیر بصل آرند و صابون و ولایتی که  
اودیه متصل است آنرا بر بان لاش پیچید و پورش بر بان آنکه نریز که کاشیشل شوت نامند از آن پنجاه حب درست کنند که وزن آن  
بقصد پنج گریں باشد از آن و زانه چهار حب بخوراند ایضا ده بود و فلن چهارم حصه گریں که شکرک های سائیس یک گریں بقیه  
باید راج که یک گریں یا سه گریں بجز آنکه اگر و حب بسته وقت شنبه را اندر صبح آن و غری تیون یک گریں شایند من ایستیر نریز  
حج و صغری غلیظ جل آرند آن نیست که روشن باین صاع لایستی دو حصه ایستر فیورک یک حصه ایستر و با با هم نیمه نیست  
از این و اخی مخرج همراه صغری مجلول آب که نیمه هم صغری با یک آونش آب حاکمه ده باشد یا نیمه زیرا که سبب این و حب  
این و آب آنجه شود و نمنا آب یا نیمه پس این و اخی مخرج مجلول آب صغری را یکبار در نوشانند و بعد پنج ششش قیقه بخورند  
آن شنبی شرق یا آب مخرج تخم کتان شکر کم نوشانند و بعد چهار ساعت بر نوشید این آب هرگاه شتهامی صاوق شود غذای  
مواقی نورزند و ماد که از استعمال این و ادر گره ضرر ظاهر نشود و زانه یکبار وقت صبح و اسی علم هر آن نوشانند که در و خوف شود  
ا تا چون که روغن زین خون بسوی گرده زیاده و آری و در سبب آن بول ادم عارض میشود پس اگر این شکایت در اثنای استعمال آن  
مکوردید شود و در روز نوشانیدن آن موقوف کنند باز شروع کنند تا تغایق ایام نوشانند که در چند روز از استعمال این و ادر  
صغری غلیظ مذاق فریق میشوند و صحت حاصل میشود و اگر نشدت در خواب نیاید بر آنی در دن خواب فیا چهارم حصه گریں کلاول  
بایندریت بسته گریں آب ساده وقت شنبه نوشانند اگر از استعمال آن قی آید کلاول بایندریت را ترک کرده چنانچه سائیس  
بسته قلاول یا شکرک های سائیس یک گریں یا سه گریں همراه مارنیا نوشانند و شهادت بعض کلین پوپین نایب شد که درین ض بقر  
نوشانیدن را فیا کلاول بایندریت و اسی بر اسی از آنکه من ض نیست چنانچه حج بهم محسوس میشود و چهاران جهناستغری  
میشوند و سبب آن مجرب سولت ناجای خود ترک کرده و در حاتی ایستند که هرگاه نایب شود که بر قان بسبب رم و تولد حج و رمل نیست  
آن را در بدن در و ظاهر شود درین وقت سهل خفیف نیست و صفی کامل دوازده گریں سفوف یا می بسته گریں که شکرک های کسی که می  
گریں پیچید و بعد صغری که یکبار کرده بسته و چهار حب سازند و در و حب از این وقت خواب بهتر بنوشانند و اگر بعد خوردن این حب  
از پیشش در ظاهر بدن حسا موقوف کرده بجای آن از آن و ادر اندر سفوف صغری که گریں یا سه گریں یا می شای  
و سفوف شلیل هر یک دوازده دوازده گریں هر سه را با هم کرده همراه آب ساده نوشانند یا همراه شیر و آب بنفشیر که بیشتر است

نخوردند و بعد از یک سه روز خفیفه سفت شود و بیاضی فرو می آید و اگر این کار عمل نکند بخت نجات کم است  
نخورانند بهر شب با آب و شرب محقق عدد آمدن مهال مثلا اگر یک بار طبع باشد خوردن آن عجیب شود و هر شب نخوراند اگر دوشنبه و سه شنبه  
بعد مرگت جابت مملکت یام داده باز دوای مذکور نخوراند پس اگر بعد مهال این خوب مسهل تا دوشنبه هفته هم برقان را بیل نشود و باقی  
ماند درین وقت آخر حرکت بخیزد و قوی بر حکم در روز دوشنبه بارد و سه روز تقویت بگیرد فرمایند که ازین حضرت انشاء الله بسوی بها حاج خواهد شد  
و در ایام نخوراند این خوب مسهل روزانه کاز دو اخالی میباشد و سه روز ایستاد و میورا مکاتی الیوت بمش قطره همراه آب ساده حلکدر  
روزانه سه بار نوشاند و هر یک طلا سازند پس اگر دست مهال این و هشتم شکایت برقان باقی مانده و عرض آن وقت شب خوب مسهل خوردن  
و روزانه مراتب بول مثل پیاس کار بناس پیاس بیانی ثار اس پیاس سیسیاس ده گریں در آب حل کرده روزانه بعد از سه یا  
چهار ساعت نوشاند و ظاهر بدن درین مرض سرد نشود بلکه قدری گرم ماند تا که جلد از کان خود که تصفیة خون بند ریخته خارج عرق است  
قاصر نشود و بجا خود پیشغول اند و سوار کردن بیمار برگردون اسپس بهتر است و هرگاه سنگ در بستر سوار کردن ولی است در غذای بسیار  
باید که شورایی قیق لحم بان چپائی یا نان چپائی همراه شورایی برمی مونگ یا شیرب منجته خوراند و اگر نان بخیخته پاره باقی در  
مثل کدوی دراز و خیار زره و خیاه سنبر و برگ بالک پنجه نخورد و اگر بدتر باشد و کچری دال مونگ تهنه هم هرگاه دم نباشد شاید  
لیکن جرم گوشت و بعضی مرغ نخوراند که ازین صوفرا زیاده پیدا میشود و هرگاه غسل کن از آب گرم غسل بهتر است ایضا باید که هرگاه  
برقان غرضی کر نیاید شود و در بعض ضعیف گردد که بسبب آن غشائیدن و دیویشگی کیلول یا جلیک پودر و غیر مناسب حال نباشد  
درین وقت بهتر است که علاج از او خفیفه نمایند این نحو که بیک رنگیشیا سفاس چهارم شود و سفاس و دارم سنگیشیا  
کار بناس یکم پیاس سیسیاس شنگی کا شکیکم نیمیم درم شنگی کا شکیکم یکم در آب ساده شانزده دانس حل کرده و دو دانس زیرین و او  
هر روز بعد سه ساعت بنوشاند و اگر سه سال زیاد کن یک یا دو دانس آن بنوشاند اگر از نیم سال زیاد شود بعد یک یا دو دانس  
بنوشاند تا که برقان دفع گردد و اگر ازین بهتر نفع نشود بعد بنوشاندن آن چند روز ایمونیامیوراس از پنج گریں ده گریں روزانه  
سه بار تنها همراه آب ساده یاد گیرد و نیمه مناسبه نشاند و اگر بعد مهال آنهم ضرورت مهال شود و دای سابق بعد یک روز حسب ایت  
اول بنوشاند و اگر بعد از نیم برقان باقی ماند ایویدا شیا سلیم زنه تا پنج گریں و زنه همراه او نیمه مناسبه یا تنها همراه آب ساده بنوشاند  
**باب چهارم در امراض طحال** فصل اول در تشنج طحال بد که طحال در شکل خوشل نصفه اند با قلات  
بر کب است از غشائی آباد که بالای نسبت وزیر آن غشائی ریشه درست که آن لدن الجوه برشل جمله صفی که در صغیر شیوه این  
در جسم طحال منتشر شده و از انتشار آن طحال مثل خانه گمش مثل بر خانهای کثیر است یک شریان از شریان عظیم که خون از دل گرفته  
بسوی بدن میرود پدید آمده و طحال می یابد اینجا از آن شاخهای کثیر جدا شد و در جسم طحال منتشر گردید و اندرون اغشیه مذکور  
و در میان شاخهای شریانین مذکور گوشت ملائم میشود و نیست لیکن خاص طحال ثابت نشده شاید که در طبع دم قدیمی باشد  
و یک ری که که از جماع او را وصفه که بسبب بازگشت شاخهای شریانین اصل میشود پدید آمده و از طحال جدا میگردد و دیگر او را که

باب چهارم در امراض طحال فصل اول در تشخیص طحال

فصل اول در درم طحال

از مده و امعاء بزرگ و در جگر و در مقدار طحال کم و زیاده میشود مثلاً هرگاه طعام در سرد نباشد طحال جگر میگیرد و وقتیکه مده  
از غذا امتلی باشد درین وقت کبیر میشود و مقدارش زیاد میگردد و بعد خوردن طعام بکثرت ساعت مقدار طحال زیاد میشود و هرگاه  
بر ظاهر بدن سردی غالب شود و خون زیاد بجانب خلل میل کند و مقدار طحال کبیر میگردد و لند از تب بالزهره هرگاه مده و خارج شود  
میشود و درم طحال حاض میگردد و زیرا که درین وقت بسبب سردی خارجی خون در طحال زیاد میگردد و فی الحقیقت بن هم غده است  
لیکن که ام جبری ازین خارج نمیشود چنانکه از کبیر گرده و بلبله خارج میشود و این غده مثل غده های است که در کلوید باشند و در درم  
گنیکه متورم میشوند پس آنچه در کتب طبیعیه برین نوشته اند که یک جبری از کبیر طحال می آید که از آن سودا از کبیر طحال میرسد و یک جبری  
از طحال بمقدار آنکه از آن سودا را وقت خلای مده در مده میریزند از جهت عاری خواهد بود و قنکر فصل دوم در درم طحال  
و این درم حاد و مزمن میباشد و اول بیان حاد کرده میشود پس بدانکه گاهی در طحال نقل میشن یعنی درم حاد عارض میشود و اسباب  
گاهی تب بالزهره و وقتی سفیدی و کمزوری خون در زمانی رسیدن صدقه ضرب بر طحال بسبب محدث آن میشوند علامات جمعی  
این جمعی گاهی شدت گاهی خفیف است لیکن این بود درم طحال در بود و هرگاه اکثر از دست غمزه کنند و زیاده میشود و نقل جالط  
همیشه اندر وضع قبض بود و اشتیاقی طعام ساقط و قلیل عطش یاده باشد چون پلک برین را بر داشته بر بنید یکس میسرین چشم  
زنگ میزند و هرگاه دست بر محل طحال نهاده از انگشتان بر آن ضرب خفیف رسانند آواز جهم صمت میزند شود و باطله هرگاه نقل جالط  
در درم جالطی محسوس شود و جالط لازم بود باید دانست که درم طحال حاد میباشد علاج اول ده دوازده عدد رو حسیپانند و  
از غیر وضع درم از جالطی دیگر از بدن بر نیارند چنانکه در کتب عربیه طبیعیه مکرر شده میشود که فصد گیرند زیرا که این کمزوری در خون زیاد  
خواهد شد پس بعد از مسهل قوی برین مثل سنگین یا سلفاسک سه چهارم درم همراه آب نوشانند یا کتول همراه سفوف جلی که چون خورند  
و مکرر مسهل بپزند و در یک روز چند بار و هم چند روز نوشانند تا که سهال قیق شود و بهر دو تلیکین طبع لمخوطه اند یعنی چنان و امی لیکن  
خورانید باشند که روزانه اجابت بلینت شود و موضع شکم نماند و تخم گمان ساینند با یک گرم سرشته بر پا و او در بر تمام شکم چسبانند و  
بر محل طحال زیاده غلیظه ضام و سازند چون بعد از تعال این خنما دم در باقی ماند از دوائی کنتاروس ضام و دست کرده بر محل طحال  
نهند تا آنکه پیاپی شود و روزیکه مسهل میرسد هرگاه اثر دوائی مسهل قطع شود همان روز بعد مسهل کنین بمقدار کبیر مثلاً از ده گریه است  
گرین خوراک که از آن جوش خون بسبب جمعی سرد و بر طرف میشود و چون که معده درین ضعیف میباشد پس اگر بسبب ضعیف  
کنین اقبل نکنند و از راه قوی دفع کنند درین وقت قدری سلفیکو کیش یا سو و اکار بناس همراه کنین بپزند تا در معده قائم ماند  
انجام این من نیست که از علاج هیچ شود یا سو و و هم من متقل گردد و آب کبیر شکم پیدا کند و از آن آثار است و ظاهر میشود و  
مخصوص قوی است که نقل میشن طحال تا غشائی آید از سرد و درین وقت در شکم زیاده میشود و بیانش امراض معالجه میشود  
تعالی اما هرگاه سو و هم من متقل شود درین وقت علامتیکه در نقل میشن نوشته شده اند ظاهر شود و لیکن خنما دم در و چنان قابل بود  
که بر اشتیاق از آن بیان نمیکند لیکن مقدار طحال بسیار غلیظه و یکم در درین وقت سفیدی و خون غالب میشود و خون خفیف

مکمل





که جدا جدا هم نهادند و بیش از این باشد که اثنا عشری عرض و وسیع است به نسبت صایم و صایم هم زیاده عرض است به نسبت غنی  
و این بر سه معای صغار که باند از چهار چرخ اول در جانب داخل میوکس میبرن است و بالای آن غشای ریشه دار است و  
غشای ریشه دار شش این عروق صغار و مجاری کیلوس ساخته بود که بر یکدیگر ترقوه است جای که در تریز و راس درید صاعده است  
متصل شده اند و بیانشند و بالای غشای ریشه از عضلات اند و آن بر دو صنف اند یکی در جانب عرض که در امعاء واقع اند لیکن آنچه که  
همه اند اینها یک عضله نباشد بلکه عضلات صغار بسیار است که بوی یکدیگر بر تمامی دیگری شروع میگردد و اما چون در بادی  
نظر دید و میشود چنان محسوس میشود که یک عضله برگردان محیط است و این صنف که در جانب عرض است از صنف ثانی که در  
آنده اند بسیار صنف ثانی از عضلات بالای عضلات صنف اول که دایره اند و طول معانی آنده اند و بالای این عضلات غشای  
آب دار است و جای که معای اثنا عشری با معده متصل شد بر محل اتصال آن عضله که در آنده بسیار ضخیم غلیظ است و بسبب غلظت  
وقت هم غده معده این منفذ نباشد و همچنین جای که معای صغیر با قولون که معای کبیر متصل گشته بر محل اتصال آنها  
غلظت در عرض معای دوران است که بسبب غلظت آن بخانه تنگ شده و در میوکس میبرن معاد جهت عرض چین با بسیار  
لیکن برخلاف چین میوکس میبرن معای بسیار در معده چین در جانب طول است و در امعاء جانب عرض فایده چین که  
در عرض واقع شده است که بسبب آن طعم در امعاء گشت و قیام کند و این چین میوکس میبرن قولون جای که آن متصل به معای  
صغیر است زیاده است مرتفع است بسبب ارتفاع آن بر این منفذ شل دروازه پیدا شده و فایده آن نیست که آنچه از معای  
صغیر قسم بر از فضول در قولون می رود آنرا مانع نمیشود زیرا که دافعه معای از اعلی با سفلی دفع میکند پس از قوت امعاء این فضول  
این دروازه را کشاده و در قولون میشود لیکن آنچه در قولون است آن بسبب منع کردن این دروازه با علی بسوی معای  
نمی رود چه ازین سو قوت دافعه از سفلی با علی دفع نمیکند که این بر از قوت قیام حرکت قسری بسوی علی نماید و صاعده شود و این  
در حال صحت هیچ چیز در معای صغار از قولون نمی رود اگر میرفت همیشه بوی بر از از دهن می آمد و باعث کدر است طبع هر یک  
و از آن در قیام تمدن شوار می فساد و پیکشتی لهذا حکیم قیام قیام را پسند نفرمود و لیکن حال مرض هر گاه معای صغیر زیاده  
منتفع میشود آنرا از این منفذ اتصال کشاده میگردد و آنچه در قولون است در معای صغار می رود و چنانکه در قولون شل میشود  
بالای چین میوکس میبرن غده های کوچک بسیار در بعضی جای که یک تنه او در بعضی جا مجتمع مثل ستارگان یافته میشود در  
غده های صغار عروق شش این مجاری کیلوس دارند و متوسط این غده های کیلوس مجاری خود می رود و چنان غده های شل از  
کیلوس میکشد بالای میوکس میبرن معای صغار اجسام صغیر بسیار شل گاه و ریز بر روی آند و چنانکه نبات از میوه و تخم یک  
هر است که میشود و اینها هم متحرک میشوند و همیشه حرکت می نمایند لیکن حرکت اینها در طول معای از اعلی بسوی سفلی میباشد  
فایده این حرکت آنست که آنچه طو بات در معده می رسد پیش میفرستند و کجا استقر شدن نمیدهند تا غده های پدید  
آند که شلند و غده های کیلوس مجاری خود را در امعاء خالی شوند تا غذای دیگری در معده و در قولون است و قیام شل

ورک در جانب بطن شروع شده بالا میرود تا که بجزگیر میرسد و از آنجا منتهی طاف شده از زیر معده تا طحال میرسد از آنجا نازل شده  
تا خلف مثانه می آید اینجا است که مستقیم شده تا مقعر می رسد و شریان از شریان عظیم که از دل خون گرفته بدین میرساند پیشتر  
با معای صغاره قولون می بیند لیکن آنچه از اعلی شریان عظیم است آن حصه صاعده قولون که پیشتر نگفتیم و حصه رست قولون  
جانب عرض که کثیرا انشعاق می یابد و حصه اعلی معای می رسد آنچه از سفلی شریان عظیم است با معادله حصه نازل قولون می باشد  
است و بایلی عظیم می رسد و او را یکله زینها خارج میشوند با ویدیکه از طحال مقدر می بیند شامل گشته همه یک ریگ کثیرش پنج درخت شده  
جگر می رسد اما باعتبار مواضع سهای آن نبربان لاس مختلف اند چنانچه جایگاه متصل معای صغیره در دوازده فیما بین کبیر و صغیره  
شدن میوکس می بین قولون سپید گشته از اینجا هر قدر که بر در دوازده رجعت سفلی است آنرا نبربان لاس میگویند که بدین مناسبت  
فتح کاف و سکون می بیند و غائی مندر و همین جاز قولون یک معای صغیره پیدا شده که تا سه چهارم از آن طول پیدا شد بقدر قلم نشانی  
ضخیم منفذ آنهم مثل مجری قلم میباشد آخر آن مضموم و مسدود است اما کار آن بت نباشد و شاید که در همین باشد و هرگاه بلند شده  
از اینجا تا جگر و برابر معده می رسد شریک قولون بکسر لاف و سین مملو سکون فی فتح دال هندی و سکون فی کاف فارسی و جوی  
صاع قولون می نامند هرگاه بعد از باز منقبض شده تا طحال میرود آنرا اثر انس ورس قولون بکسری هندی می فتح رای مملو  
و سکون لاف نون سین جمله فتح و او و سکون را و سین جمله یعنی حصه رست قولون در عرض فی مندر و چون از اینجا نبربان لاس شده  
و می باشد که قولون بکسر دال هندی و سکون یای تخانی و کسر لاف و سین و سکون فی فتح دال هندی و سکون نون و کاف فارسی  
حصه نازل قولون بنیامند چون باز خلف مثانه رفته تا وسط شکم میرسد و آنرا که کبیر میگویند و سکون کاف و فتح تاسی هندی  
سکون می بیند مستقیم نامند و نام کردن آن مستقیم را راه حقیقت نیست بلکه نسبت حصه ای دیگر آن اضافی است و آنچه در معای  
صغاره است از آن قولون هم مرکب است یعنی میوکس می بیند غشای ریشه دارد و عضلات و غشای آبدار در آنهم موجود بود لیکن عضلات  
طویل درین معای غلیظه اند و در جبهه طولی آمده چنانکه در جبهه عرضی قطع است مخفوط و مضبوط دارند و چون عضله طولی آن قطع  
گردد و طول قولون از کشاوند چنانچه یاده گیرد و لیکن فترت در معای کبیر صغیره نیست که غده ای که بالای میوکس می بیند قولون  
متفرق میباشد از آنجا که جمع نبوند و هم آنچه جسم فیصل کاه و زیر میوکس می بیند معای صغیره پیدا شده در قولون نبود و جمیع حشا  
غشای آبدار محیط است باین منطکه که بالای هرگز خارج هم منبسط است و در شکم داخل شد بر یک عضو جدا جدا جمع یک گشته است  
و بعد از نیکه بهر عضو و اما احاطه کرده و هر یک از اینها را فیصله افشان واقع شد که ناره ای آن از هر دو طرف عضو با هم دو تا شد بقا ظاهر شده  
آن مشدود و مرتب شد اندک بسبب شده و ارتباط آن بقا ظاهر شده و اما در لغاف غشای مذکور بجای خود پیدا شد  
و هر قدر که جسم این غشا در ربط و شد و بعد از با بقا ظاهر کار می یازد احاطه معادله ای است آنرا نبربان لاس میگویند که بدین  
فتح سین مملو سکون فی فتح تاسی هندی و کسر لاف و سین مملو سکون یای تخانی یعنی غشای که در آن معادله پیدا شده و شریان  
در معای آید اول در مسنری و ثانی میشود چپ و لغاف معای پس آن خل نازل شد و معادله شش شش شش شش و درین

جامع شفا فی افاد و کما یجوز  
تشریح اعضا  
این معای  
صغیره  
قولون  
است و آن  
در آن  
مشتان معای  
کبیر است  
که در غیر است  
چون این  
نیز خود را  
نیز در مثانه  
یا قوت میشود  
و فی الحقیقت  
آن بستیم  
است که در غیر  
انسان بسیار  
طویل میباشد و این  
معای مخفوط و مضبوط  
سیک که است که  
چون این که  
میشود و درین





از خضار و دغای طب یکروز در میان حادث میشود و هم چنین عفت لازم که هر روز در آن زیادتی و کمی ظاهر شود و در وقت خاص  
قسم بندی نمی شود و رسیدن سردی بیدن مثل اینکه هوای بسیار سرد و بیدن سردی باشد و این کبار در اسعای صفای  
از آن حیاتی که بید و نوشیدن دغای مسلسل قوی خوردن غذای ناموافق و هم خوردن دغای سبیه بر وزن آن طفل اسباب  
قریب حاصل آن واقع میشوند علامات آن در در تمام شکم و خارش بود و سهال بار بار و جلد جلد میشود و سهال بر وزن  
بلغم گاهی سفید گاهی سرخ آلود بود و گاه خون هم آن مختلط باشد و تپاخ در شکم بود و یکین وقت تیز درین ذیست در و مختل  
نباشد چنانکه در خبر بود و همی هم خفیف بود و لیکن اگر در هم زیاد بود و تپ هم شدید می باشد و زبان سرخ بود و هرگاه این مرض  
با طفل عارض شود سهال جلد جلد آید یا اول قی آید من بعد سهال پیدا شود و چنانکه پیشتر نوشت شد اینچاهم در سهال قوی  
بر وزن آن شیرخوار بصورت تغییرات و همراه آن بلغم گاهی سفید گاهی سرخ و گاهی خون آلود بود و اکثر در اطفال همراه سهال است  
یا آب سبز یا بلغم خون می آید و اکثر اطفال بسبب در و معده میگردانند زیرا که طفل امکان نبود که از زبان خود شکایت در و شکم  
لیکن از ذیست آن میگردانند و خواب نمی آید و همی هم عارض میگردد و حشش یاده می باشد و زبان خشک بود پس اگر این حالت دو سه  
روز بر آید بسیار از غرض ضعیف میشود و درین وقت گاهی در و ماغ ضداد پیدا میگردانند و از آن بر لبه خوابیده ماند ظاهر شود  
که خواب یاده است تا آنکه در این حالت میموشی بر آن طاری شود و هلاک گردد و گاهی از شش ساعت تا ده ساعت هلاک میشود  
و اکثر هیچ هم میگردانند و علاج اول سبب مرض در یافتن کنند بعد از آن که ممکن پروازند و علاج عام نیست که تدبیر مرض  
موزید نمایند پس اگر در و شکم باشد چنانکه زیاده بود بر آنجا زوچسپانند و بعد بنزد شدن خون از آب گرم گرم میکنند و یا پارچه  
خلال و آب گرم تر کرده و شوره روغن زیتون بر آن پاشند و محل در و بندند تا تخم کتان باریک سوده قدیمی خردل که سبب حله  
کتمان بود آن یا گرم کرده و آب گرم برشته بر پارچه آلوده بشکم چسبانند و اوپیکا کوانا از جام حصه نصف گرمین فیون خالص  
نصف گرمین تایک گرمین و پخته زردگرین تایچ گرمین سفوف کرده بعد سه یا چهار ساعت خوراند و چون در و شکم متوقف  
شود و سهال باقی ماند دغای مقوی میگردانند مثل گالک لیش یا نانک لیش همراه افیون خوراندند یا اکثر کشته سفید  
یا لیکوکه صمغ ذیابک است و نمایا همراه افیون خوراندند یا طین قیو لیا هم آن میزند و هرگاه سهال سبز زیاده شود بهیچ راجع که کشایا  
از چهار گرمین شمش گرمین طین قیو لیا و سفوف ذودرس و پنج گرمین همه با هم تخمیه سفوف کرده روزانه سه بار خوراندند و تخم  
سبک مثل آرد و شیر ماده گاؤ و شجونی بریان و خوربای تخم که قیق بود خوراندند و در علاج اطفال اول نظر کنند که اگر سبب این  
غذای ناموافق یا شیر حیوانات باشد و ای قهر کنند و شیر صغیر تخم قلیل و تغذیه در وقت زیاد جمع نشود و الا سهال  
خواهد شد اگر قهر را نمیکند نبود شیر و خر و شاند آب ساده یا آب آهک یا شیر گاؤ و تخمیه بنوشانند و اگر از بروز و ندان شای  
تغذیه وسیع است بهیچ صلاح غذا نمایند و پارچه خلال در آب گرم تر کرده فشرده بشکند و طفل بنده و بهیچ راجع که کشایا و زنده گردانند  
و همین قد طین قیو لیا و اوپیکا کوانا دو گرمین همه با یک سوده سفوف ساخته شش حصه نیم کنت و یکیک حصه نیمین سفوف

چهار ساعت بطول خوراند و اگر سه سال زیاد آید و دم کم شده باشد کته سفید صمغ کمالین قیو لیا از هر یک دو سه گرمین گرفته  
 باریک ساینده سفوف کرده بخوراند یا تنک ایش و گاه کثیف است یک دو گرمین شانه و اگر پنج و ده سال نباشد و کلون و گرمین و  
 پلباسی ایشیاس یک گرمین نبات سفیدش گرمین بهر اب با هم تخم سفوف ساخته چهار حصه سازند و بنده و دو ساعت یک یک حصه  
 ازین و ابطل خوراند و باید دانست که بر این نسخه اعتماد بسیار است و بعد تجربه کامل سید است قد کرده اما آنچه از دم میوکس میبرین  
 قولون افتد و از پیش یعنی سحج اسهال مانند و اینهم بر دو قسم بود حاد و مزمن پس هر گاه حاد بود و حالش آنچه در شرح دیده شده است که  
 دم و تمام میوکس میبرین میباشد در بعضی مقامات سرجی بود و بعضی جاها از او میوکس میبرین غشای جدید فیصله کرده و پدید میآید  
 و چون این غشا را بر در میوکس میبرین مثل گوشت سرج از زیر آن نمایان میگردد و غده های که بر میوکس میبرین میباشد در بعضی  
 متورم میشوند بسبب آنکه ماده دم از میوکس میبرین آنهای افتد و از افتادن این ماده در غده ها آنچه پدید میآید اول نیست که در آنها و دم  
 پدید میآید و در بعضی آن نقل شدن حادث میشود پس نکته شده ملائیم شوند و دم از آن با خارج گردد و بعد خروج هم زخم شکل مایه و بعد  
 غده یافته میشود و این زخم کسی چنان عمیق میباشد که تا غشائی آید بر میسر و از آن در غشائی آید بر هم زخم پدید میآید و چون باین حد  
 در نقل شدن حادث میشود و علامات دم آن موجود بودند اکثر غشائی جدید که بر میوکس میبرین پیدا میگردد در اسهال خارج میشود  
 زخم آن بر پشت لولائی در عرض میوکس میبرین قولون یافته میشود و یکین این زخم طولی منطبق و عمیق نمیشود و بعضی ضعیف است  
 دم در غده های کوچک معالیه ای میهم یافته میشود و هر گاه این مرض دو سه هفته ماند و بعد آن بیمار بپاک شود و آن آثار سخت این مرض  
 یافته میشوند از این بابت میشود که چنانکه در خارج بدن جروح میخورد و باطن معده هم راحت لایق صحت است و درسی دم جگر  
 و بیکه کبد با این ضعیف میشود و خواه یک تل کبر بود یا متعدد باشند و درین صورت در اطفال اختلاف است که آیا مرض معده از مرض کبد  
 پدید میآید یا مرض کبد از مرض معده حادث میگردد و وقت نیست که هر دو در هیچ اندکاهی از دم جگر دم قولون حادث میشود و گاه  
 بالعکس از اسباب سبب سابق کمزوری نیست بهر سبب که باشد و گاهی این مرض بطور امراض افده و با عارض میشود و آن  
 اسباب اصله آن برودت هوا و غذائی غلیظ یا ناموافق طبع یا میوه و تره های خام مثل خیار و خیاره بنبرست هر گاه بی طبع کوفه بخورد  
 و در کبد هر گاه شدید بود و نشانه آن قوی مثل رخن جب استلا طین و قهوه نیاک و کلون و تخم خنظل است علامات درین مرض اسهال  
 بار بار با بعضی تشنج اسهال میشود که آنرا هیچ گویند و بیمار وقت تیز تر گاه نشیند و تحمل مقعد در دو اذیت زیاد شود و در اسهال خون  
 با نفخ زیاد می آیند گاهی تنها و گاهی با برز و گاه گاه بخار هم میباشد و بجای قولون در و در و این مرض بسته طریقی شروع میشود اول  
 اینکه تدریجاً اسهال قوی کند و بعد اسهال بلغمی خونی میشود و دم آنکه ابتدا با اسهال خونی کند و قلیل و دردی است سوم آنکه اول قرض  
 شکم اندن بعد برز یا بس مثل بنادق با نفخ خون خارج شود و این ضعیف بود و گاهی بسیار شدید و قوی باشد و گاه  
 متوسط و اکثر نیست که ابتدا رخنه میکنند و بر روز زیاد میگردد و درسی این دم در حصه آخر قولون که دم و دم معالیه مستقیم میشود  
 و درسی ابتدا ضعیف نازل قولون که از قریب طحال شروع شده تا معالیه مستقیم میرسد و درسی تمام قولون پدید میآید و اما هر گاه در معالیه مستقیم

بسیار از میوکس



و حصه نازل قولون بود درین وقت در سهال اجزای سفید مثل راروش محلول آب و همچنین خضایی سرخ و گاهی باخون خالص رخ شود  
و حقیقت جسم سفید و سرخ نیست که آنچه بلغم از غشای متورم بدون مترج و موی خارج میشود و سفید می باشد آنچه بلغم با رطوبت  
و موی که از عروق صفرا خارج شده آن مترج شوند خارج شود سرخ بود و هرگاه این دم در حصه صاعد قولون که بسوی جگر رفته در  
حصه است آن که از ریه جگر و عرض شکم تا محل آید پیدا شود درین وقت آنچه بلغم باخون در سهال خارج میشود و با ریه مختلط می باشد  
اجزای سفید مثل خضایی میوه کس میوه کس آب سرخ رنگ که بوی آن با سهولت مثل میوه کس غساله لحم باشد خارج میگردد و در حقیقت ظاهر  
سفید اجزای همان غشای جدید بود که بر میوه کس میوه کس پیدا میشود و این مکرر در تمام قولون است یا بعضی از مواضع نیست  
بخوبی از تمام سهال ثابت میشود و چنانکه گفته شد و دیگر طریق استدلال بر آن زرد و شکم هم ممکن است پس هرگاه در بعضی مواضع قولون  
بود و دانسته شود که دم در بعضی اجزاست و چون در تمام قولون بود باید دانست که دم عام است برای قولون لیکن گاهی در دنیا باشد خصوصا  
هرگاه خون سهال زیاده خارج شود درین صورت باور دنیا باشد یا بسیار قلیل بود و گاهی بسبب این مرض اشتغال جگر و معده و گرد  
و مثانه هم امراض پیدا میشوند زیرا که این معامی که تائیر این اعضا رسیده است پس چون معده متضرر شود و واسهال عارض میشود و چون  
مثانه متضرر شود اجتناب بول یا تقطیع بول عارض میگردد و بسبب اول نیست که چون از این معاصر و دم مثانه رسد بول را  
پیدا نکند یا پیدا کند لیکن بسبب غم آن راه آمدن بول بند میگردد یا چنان کمزور میشود که از کار خاص خود که دفع بول است قاصر گردد  
و بسبب مرفانی نیست که هرگاه دم قولون مثانه هم متورم شود درین وقت از جمع شدن بول که مقدار آن زیاده میشود متادی گردد  
و خواهر که در آن بول جمع شود پس هر قدر که بول قلیل می آید از دفع میکند انجام این مرض یا نیست که اعراض سخت و قوی شوند  
بسبب آن ضعف زیاده و پیش شکلی و سیاهی زبان یا درخشندگی آن مثل سبب جاذبه و تعلق بطن ضعف سرعت نبض دوران سر پیدا شود  
و هرگاه شکلی سیاهی زبان و شکلی جلد و نهان و اختلاط عقل پیدا شود تعیین بهلاکت علیل توان کرد و گاهی جلد ملایم و متعمری گردد  
نبض طبعی شود و زبان مثل رجاخ خشنه می باشد و از بدن بوی بد ظاهر شود و واسهال بدواید که در آن غشای جدید میوه کس میوه کس  
مرد و غصه شده بر آید پس بسته است بیمار را که شود یا مرض مزمن گردد یا بسیار صحیح شود و اعراض بر طرف شوند علاج چون اول  
مریض پیش طبیب حاضر شود باید که ابتدا بخورانیدن افیون یک گرمین حب است کنند یا آب حلکوه نشانند و بعد پانزده دقیقه  
خورانیدنش پیکا کوانا زده گرمین گرمین موافق عمر و شدت مرض همراه آب صمغ عربی حب بسته بخورانش مریض آب را هم خوبانند  
پارچه بلای آن موافق فصل پوشانند و خردل سقون با بکرم سرشته بر پارچه آوده بر معده بندند تا بسبب آن قی نیاید و پیکا کوانا زده  
ناز فایده باید دانست چنانکه از دم میوه کس میوه کس میوه کس میوه کس قصبه به سرفه عارض میگردد و همچنین از دم میوه کس میوه کس  
معامی قولون جیوشین پیدا میشود چنانکه از خارج شدن بلغم زکام سرفه نازل میشوند گاه از خارج شدن بلغم در سهال دم کس میوه کس  
قولون بر طرف میشود و اصل تائیر این مرض نیست که نبردی بلغم پیدا کرده و نهنگ که تا خارج شود و چون پیکا کوانا زده بلغم کس میوه کس  
را ملایم میکند از چنانکه استعمال آن در سرفه بلغم پیدا شد و زردی در سرفه خارج میشود و از آن دم قصبه بر طرف میگردد و همچنین جیوشین





موریک در ساعت بخوردن آن روغن سیدانجیر مقدار اظلیل که دو سه درام بود نوشاند پس اگر بعد نشاندنش باز به حال جاری شود باز دو بیت قوی میوکس میبرن خوراندند و درین مرض عتقا بسوی غذا ضرورت است که سهل الانضمام قوی خوراندند مثل شیرازه گاو و شوربای تخم قزق که همراه برنج نخته یا آرد و نان لطیف خوراندند و بدن شکم را درین مرض همیشه گرم دارند که از رسیدن سردی شکم تشنج معده پدید آید و زیاد میشود و ایضا گاه زهر زهرین گرد و معنی یکم با خون آید پس بهتر است که این حب انوشانه صفت نماید ریح گرمین به سبب شش اس در گرمین فیون خاص یک گرمین با صمغ محلول باب سرشته حب های کوچک بسته در ورق نقره چسبیده و در سوراخ موافق این مقدار خوراندند و هرگاه یکم زیاد آید و خون کمتر آید این حب انوشانه طویا هشت گرمین سفوف فیون و گرمین و در یک با صمغ عربی محلول است و چهار حب بسته نگه دارند و از آن روزانه دو ناله بار یک حب نبوشاندند بعضی حکما میگویند که مقدار طویا را تا یک گرمین نبوشاندند بعضی میگویند که زیاده از نصف گرمین طویا را نه خوراندند و حقیقت است که موافق زیاتی و کمی هم مقدار طویا را اختیار کنند لیکن باید و اگر درین نوشاندند که چون این معالجات فایده ظاهر نشود و مرض قوی ماند تبدیل هوا و بلغم نمایند لیکن در بعضی از سرفه نهی برنگه اذیت نشود سوار سی راحت و آرام باشد چنانکه در سفر کجور به زیارت آرام میرند و چون حیر بر طوطی وضعف باقی ماند علاج کمزوری نمایند مثل آنکه سیوراک اندک ایلوت همراه نقع کوشا یا نقع غیش یا نقع قصبه اثر پذیرد و نشاند و چند روز استعمال این و اگر بعد آب آهین کشند نشاند لیکن آب آهین مقدار اظلیل نبند تا که سیوکس میبرن را ازین اذیت نشود لیکن فیرونی کشین سائیس از زهر بهرست این اسفوف همراه آب بخوراندند فصل چهارم در ورم امعاء که در بعضی مواضع افتد لیکن جمیع اغشیه آن میباشد مختص میوکس میبرن نبود و این ورم گاهی بقدر کیفیت یا در وقت در معامی افتد خواه در معامی صفا یا کبار لیکن اگر در معامی صغاری افتد پس هرگاه پدید میشود در حلقه غشیه رعبی باشد ازین سبب جمعی آن عظیم بود و بعضی ریح آنچه در بعضی دیده شود که است که جابجا یا در یک سرخی ورم یافته میشود و این سرخی یا زیاده سرخ مثل خون بود یا سیاه مثل خون سیاه میباشد و در که امراض معده این ورم مده و شراب یافته میشود و مواد آن بر غشای آبدار می افتد و بسبب آن معامی متصل ملتزم میگردد و گاهی در غشای آبدار آب هم مجتمع در محل ورم یافته میشود و اسباب رسیدن سردی هوا و خوردن غذا ناموافق و خوردن سردی و هم زگر قفسان و سیر میرحم چنانکه بعضی قوایل جملات فلسفی ابرامی متشویه تحقیق بعد اسقاط اصل رحم می نمایند از آن سبب جدا شده با رطوبات آنجه در امعاء حادث این مرض نمایند و هم نوشاندن سهل قوی مثل روغن سبب است یا کلون یا زیاده گرفتن سبب است مثل آنکه سفوف جلیب با بار خور و یا رسیدن ضرر به سقطة یا انسداد امعاء به سبب که باشد خصوصا از مرض قزق سبب محدث این مرض میباشد علامات در شکم زیاده بود و از غم کردن سستاین در زیاده میشود و تب هم میباشد و بعضی سیریل و صلب بود و در وجه انحراف ظاهر بود و در بطور منفص در زجر که باج بود و شکم پدید آید لیکن بهمال نباشد بلکه طبع منفص و گاهی غشای قوی عارض شود و این قوی است که مرض شدت کند و اگر علاج نگردد در آخر ناکان زمانه قرب موت است و در شکم مذکور شد بسیار زیاده و بار بار میشود و لو بکشد مثل تشنج و لیکن قوت سکون بیم در باقی ماند ضعف نفخ شکم زیاد شود و نفخ مختلف گردد

فصل چهارم در ورم امعاء که در بعضی مواضع افتد

و جلد بدن سرد شود و عرق بار آید پس در خیال بیمار میجو و گاهی قبل مردن مطلقاً در بر طرف شود و این دلیل آنست که معاشیه قیوت است آن بانی نماند و چون که این مرض شل قولنج عارض میشود در شکم شدیداً بانویه قبض شکم بود و لهذا فقره بینا ضرورت است و این طور که میشود و قولنج در بعد سکون نوبه بر طرف میشود و درین مرض در بعد سکون شکم باقی میماند و هم در قولنج از غم کردن سبب آرام می آید و درین مرض در زیاده میشود و این ملخص بای خود را کشیده تا شکم منضم ساخته میخوابد زیرا که از دراز کردن پاهای غشائی آید و شکم منضم میشود و از آن بسیار ستادی میگردد و علاج این مرض آنست که اگر در بعض قوی باشد فصد گیرند و اگر قوی نباشد زکوبه تمام محل در دانه عارضه تابست عذ چسپانند و بغیر که قفس فصد یا چسپانیدن توانا فیلو و گریز بعد سه چهار ساعت خوراندند و در روز پنج گم شود و هرگاه خون از زخم زکوبه نشود فلال در آب گرم مکرر کرده و غرق تا برین بر آن پاشند و بر آب گرم کرده باشد تا که در در مرض رفع گردد و کولم همراه افیون شروع مرض هم خوراندند و زنهاردین مرض مسهل ندهند و اگر ضرورت قطع قبض محتاج تنقیه امعاء شوند از آب گرم فصد دهند که از آن وفایده حاصل میشود و یکی اخراج فضول امعاء دوم اینکه در رسیدن حرارت آب گرم با معا آرام می آید و غشائی سبک میزند و چون ضعف در آخر مرض زیاد شود و شرب پور شربین یا شراب برائدی نوشاندند و برای مجتنب شراب میوه یا کار

باب حکمده نوشاندن و این میر آنست که بیمار در وقت زیاتی ضعف درخواست میکنند که که رام و امای مقوی خوراندند و لیکن فی الحقیقت چون بجهت ضعف میرد بپاک میگردد و فصل تخم در ورم قولون که خاص محل اتصال آن به معای صغیر عارض میشود و اکثر این ورم در جمیع اغشیه امعاء برابر عارض میگردد و گاهی مختص میوکس میبرن قولون بود لیکن اینحال هم اگر از علاج منع نگردد شود بجمیع اغشیه در چند مدت عارض میشود و آنرا پری ثقت لای شمس بلغت گر کینا مند تحقیق این لفظ در ورم کبد گذشت جائیکه این از اسباب ورم کبد شمرده شد و لا سباب پیدا شدن سرد بود که از خوردن غذائی غلیظ یا ناموافق طبع یا از خوردن اشیای صلبه و اثر ضعیف کامل یا نماند و مثل بادام غیر حادث میشود و چنان اشیای بسبب حرارت خود منضم میشوند و غیر منضم امعاء میرند و چنان بای میوکس میبرن قولون متبیس شد و ازیت بآن میرسانند و از ازیت و خلیه آن نفیل میشن پیدا میشود و همچنین ضرب و گاه بلا سبب نفیل میشن درین مقام پیدا میشود و اعلا مات هرگاه این ورم در میوکس میبرن باشد در در شکم بجای که مقابل عظم درک جانب است است پیدا میشود و از غم کردن دست در زیاده محسوس میگردد و چون نگشتان نهاده حساس کنند قدری ورم باطن یافته میشود و طبع قبض بود و چون با غشیه گیر رسیدن همه علامات هم موجود بود و فرید بران تب میشود و بر محل ورم سختی مایه محسوس میشود و بصورت دیله اگر این مرضی اعلاج نبودی نکند تمام عضلات ظاهری بطن میرسد آخر بجائی ورم سختی بدینت پیدا شود و حجم فتد و قریب فتاد و کمی حمی بالزده و نافض پیدا گردد که از آن نخته شدن ورم باطن ظاهر گردد و انجام فتاد این ورم آنست که ورم یا بسوی غل منفشود و در ورم غشائی آید که بر بطن حشا محیط است در نزد و این بسیار روی است یا بسوی خارج خراج گشته منفشود و این از اول بهتر است علاج هرگاه در میوکس میبرن ورم باشد در مجمع مرضی آواز شمش عدا نهاده عدد سبب مناسب مجمل حرارت چسپانند و از آب گرم با وادان نام آب گرم تخمیه یا بار حقه دهند و که در امعاء هستند و اسهال خارج شوند و چون ظاهر شود که در ورم رفع شد و غن بیا اینچیز چاه

فصل تخم در ورم قولون

تخیم





ساده پنجه سفوف کرده خوراندن مجرب است هم گاه که اسهال رخ گرین تازه گرین و همچنین شاتلک یسده و ورس پود و خوراندن اسهال  
الیه یسده و ورس پود و خوراندن مجرب است هم گاه که اسهال رخ گرین تازه گرین و همچنین شاتلک یسده و ورس پود و خوراندن اسهال  
که نوشته شد خوراندن و هرگاه از شور میوکس میبین معده اسهال میبینی شد باشد علامتش آنست که درین وقت بر کام زبان لب شور  
یاخته میشود و از خوردن اشیا حادی در فیه لذت میشود و اکثر شکم نموش میاند علاج شکم بر و بر این نیم گرم تا یک گرم سه گاه صاف شود و گاه  
از پنج گرم تا ده گرم و شکم فیهون ده قطره آب حل کرده روزانه سه بار نوشاند و برای مجتنب شراب سفوف و برین پنج گرم سفوف سه گاه  
گرین طین قیو لای صاف پنج گرم فیهون خالص چهارم حصه گرین فیهون خالص چهارم حصه گرین با مض  
که از شور نوبت بخوراند میوکس میبینی سید است درین وقت کاشک نقره چهارم حصه گرین فیهون خالص چهارم حصه گرین با مض  
و بل یا صمغ عربی حله آب حب بسته روزانه سه بار خوراند درین روز شکم نرسد که ازین نیم گرم میوکس میبینی صمغ خواهد شد و کاشک  
در آب حل کرده مثل نیکه دوازده گرم کاشک یک و نرس آب مصفی حل کرده زان بر شور دبان طلا سازند چون طفلین نیم سال تا  
شود سه گاه صاف دو گرم شود و کار بناس یک و گرین که ریاضی صاف یک گرم هر سه اسفوف ساخته روزانه سه بار خوراند اگر یک  
همراه این دارو بر نیم گرم گرین شریک کرده خوراند بهتر بود که مقدار قلیل آن برای حبس اسهال مجرب است پنج گرم کاشک نقره در یک  
آب ساده صاف کرده بر شور دهن طفل طلا سازند و گاهی زین اسهال حبس نیم پیا پیشود درین وقت علاج حبس نیم نوشته شد بعین آنست  
چون اسهال نباشد و غذای سهل الانضام مثل شیوه گاو یا آرد و یا شیر برنج پنجه یا شور بای لحم همراه آرد و یا برنج پنجه بخوراند  
و بدن و کم علیل را موافق فصل گرم دارند و هرگاه اسهال صغری بود و علامتشان زردی یا سبزی رنگ اسهال است با سوزش  
بودن آن کاران در مقام مقصد سوزش گاهی شور و پیا پیشود و این صغری گاهی چنان شدید میباشند که با سبزی یا شیرین میباشند که درین  
انظر طوره و غرض این لطیفه غرض ضعف نبض تشنج در عضلات و درین چنین سوزی جلد بدن زرق بار یافته میشود و فقره بینها باین  
نیم باید کرد و در بعضی بول مجتنب و درین همراه اسهال بول می یزد و بعضی صغری کمتر دفع میگرد و درین مرض صغری در اسهال و قی هر  
دفع بکثرت میشود علاج هرگاه اسهال شروع شود سهل خفیف نبشتن و غرض بیدار پنجه در مقدار اسهال است خارج شود یا سبزی  
یا سنگین یا سلفاس سه چهارم نوشاند ایضاً سنگین یا سلفاس سه گرم ایسده و سلفیکو ایلوٹ نسبت قطره تا نصف درام  
و نفوق آب پودینه خشک دو اونس آونس پنجه نبوشاند از خارج صغری کند بعد یک ساعت بخوراند و این درین و افیهون خالص چهارم  
حصه گرین دو گرم خوراند تا اینکه از تولید صغری منع کند صغری زیاد پیدا نشود من بعد سلفیکو ایلوٹ آب حل کرده هرگاه نشود  
نبوشاند چون ضعف زیاد شود و محتاج غذا گردد غذای بار و سهل الانضام مثل شور بای لحم قیق یا شجوی بریان نوشاند و چون  
این مرض صغری که در بعضی مشابه شود درین وقت میونیا کار بناس پنج شش گرم باین آب حل کرده مجتنب شراب نوشاند و کسیکه از آن  
مجتنب باشد و اگر ایونیا یا کلارک نیم گرم بود و نوشاند اگر کلارک نیم نصف درام یا پانزده قطره سلفیکو ایلوٹ یا سبزی همراه  
ساده دو اونس پنجه باشد نوشاند یا ده فیهون یا ده شکم سه سال یا اگر کمتر طفلان اوقت بر و زدن آن صغری میگرد و در گاه سبزی

در اسهال

نوشاند



نوشانید شود یا شیر دریا شیر تازه زاده از قوت هضم نشاندند و درین وقت قریب بود که هم میگویند هم برین معانی صغایر با ایشان عارض  
 شود و اگر ندرک این اسهال بعلاج نکرده شود طفل بحرقت کوبیده میگردد و گاهی بچنان سیرین هم عارض میشود و اکثر وقت عرض قوع  
 فساد همیشه باسی در هوا بود و اگر این اسهال بنده نکرده شود همیشه از آن پیدا میگردد و الا سبب اطفال را از ضعف کمزوری معده و امعا که  
 خوردن غذائی موافق و اذیت برورندان پیدا میشود عارض میگردد و گاهی اول ازین اذیت دماغ متورم میشود پس از آن بدین معصا  
 اثر این اذیت بعد رسیدن از آن ضعف حاصل میشود و از آن این مرض پیدا گردد و برای سیران جوانان بچسبب همیشه سبب این  
 اسهال واقع میشوند و گاهی از خوردن دویه سهله قوییل حب استلا طین کلوم پیدا میشود و علامات در اطفال اسهال قوییل قوییل  
 در ویشو که وقت آمدن طفل اول گریه میکند اکثر این اسهال بعد خوردن غذا یا نوشاندن شیر عارض گردد و هرگاه از بروزندان درم  
 دماغ بود طفل بقیه ریختن خواب کم آید و تب بود و گریه زیاد کند و سرگرم باشد و عطش زیاد بود و چون بچنان افتد در آن وقت همیشه یل  
 بود آنرا از علامات همیشه توان همیشه از آمدن این اسهال مائی اکثر قبل از آن اسهال غذائی یا صفراوی میشود من بعد مائی پیدا گردد و در  
 کم بود و قدری اذیت بمقابل معده محسوس شود و عطش زیاد بود و اگر تا این رسید صحت نشو همیشه نباید گفت و اگر تا این رسید  
 همیشه گفتن جایز باشد و تقییری علامات همیشه بآن موجود خواهند بود و آنچه از خوردن دویه سهله افتد بران سبقت خوردن دویه سهله  
 بود و هم در آن اول اسهال غذائی قوییل و سوزش در امعاء و قین هم پدید بود و عطش باشد اگر زیاد نخورد شود علامات و هم اسهال پدید  
 علاج هرگاه با طفل عارض شود اگر سبب ضعف معده و امعا باشد شیرده کاود و حصه آب یک حصه سینه بسیار قلیل مثل یک قاشق بعد  
 یک یک ساعت شش تا نه مرتبه شل نشود و بسوختن هم گردد و قین است که سیران بیکانی شود و هرگاه در اطفال اسهال باسی سبب هم معای  
 صغایر باشد باشد در آن آب صرف در اسهال در وقت اسهال خارج میشود و بار بار اسهال مائی و گاهی خون آلود هم میباشد و درین وقت  
 نوشانیدن دویه قابضه ضرر پیدا میشود و درین وقت باید که نیل شین کاشه و ایل یک و درام حسب ضرورت بعد سه یا چهار ساعت  
 بنوشانند تا که دوائی نکرده در اسهال سیران پس ازین و اسهال قلیق طفل بچرخوف حرث سرسام غیر بود جمله بر طرف میشود و طفل  
 سیرود و چنانکه زایشیدن آب برکتش نایب در آن ساکن میگردد و چون از ستم حال برنی و درین قسم اسهال فایده صحت ظاهر میشود پس اگر بعد از  
 اسهال هم دویت ماع باقی ماند بر و مایه شپاس به بعد از این نوشاندن طفل شش ماهه بچرخوف طفل یک نیم ساله داده گردین نشانه  
 تا اذیت دماغ را کم کند و اگر ازین زن کم دهند این نفع آن ظاهر خواهد شد و صفقه ایل شین کاشه و ایل که در نیاده شود و روغن بلیغ بیکر که  
 صمغ عربی ببت گریز نبات سفید چهار درام آب نقع جوته درام سه یا چهار حصه یک یک درام از آن بعد چهار چهار ساعت بنوشانند و طفل  
 که از پنج سال کم بود و دیگر سفوف صمغ عربی سه درام سفوف نبات سفید سه درام عطر پودینه و قطره روغن بلیغ بیکر و من آب ساق  
 شش درم بهر طور شش و سه حل سازند تا مثل شیر گردد پس اگر قین ماند وزن صمغ عربی خزانید اگر غلیظ ماند آب زیاد که شش تا چهار درام  
 و اگر با اسهال مائی قدری منبری بود که یا مشی صاف از یک گریز یک نیم گریز و سبب نصف گریز نبات سفید و قطره  
 سینه سفوف درست کرده همراه آب یک بخوراند و دیگر سلفیوک ایل کاشه و ایل و پنج قطره نبات سفید و ایل که آب ساوه یک و شش

یکی چو چای خوری بعد یک ساعت بنوشانند و آنچه بسبب سردی و برزیدن آن بود در آن از نشسته را وسیع سازند و غذا قلیل دهند و اگر  
بر نوبت اندن شبگاه و آب آهک کف نمائند ایضا که کلون از یک گری تا دو گرین پلبای میسیدند و نیم گرین تایک گرین نبات سفید چها  
گرین باریک سوده سفوف چهار حصه که یک حصه بعد سه یا چهار ساعت بخوراند هرگاه بسبب سردی و داغ بود درین وقت مادم  
در مری طرف نشود و همال منع نکنند الا فساد داغ زیاد خواهد شد پس اگر این مری داغ از اذیت برزیدن بود نشسته را وسیع سازند  
و اگر قریب برزیدن بود درین صورت هم قندی خون از ریشه برآوردن بر مری مری داغ سفید است هم در وسط خلف ذن که نشخوار ظاهر  
لیکنت او پس گوش چسپانند و دوائی سرخ که نمخه آن امراض معده و فصل پنجم و هم معده گشت بنوشانند که تا حموضت از معده خارج نکند و نیم  
علاج سرسام نوشته شد بعل آردن بجا که اسهال قوی ماند علاجش زرد و حلیله سه سال که پیش ازین فصل نوشته شد نماید از دوا  
ضعیف بسوی قوی علاج تفنن نمایند هرگاه جوانان که با افتد و بسبب میضیه بود علاج میضیه نمایند آنچه بسبب سردی و داغ میسیدند بر مری  
آن فویون خوراند از اذیت معده که معده و آب صمغ عربی و آب کینه و آشجوی قوی که از جوی لایتی ساخته باشند شانه اگر در شکم یاده بود تکبید  
بطول بعل آرد اگر تا دم اسهال نباشد بعد از آن چش پیرازند از آن سه سال دم که با چربی و روغن میباشند این کمتر افتد و اکثر از ضعف بلایه  
سعا و اثنا عشری که بسبب پیداشدن مری سرطانی در آن ضعیف گشته باشد حادث میگردد و گاهی گرم هاند و گاهی سرد و میسیدند و میسیدند  
مردن خود شکم میگردد و ندر میسیدند و صفرا از انداز جگر خارج شد و معای اثنا عشری یابد و گاهی گرم نکند و ندر میسیدند و کدر انفل میشین که معای  
اثنا عشری بطور دیله منفرشته مثل بجم از جگر در معای اثنا عشری می افتد مثل چربی قطعات آن اسهال خارج میشوند و اسباب که در  
رطوبت بلایه زیاد پیداشدن نیست آن بود زیرا که در هیت طعام بسبب متعین رطوبت بلایه میسیدند و چون بسبب مری سرطانی رطوبت  
آن کم شود و این هیت که در طعام خود میسیدند و در اسهال خارج شود و هم مردن گرم هاند و کدر بلایه میسیدند و اسهال پید میگردد و العلما  
هرگاه بسبب بلایه یا معای اثنا عشری بود در آن بقیام معای اثنا عشری زیر جگر است و در محسوس میشود و قندی هم چندی از آن گشتان  
آن جا ظاهر گردد و لیکن جمی نباشد یا قلیل بود و گاهی یرقان هم حادث شود و اسهال که می آید از آن هیت بالایی آن میباشد و چون  
قدری مدت بر آن بگذرد که در شکم و در شکم میسیدند و میسیدند و چون برایش نیندوبی سختی و غل از آن میسیدند بسبب مردن گرم  
هاند و با شد در آن قطعات میسیدند اسهال خارج میشوند قیل خرج آن علامات مرض که قبیل مجمل جگر و گاهی سردی بسبب مزاحمت پره  
شکم در آن شد باشد و قندی که این چربی خارج شود و هم که گرم کرد و علاج آنچه بسبب بلایه و در آن غذا خالی از دهیت خوراند و آنچه  
علاج مرض بلایه نوشته شده بعل آردن آنچه بسبب مردن هاند و قدر در آن مصل ضعیف مثل روغن بید بخور نشاند تا ندر دمی از اسهال بگذرد  
فصل هفتم در قشقرق شکم و آنرا کانسشی پیشگین بند بلفظ انگاشتن آن خلد همال است آن عبارت است از اینکه بر از زو افق مقدار  
اغذیه کم آید یا نایاب اسباب اصل سباب بعد آن کمزوری و ضعف عضلات معا و کمی ازیت سازند میوکس میمین باشند که آن صفرا  
و از سباب قریب آن کم خوردن غذا از مقدار یا خوردن غذای همال لانهضام کثیره افداست که از آن فضول برآزی کم پیداشوند یا از  
نشستن یا وقت مقدار بر از مشغول شدن بکار دیگر مثل غرض زیاد خوردن علوم یا دیگر امور کم پیداشدن صفرا و جگر زیاد خوردن

فصل هفتم در قشقرق شکم





ماوه دوم مذکور در مجرای امعاء نه نشود و رنگ گریه و ششم گاهی از قسم قوی و ششمی بسبب یابی است و نقل مبین و دم در قیون پیش  
و از آن بلایوس حال میگردد و علامات آن در قسم اول نوشته شد و علامه وجود و بود علامه از آن اینجا قوی و عثمان قوی شد و بود و چون  
شدت کند بر اثر هم از راه قی از دهن بر می آید و در زیاد میشود و از عمر کردن بدست آید و زیت زیاد شود و بعد از آن حالت ضعف زیاد میگردد  
و بنض ضعیف و قوی میشود و غشی طاری گردد و فواق شروع میشود و باین اختلاط عقل عارض گردد و بعد از آن مرض میمیر و علامت  
اول تخلص سبب کنند پس اگر معاد و خراطیه ضعیف و و آره باشد آنرا باید چیل ندایر لایقه باز پس شکم گردد و بعد از آن برینند تا باز بر  
نیاید و اگر از تدبیر خارجیه هیچ تدبیر بالا نرود از فشر جاسکته نگی زیاد است کشاده معار بجای آن ساند و اگر تریول امعاء سبب شبا  
و ثابت شود که در امعاء دم است درین وقت علاج دم امعاء نمایند چنانکه گفته شد و اگر دم نباشد غلبا سبب انقلاب معاسونی خل  
خواهد بود درین وقت آب کشید بر یوز زرقه در امعاء ساند یا پوای کشید بر یوز زرقه شکم ساند که سبب آن معاکشاده و برینیت خود کند  
و آنچه از پیدایش آن دم سرطانی باشد در بخار و شکاری در پهلوی شکم فشر کشاده و در واره جدید بر اینی فغ شدن مضمول بر از پیدیا  
کرده و هندی تا بر از این سو دفع شد باشد و بر شکیب و فیون گرین یا کلول بایند ریت ز پانزده تا بست گرین همراه آب بعد چا  
چهار ساعت نوشاتند لیکن آخر مرض هرگاه ضعف زیاد شود فیون از کلول بایند ریت بهتر است و آنچه از حبس در آمدن امعاء  
خانه حجاب شکم قدر آن اگر بیا قبول کند بر شکاری شکم کشاده امعاء از خانه حجاب و رده بجای آن گذارد و آنچه از حبس غشائی  
بر امعاء بود لا علاج است فشر فصل نهم در دیدان یعنی کرم آن شکم بر سه قسم پیدایش می شود یکی حیاتی آن که از آن که زبان لاش آنرا  
اشکرس لبس کایدش نفع و مد الف و کون سین جمله و ککوف سکون ای جمله و سین جمله و قح لام و سکون میم قح بای موح و سکون ای جمله  
و قح کاف و سکون الف کسری بای تخانی و ال سیک و سکون سین جمله یعنی مشابه بر کرم رین ساند و دم دید آن صفار سفید مثل قطعه شتر  
سفید بود و آنرا اشکرس و ککیرس نفع و او و سکون ای جمله و کسری و سکون بای تخانی قح کاف و کسری و سکون بای تخانی و کسری  
رای جمله و سکون سین جمله مانند سوم که خوانده و آنرا شنیب یکسری بندری و سکون بای تخانی و نون قح بای تخانی و سکون الف  
بعضی فیه نامند که از آن پایش میسازند و هم در جا همای پوشیدنی بجای گوش آنرا میدوزند و و تبخیمیه نیست که چنانکه دفته پایش  
جای نشان آنچه بود همچنین که و دانه هم در از بود و ایضا و آنهم جا بجا که با میباشند که فی الحقیقت هر که آن یک که و دانه میباشد  
و آن شکل مثلث طویل بود که از اول قح بود و از آخر عریض باشد و در طویل گاهی یک گره گاهی از آنهم زیاد خارج میشود اما قسم اول  
پس آن تا پانزده آنچه طویل میشود و در غلط مثل قلم کتابت باشد و سوم یکسان بود و اکثر سفید رنگ گاهی گلایی رنگ بود و محل لید  
امعاء صفار بود لیکن وقت نشیخ گاهی در معده گاهی در قیون هم دیده شود شاید اینجا بر اینی فغ شدن آن باشد و دم در طویل  
از ربع آنچه نصف آنچه میباشد و مثل خط سفید بود و محل آن معای قح که آخر قیون است میباشد و قسم سوم در طویل گاهی تا پنج  
شش گره میباشد فی الحقیقت طول آن مرکب از دانه بای کشیده بود و آنچه از آن در آخر بود شکم آن بیضه های کشیده بود و چون این  
برین فغ گردد و بیضه های آن بر گاه و نبات چسپند شود و چون شش ضان آنرا میخورد و در معده آن داخل گردد از آن هلاک گردد و حکم

فصل نهم در بیان

پیدا میشود چون این حیوان انسان بخورد و شکم آن که دانه شود و میگردد و کسانیکه گوشت جگر حیوانات را بخورند این گرم و خشک ایشان  
پیدا میشود و تا کنون گرم این مرض نمیشود الا سبب سبب که دانه شود و گوشت جگر سبب حیات و دیدن صفات ثابت نمیشود و ظن لب است  
که بعضی آنهم همراه غذا در معده میرود زیرا که جمیع حیوانات از بعضی پیدا میشوند خواه بعضی خارج بود یا در رحم باشد بعد از رو در معده و قتی که  
ضعیف بود و این بعضی نکند با معایر سبب و انجا از بعضی حیوانات مذکور این گرم و قوی پیدا میشود و این سرد و کسانیکه غله محض  
بخورند زیاد پیدا میشوند و همچنین اطفال هم این مرض را دیده عارض میشود الحامات گاهی که ام علامت ظاهر نباشد از این که در قیاس  
خارج میشود اما هرگاه علامات موجود نباشد پس اکثر نشانی که بر محل قعد ظاهر میشود و همچنین منجرین حکم و خارش بود و در شکم و دیبا شد  
این درد بطور رانغ یاد غده یا معده و چسب میباشند اکثر اسهال عارض شود و گاهی در که ام مرض قیض شکم وجود بود و هرگاه اسهال شود قیض  
بلغم خون می آید و قیض مدرن در معده و در وقت شل چسب محسوس میشود و حال اشتیاقی طعام مختلف بود و بعضی آید و بعضی کم یا ساقط  
و کسی خواهش خوردن اشیائی را دیده که عاده می باشد غالی آبک میکند شکم که قیض میباشند و در شکم بعضی حیات شل غلوه یا محسوس  
و اکثر هوائی این بد بود و سر زبان کناره آن سرخ و وسط آن کشیف و چرک آلود بود و گاهی صاحب یدان انواب یا دانه آید و گاهی کم کن  
هرگاه خواب می آید پس اکثر نرسد از اسهال عارض میشود و بعضی قیض فتنه لعاب و درین بیل شود و کمی وقت فتنه قیض کند و صیاح نماید که این  
مرض در ننگ بصوت غصناک میباشند و در درم اعضا ظاهر و معوضا و مخصین هم بسبب کمزوری پیدا میشود رنگ دی چشم  
زرد و میکس میبرد و سبب کمی خون سفید نماید و در چشم حلقه سیاهی ظاهر شود و گاه تب هم میباشند و گاهی با حیات قی و غشیان هم  
میباشند و این مرض را مرض شرکبه یا مرض مثل صرع و کور یا دختناق هم و سرسام و کم دینا و چشم خفقان و یقان غیر هم میباشند  
العلاج اول باید که قیض و اخرج و یدان را برنگد و اگر بعد اخرج آنکه اجماعی مرض باقی ماند بیز از آن فرمایند قیض و اخرج آن  
اول باید که در خلاهی معده مسهل دهند مثل روغن بلبلخیر و طبخ سنائی مکی تا آنچه غذا کرده اند و امعاست خارج گردد و بسبب  
و دانه خوبی برود و یدان سبزین بعد و قی قاتل دیدان مخرج آن نوشانند بهترین دویه قاتله دیدان سائونائین است پس ازین و اندرو  
گرمین آنچه گرمین همچون آن سوذا کار بناس آب در حکم کرده بنوشانند روزانه سه بار در روغن بلبلخیر یا طبخ سنائله سائونائین  
سوذا بنوشانند تا آنچه دیدان مرده اند با سائل دفع شوند و برگ سنائی مکی که سیله و مقومینا و سفوف جلیق روغن تارین اینهمه و قاتل  
دیدان اند حسب مناسبت وقت ضرورت بکار آید تا گاهی استعمال سائونائین بر این مقدار که ملوق هدایت علم نوشته شد زردی در بول و  
در چشمان بیازید و میشود و از آن بیمار و پرستارانش خائف میشوند لهذا بهتر نیست که از نیم گرمین یک گرمین و از آن سه بار و سه روز و  
بعد از آن مسهل دهند و مقدار کثیرین بنوشانند اگر چه فایده آن سریع باشد این بهر حیات بوده اما برای قیض هم که دیدان صفرا نده پس  
علاج آن دویه تلخ بجل آنکه که ناما قاتل این قیض حاصل اند و بهتر نیست که تلخ باب گرم حکم کرده باز بقیه قیضه و معاسی مستقیم رسانند و برگ سبز  
و برگ شفا کو بنه و چایه و جله شیا می تلخ را همین عنوان اعمار سائیند نافع دانند و اگر مرض قوی بود و باین پیرو و درین وقت ضرورت  
آنچه در قیض اول بر قیض اخرج حیات که با نوشته شد اینجا هم نوشانند این گرم اکثر بخرج شدن باز پیدا میشود پس اگر چنان اتفاق

خارج





و بعضی میگویند که از هفتاد و سال در هند و از پنجاه سال در ولایت انگلستان ظاهر شد و محل محل ظهور آن بنگاله است و از آنجا بطور مداوم در هندستان و ولایت انگلستان پیدا و اکنون که سال دوازده صد و نود و چهارم از هجرت است تا امر کار زنده است این مرض از بلندی تا بلندی دیگر بطور سیلاب میرسد و مختص ببلد و فصل حار و بار نیست و حقیقت این مرض آنست که آنچه رطوبت در خون و عرق است بزیاده بیکس میسرین معدوم و امعاء جلد بدن خارج میشود و اسهال قوی و عرق بجای آن آب طعام از خارج در خون عرق کم نمیشود و یا نیز و هر قدر که آب در خون کم میشود خون برای ترقیق توأم خود از اعضائی دیگر آب را جذب میکند و لهذا درین مرض نیروی غوغینین نخر طریقه و چین بر جلد بدن لاغری اعضا ظاهر میشود زیرا که رطوبات از عضلات و غشائی کشیده از اعضا در خون منجذب میشوند و چون باز رطوبات در خون جمع میشوند بزیاده بیکس میسرین جلد از بدن خارج میشوند تا آنکه خون غلیظ میشود و دوران آن کم گردد و یا معدوم گردد و تغذیه اعضا نباشد و افعال اعضائی بدن باطل یا ناقص میشوند و خون صاف نگردد و تا آنکه مریض بسبب سمیه خون نا صاف خود پاک میگردد و غالب آنست که در بدن ضجاری که ریشهای شریان عروق صفرا و شریان معده و جلد بدن با هم متصل شده اند و بسبب کیلوس عروق جذب میشوند و در شریان میروند و در شریان کورتشج واقع میشوند و بسبب تشنج آنچه در عضو است خارج میگردد و این خارج عضو ممکن نباشد که آب طعام بسبب تشنج و انسداد و فواید عروق در عضو داخل شود و وقت تشنج آنچه حال این مریض پاشیده نیست که اول بدن علیل بسیار لاغر و ضعیف میگردد و در داغ و ریو و دل و کمر و گرده خون نهایت سیاه یا قهوه میشود و لیکن مثانه هیچ امانیت نمیشد زیرا که گرده بول را پیدا نمیکند و بیکس میسرین معده و معازنم و قریق بود و آنچه در امعاء امانیت میباشد مثل مطبوع پنج پخته باشد و پنجاه شخص است باینکه مریض در وقت شدت قوی سهال بمیرد اما اگر بعد و قوت شدن قوی و اسهال و شدت حمی بعد و ال این اعراض ضعیف میگردد و این مریض گاهی در معده و معازنم میسرین معده و گاهی در بیکس میسرین معده و گاهی در شریان گرده و گاهی در معده ریه یافته میشود و الاسباب سبب ایجاد فساد و هواد که اخراجی سمیه در هوا پیدا میشوند و یا بزیاده آید و روند و جلد میشوند و هم ریه و فساد و هواد اجتماع مردم کثیر در جای خاص بود چنانکه در میل و باوقایع ایستاد و عبادات اندیشه اجتماع کثیر مردم در جاهای خاص میشود چه ازین فساد و هواد قوی میگردد و زیرا که در جای مذکور از نوع عفونات پیدا میشوند و با هوا آمیزند پس هر گاه جوهر هوا فاسد یا سمی باشد فساد و هواد ازین سبب و آن زیاد قوی میشود و این اخراجی سمیه از هوا بزرگوار و شرب و در هتشتاق و بدن انسان فتنه باعلات اسباب دیگر قوی گردد و مردم مرض نکور پیدا میشوند پس اسهال قوی هم خارج شد این خبر با هوا و آب مختلط شوند و با هر که ملاقی شوند آلوده شود و فاسد کنند و همین سبب اکثر این مرض از یکی بد دیگری میرسد و آنچه اسباب اسهال در درین وقت بسبب هتد و بدن و وجود فساد و هوا زیاد و قوی میشوند و همیشه پیدا گردد و الامارات علامات ابتدائی بر یک نقطه میباشد کسی چند روز قبل از ابتلا باین مرض ضعف و اذیت محسوس میشود و باز رقیق می آید و رغبت بسوی غذا علیل طعام کم مضمم میشود و در زیر و زرق و رقت بر باز زیاد گردد و تشنگی زیاد میشود لیکن حمی نمیشد و بعد و سه روز قوی آید و آنچه در معده از قسم غذا بود و خارج گردد و بعد سهال علخ شود و سوزش و گاهی در جای معده محسوس شود و عطش شدید گردد و چون آب یا ده نوشد قوی رفع شود و عرق را در بدن شروع شود و در عضلات

باین خصوص در سابقین تشخیص زیاده غلبه شود و گوشت بدن محلول گردد و جای جای چسبن در جانشین پیدا شود و بزناختها و لبها و گاه به  
 زخم ساره ها و گاه چشم سیاهی ظاهر گردد و بخش قوی و ضعیف شود و بوی از دهان سرد و بر آید و زبان شستن و سفید بود و نفس سریع باشد  
 و در آواز محسوس عارض گردد و بول محتبس شود و کدای میاز قبل از آمدن فی و اسهال میخیزد و در عراض ظاهری نباشد بلکه در عین سلامتی فی  
 اسهال عارض شود و گاهی فقط یک فی یا یک اسهال باشد و بعضی هلاک میشود چون قوت تشنج این مریض است و در معده و امعاء تشنج  
 آتج طبعی برنج پدید میآید زیرا که این آب از خون جدا شده اینجا جمع میشود و قبل از خروج آن مریض مرده باشد انجام این مرض یا تشنج  
 فی و اسهال بر طرف شود و مریض صحت یابد یا در حال جریان آن هلاک شود و فی و اسهال نباشد و در می پیدا شود و از آن صحت یابد  
 یا کمید و یا بعد این مرض دم داغ یا دم ریه یا دم معده یا دم قویون یا دم جگر یا دم گره عارض شود و علامات آن موجود شود و چون این  
 مریض قوت شدت فی اسهال ضعیف قوی که وقت استیلا می رود و در باطن است میخیزد و تشنج دید میشود که خون منجمد در دل و در مریض  
 که اگر که جانب چپین بسیار دل اندوهم در ریه یافته میشود یعنی شرام بوز را داشت میگردد و بسبب آنجا و این خون ممکن نبود که در شرا این صفا  
 رود زیرا که راه دوران جریان آن نباشد و چون تب بعد از آنجا عارض شود و بسبب گرمی آن قدری خون قیق شده و آن آن جا را  
 شود پس قطعات خرد ازین خون تجدید یافته شرا این عروق در عروق که می رسند و در آن متنگ میشوند و گاه آنها انقباض میشوند و دم پیدا میشود و  
 در داغ بود یا در اعضا فی کبر العطال جبر گاه این مرض بجای شایع باشد و فی اسهال عارض شود پس با فیه که میخیزد شروع شده پس  
 نوزاد تب حسیل آن گوشه لیکن اگر بسبب بعضی طعام بود آنجا انتظار رفع بد بعضی طعام کرده نباشد پس نوزاد فیون و در گریب تا بوال حال  
 مثل مریض سیاه و سرخ و طبعیت کافور و مسک این هر چه میخیزد و بخت بخورند و اگر از شراب محتاط نباشد همراه فیون شراب بر اندازی از  
 آونس تا یک و نرس شانه و سلفیوک ایست و ایلوٹ یک رام با بست چار و نرس آب ساده حل کرده و قوت تشنجی نوشاند چنانکه برای  
 تسکین تشنج آب نوشاند و نشوونو یک سلفیوک ایست و ایلوٹ بست قطره کلارک تیر از نیم رام تا چهل قطره یا هفتم آتج آب ساده  
 که یک نیم آونس و هفتم ساعت نوشاند و لطف و او اگر همراه این و اشکیر لوٹ کیون نیم نیم و رام شریک کنند و نشوونو و گوارا تر  
 و اگر ازین هم اسهال نباشد و کاشک قطره چهارم حصه گرین کشر اکث بلا و نوشا تو هفتم حصه گرین حب است و بخورند بعد و دو ساعت  
 سه بار همین قدر و او را بر خورند و در میان خوراندن آن سلفیوک میهند و الا فایده آن ضایع و نقصان پیدا خواهد شد  
 بلکه وقت تشنجی شجوی رقیق یا ریز آب ساده یا تنه آب ساده نوشاند و چون سیاهی بزناختها و دیگر اعضا ظاهر شود بعد آن فیون  
 از هزار تا هزارند میند بلکه درین وقت تخمیل سوده بر بدن مالش سازند و شور باقی قیق لحم هر لحم که باشد خواه از مرغ یا بیا خضار با گاو  
 درست کرده بجای یک ساعت نوشاند و اگر فی آید از آن اندیشه نکنند و باز نوشاند تا قدری غذا با اعضا رسد ایونیا کار نباشد  
 چهار گرین آب کافور یک نیم آونس باشد حل کرده و دو ساعت نوشاند و قدری سلفیوک ایسر بر پارچه پاشیده و در هوا بویا  
 تا قوت بدل رسد و نیم گرم شود و در جبین یا پیشانی میل سه چهار قطره بر پارچه سفید زانده و قریب بینی و درین نهاده بویانیدن برای گرم  
 کردن اعضا و دفع سیاهی اطراف تشخیص تقویت نفس بسیار مفید است و این ده هفتم شل کافور است و از اول مرض کمین پذیرنده را که

سبب حدوث دم و امراضی باطنی

در مریض که در این امراض است



یا دیگر غذای بخورد و این هم سبب سختی چوب کل یا فانیسین ناقص در غده های کیلوس مذکور که خشای منبری به سبب سبب  
 چون این جسم غریب در اندام بزرگ سبب آن رگ آمد و رفت کیلوس و آن قلیل یا باند نشود و سبب آن کیلوس بخون نمیرود و دیگر سبب  
 در خون پیدا نکرد و او پنجاه و پنج خورده میشود و خون نمیرساند و در آن کیلوس پس از آن خون کمزور و ضعیف گشته غذای لایق ببدن  
 نمیرساند پس سبب آن بدن لاغر و نرین میگرد و الاضاحون سہال درین مرض میباش از آن هم ضعف و لاخری زیادہ پیدا میشود  
 السبب سبب حقیقی ظاهر نیست لیکن سبب محتمل آنی که انورده میشود که از استعداد مختاری که خاندانی بود و هم این مرض پیدا  
 و سبب فاعلی آن در آن امر مختص است اول عدم تیسر غذا می خورد و در آن غذا نایم و افقہ دوم نه تیسر شدن لباس و توافق فصل و  
 آن سیدن سردی ببدن سوم نه تیسر شدن جوای جید و ماندن طفل مکانیکه جوای آن طب بدو باشد و طفل که بیمار و در  
 نیاید و غذای یا بسہ با خوراندہ شوند اکثر این مرض مبتلا میشود علامات اول بر از طفل از حال طبیعی متغیر شود باطن  
 که گاهی قبض گاهی اینست می بین بعد اسهال قیق بدو جاری میشود و ما یخرج رقیق و سفید میباشد گویا طین قبولی آب حلو و شکر  
 همچنین ال اشتها مختلف بود گاهی یادہ گاهی کم و گاهی خواهش خوردن اشیای دیر مثل طین غیر میکند چنانکہ وقت تولد دیدن در شکم  
 خواهش خوردن اشیای دیر مینماید لیکن بہ حال با ضعیف میباشد از آنچه بخورد و آنرا ہضم نمیکند و شکم طفل کبیرہ و در سخت میباشد و چون  
 ورم غدار زیادہ شود خصوصاً کہ فرزن و کرانیات از غر کردن شکم طفل درین صم غذا ہاریر لگشتان ہم محسوس میشود و ہمراہ این علامات ریز  
 بدن لاغر و ضعیف میگردد و اکثر شکم طفل درو میشود چنانکہ در زیر میباشد نافق مینماید است کہ درین جمع شکم متغیر باشد طفل یا با  
 بسوی طین کشیدہ مینماید و چنانکہ در ورم غشائی بدار شکم میکشد کہ درین وقت ہم در می صم فرزن غشائی بدار شکم میباشد و گاهی این  
 حادثہ قوی لا عرض بود و درین سبب ہم حادثہ غشائی بدار بر روی ہلاک میشود و اشتداد مرض سختی و عظم شکم یادہ میگردد و چنانکہ در  
 سل کہنگی ہر روز می یابد و بجا ہم می نیر کہ ہر گاہ چوب کل در غدہ با ملائم گشتہ ہم میشود سبب پیدا شدن ہمیت معلوم می بین  
 اسهال قیق یادہ می آید و آن گاهی با خراطہ خون گاهی ہم و خون میباشد پس ضعف روز بروز متعذر باشد و مرض ہلاک میشود و اکثر  
 کرانیات شد سبب ہم کرانیات غشائی بدار مرض در مدت دراز میزد و اکثر این مرض فرزن میباشد گاهی در آن مرض تا پنج شش سال  
 زندماندہ ہلاک میشود و ہلاکت علیل بہ لاغر می زیادتی ضعف میباشد گاهی ہمراہ آن سل حقیقی کہ زخم پیست ہم شروع میشود چہ ہر گاہ چوب کل  
 درین غلہ ہامیر و در ہم ہیر و در آن مرض سل پیدا میشود و گاهی بالعکس اول چوب کل در رہ یا طحال ہیر و بعد درین غذا ہاریر و درین وقت  
 بعد امراض مذکور یا ہمراہ آنہا این ہم پیدا میشود و گاهی با ورم مختاری کہ در گلو تہریم این مرض پیدا میگردد و گاهی طفل درین  
 سہ سال باین مرض مبتلا ماندہ از علاج صحت پیدا بہ معرفت این مرض بسیار مشکل است چہ اکثر علامات آن بامراض دیگر شباهت پیدا  
 خصوصاً وقت بروز دندان یا خوردن غذا نایم و افقہ ہم سہال پیدا میشود و همچنین امراض حادثہ طفل کہ منہک قوت بودند مثل  
 و غیر ہم سہال ضعیف ہضم پیدا میشود و همچنین ہائیکر و نفلس ہم ضعف و اسهال حادثہ میگردد و از این ظہر کہ اکثر علامات این مرض شباهت  
 بامراض دیگر اند و از ان شکیانہ در تشخیص واقع میشود لہذا بیان علامت فرقہ ضرورت و آن نیست کہ شکم طفل و دیگر امراض سہال غایر و لا



و این غشائی جدید بر ماهی چسبیده میگیرد و پس و امر درین صوم وقت تشنج یافته میشوند یکی آب قوی که آن گاهی صاف مثل آب چاه بود و گاهی سفید که رباشد گویا طین قهویلیا آب محلول است و گاهی سفیدی آن مشابه بکرم مخروج آب باشد و دوم غشائی جدید اول نرم و لزج مثل صمغ محلول آب میباشد بعد غشائی سبک و آلسابک رسیدن حجم چنانکه شکلی صمغی صریح قسم تیره و کار و شمشیر را یکا هم چون از قرن خود زخمی سازد و از رسیدن صدقه ضرب و سقوط و از رسیدن سردی خصوصاً عوارات را وقت جریان حیض اتفاقاً ساقط شدن محل این مرض زیاده حادث میشود و از زیاده نوشیدن مسهل قوی مثل عن حبالتا طین و کلون و حبالتا از سگافه شدن زخم معاینه گاه جمیع طبقات آن شکافند و آنچه در اعصاب درین غشای نرود و کاک انفجار شانه و مجتمع شدن بول درین غشای دوم مشابه که بعد از برون سنگان آن بذر فیض و تنکاری پیدا میشود و هم از درم کبد هر گاه هم از آن بعد انفجار است بر این غشای نرود و از طحال هر گاه آن بکدام سبب شکافه شود و خون از آن خارج شد بر این غشای نرود و از درم معاینه گاه و در آن از میوکس میبرن تا غشائی خارجی آن عام شود تا این غشای نرود شکافتن بطن چنانکه برای صلاح امعاء بعضی قصاصم قوی گاه و علاج نوبت شکافتن بطن میرسد هم هر گاه از آن سوم بر کار برای خراج مائیت و شکم حجم میکنند این مرض پیدا میشود و گاهی صحت این مرض خفناق حجم یافته میشود و علامات مرض بر پشت خوابید ماند و پاها را بسوی شکم میکشد تا سبب آن شکم متشنج شود و نفس ضعیف متواتر باشد بر چه بیمار از تحراط و ثقل و اذیت ظاهر بوند و نبض سریع و دقیق بود و اکثر با صلابت باشد مثل تار آهن تنبیه است شکم غلیظ میشود و از غیر کردن بدست از آمدن سر قوی از تنفس غلیظ از آمدن عطسه و زیاده میگیرد و زیر که از این امراض ضطکاک بعضی توهم زیاده میرسد چون بیمار بر پشت خوابد این وقت شکم بالای ناف قریب معده انگشتان ده صوت بطن دریافت نماید و این موضع آواز جسم جوف ملو هوا که آن معاند محسوس شود و بر پهلوی و زیر ناف و از جسم صمت شنیده شود زیرا که درین صوت آب زیر امعاء می پاشد چنانکه معاینه است و از هوا مسجع میشود چنانکه آب است و از جسم صمت شنیده شود و هر گاه بیمار بر پهلوی خوابد این صوت بر پهلوی که چسبیده اگر دست نهد از جسم صمت می نگیرد که آب درین پهلوی می پاشد و می خالفت آن چون دست نهد آواز مسجع میشود زیرا که اکنون امعاء این سوزی می نرود این تجربه است و شکم با درم غشای جمع است این علامات ضروری و لازم این مرض اند اما غیر لازم پس آن قی است عصب بول زیرا که هر گاه درم این غشای بالای معده و قوی می یابد و معده را غیر میکند هر گاه بالای مشابه بول بشواری می یابد و شواری بول از چهار سبب بخا پیدایش اول نیکه چون هم این غشای مشابه میرسد سبب آن پنجه ماده فایز از درم میرد از آن عضلات مشابه و باطن آن با هم می چسبند و از آن بشواری منقبض می شوند دوم آنکه گاهی از درم غشائی که این عضلات مشابه هم متورم شد مثل مفلج از حرکت باز میماند سوم آنکه از شدت در شکم بول را شکم هم پنجه بر اراقت بول معین می شود ازین فعل خود باز میماند چنانکه در خیالت بول هم پیدا میشود و از آن بر نمی فاع کردن بول حاجت بسوی قوت قوی اعی میشود و چون در خیالت قوت ضعیف میباشد پس عدم قوت هم شواری در آمدن بول پیدا میشود و از پنجه از خفناق حجم می افتد و آن را بر پا می نمود و را بسوی شکم میکشد زیرا که در خیال درم نیاید هم او از جسم صمت اینجا از شکم می نگیرد زیرا که اینجا هم در شکم غشای نرود و کاک

آنست که شکم نهد و ناله کند که قدری نمی گزید و رفته رفته زیاد اظهار اذیت میکند و اگر تقریر شود که شکایت کند انجام این مرض یا است  
که عوارض شدیدی رفته رفته در پنج شش روز بر طرف شود و صحت گردد و یا اینکه مریض بعد از آنکه کمی میخورد و حالش نیست که گاهی از شدت شش  
ساعت نادیده روز میخورد و گاهی زیاد مدت میکشد و علاج اگر مریض قوی باشد قضا گیرند و شکم جای که صلابت در زیاده بود  
پسپانند و کاول فیون خوراند تا که دهن خوش گشت چون خرم زون بشود و پارچه فلان باب گرم تر کرده نشود و روغن زیتون  
پاشند از آن تکیه سازند و اگر در زیاده بود ویرانی شکم جمع فیون دو یک گرمی گیرند و میان مدت خوردن فیون کاول خوراند و آن  
زیادتی مقدار فیون اندیشه نکند زیرا که سبب سختی و شدت مرض است فیون کمتر ظاهر شود و اگر مریض ضعیف باشد و آن قصد  
نگیرند و عوض آن تعلیق کوثر شکم اتقان نمایند و عوض کاول بر خوراندن تنها فیون کتفا نمایند که بعد و دو یا سه تا یا چهار چهار  
ساعت و یک گرمی از خوراندن باشد زیرا که خوراندن کاول برای بریدن استیصال غشائی جاری بوده و چون که مریض ضعیف  
ماده هم ضعیف کم میباشد که لیاقت تولید غشاند از بلک از آن هم تنها پیدا میشود و کاول هم از زیاده میکند از چوبت آنرا در اینجا  
کون مناسب دیده ترک واجب کرده همچون خرم زون شک شود درین وقت چنانکه برای مریض قوی بنابر تکیه سازند اینجا هم موافق  
آن انتقال نمایند و آخر مرض هرگاه شدت اعراض کم شود پلاستر زینش که بر شکم نهادن آب شکم کم گردد و درین وقت زمار مسهل نهدند  
منظرت بلکه دوا سی مدر البته نوشاتند و غذا وقت شدت مرض نیز نیست بعد حصول افاقه و خفت اعراض اگر مریض قوی باشد  
و اشتها زیاده بود چنین غذا دهند که از آن خون قوی گرم پیدا نشود مثل نیلکه آروغ یا ساگو دانه همراه آب پنجه بخوراند اگر مریض  
ضعیف بود بر آبی بن غشائی که سهل الانضام مقوی بود مثل شوربائی هم یا شیر محروم آب ساگو دانه همراه شیر خوراند تا که  
این هم کرانیک یعنی مریض بود و خواه از اول باشد یا بعد کیوت یعنی حادث مریض کرانیک شود پس درین وقت که از اول ضعیف مریض پیدا  
اکثر حدود آن بسبب چوب کل میباشد از خون جدا شده اینجا افت چنانکه در دیگر اعضا و امراض آنما مثل و طحال پیدا میشود  
و مخصوص همین غشا بود و اعضائی دیگر نبود و گاهی همراه امراض دیگر اعضا مثل و طحال اینجا هم می آید و مریض میکشد و تغییر  
دیده میشود که درین غشامثل و اندامی که بعد یافته میشود و غالباً کبصل محل آن غشائی ریشه آر بوده باشد که مولف از عروق شش  
است و آن غشا و غشائی که باریدنی است لیکن بسبب برآمدگی و توان چنان ظاهر میشود که در غشائی آبدار است و گاهی که مریض  
از مریض غشائی که مذکور شد کسی مرض سل مریض هم غشائی آبدار پیدا میشود و این قوی بود که نقل میشین میوکس میبیند امعا  
تا هر غشائی دیگر که بالای آن در امعاء هستند بر سر از مریض مجموع اغشیه معا غشائی آبدار هم متوجه میگردد و هم از رسیدن سر  
وضع این مرض پیدا میشود و علامات چونکه مرض ضعیف است علامات اعراض آنهم در اول چنان خفیف بودند که استلال  
انسان بر مرض شوار بود لیکن با شکم زیاد قدری شخ و عظیم میشود و قدری در آن در و اذیت میباشد اما چون مرض شدت  
گردد قوت گیر و اعراض ظاهر شوند و از انگشت و نایز ناف شکم و از جسم صحت می آید و روز بروز مریض لاغر و ضعیف میگردد و پس  
قدری بخار ظاهر میشود و بر اطراف حرارت محسوس گردد و چون شکم عظیم شود و جمیع قوای شکم حرارت اطراف بر مریض طعم پیدا گردد

علامت غشائی که هرگاه با شکم از مریض در میان است چون بقوت خود کند که شکم میکشد و شادی میشود

درین



دلیل برشته کردن آنست که درین مرض باکست علیل است لیکن اگرین هم سبب رجم میوکس میبیند اما مطالبات درین وقت عوضش نش  
شکست سال بود و هرگاه آب درین غشاء زایده مجتمع میشود نفوس شواری میباشد زیرا که معایب سبب اجتماع آب بالا میزند و معاده کوکب  
غیر میکنند این همه بر دشواری است که آن سیر قلب از حرکت مراحت میکند و انداختن نفوس شواری در حرکت قلب عارض میشود  
چه وسعت محل حرکت هر دو تنگ میشود و ازین و ضرر که نفوس حرکت قلب هستند درین کمال متادری میباشد اگر این درین علاج  
رفع نکرده شود مرتین عشی کرده هلاک گردد و علاج اگر از اول در جای شکم در دوختی باشد بران کوچسپانند و بعد خشک شدن رجم  
از آب گرم روغن تارین یکسازند و چون در دم شود پلاستر زینش گیس بار بار مانند زینش آب شکم کم شود و او دویه دره بول نشا  
و هرگاه رجم پلاستر رفع گردد در هم ایوین شکم تمام سازند و روغن ماهی سرپ نفیری ایو و این بعد گشتن ساعت بر خوردن  
غذا خوراند و ایو و ایند پلاس پنج گرین تنها یا با سیکو که شانزدهم حصه گرین باشد همراه آب حل کرده بانقوع قصب الزمیره یا بملو که  
دوای تلخ شل آب مله نوشتند تا مدت دراز زیرا که مرض فزین است و هرگاه قبض شکم باشد برای ازالان اول حقه و پسینا پنج  
پیشتر برای صاف کردن معالجه حقه های اندیه مخصوصه نوشته شد اند و اگر از آن کار بر نیاید سیس خفیف مثل سفوف جلیب کمپو  
هرگاه آنرا تحلیل نوزن باشد چون ازین تدابیر فایده ظاهر نشود آب کثیر شکم جمع بود از رز و کار که که مشهور است آب شکم برآند  
غذایی مقوی مثل لانهضام مثل شور برای لحم شیرده گا و آزار و و ساگو دانه و آنچه از تره یا در بود مثل خیار و نیازند و که  
داز و برگ پالک پنجه بخورانش فصل سیزدهم در دستن قهوان در کتب عربیه طبیه بر سه قسم بود یکی قوی و دیگر طبلی و سوم لمی  
لیکن طبلی ثابت نیست و در کتب انگریزی مذکور نیست مازنی که در آن آب شکم مجتمع میشود و آنرا بران که یک یا سیکاس بقع اند و سکون  
سین حمله وقع کاف و سکون الف و ن حمل ثانی بمغنی مجتمع شدن آن چه فراطه غشائی با دست مینامند در لغت انگلش لاس میگویند  
سینس هم گویند این آب گاهی صاف مثل آب چاه میباشد درین وقت غشاء از نفل میشنالی بود و گاهی که بر دو که قدی سفیدی  
آن مخرج بود و این سفیدی از نفل میشن سابق باشد آنرا غلط شد با لاسباب سبب آن گاهی هم غشائی بار بود و چنانکه  
مذکور شد زمانی از روم جگر هرگاه مقدار آن صغیر بر آن حطب گردد و روم سرطانی سخت که کین است در آن پیدا شود عارض میگردد  
وقتی از روم سرطانی بلبله گاهی روم عظیم و حتی طحال جایی روم گزده و هم از کمزوری خون هرگاه سفیدی آن زیاده پیدا گردد  
میگرد و علامات آنچیز روم غشائی بدافند علامات و هم غشائی مذکور در آن موجود بودند و آنچه از روم دیگر اعضا که قبل حدو  
این مرض شد باشد پیدا شود در آن چند روز زمین قدر محسوس میشود که ریزان قدی ذیبت بود و طحال خوبی بهضم نشود و اشتها کم باشد  
من بعد از بروز شکم شتف و عظیم میگردد و چون بیمار بر پشت خوابد شکم آن بالائی انگشت تنه از جسم جوف پر و جوی بد و بالائی  
هر دو پهلوی آن ریزان از رول انگشت از جسم مصمت می آید هرگاه بر پهلوی سپید بر پهلوی که دراز شد باشد از انگشت زدن آن  
جسم مصمت آید زیرا که درین صحت خاص شکم بجانب پهلوی میاز جانب پهلوی دیگر آید و جسم جوف پر و جوی از ضرب انگشت بر می آید  
زیرا که درین قضا معاینه سومی میشود شکم درین وقت در دو تنب میباشد زیرا که وجع و جوی از رولانج قلمند و درین صحت سواهی اجتماع

در وقت که آب زیاد در شکم مجتمع شود و آن زمان که نفس شوری بود و حرکت قلب هم بخوبی صلا و خشوع و زیر که محل حرکت آن  
 از اجزای شکم پر شده شکم اعضا نمی گیرند آن بسبب یاقی مقدار آب تنگ شده چنانکه پیشتر فصل سابق توضیح آن نوشته شد و بعضی  
 روز بروز را غرض و ضعف میگردد و از اجتماع و کثرت آب شکم این قدر عظیم میشود که جلد ظاهر آن مثل آینه می درخشد و عروق در آن نمایان میگردد  
 و سبب و این عروق آنست که بسبب کثرت آب شکم از اندرون اینقدر نوبت یافته فضا شکم سست است که انچه خون از سر و پا بسوی ل اندرون  
 اندرون شکم بگریزد و یکسریه رفتن آن از اندرون منجم میشود پس بدین ریشه های این رید که در جلد شکم بودند بسوی قلب میروند  
 ازین سبب این ریشه ها کثیره محسوس نمایان میشوند و چون خون درین وقت پایا به شوری و تاخیر می رود و اندک از طول کثرت آب کثیر  
 از خون عروق جدا شد و گوشت پایا میزد و پایا متورم میشوند و همین سبب سست شدن رقی و دم در پایا یافته میشود و چه و دست  
 نبود و این مرض بچهار مرض مشتبه میشود مثلاً هرگاه مثانه در عرض حبل البول عظیم متورم میشود این مرض شایع گردد و هم با  
 غشائی آید و در هم از مرض ویرین در اسپس بلغم سکون او اول و کثرت و ثانی و سکون یابی تخمائی و کسری حملیه قمع یابی تخمائی  
 و سکون و کثرت هندی قمع رای حملیه و سکون الف و بای موهن فارسی کسین حملیه و سکون یابی تخمائی که بعضی مجتمع شده آن  
 در او ویری که محل خائید شدن میفرم عوار است هم از حمل هرگاه در حمل آب کثیر در رحم پیدا و جمع شود چنانچه فقیر کیبار  
 زنی را دید که وقت حمل شکم آن بسیار کبیر بود و وقت ایستادن اول آب چنانکه از دهن مشک میزد و از قش جاری شده و در آن  
 خایفانه نزد حقیر آمده بیان کردند آنها را تعلیم میکنم که در من بعد مخاض جاری گشت حبس پیدا شد هم هرگاه از احتباس حوض خیار  
 خون حیضی جمع شود و مرض جاپید گردد هم بلتبس میشود و درین وقت تفرقه باین نحو کرده شود که در مثانه که از احتباس بول  
 پیشاپیش قلقلی می آید یا نه آمده باشد درین مرض احتباس بول نباید باشد و هم آنکه هرگاه انگشتان بر نشانه زنند و از جسم صمغ  
 وسط بطن محل نماند نشانه است تنهائی نیا از هر دو پهلوی از جسم محبوس هوا در می آید که در احتباس بول آب در مثانه فقط میماند  
 و شکم نام نموده و اگر مرض بسبب حمل خود بنظر نیکی قطر قطره از بول بار بار می آید بگویم که بول بسیار می آید و سخت شک تشخص  
 واقع شود درین وقت قاعه طریقه در مثانه انداخته افراج بول کرده تجربه بکثرت تالیقین حاصل شود زیرا که در صوت احتباس بول آب خلل قاعه  
 بول آید و خواهد آمد و از آن عظم مثانه بر طرف شده و در سست شدن ثابت خواهد شد از ورم غشائی آید و تفرقه بعلامات مختصه آن که می  
 و در و غیره اند کرده شود و از مرض ویرین تفرقه باینطور کرده شود که اویرین از یک جانب خاص که جانب یمن یا سیار عاده است  
 شروع میشود و بعد از آن تا جانب دیگر میزد و هم اینک درین مرض خصیصه بویات است و تفرقه از مل باینصورت است که در حمل اول سختی  
 زیادتی خاص در وسط بطن که محل جود رحم است شروع میشود و درین جا از ورم صمغ است از زدن انگشت پیدا میگردد و لیکن در پهلوی  
 او از جسم میزد و می آید و در آن تفرقه و تاخیر باشد و هم آنکه بعد چهار ماه هر که طریقی از او از قاعه آن ظاهر میشود و چنانکه  
 در حمل نخستین و در مرض احتباس حیضی با حمل اول احتباس حیضی و در ورم آواز صمغ از زدن انگشت خاص بر حمل جمیع شود  
 و بر پهلوی او از جسم میزد و یا نشانه آنکه در ایام حمل میماند علامت اول برین کردن سبب پر از و آن از خلل و قلقلی است

پس اگر این مستقامت را در کمال یا سلب یا در یک یا در دو اعضا که مثل آنند در شکم حادث شده باشد درین وقت که مثل سلس و دیگر اعضا  
اعضای مذکور در آب شکم هر دو خارج و دفع شوند پس اگر از فساد جگر باشد درین وقت که اول چهار گرین سفوف جلیپ کمپوژن  
چهل گرین تایکت هم خورند بعد از یک کلوپل چهار گرین سفوف اسکاسنی پنج گرین ده گرین بخورند ایضا کلوپل چهار گرین سفوف  
اسکاسنی یا لایسیریم نصف گرین سفوف ساخته بعد چهار یا شش یا هشت ساعت بخورند تا که اسهال قیق شود و درین عرض  
مریض قوی بود و روزانه مسهل دهند تا که بروی آب از شکم ندریغ اسهال خارج شود و اگر ضعیف بود یک و نیمین طریق مسهل  
و یک و نیم در دست نوشاند با این طریق که پیاس بائی مارشاس از نسبت گرین نصف درم پیاس اسید پیاس و گرین پیاس شش  
پنج گرین آب حل کرده بعد از سه یا چهار ساعت بخورند اگر کور یعنی شراب مجتنب نباشد پیچ اسکولین اسپریت لیکر که نیم نصف  
نصف درم آن ضافه کرده نوشاند که از آن نفع عظیم شود و ایضا لایسیریم چهار گرین سفوف اسکولین یک گرین سفوف و دیگر  
یک گرین که لیکر بائی سانیسیس پنج گرین همه را بخت یک و نیم بعد چهار یا پنج ساعت بخورند بعد از دو روز  
باز مسهل دهند با پنجه نوشته شده و این نسخه که در آن چل شیداج است برای مستقامتی هر گاه با دم غشائی ریشه را که بزرگتر از آن  
مقدار که صغیرتر باشد زیاده فید است اگر سبب هم طحال بود در آن مسهل از سفوف جلیپ کمپوژن یک و نیم سفوف و بر یک  
درم سفوف کلبا یک و نیم و پیاس بائی مارشاس یک و نیم فیتری سلفاس و گرین همه را با یک سایند با پنجه هشت حصه کرده  
نخنداند و یک یک حصه از آن بعد شش ساعت بخورند تا که اسهال قیق پیدا شود پس اگر از اسهال قیق ضعف پیدا شود  
و دیگر مسهل موقوف است مدت موافق نشوول نباشند آنچه در آن میاید ج است تا هر که از استعمال میاید و یک و نیم طحال  
خوف انفجار طحال بسبب ضعف آن میباشد بعد نوشاندن مدت روز دیگر باز مسهل دهند و همین ترتیب اسهال و ادرا  
درین قسم هم کرده باشند تا که ماییت از شکم خارج گردد و صحت حاصل شود و نوشاندن پیاس یو و و ایندایو نیامیوراسن از هر یک  
پاتر ده گرین بگیرند هر گاه مستقامت بسبب هم جگر بود فید میباشد که از آن هم جگر بطرف میشود و ادرا زیاده بگیرد که از آب شکم  
کم میشود و نهادهن مرهم یو و دین شکم درین قسم مستقامت خواهد از جگر بود یا از طحال باشد کمال فید است لیکن اگر در هم جگر بود و جگر اگر از  
و هم طحال بود بر موضع طحال خماد سازند و همچنین مرهم بنای دایک که برگینکه ضا دکره میشود درین قسم مستقامت بر این اعضا ضا دکره  
و زیر آفتاب نشانیدن و هر دو سبب فید میباشد چون بادیه کار بر بنیاید برینان بعد تمامی دو آنچه طول بطول آید و کار  
شکم انداخته از آن آب بپزند و آن رند و وقت بیرون آوردن و کار از شکم جاری شدن آب از شکم باید که یک پارچه طول شکم  
از آنجا بپشت ببینند یا امر فرایند که دو کس سر ترا گرفته از پس پشت بطول می کشند که امحان برینانند تا که وقت بود آب  
در شکم معا بالا میزند پس اگر حفظ از فرو آمدن آنند درین وقت نکره شود پس هر قدر که آب خارج خواهد شد بسبب خلوص مکان معاف  
خواهند آمد و از آن نیز هم بنده خواهد شد خروج آب ممنوع شود و بعد از خارج آب از شکم هم عصاره یعنی شکم بر بنده تا خون عروق  
کم آید و آب کم پیدا شود و از عرض و در آن سرغشی بکیر و ثامن شود زیرا که چون وقت پیدا شدن آب شکم است از زیاده منفر میشود

و باید دانست که خوشتر از هر کسی که بدرات آتست که در خواص سیاه مرکبات سیاه پیوسته که بهر دو اشک و شراب یکدوره میشود و نفع او در دواهای ساسل بود یا نه داخل آنرا تا وی چنانکه در اندیشه منجمی

ازین سبب خون بسوی اشکام می آید چون فاخر احشای که آب است در شکم نماند از وسعت محل آنجا بر مقدار طبیعی خود رجوع کنند  
و فتنه خون کثیر این بسوی دماغ کم می شود و از غلبه آن که حفظ از آن نکند و در دماغ رسد و در دماغ رسد و در دماغ رسد و در دماغ رسد  
از آن غشی افتد و بسبب ضعف این غشی اکثر بسوی سوراخ بینی و از پیشین عصبانیه بر می آید اما آن میگذرد و غذا این در بعضی اعضا  
و در بعضی اعضا مثل شش و ریه و کبد و معده و در بعضی اعضا مثل کبد و معده و در بعضی اعضا مثل کبد و معده و در بعضی اعضا مثل کبد و معده  
مثل خیار و خیاره اینها را غشی بخوراند و در شکم می آید و از آنجا که آب است در شکم نماند از وسعت محل آنجا بر مقدار طبیعی خود رجوع کنند  
سپین جمله سکون لغت را می مصلحت فتنه کاف و سکون لغت یعنی در آمدن آب جلد بدن گوشت بدینا مندر حقیقت این مرض است  
آب از خون متوسط و قوای خارج شد و غشائی خانه دارد که در تمام بدن منتشر است هم در لحم بدن مجتمع میشود و از آن مقدار اعضا  
بدن عموماً زیاده میگیرد و خصوصیت عضو خاص نبود چنانکه در قاعده باشد الاسباب سبب آن یا زیاده ماندن خون در عروق بود که  
در دوران خود وقت متفاوت بسوی قلب بسبب وجود کد م مانع برودی صحت نکند چنانکه در مرض غشائی قلب بسبب اشتغال  
قلب خون نرسد و در مرض بوعنی استهما بسبب علو بودن این خون شدنش نیز و یا زیاده شدن آب خون بود و این قوی پیدا میشود  
که در دماغ و جلد از کار خود که اخراج نمایند از خون در عروق بول است قاصر شوند چنانکه وقت سیدان مری بر بدن می افتد و در این  
آب از خون متوسط و قوای خارج شد و غشائی خانه دارد و گوشت بدن جمع میشود یا بسبب کمبود خون بود چنانکه در دم طحال و کبد  
بر جلال و نشوان بر دو یا عوارث را خاص قوی که از فساد در لحم سفیدی در خون پیدا میشود و علامت اول زیاد  
مقدار گوشت در تمام بدن پیدا میشود و چون آنرا با انگشت نمک کنند گوی در لحم پیدا میگرد و تا دیر از آن در لحم باقی ماند و جلد بدن  
خشک می باشد و بول کثرت پیدا و بودن تب درین مرض ضرورت نیست پس اگر بیشتر که اعضائی دیگر مثل قلب گره افتد علامت  
امراض آنها موجود بود مثلاً هرگاه بسبب مرض قلبی بود طپش قلب سرعت حرکت قلب نبض توان آنرا شایه بود و اگر بسبب  
فساد ریه باشد چنانکه در ربو نفس شایه بود و اگر از مرض گره بود در محل گره درد بود و در دم و دستسقای کلوی برودی زیاده و  
عام میگرد و در آنچه ذکر فرسی خون بود و آن زبان میوس میبیند چشم سفید بودند و رنگ بدن ابل برودی باشد دیگر اسباب مثل  
امراض قلب گره بآن موجود بود علاج این سبب امراض قلبیه بود در آن مسکن دهند یا بنوعی در قسم اول نوشته شد و چنین وای  
که در آن دوی شلیس است بنوشانند الاضاله پل میزد ارج سنگ برین سفوف اسکونیل یک گیرین سفوف دوی شلیس نصف گیرین زرا  
سه بار خورند و یک و سه مسهل یک و سه روز بنوشانند تا که صحت شود الاضاله در شپاس بی بی مار شراس سبب گیرین شپاس  
و ده گیرین شپاس شراس پنج گیرین آب حلک و بعد چهار ساعت بنوشانند و چنانکه اسکونیل یا شپاس اگر نصف نصف و هم باین  
و وای در آنچه نوشته شد زیاده سفید است این سبب مرض گره بود و در آن دوی وای در دهنند بلکه مسهل قوی و سه مسهل  
سفوف جلیپ کمپو و یک و هم بعد چهار ساعت بخورند تا که اسهال قوی شود یا شپاس بی بی مار شراس نصف و شپاس آب  
پودینه حلک و بعد چهار ساعت بنوشانند که این واد ورن قلیل در دست هرگاه ورن زیاده کرده شود اسهال هم میکنند





اکثر اکثر بلاد و نادر و گریه پلپهای ایستاده و گریه ناک است چهار گریه با همیه نر جگر و ده مثل مرهم غلیظ ساخته از آن شیشه  
 بلوطی درست کرده از طرفت رایت مفصل را از اندو داخل کنند که ازین جنس هم کم میشود و هم بگردد و تشنج عضلانی اختیار می کنند  
 میشود لیکن شرط استعمال این و آنست که مادامی که از اندو داخل نشود و شکلی گلو و سوزی هر دو کشادن فیه عینه است پیدا نشود در استعمال  
 دارند و هرگاه این آثار یافته شوند بلاد و نادر نشود موقوف کرده عوض آن با رقیابا ایون درین مرهم داخل کنند ایضا اقوی منه بلاد و  
 دو گریه نایب سلوم یعنی کاشک نفور ریح گریه با کم همیه حیوان سرشته در مفصل بلوطی شایان بلوطی ساخته اند اگر هیچ علاج  
 نشود از کار و خاص که فی الجمله مقوس میباشد آید در جانب یرین آن بر سرش میباشد بر پیلوی فشرود و وسط انفرج منفرج  
 تازه چنان پیدا کنند که از آن میو کس میبرند صحیح هم زد و سوزی زخمی گردد که ازین بقیه بلا استعمال او و صحت حال میشود  
 و آنچه بسبب تشنگ بود در آن علاج تشنگانی است و آنچه و از کول و آک آب ساخته میشود و آنرا بلفظ انگلش بگوید  
 نامند آنرا بلیه زرافه در مفصل ساخته و زخم جدید را اینجا هم پیدا کنند فصل سوم در و بلیه مفصل و از آنکه انیسون بلیه  
 گویند این بلیه بر پیلوی مفصلی در غشائی ریشه از مفصل گاهی در غشائی ریشه از کبریر و در مفصل در وسط مفصل و در آن  
 است پیدا میشود سبب آن اکثر از شستن بر محل سرد و از سواری است از سیدن صدمه ضرب و سقوط و از زخم مفصل که در  
 سابق نوشته شد و از مرض سل از ورم مثانه هرگاه ورم آن تارین غشا بر سپید میشود و این بلیه اکیوت یعنی حاوی قوی و کبر  
 یعنی ضعیف و مرمن هم میباشد هرگاه قوی بود در مفصل ضربان هم قوی میباشد در دناخس بود و این در دنا مثانه و گاهی تارین  
 میرود وقت شستن درین دیت یاده بود که گاه گاه شستن مکن نباشد هم وقت سفره در زیاد میشود و چون انگشت مفصل  
 ادراک کنند که در مفصل سختی و ورم محسوس گردد و وقت تبر از دیت در زیاد میشود لیکن بعد خارج شدن بر از آنچه دیت بسبب  
 بر از شد بود و فوراً بر طرفت میگردد و مثل دیت خیم معاک بعد خروج بر از هم در آن میماند باقی نماند و ازین انسته شود که هم در مفصل  
 نیست هم بخار کم عارض میشود چنانکه از دیت و قوت ورم می آید و انجام این مرض نیست که یا برودی بخت شده و بجز گذر دیکه  
 و مرمن شود و گاهی از شروع خود ضعیف مرمن میباشد درین وقت چنان از دیت نباشد که وقت قوی و حاد بودن آن بود  
 و اکثر بلیه مرمن مفصل با مرض سل میباشد بعد مدت در از در آن هم می افتد و انجام ظاهر میشود علاج هرگاه مرض قوی بود  
 از تخم کتان یا بر آنچه دو که منضج ورم باشد بر مفصل بنده چون بخت شود بلاد و نادر خود منفرج شدن آن نشتر زده بکیم بر اندر بلیه  
 و بلیه یا بسوی ظاهر یا بسوی باطن منفرج شود و هم در امعاء افتد یا بسوی ظاهر یا باطن هر دو منفرج شود و در هر صورت از آن ناصح  
 پیدا میشود فصل چهارم در انواع مفصل و آنرا منفرج خوانند این نوعی که می بیند و قوع ناصح در مفصل آن برشته هم است  
 اول آنکه یک من ناصح یا شفت متعذر و پیلوی مفصل بسوی ظاهر و یک من آن در آخر معانی مستقیم که متعذر است بوده باشد  
 و از خارج تا داخل معاره جدید باشد و آنرا بر بان انگلش کم لپت منقح کات و سکون منفرج قیاسی موافق فارسی و کلامی و کلام  
 یاسی تختانی و یاسی بندری یعنی لپه که کامل و تمام بود نامند آن مثل کوچه نافه باشد که از اندرون امعاء برون بدن آید

فصل سوم در و بلیه مفصل و از آنکه انیسون بلیه

فصل چهارم در انواع مفصل





علاج در تمام دل گاه گاه مسیحی ضعیف هستند بعد از آب گرم خنک دهند تا نرم صاف شود من بعد از دهن بنی بصورت که در جانب  
ظاهر است کاشک نقره محلول آب که قوی بود یعنی از ده گرین کاشک نقره تا بست گرین یک لونس آب جگانه باشد یک و دوم  
بدریغی ز راقه در ناحیه رسانند یا بنگار اوین آب ساده که هر دو نصف نصف در آب باشند گرفته بهمان طور در رحم رسانند و چند روز  
بر این علاج مداومت کنند چون صحت حاصل نشود از نشتر خالص مقوس میباشند شق کنند چنانکه قعد شکافه شود و طریقی نیست که  
اول میل اندازند پس انگشت در قعد انداخته احساس کنند هر گاه بدانند که سربل در معده رسیده همان وقت کار مذکور بوزان میل  
مذکور در صورت داخل کنند تا که سر آن بر سر انگشت رسد اینک میل ایکشت و کار در پست ضابطه گرفته انگشت را بیسوی خارج  
تیرسته کشند بهر آن متعاقب این برید شکاف تا که کار بهر انگشت از قطع و شق خارج شود و رحم را از اندرون  
تا بیرون رسانند پس اگر خون باده خارج شود آنرا بنده کنند باین نحو که از پارچه خشک آنرا بپایند و چون آن بدن بند شود پارچه را  
بر وزن کار بولک یا بر وزن نخ بچیده کرده در رحم بندند اگر تخم کتان محلول آب بر آن خامه سازند تا دم زیاد نشود و چون اکثر تخم منبسط  
شود و قوی از آن باقی ماند بر آن میل کاشک نقره بمیل سبکی دست نهند تا برودی منبسط شود و صحت گردد زیرا که این تخم  
بسیار بدن برادر دردت در صحت میاید و در تمام تانی کاشک نقره قوی که محلول آب باشد بدریغی ز راقه در ناحیه رسانند تا که شکاف  
تایک ک قوی بر سر میل آلوده در ناحیه رسانند و همچنین چنانچه اوین بدریغی میل در ناحیه رسانند تا که غشائی جدید که در رحم است  
زوده دفع شود و قرح خشک شود منبسط گردد اگر از استعمال این دو بیدرین قسم صحت حاصل نشود آنرا به شق کنند باین طور که  
اول میل در ناحیه اندازند و اگر چه درین قسم میل دور بر سر لیکل از آن کاری نیست بلکه مقصود نیست که شرب را بپای معده رسانند و شق  
در قعد انداخته احساس کنند چون دانند که سربل سید آنجا قریبی سربل اخلاص تا در میکس میبیند معده تقویه پیدا شود و چون  
تقبیه جدید پیدا شود بدستور اول شق کنند و قعد این تخم میل اول همان آن قعد شق کنند و بعد از آن شق یک لونس میل او شق کنند تا که شکاف  
ظاهر بدن سانت چون جلد سید این قبیه جدید در ظاهر بدن زشت پیدا کرده باشد شق قعد شق کنند و آنچه در تخم نهفته شده باشد آنرا  
و بعد پدید آید تخم در هر قسم تخم فون یک و گرین خوراند تا حس کم گردد و از در رحم متاد می شود و در قعد از شق کردن سربل ضعیف  
نوشانند تا باز از پستی و سهولت آید لیکل این علاج قوی مناسب است که مرض ضعیف و فرس باشد اما اگر در دویم و سواد قوی  
یاد رسا و دم سطلانی که سووم بکینسر است بوده باشد درین وقت تخم پیدایکند که بخوابد شد و باعث پاک مرضی است و چون اگر  
بسیار ضعیف باشد تخم کردن مناسب نیست بلکه اول تقویه علیل کنند من بعد پیدایکند و در مرض بل هر گاه ناحیه قعد بود پس  
اولیا اختلاف است که تخم کردن جایز است یا نه زیرا که در صحت این خصوص مرض بل یاده باشد لیکل نایب قعد نیست که در حالت بود  
تخم پیر گاه مد در سرفه کرده باشد تخم پیدایکند تا که یقینی از صحت این خصوص تخم پیدایده باشد و اگر ناحیه قعد درین وقت بر آن  
تخم پیش بل پاشی است و مادام که در ریه تخم نیافتاده باشد علاج ناحیه قعد بیدریم ایجا تخم نمایند لیکل بجای آن بدن جانی  
شکل رویا بغل تخم ضعیف از نشتر پدید آید از آن بیم جاری سازند که عوض آن بر آنی تخم نیاید باشد قعد فصلی تخم در شفا فی مقدمه

تخم پیر گاه مد در سرفه کرده باشد تخم پیدایکند تا که یقینی از صحت این خصوص تخم پیدایده باشد و اگر ناحیه قعد درین وقت بر آن تخم پیش بل پاشی است و مادام که در ریه تخم نیافتاده باشد علاج ناحیه قعد بیدریم ایجا تخم نمایند لیکل بجای آن بدن جانی شکل رویا بغل تخم ضعیف از نشتر پدید آید از آن بیم جاری سازند که عوض آن بر آنی تخم نیاید باشد قعد فصلی تخم در شفا فی مقدمه

و آن عبارت است از اینکه عضله که برود و قطع شده یا میوکس میمیرن آن شتر می و ضعیف شوند خواه بسبب کمزوری ضعف یا بسبب  
 قلع بدن از آن وقت پس مقعد شتر می معلوم میشود و آنچه سختی در وقت صحت محسوس شود مفقود گردد پس آنچه بسبب کمزوری بود اکثر  
 در سن طفولیت پیری افت و قتی که زیر اسهال مزمن پیدا شوند یا بسبب بواسیر میوکس میمیرن شتر می شتابند درین وقت قدرت  
 جبرین از باقی نبود بلکه بقوت حاجت خارج شود و آنچه از اثر خوار عصب بود در سکت و وقت سیدن صدمه ضرر و سقطه بخارج که از آن  
 خارج نصف بدن را که تا درین پیدا میشود عارض میگردد علامات آنچه بسبب کمزوری بود از دیدن لموس معلوم شود که مقعد ضعیف است  
 و برانچه چهار بار در روز و شب می آید که از آنکه از معای دیگر درین معالجاتی که آن نمیشود بلاتجتماع قدری قدری  
 بر آید اگر در بیست الحلاز یا ششیدنه مقعد برین می آید آنچه از فالج عصب بود در آن کج و دست بالا داده خارج شود و بعضی از جروح  
 آنها اطلاع حاصل نباشد خبر از از آن نشود و آنچه در سکت بود و جراحی بر آن شایده بود و علاج آنچه بسبب ضعف و کمزوری وقت در آن  
 او میگوید در مقعد سانسندل نیک از آب طنج بر گنبدان یا آب طنج بر گیل یا از آبیکه در آن شب میانی حکم کرده باشد مقعد  
 و هر گاه از غنی از و بر قعده مواد سازند یا فیری سلفاس غنی میسریش چهار گریں در آب حکم کرده از آن در مقعد را قه سازند و آب آه  
 کنین فنج شاند و آنچه از فالج عصب قدری علاج است فصل ششم در خروج مقعد درین مرض میوکس میمیرن غشائی است که  
 آخر معالجاتی مستقیم بسیار غلیظ و شتر می شند از مبر وقت یا ششیدن بیرون می آید این اباحت لاسن پرتو پس این غشائی گوشت  
 شتر می شایر و در آن مقعد لکین درین وقت او معاند میشود و گاهی جمله معالجاتی مستقیم غشائی آن زاندر و منقلب شد  
 بیرون می آید اینک او معاند میشود و در آن در صنفه و خنجر شکافند و سبب آن طفلان وقت برورندان ضعیف معاند  
 باشد که از اسهال مزمن مزمن ضعیف میشوند و در کبار وقتیکه از کثرت اسهال یا خیر مزمن ضعیف شوند یا هرگاه با کمزوری و ضعف  
 تبخض شکم پیدا شود و بسبب آن وقت تبرز برای دفع کردن فضول محتاج بسوی تبرزه قوت شوند و هم بسبب بزدلیت مثانه وقت  
 پیدا شدن سنگا سل در مثانه پیدا شد عاوت میشود علامات آنچه از ضعف میوکس میمیرن غشائی است که در آن بود در آن آنچه  
 مقعد خارج میشود که آن قدری جانی خالی میباشد آنچه در آن هر سه غشائینقلب شد بر آن در آن هم گرد و آنجا خالی بود که آن اندک  
 معا بالکل مسدود بود زیرا که تمام معاندنقلب شد بر آن است آنچه بر می آید اگر در گان و گاهی بقدر ناگنی زمانی زیاد  
 از آنهم باشد قریب ج خوب سرخ بود و هر قدر که مدت بر آن بگذرد رنگ متغیر بسوی سواد میشود و اگر اندرون شکم نکرده شود آن  
 هم پاپی اشوند و بقیه ایام کرده و در علاج او آن را بقوت خروج شکم خل کتار باین طریق که قدری غن گرم بر پاچه آلوده  
 بر آن نماده و شکم خل کنند پس اگر در غش کبیرین و بعد از خل کردن مقعد فاده نماده از لنگت بندند تا وقت حرکت باز بر نیاید  
 و اگر ترخیص شکم کمزوری بموصل خفیف هندا آنچه در آن جبر نباشد و غن بیایید از غن فصل است و بعد از خل کردن مقعد در شکم پاپ  
 حکم کنند که یک ساعت بر بستر راحت دارند تا او نیت خروج و دخول دفع شود و اگر بسبب مثانه بود علاج خاص آن نماید  
 و آنچه از ویرانی تقویت میوکس میمیرن در شتر خای مقعد نه ششند که با برند و چون از و انفع ظاهر شود و اثر خاست میوکس میمیرن

فصل ششم در خروج مقعد





در معارسات یکدیگر یا کینه یا کینه سفید در آب گرم حل کرده بندریه زرافه در مقعد سازند و اینها زیاد از دیگران و به جای هم درین مری  
فصل دوا سی بانین است که درین یام برای رفع بواسیر قشر هم مستعمل میشود اما مگر گاه بواسیر دامیه باشد پس باید آن قشرینی ببردند  
بالجمله این وار از سی قطره تا یک گرم زرافه و دو سه بار همراه آب ساده نوشانند و همچنین بندریه زرافه یک گرم از آن معارساتند  
و پارچه دانه کرده بر سر گذاشته و از اغتشاش آب گرم درین قشر قشری بخون نباید ریختن در دفع عظیم حال میشود و همچنین اگر گرم  
و شستن بدن نفع حاصل میشود و بسیار فصل قطع کرده و آب جوشانیده بخار آن بمقدار سائیدن سکنجوب فصل هم در جگر  
و آن عبارت است از در و دوا ویت که محل مقعد شود و بعد از آن قدری لخم می بیند فی الواقع آن چشیدن من است که در امراض کوفه  
نکودر شد و حقیقت آن ضعف شتر خانی میگویند معبرین است که به چشیدن بعد بواسیر کوفه پیدا میشود درین من هم قوی کس نیست  
باستعمال زرد پیل چله و بهر چشیدن بواسیر بندریه زرافه برای سائیدن در مقعد شده اند و بخام هم کار آرد و گفته اند  
**باب هفتم در امراض کوفه** و آنهم مثل است بر چند فصل **فصل اول در شرح کوفه** بدانکه آنهم غده است  
که مرکب است از غده و کینه که در آن میباشند آن در بدن انسان بجهت دو تا هستند یکی در جانب چپ و دیگری در جانب راست  
و ضلع نموده و که از ضلع زور است و به پلوی فشار واقع اند و گاه جانب چپ از آن کینه متصل است و قریب بلبه مقابل حصه اول  
که آنرا استنگ لئون گویند و گاه جانب راست متصل است و مقابل دومی استنگ لئون که حصه ثانی است میباشند  
گروه دوم که در چپ بسیار است تا که همیشه گرم ماند و بسبب این حرکات صدمه ضربات غیبه متاخری نشود و خون و طماننازی است  
و صورت مشابه به تمام دانه با قلاست و در درازی بقدر چنانچه در عرض بقدر و آنچه در غلاف خود قریب یکسان بود و کلاهی  
میان یکایک جانب بسیار و طول قدری کم است لیکن غلاف آن زیاد است و در هر جوان کثرت آن از چهار و نصف و نشت تاشش تا نشت  
میباشد و زن جوان از چهار تا نشت و نفع آن نشت و بالایی کوفه غلافی است از غشائی ریشه و کرک مثل غشائی خانه و از بون  
لیکن این غلاف مثل غلاف کینه گرده داخل نمیشود چنانکه غشائی ریشه را بالای کینه کینه نخل میشود بلکه غشائی مذکور بر جری بول که  
از کوفه به نشانه زفته و آنرا بعربی حالت گویند آمده تا نشانه میرود و گویانی الواقع همین غشای جری بول یعنی حالب شده و باید دانست  
که غده اگر چه در بدن مختلف است و میباشند لیکن حقیقت غده نیست که اول صورت جری از احاطه غشای پیدا میشود پس آن سر  
صغاری نیند برای سائیدن خون این غشای را می تغذیه هم برای کار خاص که از غده صادر میشود و هر کار که باشد از اینجا و  
صغار از آن ریشه بائی شترین پیدا شد باز بسوی آورده که بار صغیرند پس بخاک در کوفه اجتماع غده است کار خاص آنها نیست که آنچه  
اجسام احب از دفع و خون بون که از فعل کینه و جلد در آن باقی مانده باشند این غده آنها را از خون کوفه همراه آب نشانه میرند  
و اجسام مذکوره یور یا یورک میشد فاسفت فلا نیم سو و او نمک آب غده میباشند که همراه بول برقی میگذرند جد شدن این  
اجسام از خون کوفه نیست که نشانه های حالت در گرده میرود آنها تا نصف گرده است میباشند من بعد پدیدار شد بالا تا آخر گرده  
میرود جای که سر بر شاخ ختمی میشود بخام و در وضعی مثل دانه انگو میشود و در آن خالی میباشد از آنچه شتر این صغار که بالای این

بسیار است که در کوفه  
فصل اول در شرح کوفه

سر جری مدور و منع می آیند از آنجا که آب صرف از خون جدا شده درین محل وسیع میریزد و چون که از سرای این شریان صغارا وارد شود  
تفرع میشود پس بعد جدا شدن آب خون قدری غلیظ شود و درین وارد و داخل میشود و این وارد این خون غلیظ را گفته اند اگر چه درین  
میفرمودند و قیاس در بازگشت این خون در او صغارا مجاری مذکوره که در گذشته است و برینست استقامت اندر سدا اینجا آنچه جسم  
غلیظ مثل یوریا و دیگر که ایستد فاسد فلانیم سو و او ناک غیر با خون تخته و متعرج باشد جدا شد درین مجاری حاصل میشود  
و آب تخته از گره بدین حالب خارج شود و مثانه می رسد و فایده تولد این جسم در مجاری صغارا حالب جایگزین است و در پیشگاه  
آب صرف و محل دفع که بالای تلافیه پیچ های این جری است است که تا آنیکه از بالا بر جری می آید همراه آن این اجسام غلیظ میروند  
و بسبب استقامت مجاری بسوالت جاری خارج اگر چه شود و از آب صرف که از بالا بر جری می آید شست و شوی آنها حاصل شود  
و اگر اجسام غلیظ مذکوره هم بجای پیدا شدند آب پیدا میشود و خروج آنها از پیچ های مجاری مذکوره دشوار شدنی همیشه در مجاری  
مذکوره انسداد عارض میشود آب ساد و بسبب استقامت خود بسوالت در تلافیه پیچ های مجاری صغارا داخل جاری میشود و حالب چون  
قریب گره می رسد عرض میگرد و چون در گره داخل میشود زیاد عرض وسیع میگردد و بنام خاص موسوم میشود و چنانچه این مقام  
را در کتب عربی بیان کرده و نیز بیان نگارش پلوس یکسر برائی فارسی و سکون لام و فتح و او سکون سین و همایه معنی طبعی گویند زیرا که آب اینجا  
میریزد و من بعد در حالب میرود و اینجا خانه های متورم و لحم سفید گرده بصورت حلشدی در تجاوید گره افتاده میشود که در ختم  
یکه بنوبه از انوبات که مجاری صغارا بول میزد و در اینجا رسیده بسوی مجاری صغارا کشیده و بدین آن بدون خردن بین مکان نیست  
منشعب میشود و از اتحاد آنها صورت لحم پیدا میشود و در تجاوید گره میزد و درین حلقه از سرای مجاری صغارا که در لحم حشر کینه  
و از سرای شریان صغارا در آنها آب از خون جدا شد حاصل میشود بر آب می افتد و جمع شد در حالب و در آن شانه میریزد  
و پلوس مرکب است از سیوس میبین و غشائی رفته از شانه های صغارا انهم که این غشائی رفته از سیوس میبین و الیکل اینچنین  
مجاری بسیار ضعیف در آخر هم است در آن تنها سیوس میبین است و این سیوس هم بسیار رقیق و نازک است و بسبب این  
وقت آب شریان صغارا در آن می افتد حالب منفذیکه درین گره داخل میشود از همان منفذیکه شریان هم از شریان عظیم که بموازات  
حقاظره در بدن آمده جدا شده همراه حالب در گره میزد و چون این شریان قریب گره میزد بر شانه های بسیار منقسم شده در گره  
میرود و این شانه ها هم بسوی شانه های ضعیف مثل شانه های صغارا حالب متورم میشود و بخوبی که همراه ششاخ ضعیف حالب یک  
شاخ ضعیف شریان در گره منتشر میشود که وقت دوران خون آب شاخ شریان مذکوره جدا شد در شاخ حالب میریزد و همو شریان  
در حالب صبی سببی بیشک هم نا آخر گره میزد و در آخر شریان صغارا را که کشیده پیداشده با هم تکیه میکند یک ریگ کشیده شد از همین منفذ  
بر می آید تا بدین گره از آن بازگشت خون بر غل بن بسوی دل میشود متصل میگردد و در حالب آخر پلوس یعنی حلقه گره شروع  
میشود و فی الحقیقت حالب پلوس واحدند و اختلاف هم باعتبار مقام است لیکن از جایگاه اطلاق هم پلوس و طبن گره بران  
تمام میشود و هم حالب بران صادق می آید از اینجا مرکب است از سیوس میبین که زیر هم است و از غشائی رفته از که بالای است



فصل دوم در امراض گردن

و از غشای صلی که در آن عضلات بزرگ هستند اندکی در طول زیر پهنه دیگر در عرض بر دو عضلات طولانی و تنوم ایضا در طول  
 آما بالائی عضلات دایره و حالب غلط خود بقدر قلم مدور و ضخیم است از گره تا شانده کسی بقدر پهنه دیگر کسی بقدر تازده پنجه  
 در طول بسیار شد و در هر لوی شانده از پس پشت آن خل میشود و جایگاه گره داخل میشود و اینجا گره غیبی قریب حلقه گره  
 یافته میشود و آن غیبی قریبی و باقی گوشت سفید بود و آن از جاری صغار حالب است و در وقت شایسته این لغبت عز  
 به قریب شریک است لغبت انگاش بلال برنی است شش یعنی منفر جسم گره گویند و گره سفید حلقه سرخ رنگ لیل بسیار پخته میشود  
 و سرخی آن بسبب کثرت شریکهای شریکین آورده میباشند از این لغبت انگاش که در کل است شش است یعنی پوست جسم گره و  
 شش شش یعنی جسم است مطافه فک فصل دوم در امراض گردن و آنرا نیربان انگاش منفر شش است که سرخ و  
 سکون و کسری است و سکون یا بی تخلفی و کسری بهندی و سکون بین نهاله یعنی ورم گره گویند و آن الیوه یعنی حاد و کسری  
 یعنی قریب جسم باشد اما هرگاه حاد بود و مریض بمیرد و آنچه در شرح دیده شود نیست که گره مثل خون بسیار رخ بود و تنوم باشد و  
 چون آنرا بشکافند از گره خون کثیر خارج میشود و در لخم سرخ گره خون پنجه یافته میشود زیرا که از عروق صغار در آن خون پنجه میشود  
 و هم درین لخم جایگاه مثل نقاط آردگی با یافته میشود که آن سرنو بهای صغار بول بودند که در آن سرنو بهای شریکین چه غار بر آردن  
 آما از خون می آید و تنوم میشود و کسری بهندی و کسری صغار بول که در حال صحت سفید میباشند درین وقت قشر شرح  
 میست سرخ دیده میشود و غشای که بالای گره بطور غلاف است متون میشود و باسانی و سهولت از گره جدا میگردد و سبب آن رسیدن  
 خمر و سقط باشد که مجمل گره رسته بهم خوردن ششایی سمیه مثل سبک بود و دای که در آن ز رایح غنی انتشار و من باشد یا رخن تا برین  
 گاه از استعمال این دو یز خارج بالائی گره ورم مذکور پیدا میشود و از پیداشدن سنگ به تمام پلوس یعنی طبل گره یا در شاخه های  
 یاد حالب گاهی از انفلیشن یعنی ورم حار شانده هرگاه ورم مذکور بدیده حالب گره رسد از رسیدن سردی بدن خواه از سردی  
 هوا رسد یا از پوشیدن لباس طبع باشد هم از در فقر ششایی لازم که نسبت به هوا عرض میشود این صم حار گره پیدا میگردد  
 علامات در مجمل گره و تنوم بود و ابتداء ای بن تپان سردی و افق لرزه شد باشد غشای بود و قی می دیده گاهی در آن  
 محل گره تا شانده و امعا سیر شد در امعا گاهی چنان در و ششید باشد که با قونج مشابه شود و این در از سرفه و عطسه قی کردن  
 زیاد میگردد زیرا که این حرکات پرده شکم یافته منفر میشود و گاهی قوت بول کردن هم در زیاد گردد و درین مرض بول بسیار قلیل  
 پیدا میشود و بسیار رخ بود و گاهی احمر قتم گردد و لیکن گاه سیاه شود و آنرا بر چرخ ریزند بر پارچه سفیدی ظاهر میگردد و خللا سیاه  
 بول بر قان که در آن پارچه زرد میشود و قوض شکم یاده بود و خصیه بالا میرد و متقلص گردد و بسبب ذیت گره و گاهی در طبع سبب  
 ضعف میوکس میبیرد معانی افتاح ظاهر میشود چه درین وقت میوکس میبیرد و غرض آب هوا پیدا میکند انجام این مرض است که  
 یاد در و تنه زدن خود و اعراض بر طرف شوند و زنده زنده مرض صحت یابد یا نرمنی که انیک گردد و در اعراض غشای ظاهر شود یا  
 بر زدن آردن تپ که بالزره و افق شد شروع گردد و با آمدن عرق مثل حمی که در ل می آید رفع شود و این علامت پیدایش



نیش گیس پلاستر درین مرض در امراض کرده مطلقا جایز نیست قند که فصل سوم در مری و کرایه گری کرده  
خواه از دم حاد حاصل شد باشد یا خود از اول مری یعنی خفیفه الاعراض بود و در آن بعد شرح میت آنچه هر شربت  
که کرده نسبت صحت صغیر میره میشود و گوشت سرخ آن سخت بسیار کم میباشد که اگر چه مواد از فصل پیشین سابق ریخته شدند  
مجاری بول و گوشت کرده را کمتر یکسبب غرض آن مجاری تنگ میشوند پس بیک از خون جدا شد و آن می گویند می یزدان  
بکرده کم میرسد این سبب این مجاری بول و گوشت سرخ کرده بود و محتج و ناقص سخت میشوند و از آن مقدار کرده صغیر میگردد و گاهی  
در جسم سرخ کرده دانه های خرد و پراکنده یافته میشود و کس می بیند همیشه غلیظ میباشد گاهی نسبت صحت بسیار غلیظ بود  
و گاهی بر آن نازخ تر هم یافته شوند و این مرض گاهی از اول مری بود درین وقت سبب آن پیدا شدن تنگ بودن کرده یا در شاخ  
آن میباشد فقط علامات آن صاف خوبی کم معلوم میشود لیکن اگر در در و در که محل گرفته قلع بول میباشد و بیار بار بار بول  
تحلیل قلیل میکنند از بول بوی تیراب می نیامد و بول بلغم لزج و اکثر هم می آید یا وقتیکه هم آید و شربت هم پیش  
حاصل اینجا هم می یابد و لا عیش و علاج آن و شواست و فایده در علاج کمتر است لیکن ای تحلیل از تیت بهر گاه در و در  
زیاده بود محل کرده را چسپانند یا حجامت با شربت نهند و آنوقت بهر وقت که بول نداشتند که  
موافق طبع عمل اقتضا از زیاده نداشتند تا از تیت رفع شود و اول اینکه پاری را بر او آکا کشی یعنی مطبوع پاری را بر او از یک آنس  
تا سه آنس بکشند ساعت یا هشت یا هشت نبو شاست این و امیوس می بیند کرده و بپوشد حالت نشانه را قوت میدهد  
و حسن آنکه می کند و ترکیب طبع نیست که بگزیده سبب پاری را بر او یک نیم آنس آنرا از کار و ورق و ورق کرده و بست آنس  
آب انداخته در پاتیله تقوی با سسی طلعی و در سه رسته تا پانزده دقیقه بر نش ملائم بچسباند پس صاف نموده آنچه نفل در پارچه باند  
بر آن آب گرم بگذارد که بشن آت و کس در حال طبع سوخته باشد بر نرند تا باز بر مقدار بست و آنس بزد و شیشه گاه دارد  
و وقت حاجت چنانکه بماند کرده شد نبو شاسته ایضا له تقوی بپو که آنرا بگویم گویند و آنهم شیشه ایست از یک آنس تا چهار  
آنس و سه بار روزانه نبو شاسته ترکیب تقوی مذکور نیست که بگزیده بپو که آنرا بگویم گویند و آنهم شیشه ایست از یک آنس تا چهار  
ده و آنس آب گرم برین ریخته سه رسته یک ساعت نماده و از من بعد از پارچه گذارند و گاه دارند و وقت ضرورت نبو شاسته  
تقوی یو و آنس از یک آنس دو آنس و از نه دو سه بار نبو شاسته ترکیب تقوی مذکور بگزیده نیم آنس و آنس یک یو و آنس یک شیشه  
ایست و لفظ یو و ابغی کنار است از می یعنی دُپ است یعنی کنار دُپ زیرا که خرس از زیاده غریزیدار و همیشه بخور پس آنرا  
سایند و ظرف نماده آب گرم ده آنس بر آن ریخته سه ظرف بند کرده دو ساعت نگه دارند پس صاف کرده و شیشه باند و وقت  
ضرورت نبو شاسته و چون ثابت ظاهر شود که سنگ کرده افتاده است همراه این تقوی شپاس کار بناس شود اگر بناس بر یک یا نه  
تا پانزده گرین حلقه نبو شاسته یا لایکه شپاسی زده تا پانزده قطره ریخته نبو شاسته و بپو که آنرا بگویم گویند و آنهم شیشه ایست از یک آنس تا چهار  
چهار گرین ده گرین حلقه نبو شاسته فصل چهارم در الیومین یوریا بفتح الف و سکون لام و کسر بای مو حلقه جسم بای تخمانی

فصل سوم در مری و کرایه گری

فصل چهارم در الیومین یوریا





کلیت و این منشی از حوض است که با آنکه تنجیر رمل و حجر پیدا میکند و این حجر بکثرت شایع است و این منشی در بول پیشین  
 نمیشود یا بعد گذشتن منشی از قدر می میرد و می نشیند اما از خوردن و این وقتیکه آنرا از طرف برآورده و بروی خوردن این اندازه  
 از آن دیده میشود که در آن هنگام خوردن مریج یافته میشوند باطله تسلیم از رمل یا حجر سبب آن بضمی طعام و زیاده خوردن شیرینی  
 گوشت زاید باشد و گاهی آن عرق بسبب سیدن سردی بطایر جلد و نه خارج شدن یورک ایشان از راه مسام جسم نکند  
 در بول زیاده می آید و همچنین گاه در جلد امراض جلدیه مثل قوایی پیدا شوند و از آن عرق کم آید و اعضا و ماییم افتد یا تغییر  
 بهم این مرض پیدا میشود علامت در دکل ظاهر میشود و این درد از گرده نامشانه واریب می آید و بول بقلبت سرخ رنگ بار بار  
 می آید همراه بول رمل سرخ خارج میشود یا بعد خروج بول بزرگ یا در شیشه این جسم سرخ رنگ را سبب میگرد و گاهی همراه بول صغیر  
 مثل اینچ سرخ سرخ رنگ یا در شیشه می آید و این علامت هر وقت یافته شود چه وقتیکه این سنگ بطن گزیده پیدا میشود  
 و همان جانی است که ران ندن آن در بطن گزیده گاهی میل که ششکایت نکند اما هرگاه در حال گزیده خارج شده بر می آید زیرا  
 از در مقام گزیده و الی آن دیگر علامت ثابت میشود که در گزیده سنگ پیدا شده اما اگر در بطن گزیده زخم پیدا کند و از آن آید  
 آن زمان علامت پنهان علامت در ورم گزیده نوشته شده انظار میشود و هرگاه حجر از گزیده خارج شده در حال می آید علامت نکند  
 میشوند و در ورم گزیده است که از حوالی گزیده سرخ میشود و غشای آن بسبب شدت ذیت عارض میشود و جلد بدن سرد میگردد و ضعف  
 زیاد میشود حتی که از شدت درد و قریب نفی می رسد و گاهی غشی عارض گردد و عرق بار و از بدن جاری میشود و این درد اگرچه لازم  
 میکند باقی و کمی در آن میشود زیرا که هرگاه بسبب بزرگی تخلیص در جبهه غالب است و می شده برای اخراج آن تشنج میشود و درد  
 زیاد گردد و چون تشنج قدری بازماند و کم میشود تا اینکه سنگ در مشانه ریزد آن زمان درد ساکن میشود و اعراض بطرف شوق  
 بسبب شدت درد اکثر خصیصه بالا میزند و این حجر در مشانه رفته خارج میشود یا از آن حجر عظیم پیدا میکند و علاج اول بر آن  
 دفع سبب کوشش کنندن بعد چینی و او پسند که از آن ترشی در بول پیدا نشود و کم کرد و شل شپاس کار نباشد سو و کار نباشد  
 و الا لیکر شپاس همراه آب ساده یا همراه سو و او اثر حاکم در نوشانندیم آنچه مرقی و ما در بول است مثل آبجو قریق و آب نقوع  
 و بل آنرا بکوشش خوب بریان کرده باشند و نوشانند و از نشانی بدن در آب گرم هم نفق برای درد کم و ذیبت حاصل میشود و چون  
 سنگ در حال آب یور و در وقت کند درین وقت بویانیدن کلار فام برای کم کردن تشنج که سبب درد است مفید باشد بلکه چون  
 سنگ گزیده خارج شده در حال آب یور و ذیبت مرو آن تشنج در بطن پیدا شده در حاد گردد و درین وقت مناسب است  
 که آب کواناد و دو یا سه گریب بعد از بیع یا نصف نصف ساعت نوشانند تا قری غشای پیدا کنند که از آن در شدت  
 این در خفت حاصل میشود و اگر تشنج گریب آب کواناد ریک و شل آب ساده حاکم در نگه دارند و وقت دوره و شدت این  
 بعد از بیع ساعت بعد کافش چائی خوری یا لیکر هم از آن مرض نوشانند بهتر است الفخ از آن نیست که وقت شدت  
 در و اثر لیکر شپاس هم گریب آب حاکم در نوشانند چون غشای شروع شود پس برای آن ماندن این حالت باشد و تشنج

و این تشنج منشی است

شماره

نشان در معده گرین را بر اینک باب ساده حاکم در معده نیم نیم ساعت نوشانیه باشند که اکثر ازین تدبیر درین در وقت پدید آید  
و چون مجرب در نشان آید و خارج نشود تدبیر خارج آن نشان فرماید بهتر است که برای آن بسیار از فرمایند که اول پیشانی خوب بکشد  
و چون بول کثیر در نشان جمع شود حشمت از دست خود بقوت بگیرد و تا بول خارج نشود بعد هر دو روز بزرگین نهاده خوب بقوت  
بول را دفع کند چون راه دفع بول مسدود است ازین تحریک مجری یاده کشاده خواهد شد چون دانند که خوب دفع شد و حشمت کشا  
بقوت یکبار بول را دفع کند تا همراه آن سنگ صغیر خارج گردد و ایضا باید دانست که هرگاه سنگ بزرگ در خارج شود و در دفع  
دفع گردد درین وقت برای حفظ آینه از پیدایش سنگ کرده این دویه را نوشانی و حشمت نیواک ایست بابت گزین نیاکار  
بست گرین باب قطره نیم و نیم آونک که اگر هم کرده باشند حاکم در معده برای سائیس یک نیم درم آن پنجه یک یک آونک زن زن روزانه سه  
نوشانی و ایضا سه سو اگر نباشد یک نیم درم بیزواک ایست چهل گرین سودا فاسف سه درم بایک از پنجه شانی صاف کرده باشند چنان  
آونک و حاکم در معده برای سائیس چهار درم آب و از پنجه هشت و نیم آونک آن پنجه یک یک آونک زن زن روزانه سه بار نوشانی  
قسمتی که در مل یا مجرب است چون پیدایش سبب آن اکثر شیخ بود یا هرگاه ریاده ضعف دیدن پیدا کرد و یا جو و دیگر کرده  
یا نشان باشد و بر آن ده این حجر نیمه مجرب گردد و از آن زن قسم پدید آید و هم از رسیدن صدمه ضرر و نقطه مجمل فقط از ناف و شش  
هم این قسم پدید آید و علامات در داخل کرده نشان نیمه وقت بول کردن در ریاده بشود و هم بول مل سفید گاهی می  
شکل آب مخرج بایست بول خارج میگردد و در بول را پنجه شش آب میونیا میونیا گاهی شل شیره در آخر بول می آید علامت غذا  
خوش بر بعضی خوانند تا اگر آید و ایلو شایسته است پنجه قطره در دو آونک حاکم در معده غذا و پنجه شش بار روزانه نوشانی اگر  
همراه استعمال این و ابجائی آب نوشانی آب طبع بار کف نشان ریاده نهید بود کسی که محبت شراب نباشد باید که قسم هم  
نوشانی آب کهن کهن و غن جگر برای برای تقویت نوشانی و در بعضی آید هرگاه وقت بول کردن دیت ریاده شود آب مطلق  
و نفی او ریاده گانه که نخدای آن و درم کرده نوشته شده اند نوشانی و قسم شش سبب آن یا بهیمل آوردن حرکات نفسانی  
زیاده مباشرت با عورت و ریاده خوردن شیرینی و بعضی طعام سیاه علامات در داخل کرده نشان و اذیت و وقت بول  
درین قسم از نیم ریاده بود و بول صاف می آید لیکن گاه در شش ریخته بارند قدری سوب نشین شود و حال مریض در خوف و گشایی  
و انضجی طبع و خوش مثل حال صاحب الخلیا باشد و شهوت باه ساقط بود و اگر ماه هم شوخ و از ایل گردد و بدن روز بروز لاغر  
شود و اشتیای طعام ساقط بود و آنچه خورد و خوبی هر قسم که در علامات ضعف ظاهر باشد علاج اول سبب یافته آنرا دفع کنند  
و شیرینی کم بنه غذای خوش خوانند و در غن جگر برای نوشانی و ایلو شایسته است و ایضا سفید است و این  
مریض در هوای صاف دارند و اگر داند و امر بر یا صحت معتدل فرماید تا در عضلات آن قوت یابد ظاهر بدن و جگر اگر مردانند  
و اکثر درین قسم مسل خفیف داده باشند و علاج تقویت تندرستی که مکرر نوشته شده نماند که فصل ششم در بول لینی و آنرا  
کیلو یا ففتح کاف و سکون بایست تخان و هم لام و سکون و او و کتری همایه ففتح بایست تخانی و سکون و بعضی بول مشاکیلو یا ففتح

در بول لینی



سبب حقیقی آن جدا ثبات در تحقیق نرسیده لیکن اکثر سوره این مرض علامت ضعف و کموری خون مثل سفیدی لب و چپان یافته  
 میشود و از این ظاهر میسر که در مرض خونی است و هم بعد خوردن طعام زیاد میشود و در حالت خافه و گرسنگی کم باشد از این ظاهراست که بعد  
 خوردن طعام گیاهان در خون زیاد میسر و پیش قشنگه خون قوی بود گیاهان را بچکوت خود فوراً میگرداند و چون کمزور بود و چک گیاهان را  
 برصوت خود دنیا را بیکه بعضی برصوت گیاهان باقی ماند و براه خون کرده رسید با آنکه کرده از خون جدا شده و میریزد و همراه بول خارج میشود  
 باطله بعد از خروج بول چون کم میماند این جسم سفید را می بیند و در آن روغن سفیدی بیشتر می بیند و یافته میشود و این جسم  
 و بعضی بلا در یاده پیدا میشود و آنجا مردمان اکثر آن مبتلا میشوند و چون از اینجا نقل کرده بماند و در اندام مرض غمگوز را میگرداند و از این  
 ظاهر میشود که آب بواسطی خاص بل در این مرض داخل است و در کالته از بعضی مریضان این مرض که خون بر آورده شده  
 در آن کرم غیر مثل بچه خرد حیات ندارد و خورده بین جسم سوس شده که آنرا فایده ای که می بیند یعنی شته باریک علامات گاهی بخیر بول سفید  
 دیگر کم شکایت نباشد اکثر بعضی شکایت ضعف و کموری مثل ضعف مضم و ضعف بدن میماند سفیدی که در بول میاید گاهی  
 فوراً مثل غشائی سفید میخورد و گاهی مثل شیر بول منجم و سیال میباشند لیکن گاه بول را در شیشه نهاده و آنرا برش گذارند فوراً  
 منجم گردد و مثل سفیدی بیضه منجم و گاهی در سفیدی جسم کالانی رنگ هم یافته میشود و سرنخی آن بسبب اختلاط اجزای و غیره  
 میباشد علاج کدام علاج خاص آن نیست لیکن آنچه قوی خون مقوی معده اندازد و قوی می باشد مثل کچر شلیل که قوی خون و کور  
 است و گاو کالک الی و از زده تا بستن کرفش شانه که قوی و تقویت عروق است هم نوشته اند که ایو دایند پیاس را چون مقدار کثیر  
 پانزده بنت گیرین در این مرض شانه بعد شست شست ساعتی فاع میشود و زیاد منفعه از آن قریه و نقل بله حاصل میشود  
 و فی الحقیقت این مرض خود شروع میشود و خود دفع میگرد و درین عرض کسی نه ندیده شده که مرده باشد فقط فصل پنجم در پیدا  
 شدن بول در گاو یا کم پیدا شدن آن و آنرا بلوغت انگاش سبب بیشین و کف یور این معنی نه پیدا شدن بول در گاو پیدا  
 و باید دانست که مراد از عدم تولد اینجا آن نیست که سبب هم گرده یا مرض بر اثر صاحب که در آن بدن توم می شود و یا مرض  
 میخورد که در آن بسبب غلط خون بول پیدا میگرد و زیرا که اینجا اسباب عدم تولد را کم پیدا شدن بول ظاهر اند بلکه مراد از این پیدا  
 شدت که بول بلا سبب کم پیدا شود و درین وقت غالب است که سبب آن استرخائی عصب میانی شکیک نه رسیدن  
 قوت عصبیه گرده بوده باشد زیرا که قوت فعال جمع احتیاج قوت عصب مذکور میباشد پس گاه که سبب شمع ظاهر شد از آن  
 دانسته شد که از زیادن قوت عصبیه گرده اینجا است پیدا شده باشد علامات اول خبر اینکه بول نیاید یا کم میاید شکایتی دیگر  
 ظاهر نبوده و من بعد از آرامی در بدن پیدا میشود و غشیان عارض گردد پس می میایک که گریه آمدن می می میباشید نیاید بعد و قوت  
 ساعت مریض مثل شمع میروش میشود و متعجب شده شمع عام بدن پیدا میکند و درین حالت می میرد و اگر قدری بول هم آمده باشد بعد از  
 بهر شش تشنج میشود زیرا که یور کالک است و یور یا چون خون جدا میشود و خون را ندر داغ رفته می ریزد این فساد میشود و این شمع  
 یور کالک میماند علاج اول مسهل است و قوی مثل روغن سیاه تله این با این میاید که یور یا یور کالک است و یور یا یور کالک است

فصل پنجم در پیدا شدن بول در گاو

و از شعله



[illegible]

بویید یا بتبله یا شکر و اکثر این فرقی مدت دراز میماند و گاهی خفیف شود و گاهی شدت کند لیکن در اول تمام آن نادر است زیرا که هرگاه  
استحسان کنند همیشه شکر در بول شان یافته میشود و مقدار بول خارج درین عرض مدت بشت چهار ساعت گاهی یک نهار آونش میسر  
در آنچه بول مشابه بوی سیب میباشد چون بول صاحب یا بطلش یا بول شخص صحیح موازنه کنند این بول بسبب اینست که  
تقییل میباشد مثلا بول صحیح را چون بحسب پیمانه موازنه کنند پس ظریفی که آب خالص که بطریق کشتید باشد نه آونش می آید و آن  
بول صحیح یک نهار در چهل آونش می آید بول صاحب یا بطلش یک نهار در هفتاد و آونش می آید باینست که استحسان یا بطلش صحیح  
ممکن است از دقیقه از راجحه و از وزن بول بول کیمیائی استحسان کنند آن بول صحیح است و بول اینک نقص آونش بول می بخشد پس قدر  
لاکیر شپاسی در شیشه انداخته بولش نه بول شکر و یا بطلش است این مجموع رنگش ابر شده و بیکر قاری بول شیشه انداخته  
قاری آب توتیا و قاری لاکیر شپاسی در آن اندازند و بول شکر و یا بطلش ازین قاری رسوب نیل بر روی در بول را بخواهند که آن  
اجزای مسمی میباشد از خصلت توتیا و لاکیر شپاسی بول شکر و یا بطلش بزرگی استحسان بول صاحب یا بطلش استحسان در آن توتیا  
و لاکیر شپاسی بول شکر و یا بطلش بزرگی استحسان بول صاحب یا بطلش استحسان در آن توتیا  
لاکیر شپاسی یک آونش در بول شکر و یا بطلش صاحب لاکیر شپاسی در بول شکر و یا بطلش صاحب لاکیر شپاسی در بول شکر و یا بطلش صاحب  
بعد دو سه قطره بول آن اندازند و بول شکر و یا بطلش بزرگی استحسان بول صاحب یا بطلش استحسان در آن توتیا  
قلیل بود بعد یک و دو دقیقه رنگ آب توتیا خاکستری خواهد شد اگر شکر بسیار قلیل بود و بیکر قاری و دو قطره بول انداخته باشند که  
بول هم آن خصل شود درین مدت بر آتش دارند چون یک گرم کامل بول در آن انداخته شود از آتش فرو آورده سرد کنند بعد  
شدن هم اگر رنگ توتیا بر حال خود ماند باید دانست که در بول شکر نیست و اگر متغیر گردد و شکر خواهد بود و ایضا باید دانست که  
بول صاحب یا بطلش سفید یا بنفشه باشد درین وقت بسبب این توتیا از آب در استحسان کیمیائی جدا نمیشود و از هر دست که  
اول باشد بهر سفید یا بنفشه بول صاحب یا بطلش در شیشه انداخته بول شکر و یا بطلش صاحب لاکیر شپاسی در بول شکر و یا بطلش صاحب  
بول مطبخ گرفته در شیشه اندازند بعد سلوشن توتیا که مستحق آن مذکور شد چنانچه در آن گرفته در شیشه مذکور را اندازند تا  
بول تنگی شود من بعد هم در ام لاکیر شپاسی در آن انداخته بول شکر و یا بطلش بزرگی استحسان بول صاحب یا بطلش استحسان در آن توتیا  
و اگر رنگ آن سیاه گردد و شکر نخواهد بود و ایضا اگر قاری خفیف گردد و بول صاحب یا بطلش نماند فوراً در بول آن جو  
می آید و از آن هوا خارج شود و بوی شراب از آن دیده شود و بیکر قاری که چنانچه چشیدن بول نباشد و او را در شستن  
و دقیقه شیرینی در بول کافی است حاجت استخوانات مذکور نبود و هم این طریقی بعد خوردن نان گندم و خجری که آن  
نشاسته و نبات زیاد باشد زیاد و متعذر میشود و علاج که در ام علاج خناس آن بدو نیست لیکن چنان طعام خورند  
که در آن اجزای نشاسته و شکر کم باشد و شیرینی مطلقا نه بماند و از سبوس گندم خورند و بپزند بهتر است هر قدر که گوشت خورند







مشابه بود از رنگ ایض مرض کلاه گره لیکن از بزار آن هم همراه رنگ مذکور میباشد بخلاف مرض کلاه گره که ایشان  
از تشنج خالی میباشد پس هرگاه که در مرض تشنج طبعی که ضعیف گردد و رنگ جلد آن مرکب از زردی و سیاهی و بخی بود و از  
نور احکم مرض مذکور نگفتند بلکه سبب تغییر لون را دریافت نمایند چنانکه نوشته شد از آن تفرقه سازند من بعد علامات گیر چنان  
کرده مرض تشنج را از غلط تشخیص در او را مانند العلاج العلاج خاص آن حال پیدا نشد زیرا که اصل سبب تا حال  
پیدا نشده لیکن بعضی میگویند که این صفت از امراض دموئید نیست بلکه از امراض سمی شیک است لهذا فاسفورس در آن دفع است  
خوارین اصل فاسفورس مقدار مناسب مثل حب فاسفورس یا ناک سیرپ چون بر یکند و بعضی آنرا از امراض دموئید دانسته و نیز  
مرکبات آهن مثل تشنج شیل فاسفورس آهن یا فیری سلفاس غیره مفید میداند و مناسب نیست که مرض ازین دو به بطور  
تفتن گاهی چیزی از مرکبات فاسفورس یا خود فاسفورس گاهی سفوف آهن یا از مرکبات آهن شایده آتخان کنند که  
در هر کدام دو که نفع ظاهر شود بر دوان آن حصار و التزم کرده شود و برای تقویت بدن تولید خون غذاییه صالحه خورند  
و در غن جگرایی با سیرپ فیری ایو و ایندو شانه در چه تقویت و همین ترطیب بن معین باشد آنرا استعمال آن رفت که  
**باب بیستم در امراض مشانه** و آنهم مثل است بر چند فصل فصل اول در شرح مشانه بدانکه مشانه اسم  
خوبی است که در آن بول از گره ریخته جمیع میشود و از آن بطریق مجری بول که در قضیب است خارج میگردد و در رجال و نسوان  
پس تشنج عانه میباشد اما در رجال پس مشانه عقب معانی مستقیم است و بآن چشم تیکه است و در نسوان عقب مشانه  
است و پس هم معانی مستقیم است پس تشنج تیکه است و شکل مشانه خلوا از آب در اطفال بجهت ناشپاتی است و در جوانان  
رجال کبار به شکل بعضی بود که طول آن عرض زیاد بود و در نسوان عرض مشانه از طول زیاد میباشد یعنی آنچه در طول شکم است  
کم بود و آنچه در عرض طبع است زیاد بود و مشانه وقت خلوا از آب قریب پنج قضیب میانند و تشنج عانه بالا نیز در جوانان  
از آب مخلو میشود بالا نیز در جوانان گاهی مشلی شد تا نوات میرسد و اوسط و معنای برای جمیع آب است که در مشانه جوانان  
آوست آب به سولت علی بود حال مرض به شواری از آن باده هم آب در آن جمیع میشود لیکن حال صحت برای جمیع آب است و تشنج  
آب طول آن پنج آنچه عرض آن سه آنچه میباشد و در نسوان موافق همین نسبت در جانب عرض طول شکم میباشد یعنی در جانب عرض  
شکم پنج آنچه در جانب طول شکم سه آنچه بود و مشانه از چهار غشای مرکب است اول که بالایی همه است و آن غشای آبدار میباشد  
که آنرا بار بطون گویند لیکن این غشای تمام مشانه محیط نیست زیرا که قریب کردن مشانه در جانب قد هم و خاستان این غشای آبدار  
دو غشای عضلی است که آن مرکب است از عضلات که طول آمده اند و هم از عضلاتیکه در عرض پائین و زیر آن غشای شیهه است  
سه غشای زیر غشای میوگس همبرن است و درین غشای عضلاتی برگردن مشانه عضلات زیاد اند و خاصه عضلات که در  
عرض غشای دو گردن مشانه آمده اند و زیاد اند و عضلات غشای با ختیا از بی ختیا دارند زیرا که آنچه ریشهای عصاب درین  
عضلات آمده اند و در مشانه غشای از تشنج شیک که از آن فعال اختیار میباشد چه او محرک اعضا برای افعال بی اختیار است

باب بیستم در امراض مشانه  
فصل اول در شرح مشانه



و منفی دیگر از ریشه های عصب نخاعی که از آخر نخاع رسته می آیند و بسبب آن نخاع را می بیند و در مثانه و انسان بول را  
 در مثانه در حال صحت پس می کنند ریشه های عصب پس می بیند عضلات مثانه که در صفت اول آن واقع اند و از او می آیند  
 و کار آن دایم تحریک دفع بول است پسوی زیرین ریشه های عصب نخاعی در صفت آخر آن قریب گردن مثانه است زیاد  
 میزند سرهای ریشه های هر دو عصب اند و کورین با هم ملاتی شده متحده اند و شریان عظیم که به حوانات قفا طرزال شده  
 شاخ گشته که یک شاخ آن در جل یعنی و یک شاخ آن در جل میسری میسر ازین هر دو شاخ گشته ریشه های شریان جدا  
 در مثانه داخل میشوند و چنین بهمین آورده از آنها رشته از مثانه خارج شده با وید که از بدن پسوی ل میروند متصل میشوند و  
 مثانه نسوان و شریان یک از جسم می آیند و از زیر مثانه و خلف آن قریب گردن مثانه داخل میشوند و میکوس میسر ل  
 و مثانه متحرک و از آن بول از گره مثانه میزند و فی الحقیقت مثانه از دو حال کب است یعنی دو مجری متحرک و یک مجری  
 و سبب گشته میکوس میسر ل است که از مثانه میان می آید که از آنچه حال کب است بخاری تکمیلی آن بعینه در مثانه هم موجود  
 اند و از گردن مثانه انبوب مجری بول شری می شود و تا سر حشفه میسر ل این انبوب بحساب وسط حشفه پنجه طویل است و بعضی ازین  
 و قصه هم عیاش و این انبوب مرکب است از سه غشا که از اول و زیر هم است میکوس میسر ل است بالای آن غشای عضلاتی است  
 سوم غشای است از ریشه هم که مشاب عضله است آن ایستاده شود و چنانکه در حلقه شدی است برگردن مثانه طم غدی است  
 که آن رسته غده مرکب است که یکی از آن جانبین گردن مثانه و دیگر در جانب میا است سومی زیر قیه مثانه بود و این هم گردن  
 مثانه را غم می کند خصوصاً در زمان شیخوخت که اکثر این پنجه با و سخت میشود و اگر غده جانبین با ایستادن غم گردن مجری بول که میشود  
 و اگر غده زیر قیه دراز و سخت شد غم گردن مجری بول بلند و متغیر میشود و غشای بد از این هم غدی هم میسر ل چنانکه نوشته شده  
 این غده هم مثل دیگر غده های لوبی سفید که مثل شیر سفید است بطایه مشابه بود با منی پس می کنند این طوبت از ریه چنانکه  
 صغرا که ازین غده رسته در مجری بول که کثیر و قفیب است میروند در مجری ناکور می اندازند و درین طوبت هم تیراب است  
 مثل تیراب یونانیست که از تیر کردن کاغذ می بین طوبت رنگ غده منج بربک گلابی میشود چنانکه از تیر کردن حوض  
 و گیر منج میگرد و از آن هسته میشود که در آن حوض است و این طوبت که در بطایه مشابه با منی است لیکن چون زور و منی  
 آنچه بدان در منی میگردند در آن محسوس نشوند لیکن این طوبت هم صلاح منی مجری بول دلی است مثلاً هرگاه  
 منی در منی پدید شود و در جماع خارج نگردد پس هر دو کیسه در پهلوی مثانه در جانبین بسیار صاعده میماند چون چنانچه در  
 بگذرد منی بتغیر گردد و من بعد هرگاه جماع کرده شود و ضرورت از آن خریطه با برآید این طوبت بخت فسادش بر طرف میشود و  
 قوام و مزاج معتدل می نماید این خریطه منی را و یکسبکی منی که منی را یعنی خریطه منی فتنه فصل دوم در ورم مثانه  
 و آنهم مثل دیگر ورم حاد و مزمن میباشد این انبساط گشاست بیش یکسبک و مایل و سکون بیش فی نای مثانه و قوام  
 و قوام الف و سکون نای مثانه تحفاتی و کثرتی است و سکون منی همانند منی ورم مثانه نامند هرگاه ورم مثانه کیسه یعنی حاد

فصل دوم در ورم مثانه





اکثر از گروه بر مقدار صغیر خود در شانیه می آید و در شانیه رسیده بر آن ریکه گیر که از گروه همراه بول می آید پنجمه میگردد و دو سبب آن  
مقدار بیش در شانیه عظیم میشود و گاهی خاص در شانیه فاسفت آن لایم یعنی ریکه سفید که در بول بود از بول جدا شده بر سطح  
شانیه اند و فضای آن میریزد و منجمد میگردد و از آن سنگ ریکه شانیه پدید میشود و این یک خاص فاسفت آن لایم یعنی ریکه سفید  
میباشد ریکه سرخ رنگ اینجا پدید میشود و اکثر این درین شوخت پدید میشود و آنچه در سنگ گرده نوشته شده که حجر در بل بر ششم  
بیشتر یکی سرخ یا زرد که آنرا یوکرک میشد گویند دوم سفید رنگ که آنرا فاسفت آن لایم نامند سوم اکسا کالایس که آنرا آمیتین نامند  
با محوشت پدید میشود و قدری مایل به سرخی میباشد سبب نیکه ز رنگ آن سرخ میشود پس باز که گاهی این سه قسم در شانیه میریزند  
و بر آن فاسفت آن لایم و هم گاهی خون یا مواد دیگر از شانیه ریخته تو بر تو میشود و سبب آن مقدار آن عظیم میگردد و این مرض تا  
سال از ابتداء می عمر زیاد میشود و از بعد ده سال تا بیست سال خوف حدوث آن کم است از بیست سال تا پنجاه سال عمر خوف  
حدوث آن بیشتر است و از بعد پنجاه سال تا آخر عمر خوف پیدایش آن کم شده است لیکن آخر عمر خاص از فاسفت آن لایم حادث  
میشود و این مرض در نوزاد بسیار کم پدید میشود زیرا که مجری بول ایشان قصیر و وسیع است ازین سبب پنجه سنگ یا رمل کوچک که در گردن  
شان پیداشده در شانیه ایشان می آید سبب وسعت مجری همراه بول باسانی دفع میشود و در شانیه نمیداند تا عظیم گردد و در این  
مرض بخصوصیت بلد هم کم و زیاد عارض میشود مثلاً در بلاد بارده و در بلاد حار کم حادث میشود و در ملک افریقیه کم پدید  
میشود الا سبب اکثر از آمدن سنگ یا ریکه گرده در شانیه چنانکه اول نوشته شده پدید میشود و گاهی از دفع شدن بول با تمام از  
شانیه و قدری مانی ماندن آن در شانیه تا که فاسفت متعفن گردد و هم حجر در بل شانیه پدید میشود و گاهی از داخل شدن که هم در شانیه  
بدر مجری بول شانیه چنانکه اطفال وقت لعب بازی که در آن خرد و ادا حلیل می اندازند و چون این جسم در شانیه رسد و بر آن  
فاسفت آن لایم ریخته نمیشود از آن حجر شکون میگردد و گاهی از داخل قاشا طریکه می کشد و دیگر که شل می کشد هر گاه بی احتیاطی  
انداخته شود و سر آن شکسته در شانیه ریزد و بر آن فاسفت آن لایم ریخته نمیشد و هم سنگ شانیه پدید میشود علامات همیشه در  
در شانیه ماندن این درد تا مقصیبت مقعد تا سر می ساقین میرسد بلکه اثر از بیت تا قاعین متنی میشود و وقت بول کردن این درد  
زیاده میگردد و در آن وقت مجل مقعد هم در زیاده میشود خصوصاً در اطفال که در آن وقت بول کردن از زیاده می درد و بر از هم خارج  
میگردد و طفل قضیبت از دست گرفته می کشد چون بول در شانیه قدری مجتمع میشود این درد کم گردد زیرا که سبب پادیده شدن آب  
در شانیه نقل حجر بر شانیه کم افتد از آن ذبیت شانیه کم میگردد و حاجت بول درین خلل بار میشود و هر بار بول بخت می زند گاهی  
بول مجتنب میگردد و این وقتی است که سنگ شانیه بر لبه گردن شانیه آمده سید طریق بول میکنند لیکن گاه مرضی بتر افتاده برین بسیار  
منقلب شود و از تبدیل وضع سنگ از اینجا بجای دیگر رود باز بول می یزد احتیاج بر طرف شود و هر گاه مرضی بر لبه می دفع بول  
می نشیند اول بول صاف می یزد در آخر ششی سفید مثل شیر بول ریخته دفع میشود و آن اکثر بلغم میباشد از ذبیت می کشد پس میریزد  
شانیه می یزد گاهی هم باشد که از پنجم شانیه خارج شده بول دفع میشود لیکن چند روز قبل از آمدن هم ضرورت است که خون همراه بول

در شانیه پدید می آید

و

آمده باشد و هرگاه خون در بول اطفال چند روز بیاید گمان غالب درین وقت آنست که بسبب افتادن سنگ مثانه و از شوق شدن میوکس میمرن مثانه بسبب خلیدن حجر بوده باشد و گاهی از نوبت و غده سنگ قریب پنج و گاه بود و قضیب ایشان در خصوص اطفال و گاهی حاجت بزرگم بار بار میگردد و در بعضی وقت مخصوصا پس از ایشود و گاهی بابر از خراطه و تخم هم خارج میگردد بسبب ذیت میوکس میمرن مثانه علاج آن اصلی همین است که به شکاری مثانه را در میان حوضه تقه از کار و شکافه حجر برد آرند و لیکن از آنیکه این علاج کثرت شود تسکین ذیت اعراض نموده باشد پس برای تسکین حجر مثانه و تسکین ذیت علیل سو و اکا و ایز از ده تابشت گریز با قدری افیون آب یا عرق انیسون حکم کرده باشند لیکن باید دانست که این و اینها که برای تسکین در سفید است برای زیاد کردن مقدار حجر ضرر است چنانکه پیشتر نوشته شد که این دو اخود و حجر مثانه می نشیند از آن در حال چند روز مقدار حجر زیاد میشود پس باید این را بخوراند و بگوید که وقت ضرورت یا هرگاه زمانه بزرگ و درون حجر از مثانه بزرگ و شکاری است باشد بخوراند تا چند روز کم شدن ذیت و بیکار قوت آید و لایق دستکاری شود و از نشاندن در آب گرم هم قریب در یک میگرد و در آن خوراندن فیون ساده یا همراه اتمه سیاه بیک هم در دکم میشود و خواب می آید و از نشاندن ما الشیعه و آب طبلو تخم کتان میوکس میمرن مثانه را قدری آرام و راحت حاصل میشود و ذکر فصل چهارم در احتباس بول و تفسیر آن است که آنرا بغت انگلش تنگی است یعنی بول را نمی بیند ماندن بول نماند درین موضع بول در گرده پیدا میشود و در مثانه می آید لیکن از مثانه خارج نمیشود یا بشواری خارج میگردد و سبب آن گاهی در مثانه بود و گاهی خارج از مثانه باشد تا آنچه در مثانه بود پس گاهی شتر خامی مثانه بود که از رسیدن که اتمه بمقام خراج پیدا میشود یا ضعف غشائی عضلات مثانه بود چنانکه سنج نخوته بسبب ضعف عام بدن پیدا میشود یا بسبب حبس کردن بول که هم ضرورت زیاد از عادت طبیعی میباشد از آن مثانه مقدار بول زیاد حاصل میشود و سبب یادتی مقدار مثانه عضلات بر غر مثانه قادر نشوند پس از فعل خاص خود قاصر و ضعیف میگردد و این بکر از جوان پیر که زیاد در ارقه بول تا غیر کثرتش میشود و گاهی از فساد و مانع و بیوشی مثل سرسام و سکت و امراض ماغیه هم بول محبوس میگردد و گاهی در موم غده که غرق مثانه اند و در شرج مذکور شدند و آنرا را بغت انگلش است که باقی نفع باقی موصوفه فارسی و راسی و مله و سکون و نف و کثرتی بهتری قل و سکون فی بعضی رو برو قیام کنند و مثانه زیرا که آنها رو بروی مثانه غرق آن میباشد پس میشود و گاهی از قرحه مجری بول که از اسوزا که منجم بول محبوس میشود و از شرج غرق مثانه و هم از شرج مجری بول که از مثانه حشفه پیدا است هر جا که در آن شرج افتد و سبب آن راه بول بند یا خیش گو و قهبا و تفسیر خروج بول پیدا میشود و از دیله پیری بل نفع باقی موصوفه فارسی و مله و سکون یا بی تخمائی و کثرت نفع باقی تخمائی و سکون لام که آن جنونی است در میان پنج قضیب متعده که آنجا برای اخراج حصاة مثانه نجم میکنند هم در امراض حمیه مثل خنثاق حجم بول محبوس میشود و گاهی بسبب فعال نفسانیه مثل شدت شرم و حیاء و متفرق در فکر هم بول غلی یا علامات آنچه بسبب نقصان و آفة خراج بود و فوراً با وقوع آفة بول محبوس میشود و آنچه بسبب امراض و دیگر اسباب بود مثل شیخوخت که در آن غده

فصل چهارم در احتباس بول



فصل پنجم در سلسل البول و البول فی الفراش

فصل پنجم در سلسل البول

قسم طحال را بفرستد باید که طفل را در آب گرم نشاندند و قدری آب سرد نوشانند که نور از بین می رنج بر طرف می شود و بول جاری می شود  
 و چون سبب نفیض شدن غذا که در وقت نشاندن اند بود یا از قرحه مجری بول افتد در آن علاج امراض مذکوره فرایند و آنچه از بول بیداری  
 افتاده باشد در آن علاج اصل مرض بماند و آنچه از ختناق رحم بود علاج ختناق رحم فرایند و همراه علاج مذکور اگر قرحه سی آب گرم  
 کرده نباشد بهتر بود و علاج عام نیست که هرگاه بول مجتبی شود و خارج نکند و قاطع در نشاندن اندازند اگر دخل کردن آن ممکن باشد  
 داخل کرده شود و چنانچه همراه آن بول خارج می شود اما اگر قاطع بیداری هم غده مذکوره یا در مجری بول در نشاندن داخل نکند و  
 خوف پلاکت مرخصی شد درین وقت اگر کار بالا می خیزد نشاندن متصل به غده مذکوره در عانه اندازند تا در نشاندن رسد و بول خارج گردد  
 باطیون نمی شود و اگر آن مذکوره در در انداختن طرف معاشی مستقیم در نشاندن رسانند یا دهامون برای تحفظ باطیون است و از  
 بر نفس است فصل پنجم در سلسل البول و البول فی الفراش و آنرا ان کان من انفس کت یوراین نامند یعنی بول نشاندن  
 بول نه ماندن آن در نشاندن و سبب آن گاهی متناوبی شدن نشاندن است بول بود قوی که اکساکلیس در آن پدید می شود  
 و گاهی متناوبی شدن نشاندن از نفس ل سبب هم یا جراحت خود بود و گاهی بسبب شتر خالی نشاندن این ض پدید می آید و در آن  
 درین وقت قوت بر حبس ستمساکت نه بود پس چنانکه از کرده در نشاندن می خارج می شود و گاهی از ضعف نشاندن خصوصاً هرگاه این  
 ضعف از زیاد ضبط و حبس کردن بول پدید آمده باشد و گاهی بی علت بود چنانکه در اطفال اکثر همین سبب می باشد و گاهی  
 اوتیت بواسیر و از اوتیت کم شک و گاهی از اوتیت سنگ نشاندن و هم از زیاد شدن جنس بقا کردن نشاندن و همان نوشیدن خوردن  
 مدرات بول و نوشیدن سفوف یا آنچه که گشت سوم به فرایح هم این ض پدید می شود علامات بول بی اراده و بکثرت جاری بود  
 و در عالم خواب بفرش بول می کند علاج اول سبب مرض دریافت کرده بر فتنه آن پرواز و چون سبب ضعف بود و در آن  
 مقوی مثل آب پن نشاندند اگر از زیادتی گری بول زیادتی نشاندن بود در آن سو داکا ریواس یا ریواس کار نباشد نشاندن یا حیات  
 و موضعت بول کم شود و آنچه سبب عادت بود در آن وقت شب بیمار را دو سه بار برای بول کردن بیدار کرده بول کنند خصوصاً  
 در اطفال این سبب بهتر است و آنچه از خوردن گشت سوم به فرایح بود در آن از نوشاندن کافور محلول یا آب که دو سه گریز باشد و  
 از ماکو کردن نفع کثیر حاصل می شود و قهقهه فصل پنجم در حرقة بول و آسباب آن گاهی در نشاندن بول یا در مجری بول  
 باشد مثل هم حاد و مزمن میوکس میمرن نشاندن یا زخم آن یا در هم میوکس میمرن مجری بول درین وقت اگر چه بول کد ختم  
 و جوهر غریب طبعی متمرج نباشد لیکن حرقت در بول محسوس می شود زیرا که میوکس میمرن سبب هم و زخم از مرور بول بسبب  
 اجزائی نکات که در بول طبعی می باشد متناوبی می شود و لیکن گاه از زخم نشاندن مجری بول بود و هم در بول خواب بود و گاهی از  
 قبل آن بوده باشد و گاهی سبب گرده باشد مثل اینکه هم در گرده بود و سبب آن بول کم پدید می آید و آنچه پدید می آید گاهی  
 سبب حرقة در بول می باشد مثل اینکه هرگاه رطل سنگ صغیر در بول پدید می آید و خواه یورک لیست یعنی رطل سرخ و زرد بود و یا که  
 یعنی رطل گهم این وقت یا فاسفت غلاخیم یعنی رطل سفید مثل آب بود و از این هم رطل اکثر حرقت در بول پدید می آید و چون هرگاه



این رمل حجب و مثانه باشد سبب خلیه آن هم طحال آن هم حرقت در بول پیدا نشود و از دفع شدن صفرا در بول هم خفیه پیدا میگردد  
و هم حمی هرگاه شدید و زیاده حاد بود و خصوصاً که صفراوی بود چنانکه در یرقان میباشد هم حرقت در بول محسوس میشود و گاهی سبب  
غائی شدن طوبت میوکس میبینیم جبری بول که سطح آن میباشد هم زغانی شدن طوبتی که غده که غرق مثانه آنرا پیدا کرده در  
مجری بول می اندازند هم حرقت در بول پیدا میشود و اکثر فنای آن سبب کثرت مباشرت میباشد درین وقت نه بول رنگین بود  
چنانکه وقت خروج صفرا پیدا شده در آن ریم و رمل حجب بود فقط علامات هرگاه سبب مثانه بود علامات امراض مثانه چون  
در کرده بود علامات امراض کرده موجود بودند چون در بول بود از راه احتیاج بول ظاهر میشود مثلاً اگر از زخم مثانه مجری بول  
بودیم در بول مثانه از زیاده دفع شدن صفرا باشد صفرا در بول موجود و از رنگ کردن پارچه سفید آن صفت پارچه محسوس  
شود و اگر از رمل حجب بود علامات آن شاید باشد آنچه سبب حمی یرقان باشد وجود این امراض شاید بود علاج اول تشخیص  
نمایند پس باز آن چنانکه در ویل هر مرض نوشته شده محمل آن را مثلاً آنچه از زخم و زخم میوکس میبینیم مثانه بود علاج ورم مثانه  
فرمانند و آنچه از ورم کرده بود علاج ورم کرده نمایند و آنچه سبب حمی صفراوی بود علاج حمی از اسهال صفرا و تسکین رت باشد  
و آنچه حرقت بول را کم میکنند مثل شپاس سایه لیس شپاس ایستادن شانه و آب خیار مشوی و آب کدوی مشوی نوشانیدن  
درین وقت مفید باشد و آنچه سبب فحاشی طوبت مجری بول از کثرت مباشرت بود در آن تبرک جماع امر فرمایند و اغذیه جیدتر  
قسم البان مقویات مثل آب پهن غیره نوشانند فصل هفتم در وجع المثانه بدانکه در مثانه در اکثر امراض یافته میشود  
مثل ورم مثانه و زخم میوکس میبینیم مثانه و سنگ رمل مثانه و گاهی سیج آفته در مثانه موجود و نباشد لیکن در مثانه موجود بود و در  
بدن سبب بود یکی سبب عصب که از نخاع در مثانه برای رسانیدن توت حی حرکت آمد و این و شل و عصا میباشد که با سبب  
مرض عصا پستانداری و در دناک میشود و آنرا نورال جیا گویند و این دگاه دگاه در المخیلیا و سیستیر یا هم یافته میشود و در سبب عصب  
سپیدی شیک که از قریب جوار عضوا و فوسفات سردی اینجا هم در میشود چنانکه در امراض معاشقی قسم از قسم بواسیر و زحیر اینجا هم در  
میشود و همچنین امراض حشیه این در پیدا میگرد و در هم از ورم غده که غرق مثانه اند این در و عارض میشود علامت اول در  
مثانه است بهر سبب که باشد خواه اصلی بود یا شرکی لیکن گاه از امراض مثانه یا ورم غده بود و علامات امراض مثانه مذکوره شاید  
بوند و هرگاه سبب غیر مثانه بود و بطور مشارکت باشد پس آنچه سبب باریت عصب نخاعی باشد در آن در و بطور نو بهر که یاد شود  
درین وقت در کدام عضو دیگر از اعضای بدن در ورم موجود نباشد آنچه سبب سپیدی شیک بود در آن بهر دوی ظاهر بود یعنی در ورم  
مرض هم یا ورم غده وجود خواهد بود و موافق زیادتی و کمی آن در و مثانه زیاده و کم شود چنانکه نشان امراض شرکیه است علاج بعد  
در یافت سبب مرض باز آن هر سبب پرواز لیکن آنچه سبب عصب نخاعی بود در آن آنچه در مرض عصا به نوشته شده عمل کنند  
و آنچه سبب عصب سپیدی شیک است در آن علاج اصل مرض که در کرده یا معاشقی یا زخم یا غده بود کافی خواهد بود فصل هشتم  
در قهطیر البول و آنرا دیسوری یا مینان و این حالت متوسطه و میان غش و استرسال بول است و سبب آن یا گرمی و خشکی

محمد بن عبد الله

محمد بن عبد الله

2

بول میباشد خواه بسبب خروج صفرا باشد یا از ریل و مجری غیره بود و اسباب حدت بول در حرقة بول نوشته شده اند پس  
 بسبب آن مشانه را حملت میسر نشود که بول کثیر را جمع کرده یکبار دفع کند چنانکه در حال صحت میکند و بی صبر شده بار بار  
 نفق آمدن بول در خود بسوی خارج دفع میکند از خجست آنچه قطره قطره از کرده در آن میریزد دفع میشود یا بسبب ضعف  
 بود یا بسبب اینکه در مکیوس میبرن آن ضعف میکند از آن اجتماع بول کثیر در مشانه ممکن نبود یا از خجست شود در مشانه بوند که  
 بسبب آن از گرمی بول متناوبی میشود زیرا که هر بول یکمین میباشد از ناک ترشی قهرم قرح و جبریا اذیت میرسد و گاهی بسبب  
 فقدان حسن این ض پیدا میشود چنانکه در امراض ماغیة مثل سر ساقم سکت عارض میشود و گاهی بسبب متلی شدن مشانه کشیده  
 شدن آن بسوی بالا تا ناک از رست شدن عنق آن درین کشیدگی قطرات بول میچکند چنانکه در اعتبار بول نوشته شده  
 همچنین گاه که ام آفته در راه بول رستل نیکه تنگ یا کج گردد و هم این ض پیدا میشود یا در راه بول عنق مشانه کشیده میشود  
 هم در مرض قرحه جبری بول از تنگی راه بول قطره قطره کرده می یابد چنانکه در عسر بول نوشته شده و گاهی زافتادون سنگ در  
 مشانه هم تقطیر عارض گردد چنانکه در اطفال گاه سنگ خاردار یا ریگ در مشانه اینها افتد و از آن حرقة در بول ایشان عارض شود  
 این ض پیدا میشود علاج اول فحس سبب نمایند پس چنانکه در علاج هر یک نوشته شده بعمل آید فصل پنجم در امراض  
 فی المشانه این مرض در کتب طبیه عربیه مسطور است و نوشته اند که از آن گرفتاری و بر و اطراف و سقوط منقضی عارض شود  
 و قبل عروض آن بول لیم شد یا خفیه و سقطه بر محل مشانه رسد یا از آن استه نشود که خون در مشانه بنشیند و بسبب  
 این مضمون از حلیه صحت عارضیت زیرا که در مشانه همواره و هر آن بول از گره می یزد در بول همواره نمک میباشد خون  
 با اتساع نکات بنشیند و شاید علامات مذکوره بسبب نفیل شدن مشانه که بعد بسببین ضربه و سقطه شده باشد یافته شوند و درین  
 علاج آن علاج نفیل شدن خواهد بود که مذکور شد فصل پنجم در مشانه در کتب عربیه طبیه این از ذیل امراض مشانه  
 نوشته اند و میگویند که مشانه از رسیدن حده ضربه و سقطه که بر قنار ظاهر شد ریل میشود و گاهی بسبب بیج محدود و قوی بسبب  
 رطوبت مزاج یا جایی خود زایل میشود و از روال مشانه سلسل البول یا حبس بول پیدا میگردد و موافق عروض تمدد و تشاع  
 و محضه حقیقت نیست که ذوال مشانه از جایی خود نکیند لیکن هرگاه بول محبوس شده در آن یا در جمیع میگردد و قدری بلند  
 میشود لیکن از جایی خود زایل نمیکردد چنانکه در سلس البول خسر و ج آن نوشته شده و تدبیرش همانست که آنجا نوشته شده فصل  
 یازدهم در ریج المشانه در کتب عربیه طبیه این را هم مرض مستقل شمرده اند و گفته اند که این مرض از ضعف هضم پیدا شدت  
 نفخ و از اغذیه یا از کثرت رطوبت که در مشانه یا ضعف حرارت یافته شود پیدا میگردد و بحال است ریج مشانه وجود هم  
 ندارد که بدون ثقلی شد قرار داد اند خصوصاً وقت نقل کردن از یک طرف بسوی دیگر لیکن اینهم لایق صفا نیست زیرا که مشانه  
 محل اجتماع بول بطوری است محل منخ و مضمون نیست و تو اگر ریج در آن ثابت نشده قدر فصل و از دهم در ورم  
 غد و ثلثه که در عنق مشانه اند و این هم حادثی و فرمن ضعیف هم میباشد اما هرگاه حاد بود پس و بسبب عارض میشود

فصل پنجم در امراض فصلی هم در جمیع اقسام  
 فصل پنجم در امراض فصلی هم در جمیع اقسام  
 فصل پنجم در امراض فصلی هم در جمیع اقسام

یکی از قریحه مجری بول که آنرا سوزناک نامند هرگاه قوی و شدید بود و دوم از او خال قاننا طیر بر گاه بر بی احتیاطی در مشاهده  
 شود و گاهی مثل دیگر ابرام اعضا اصل سبب آن ظاهر شود و بیکی هم یافته میشود و این هم را بخت لاشن پشیمانی میگویند  
 علامات در دو سوزش و نقل محل کردن مشاهده زیر پنج قضیب یافته میشود و بار بار بول می آید و عرق مشاهده از بار بار آمدن بول  
 چنان در دوا و زیت پیدا میشود که در هم مشاهده میباشد چونکه علامات این هم هم با علامات و هم مشاهده و گزده ششیده میباشد  
 لهذا تفرقه صورت و آن بحسب محل میتوان کرد و چون انگشت در معانی مستقیم انداخته تلاش کنند و صورت موجود بول این  
 مرض مقدار غار مذکور عظیم محسوس شود و در دوا و زیت وقت احساس بن غده و زیاده یافته میشود و وقت آمدن بول از این  
 زیاده میشود و انجام این غرض نیست که یا صحت شود یا منتقل گردد و بسوی و بیل یا نرسن ضعیف گردد علاج چونکه درین مرض  
 خوف پیدا شدن کم زیاده است لهذا برای حفظ از تولد بیم بعد از ثبوت این هم فوراً در میان پنج قضیب مقدار کوچکی پاشند  
 حجامت با شتر طرند بعد یک ساعت در آب گرم نشاند تا خون بسوی جلد آید و در هم باطنی رفع گردد و بعد بر آوردن علل  
 آب گرم از آب مطبوخ پوست ششاش بکشد سازند و هر روز از او مال مرض و آنکی اسهال قیق و شکم جوش خون کند مثل  
 سنگین یا سلفاس دو سه درام همراه مارشالیک شاتر دویم حصه گرین بود همراه آب ساده حلاوه بعد چهار چهار ساعت و  
 سه بار نوشاند تا هر روز پنج شش بار درست رفیق آید و اگر با وجود این تدابیر هم پیدا شود و آن استه میشود آمدن جوشی که  
 بار زده و ناقص باشد از قوی و شدید شدن اعراض سابقه از پیدا شدن ضربان در محل هم و هم درین وقت بول قطره قطره  
 می آید یا با کل محسوس شود و زیرا که چون و بیل گردد و مقدار این غده زیاده شود مجری بول را غم و مزاحمت کرده و عسر احتباس  
 بول پیدا میکند و همچون درین وقت مقدار غده زیاده عظیم میشود با معانی مستقیم هم مزاحمت میکند سبب آن آمدن بران هم  
 میشود و ما بین مقدار پنج قضیب آمدگی و خونی گرمی پیدا میشود زیرا که در بیله خواهد که بسوی خارج یا بطرف شانه یا بجانب  
 معابر و رگها دفع گردد پس گاهی بسوی معانی دفع میشود و این وقت هم همراه بول دفع میگردد و گاهی بسوی عرق شانه جایگزین  
 مجاری این غده در آن هستت ششش میشود و درین وقت هم همراه بول خارج میشود و درین وقت مرقه بول پیدا میگردد و این هر دو  
 انفجار سل است تا هرگاه بسوی خارج آید شود و صلابت و زیادتی در خارج معلوم شود و بداند که این طرف منفرجه خواهد شد  
 بلا انتظام و افتادن بیشتر داده در آن کشاید تا خون جاری شود و از آن مقدار و کم گردد و الا تا خارج شدن کم  
 به بار از احتباس بول هلاک خواهد شد و بعد کشادن بیل از شش تخم گمان محلول آب ضما و کنند تا بیم پیدا شده جاری شود و بسوی  
 ماده باله نام از غشائی ریشه و از خارج گردد و صحت شود و اگر بعد از آن شش هم بول محسوس اند و خال قاننا طیر همی در مجری بول  
 اگر ممکن باشد خارج بول از شانه فرایند و اگر سبب مزاحمت و هم غده و خال قاننا طیر همی در مجری بول نامکن بود از طرف معا  
 مستقیم آنکه در گاه انداخته بول از شانه برآید و هرگاه این هم نرسن بود و خواهد بود و هم مزاحمت شده باشد از قبل منفرجه  
 بود و یا شش درین جوان بود پس اگر سبب در آن زیاده میباشد که درین با عوارض میباشد اگر مرض پیرو خود نخواهد این

بسیب شیخوخ پیدایش دو درین وقت در دواؤیت کم میباشد و مادام که غده زیاد عظیم نشود حتی که از اراقت بول نفع نشود  
وقت بول کردن هم زیاد اذیت نمیشد لیکن این وقت نخله این غده در حال صحت رطوبت پیدایش کند و از آن باده پیدایش  
میکند و هرگاه وقت تبیز بسبب قبض خشکی بزرگ تر و تبیز جزایر رسد رطوبت سفید از راه حشفه بر می آید و چون این طوبه  
را از خورده بین بستند از این بول نوین نباشد که در نظایر در بادی نظر مشابه بمانی میباشد چون این طوبت در مریض جوان آید  
او را یقین میشود که منی رقیق شده بسبب کمزوری خارج میشود و چنانکه در حال صحت ثبوت بازن مباشرت میکند  
درین وقت او را ممکن نبود علاج چون در وقت شیخوخ این مرض عارض شود لا علاج است و مادام که مانع اراقت بول  
نشد در پی علاج آن نشوند اما چون بول محبس شود روزانه در سبت و چهار ساعت شب و روز سه بار بعد از هر ساعت  
او خال قانا طیر بول را از مثانه بیرون کرده باشند الا از اجتماع بول مثانه ورم مریض مثانه پیدایش خواهد شد و هم آنچه تا بیهوش  
رفع احتباس منی نوشته شد اندک آنها را بعل آرند و هرگاه جوان عارض شود اندک وید مقویه مثل آب پهن اذراتی یا عکینیا  
نوشانند و گاهی از نمادون پلاستیکش گیس هم درین مقام در جوانان نفع ظاهر میشود و درین مرض اکثر تشنج در مجری بول محبس  
و از آن سبب هم باقی میماند و زایل نمیشود و از درین وقت بهتر است که میل صمغی آهسته آهسته در مجری بول انداخته پس شکاف  
در آب حل کرده مثل اینکه چهار پنج گرین اصل کاشک تفره در آب ساده که یک آونس بود حل کرده از زرقه در دهن قانا طیر  
انداخته تا محل صم و در مجری رسانند که از آن تشنج هم موقوف شود و ورم غده هم دفع گردد و وقت که فصل سنیر دهم در ورم  
میوکس میمیرن مجری بول و آنرا تویریت آئینگیس بنید یعنی ورم حار مجری بول و آن خیر سوزاک است زیرا که سبب  
سوزاک خاص است که آئینه مذکور میشود و انشاء الله تعالی السبب گاهی بسبب گرمی و حرقت بول که از آمدن یورک  
و فاسفک آف لایم و اکساکال است افتد حادث میشود و گاهی از ادخال قانا طیر گاهی از مباشرت کردن بازن بیمار که  
سفید از فرج آن باده آمده باشد و هم از مباشرت کردن بازن حامله پیدایش شود و در اطفال گاهی بسبب گرم شکم این مرض  
حادث میشود و گسائی که در روستا و فاضل یعنی اوجاع مفاصل و تقرس مبتلا میشوند هم از این مرض متولد  
گردد و گاهی از پیدایش این مرض بسببی مرض بدگمانی کرده میشود که شاید بازن فاحشه صحت و مباشرت کرده باشد  
لیکن حقیقت اینست که این مرض مشابه به سوزاک است سوزاک نیست زیرا که بعد از آن نخله اکثر بعد سوزاک عوارض مثل  
اوجاع مفاصل عارض میشوند اینها نمیشوند و هم اعراض آن بجز تبه عارض سوزاک نمیرند علامت اول در بول  
میشود و خراش در مجری بول یک و در محسوس میکند و پس قدری یکم می آید و وقت بول قدری اذیت و درد میشود  
علاج مسهل از مثل سیکنشیا سلفاس یا نایر ایستیک برای از ازاله انفل میشین نشانند و اکثر اکثر کاشیکیم کن و گری  
و اگر بچکر آن باشد یک و درام یا پلاس ریاس که از ده گرین تا پانزده گرین بود در دو آونس آب حل کرده بعد چهار ساعت  
نوشانند پس اگر از این بیروم دفع نشود و قدری یکم آمده باشد قدری زنک سلفاس یا تلج سفید خام در آب حل کرده

فصل سینہ و رحم و درم و عروق کبک و سینه بن مجری بول

از ان در مجری بول زرافه سازند یا لپهای سیاه بکب حلقه زرافه سازند و اگر وقت بول در دوا ویت بوده باشد قدری خیمون هم با دوائی زرافه آینه زرافه از مطبوخ قوی جای ختمای زرافه کردن درین بسیار مفید مجرب است و آنچه فوق بول بود مثل زرافه آب مطبوخ تخم کتان نوشتند تا بول قوی شود فصل چهارم در سوزاک و آنرا بلغت که یک گنوا یا نیناسند و آنهم نقل میشن یعنی ورم حاد میوکس میمیرن مجری بول است که بسبب خاص پیدا میگردد و دوا و سمیت آن در بدن موثر میشود و بیشتر امراض از ان غیر سوزاک هم پیدا میشوند و آن سبب نیست که هرگاه چنانچه شفا حاصل از مردان با عورت مباشرت کنند و زن نجوبی هم خود را صاف نکند چنانکه حال زنان بازاری و فواحش است پس از دخول نمی آید متعدد در جمیع سمیت پیدا میشود و آن سمیت از ان بذریع مباشرت در ابدان جال متعدی و موثر میگردد و از ان سوزاک پیدا میشود چنانکه آتشک هم همین سبب خاص پیدا میگردد و لیکن هم آن غیر سوزاک است لکن ماده آتشک سوزاک پیدا میکند و نه ماده سوزاک آتشک پیدا میکند این مرض بحسب علامات علاج بر سه درجه میباشد درجه اولی نیست که از روز مباشرت با زن فاحشه مذکوره اندرون پنج روز این مرض ظاهر میگردد و اول حلقه قدری سوس و مجری بول محسوس میشود من بعد بر این حلقه سرخی و ورم ظاهر گردد و چون قضیب در دست گرفته نمیشود و بر دهن حشفه قدری بلغم از او نشت میکند می آید و این حالت از شبست و چهار ساعت تا چهل شبست ساعت میماند من بعد درجه ثانیة شروع میشود و آن نیست که در جمیع غلیظ مایل بر روی و سبزی بکثرت جاری میگردد و بول بکثرت آید و بانسوس و حرقت بود و بار بار حاجت بول میشود و آنچه خارج میگردد تا بول که از انبندی پیشاب کی و بار میگردد صغیر میشود و گاهی بر سهقامت خود نماند بلکه کج شود و بول در پهلو یا قاضیب افتد و چون مرض و باز دیوار در و اندرون مجری بول قضیب یاده میشود و تا پنج ذکر میرسد درین وقت گاهی غدد که عرق مثانه اند هم متورم میشوند و درین وقت که آنرا ستورم شوند و با من خصیة متورم هم پیدا میشود و اذیت زیاده میباشد و خواب نیاورد و پدید گردد و وقت شب نندارد سخت و قضیب پیدا شود و لیکن درین وقت قضیب کج نمیشود چنانچه باشد چون این حالت ظاهر شود باید دانست که آنچه سرهای مجاری منی از حقیقتین شده در مجری بول و قضیب نماند آنرا متورم شده و بذریع مجاری مسطوح ورم تا خصیة سیده و این حالت شدت مرض است که تا دو هفته میباشد من بعد درجه ثالثه شروع میشود و آن نیست که در دو ورم کم شود و آتشک قضیب که وقت شب میشد کم گردد و بار بار حاجت بول میشود کم شود و ممکن است که این حالت سه چهار هفته بماند و شود و صحت گردد و هم ممکن است که آب سفید غلیظ از حشفه میوکس میمیرن پیدا شدت های دراز از راه بول آید علاج در درجه اولی اگر اتفاق علاج شود پس یکت بیزن مرض نیست که همان روز صحت شود و آن نیست که کاشک نفوذ نیم ورم در یک اوتن آب ساده کند و ریخته کشیدن بطور عرق گرفته باشد حلقه زرافه بذریع زرقه در مجری بول از ان تریق سازند لیکن احتیاط در ان ضرر است از نیک و دوا در مثانه داخل نشود و همچنین جگر و دیز زرافه این شرط را واجب اند و برای آن وقت اذخا و دوا در مجری بول پنج قضیب از دست چپ خوب بقوت بگیرند تا راه دخول وادر مثانه مسدود شود و یا ورم کاشک نفوذ بیزن

فصل چهارم در سوزاک

در سوزاک از ان سبب علامت علاج

آلوده در مجرای بول داخل گشته تا نیم رسد زیرا که در اول مرض خم قریب حشفه میباشد یا پلمبای ایسی بیشتیست گرین در  
 آب حل کرده از آن راقه سازند و این را اول هم افضل است زیرا که گاهی از کاشک نقره و مریاده میشود و لیکن این خوف از دیار  
 ورم نباشد و تا وقتی که این علاج کرده میشود طعام بمحض کم خوراند و مسل قوی نوشاند مثل سیکنشیا سلفاس پس اگر اگر  
 مرض دفع نشود و تا درجه ثانیه نوبت سرد و زیاد گردد و خواه در قضیب یا مابین خصیه مقعد درین وقت زلزل و محل در چپ  
 و یک ساعت در آب گرم نشانند چنانکه آب تا کم آید چون آب گرم بسیار بر آن پدازد آب مطبوع پوست خشنخاش تکمیل  
 و پارچه آب گرم تر کرده بر قضیب بچسبید بر بندند که از آن نفع عظیم حاصل میشود و چنان مسهل دهند که اسهال قیق شود و چون  
 خون کم گردد مثل سیکنشیا سلفاس که سه درام بود و نارتریکاتیک از هشتیم حصه گرین دو از دهم حصه گرین باشد و پلاس تر که  
 پنج گرین بود با هم تخمیزه روزانه چهار چهار ساعت نوشاند و مادام که اعراض بر طرف یا خفیف نشوند هر روز مسهل افق  
 نسخیه مذکوره نوشانیده باشند و غذا بسیار قلیل دهند و بر آشوبی قیق یا آب مطبوع پنج یا آب مطبوع تخم کتان بجای غلی نوشانیده  
 اگر نمانند و تخم سی آب حل کرده نوشانیدن هم مفید است و چون اعراض خفیف شوند کنیوب یعنی کباب چینی یک اونس  
 سایید بالا بکشد پاشی که یکم باشد همراه روغن کپیا بقدر ضرورت شسته خوب بندند یک کف ام از آن بعد چهار ساعت  
 روزانه سه بار بخوراند و لیکن خوراندن این و اگر گاهی اعراض زیاده میشوند درین صورت خوراندن این و اگر گاهی باز  
 مسهل سیکنشیا سلفاس موافق نسخه سابق نوشاند تا اعراض خفیف شوند اما این دارا بخت اعراض هم نهند و اگر  
 خراش می باشد بلکه عوض آن میکنشیا ثقیل که آنرا هم بغلث الاث میکنشیا اوستا یعنی میکنشیا سوسخته میگویند  
 چنانکه میکنشیا سوسخته خفیف میکنشیا سوسخته اوستا مینامند زیرا که هر دو بیشتر حاصل میشوند نصف درام و روغن کپیا نصف  
 درام با هم تخمیزه بستره روزانه سه بار بخوراند و مادام که اعراض مرض قوی باشند راقه نهند اما هرگاه اعراض خفیف  
 شوند استعمال آن بهتر است و فضل نیست که اول پلمبای ایسی بیشتی از پنج گرین بآب ساده حل کرده از آن راقه نمایند  
 نوعی که رنگ سلفاس فیبری سلفاس کسین است و زاج سفید خام و قویا سنی تمام هر یک ازین دو تیه یکدو گرین جدا  
 در آب ساده حل کرده ز راقه سازند یا یک یک گرین از هر چهار دو گرفته در دو اونس آب ساده تخمیزه ز راقه سازند و اگر بعد استعمال آن  
 سوزش زیاده محسوس شود مقدار آب آن زیاده سازند تا سوزش حدت آن کم گردد و نوعی که رنگ سیاه و کالکیش از هر یک  
 پنج گرین تا ده گرین گرفته در آب ساده که یک اونس باشد حل کرده ز راقه سازند و نوعی که رنگ سیاه و کالکیش از هر یک  
 با هفت درام آب ساده حل کرده از آن راقه دهند و بدینکه اول وانی قلیل بعد آن قدری از آن زیاده بعد از آن آنهم زیاده  
 و در او مجری بول رسانند و چون جمله اعراض بر طرف شوند و تنها آمدن آب سفید باقی ماند درین وقت از داخل قاشا طیاریه عظیم  
 حاصل میشود زیرا که چون قدری تشنج بمقام خم میماند از آن سبب هم بالکلیه طرف نمیشود و چون از داخل قاشا طیاریه کشاده  
 شود تشنج بر طرف گردد و درم برودی دفع میشود و درم آنکه پنجه کوس میبهرن که خراب بوسیده است از داخل قاشا طیاریه

میشود و دیگر میسوس میبهرن پیدایشه و هم مندل میگردد و فکدر باب نوزدهم در امراض مخصوصه حال  
 و آنهم مشتمل بر چند فصل است فصل اول در تشريح آلات تناسل مردان بدانکه عضو تناسل یعنی قضیب  
 آنرا بلذت لاشن منقش گویند در رجال مرکب است از اجسامی چند که گرد مجری بول یعنی حلیل میباشد پس اول آنرا دو جسم  
 اند که بزبان انگریزی آنها را کارپراکاو و کوروا یعنی جسم خانه و از نامند و این هر دو جسم طول در بدن بسیار مجری بول آمده اند و شکله  
 هر دو از پهلوی آمده و تا بالای آن منبسط شده با هم گشته اند و یک جسم که موسوم به کارپسین است و از هم یعنی جسم مشابه بهنج در هر  
 و خانه داری زیر حلیل میباشد و این جسم پاره دو جسم که در پهلوی حلیل بودند متصل شده و با اتصال این جسمان جسمان یک  
 سابق مجری بول در اینها محیط میباشد و اتفاق این اجسام ثلثه هم می شود و از قسم هم اند و بالای هر سه جسم غشای ریشیه از جنس  
 بر هر یک مثل غلاف محیط است هر دو جسم که از پهلوی مجری بول اند تا استخوان عانه رسیده آن مشد و اند و غشای ریشیه در هر محیط  
 اجسام مذکوره است آنهم با استخوان عانه مشد دست و دو عضله قافضه از استخوان عانه شروع شده بالای غشای ریشیه در هر محیط  
 بر جسم پهلوی مجری بول است تا یک پاچه که ماده اند و بسبب نواقص شهور قضیب کشیده و مستقیم میشود و جسمیکه بر مجری بول  
 میباشد آن تا استخوان عانه نمیرسد بلکه یک نیم پاچه از خم مثانه دور مانده تمام میشود و تا در آخر خود قری غلیظ شده و قریب تمام  
 مجری بول که قضیب است یک جسم بطور غده ملائیم که لیت آنهم قریب جسم انجی میباشد از بدن بسیار بر هر دو جانب محیط  
 گشته و آنرا حشفه مینامند و آنرا بلذت لاشن کلانشن پیش یعنی غده قضیب مینامند فایده ملائیم آن نیست که تا در آنهم  
 خون زیاده جاری شود و در هر چهار جسم مذکوره شریان آورده بسیار آمده بطور شبکه مایه یافته اند چون دل مرد خواش زن  
 پدید میشود و از آن لذیت گردد و خون از شاخ های شریان عظیم که در شکم اند در عروق شبکه می رود و بسبب دخل شدن خون کثیر  
 عروق مذکوره وسیع میشوند و وسعت آنها بحدی میرسد که غشای ریشیه در هر محیط است از نسیج عاخر شده بر آنها تنگ میشود  
 و از تنگی سختی خود آنها را مانع از توسعه میگردد و درین وقت سختی در قضیب پدید میشود چون این حالت طاری شود هر دو عضله  
 قافضه که متصل به غده ملائیم و سو قضیب میگردد پس کشیدن آنما قضیب با تقاضاست بر نخیزد و بالای جسم مذکور جلد  
 میباشد که وقت آرام ترین و منقبض میباشد وقت شهور منبسط و صاف میگردد و جلد مذکور که قضیب ماده قاری زیاده متعلق  
 اجسام مذکوره پیش از آنکه آنرا غلفه نامند در فتنه قطع کرده میشوند و کار غلفه نیست که تا حشفه ملائیم در زیر که در غلفه میسوس  
 است که آن را میسوس میبهرن بالای حشفه رسته است آن بسبب قلیطوبت حشفه ملائیم میدارد و از ملائیم اندر آن حشفه  
 محفوظ و قوی میماند و از زیاده حشفه لذت جماع زیاده حال میشود و انزال خوبی میگردد و در قضیب در دو خرطیه میباشد  
 که هر یک از آنها مرکب است از جلد بدن زیر آن غشای عضله است و عمل آن عضله تقبض است لیکن تقبض بی اختیار است زیرا آن  
 غشای ریشیه در است زیر آن غشای است ابدار مثل بار طیون درین هر دو خرطیه بر خیزد و بران است و فایده بودن غشای  
 ابدار اندرون خرطیه نیست که بسبب آن خرطیه مسوی فوق و تحت بسهولت حرکت کند و خود نفس بر خیزد مرکب است مثل

تشان جنون

تشان جنون

مردی



قدی از غده های کبیر که آنهم کم بسیار اند از غده های کوچکتر بر سر غده کبیر غشای زرشه و محیط است و شاخ های این غشا  
اندرون غده رفته بر سر غده غیر محیط اند و هر غده کبیر طوبست می رانند و می کنند و در مجری کبیر که قریب پنج بیضه است میریزند و جری  
ند که منقسم شاخ های کثیره شده که از این شاخ ها جسمی که کبیر قریب مشابهت در شکل از جوف فاسی فارسی بود پیدا میشود و آنرا زرشه  
انگلشانی می گویند و کبیر غشای تشدید باغی می رسد و سکون باغی تحتانی و قمع دال هندی اول و سکونانی و کبیر میم و سکونانی  
یعنی جسم بالایی بیضه است این جسم مرکب است از مجاری کثیره که بطور دوایر خود در آن با هم شده اند و جسم مذکور بالای بیضه میباشد  
مثل کلاه گرده و این همه شاخ ها در آخر یک جا شده باز مجری کبیر که در اندک آن مسوی فوق رفته اندرون شکم می شود و در وقت آن  
شکم تنبست که آنچه غده کبیر پیش مشانه است و از در میان آن گردن مشانه داخل شده مجری بول گشته و قصبه آید و در همان  
غده این مجری هم آنرا پرو جانب می بیند بسیار از هر دو بیضه است و فصل شش تا راه مشانه منتهی میشود و در مجری بول کشاده میگردد و  
همان جایی میریزند و این راه را مجری منی میگویند زیرا که درین راه غیر منی چیزی دیگر جاری نمیشود و این مجری مرکب است  
از سه غشا اول غشای خانه دارد و غشای عضله که عضلات آن قابضند و خیتار آن رسوم غشای که اندرون  
همه است و آن میوکس میمرن بود و از اجتماع و انقباض این مجری منی باقی خارج میشود و همراه این مجری درین راه دخول  
شرابین و آورده و اعصاب حس هم میباشد و مجموع این اجسام را جمل الانشین مینامند زیرا که بسبب همین اجسام کبیر  
خود بیضه و نیزان میباشد بالای این اجسام ریه غشای آبدار و غشای ریش دار و غشای عضلی قابض با اختیار می باشد  
و همین بر سه غشا بالایی مضیتین هم آمده اند لیکن مادام که طفل در شکم مادر است و بیضه غشای عضلی میباشد غشای آبدار و  
غشای ریش دار فقط و غشا میباشد و مضیتین وقت موجود بودن طفل در شکم مادر پیدا میشوند و لیکن تا پنج ماه بعد و بیضه زیر گردن  
قریب تقاطع میباشد و چون شش ماه یا هفت ماه از حمل بگذرد از آن فرو تر آید و چون ماه ششم گذرد هر دو بیضه زیر مجرای  
شخوان عانه زیر آمده در حریطه های خود آویزان میشوند و چون غشای آبدار و ریش دار و غشای عضلی بر سر شخوان عانه میباشد  
لذا وقت فرود آمدن مضیتین آن هر سه غشا هم همراه بیضه فرو می آیند و لذا بعد از خروج از شکم مادر بیضه مرکب از پنج غشا میباشد  
و غشای سالی یعنی غشای آبدار و ریش دار که وقت بودن طفل در شکم مادر بودند و سه غشای اندرونی شکم که وقت بیرون آمدن طفل  
شکم مادر فرود آمدن بیضه از زیر مجرای شخوان عانه در حریطه خود همراه آنها آمده اند لیکن این غشای عضله که از شکم همراه مضیتین  
قابض خیتار است بخلاف غشای عضلی که در حریطه مضیتین است زیرا که حرکت آن بی اختیار است چه آن بسبب رسیدن  
سردی و هر اذیت منقبض میشود و از گرمی متشنج نمیشود و بیضه منی مادر و قوسی بیضه منی سردی طویل و ضعیف است  
اول بود و این بیضه طویل نیز زیاد از مادر می آید بسبب زیادتی فصل هم در آن می آید که آورده که خون ازین بیضه منی برآمده  
گرفته و رسیده اند از نخیر تا زین بیضه خون بتأخیر خارج میشود و در وقت برنده خون از بیضه منی تا وریه کبیر که در شکم است می کشد  
و آن نسبت گرفته اقرب است لذا این بیضه نزدی از خون خالی میشود و همیشه نصف وزن میانه وقت که را بسبب پختن

و حرکت و انتفاخ قضا فی حرکت ضربانی احتمالی آن وقت شدت شقی ظاهر میشود تا بعین یونانی من سباب آن میگویند که شوق از دل و دماغ بر میخیزد و سرخی بسبب خون و انتفاخ آنکه بسبب در آمدن ریا ح و عروق و حرکت احتمالی بسبب آن عروق بود از کثرت سیح در آن پس حقیقت نیست که وجود روح غیر ثابت همچنین آمدن ریا ح در قضا یا تولد آن در آن غیر ممکن است لیکن فی الواقع قوت عضله که از قوت قوی بسیار جمیع قوی است از دماغ و نخاع در اعصاب می یزد بسبب آن جمله افعال بدن واقع میشوند وقت پیداشدن خواهش یا خود بخود چنانکه در حال نوم بود هرگاه از دماغ و نخاع در اعصاب که آنها را د امر شتوت دخل است مثل عصب سیمانی شیک یا عصبی که از آخر نخاع رسته یاده آید و افاده قوت میکند درین وقت همراه قوت خون هم در قضا یاده می شود و بسبب آن که تناسل یاده سرخ قوت ظاهر میشود و بسبب سیح شدن عروق و چون وسعت عروق است مابیکه در عضلات اندنند و متنازی میشوند حرکت می یزد آن پیدا میشود که از یونانیان حرکت ضربانی احتمالی نام میگردند فصل دوم در بیان حقیقت منی که یونانیان آنرا فضله میگویند گفته اند با آنکه منی طوبی است غلیظ و قوی از جبهه سفید رنگ حسن ظاهر هرگاه بذر یکیمیا آنرا تحلیل کنند از خورده بین بیند پس آن مثل منی جسمانند است یکی از آن آب است دوم سفیدی بیضه سوم از آن که در آنرا بزرگان انگیزی الکلی گویند مثل سو داکا رناس پناس کارناس چهارم از آن میگویند که آن طوبی است که میگویند هم بر آنرا پید کرده باشد مثل جیم از آن جیم از آن جیم است و مثل منی که میگویند که چاک بزرگان انگیزی آنرا گران پول یعنی گرین نور و بعد از آن خوراک خواهد بود شش طم از آن سیل مشابه بزرگ که چاک است منی و منی طویل و حرکت در و منی است و آن مشابه بود به چاک که خوراک زاید یک فریود و آن خورده بین محسوس میشود و منی هم سیل مشابه بزرگ که چاک دارد است و منی از آن چاک پیدایش پیدا میشود و منی هم است فقط که از غده های منی پیدایش میگرد و اول بصورت کروی بود که آنرا بلطف انگاش سیل بینا منند و چون از غده سفید جدا شود از آنجا در مجری منی که قریب پنج بیضه است میرود و از آنجا در پای دو کس آنهم مجری ثانی است و منی که در آن میرود لیکن از مجری اول که قریب پنج بیضه است تا آنجا خود پای دو کس یعنی مجری ثانی آن کرم بدو شق شده صورت کروی را گذاریده و منی منی دم پیدایش منی بعد از مجری اول تا آخر مجری منی جسمانند از منی دیگری که شمار کرده شده پیدایش منی و با منی منی منی منی پیدایش منی و از غده های منی چنانکه لیکن پیدایش منی از غده های منی و این غده های بیضه غذای خود را از خون گرفته از آن طوبی را پیدایش میکنند اما ضعیف که از آنرا عارض میشود و منی چند از آنرا اول نیکه بسبب حرکت جماعی اعصاب ضعیف میشوند و بسبب آن در دماغ و نخاع ضعف لاحق میشود و منی آنکه قوت عصبی که در سبب انتشار و ذکر آن کرده شد و در فعل زیاد صورت میشود و منی آنکه بسبب لذت چون توجز زیاد میشود از منیت هم قوت عصبیه یاده صورت میگیرد و قلیل میماند و از قلیل آن ضعیف پیدایش میشود و چهارم آنکه منی همیشه در آن پیدایش میشود لیکن قوت جماع زیاد و یکبار پیدایش میشود و ازین سبب یکبار زیاد پیدایش میشود و اکثر اشیاء از خون و غده صورت میشوند و بسبب آن در خون کمتری و وقت حال میشود و از آنرا زیاد جماع کردن و منی ضعیف و لاغری میگرد و از آن

فصل دوم در بیان حقیقت منی

بیان سبب ضعف که از آنرا پیدایش میشود



علت گاهی یک بنفشه در خرطیه فرو آید و یک بنفشه در شکم طفل ماند و گاهی هر دو در شکم طفل میباشند و ظاهر نشوند اما مضر عدم نزول بنفشه در خرطیه پس هرگاه بنفشه نازل نمیشود بر مقدار طبعی خود و نیز سدر بلکه نیز و صلب شود و شکم میماند و هرگاه این چنین طفل چون پیشتر میگوید و بعد از آنکه بنفشه نازل نشود بنفشه نازل نگردد و این معنی انسان یعنی در آن یافته نمیشود و هم این کس را مرد میباشند اگر یک بنفشه نازل نشود و بنفشه دیگر فرو نیاید بنفشه نازل کار هر دو بنفشه میکند علاج این ض نیست و از امراض فطریه است فصل پنجم جمع الایض

و آنرا نورال حیا آفاتش گش گویند و مراد از این آنست که در خصیه بدون هم آن پیدا شود و بسبب ذیبت اعصاب چنانکه از این در دو سر حادث میشود و نریمان انگیزی آنرا نورال کجیا مینامند و این درد اکثر نفس بنفشه گاهی در مجرای اپی و دوسم گاهی در مجرای اپی یافته میشود و درین حج در نشین نمی ورم نمید و بلکه نشین ملائم میباشند لیکن تاب علیل انبوه خصوصاً بمقام پنج نشین محال می باشد است زیرا که اینجا حسن یاده است و این درد از بنفشه نرنگر که در حال ماندن طفل شکم او را آنجا بنفشه میماند و آن محل صلی اولی آن بوده منتفی میشود لیکن در باعتبار خفت شرت سبب کم و زیاد میباشند و گاهی این درد مستمر و هر وقت میان دو گاهی در آن بطور دوره امراض دوریه میگردد و شدت بود و باد و از زیاده و کم شود و اکثر همراه این در و یاس نامیدی و دل تنگی مضجار با کمال علامات مایخو لیا میباشند حتی که بیا سبب شرت حج در آن مرکب و کشی میشود و سبب سبب آن گاهی متناوبی شدن اعصاب بود و سبب کموری چنانکه در نورال کجیا بود و درین وقت درد باد و حادث میشود و گاهی بسبب هم و ریدی باشد که در محل البینه است زیرا که این ری سبب هم شدن خود اپی و دوسم میماند چه درین عرق التواء تعالج بسیار اند و چون سبب هم مقدار آنرا زیاده میشود و مجری ندر و امراض احمیت و غیر میکند گاهی از مرض بواسیر هم این درد پیدا میگردد و زمانی که قبض شکم هرگاه در تنابض شکم نهم این در و حادث میشود و درین هر سه سبب درد و ایما بر کمال ماند لیکن آنچه سبب هم و ریدی بود از نو آیدین برینیت استلحاق آن خفت حجت در و میشود زیرا که درین طبیعت خون از ریدند و رید و سی خارج شده بالا میرود

علاج اول تخصص سبب نموده باز آن مشغول شوند پس اگر سبب ری کجیا باشد علاج نورال کجیا از تقویت اعصاب بدن از مثل مرکبات فولاد و کنیغی غیر کنند و هم ایگو نالی میا بر می تخدیر و تسکین حج بر محل درد و مالش سازند و اگر سبب رید و علاج ورم و رید که بطور ضراحی از بستن ریغلا نیدن سوزن از زیر و بالا میکنند تا آمدن خون درین عرق بندگردد و در گری دیگر جاری شود و این خون که از آن هم پیدا شده بود بند شد و بند شد و عرق درین عرق بندگردد و در گری دیگر با سوراخ بند و سوراخ بواسیر هم در و آنچه سبب قبض شکم بود در آن هم از مسهلات دفع قبض نمایند استعمال حقیق آنکه آن برای تعفیض معده و بن صورت اسهال بهتر است و اگر علامات مایخو لیا موجود بود و علاج و تدارک مایخو لیا از ترتیب تقویت بنای نماند چنانکه گفته شد فقط فصل ششم در و راهم الا نشین و آنرا نریمان یونانی و لاشن و ریشیش بفتح الف و سکون و او و اش و طبع کات و سکون یا سی تخمائی و قح ای هندی و سکون یا سی تخمائی و کستر ای هندی و سکون سین جمله آنها و هرگاه در نشین مجری اپی و دوسم دو یا نفس بنفشه و این هم نام کرده میشود و اگر مخصوص مجری اپی و دوسم و ابی و دوسم نام نهاده

فصل پنجم جمع الایض

سبب حج الا نشین یعنی نورال کجیا و نریمان

فصل ششم در و راهم الا نشین

میشود این دم بر سه قسم است قسمی حاد که بزبان گلکش آنرا کیوت گویند قسمی حاد و مزمن که آنرا بزبان گلکش سبکیوت خوانند و قسمی  
بارد و مزمن که آنرا کرانیک گویند و اول بیان قسم اول کرده میشود پس بدانکه سبب آن گاهی جمع مفصل یعنی روماتیسم و گاهی سبب  
و گاهی شوک گاهی سیدن ضرب گاهی هم و اذیت مجری بول بود چنانکه از داخل قاططیر با وقت خروج حصاة و رمل گردد  
و مشانه هم میشود اما هرگاه از سبب رجه مذکوره سابق بود پس اکثر این دم نفس بنفیه حادث میشود و اگر از اذیت قبل مجری  
بول بود اکثر مجری اپی دوس میماند و تا بنفیه رسد العلامات اکثر آنها واپی دوس و دم سختی در پنج بنفیه یافته شود در  
بنفیه دم نمود و در از لمس غمزه پیدا شود و اگر نفس بنفیه بود مقدار بنفیه سبب دم زیاد شود و در دو صلابت ثقل که لازم  
در دم است محل بنفیه محسوس شود و دم چهل بنفیه دایفته شود و تا قریب هفتی گردد و چون دم نفس بنفیه یاده شود اغشیه که سبب اول  
بنفیه شکم بر آن آمده اند هم تو هم میشود و پدید آید و غشیان تنوع هم گاهی حادث میشود و گاهی بی قی هم مطرح میگردد و درین وقت  
در بسیار شدید بود زیرا که غشائی ریشه را که بالای بنفیه است بسبب سختی خون زیاد و وسیع میشود و بر دم تنگ میگردد و در نهایت  
مینماید از فراحت آن بنفیه غمزه در زیاد محسوس میشود و همچون این دم تا غشائی آید از ریب غشائی آید بر دم که بالای بنفیه  
است تو هم میشود و غشائی مذکور آب پیدامیکنند ازین سبب مقدار بنفیه یاده سخت محسوس میگردد و دم بعد از آن این حادث  
رسید و با خطاط آرد و بتوالا بعد آن در خریطه بنفیه هم آب دم پیدا میگردد و درین وقت صلابت مقدار دم ثقل بسیار زیاد  
محسوس میشود و جلد خریطه سنج گردد و در عروق و در و طون زیاد ظاهر شود علاجهش آنست که از سبب اول بیمار را بنفیه استقامت  
خواه باشند و ساده ملائم فیضیه سر آن نه تا بنفیه بلند شود و خون از آن بالا رود و دم بعد خون بقدر مناسب بگوید و فتن  
عروق بنفیه تین آن را تا تعلیق علق مناسب نیست زیرا که گاهی تعلیق آن دم در جلد پیدا میشود و بعد از آوردن خون هرگاه بنفیه  
نعمت نباشد و پارچه آب مطبوع پوست خشک تر کرده از آن کمی سازند و بعد از آن مسهل قوی که خراج آب و ثقل میگذشتا ساغاس  
نوشانند لیکن بالنظر به آن مارترایمیک کساکش یا شنگه های سائیش یک سازند تا تسکین جمع و راحت سانی  
و کم کردن جوش خون معین شود و خون زرد بسوی دم کم رود و وقت شب قبضه فتن کیلول چهار گرمین و دو وین و دوده گرین  
بخوراند که ازین دم هم کم خواهد شد عرق هم خواهد آمد که از آن جوش خون کم خواهد شد پس اگر بعد تین بیز هم ماند باید که از آب از  
دم جدا شد در خریطه بنفیه جمع شده آنرا باریع نشتر بر آید و چون خریطه از آب خالی شود و نفس بنفیه جمع باشد که سبب  
ثقل دم باقی بود با و خال نشون جو فار آب نفس بنفیه هم میران رن پس اگر بعد این همه ابی هم دم باقی بوده باشد درین وقت  
خریطه بنفیه اچان کشند که بنفیه یک طرف آن اندازند و بعد حلق شعر عصابه های که بر آن دم هم شکران لوده باشند خیریه  
چسبانند از اثر غمزه آن بنفیه منقرض شود و آنچه مواد در آن از دم منصب شد جمع بود بسبب غمزه و عصابه جاج شود و دم  
زایل گردد و درین وقت ایو و ایو پلاس زنج گرین ده گرین آب ساده حلو کرده نوشانند تا بزوال دم معین شود و تا قسمی  
پس اکثر سبب دم از فرو قفس پیدا میشود و صلابت چهل سالگی اکثر سبب نفیس پیدا میشود و از دیگر سبب کوره در قسم



پارچه که بر آن عزم شکم آلوده باشد چنانچه در دم اینک غشائی بالائی بقیه از آن بریده یا دهن نیم را از کار و قطع کرده  
بیشتر از آن جدا ساخته بقیه اندرون خرد کرده باز دهن نیم را بر برگزیده بر آن پارچه شکم آلوده برینند و ضرورت بریدن  
غشائی بقیه توسیع در نیم نیست که درین وقت غشائی بقیه در نیم هر دو نیمه و یکفات میشوند و مادام که آثار جدا نگذاشته شود  
اندرون رقتن بقیه یا منضم شدن نیم ممکن نبود و فصول هشتم در صفت غشائین یعنی کم و خورد شدن بقیه و تقطیر  
طبیعی خود و این اثرنی آتش کش گویند و حقیقت این مرض آنست که غده یا می اندونی بقیه نوزاد کوچک میشوند و بسبب آن  
نقصان در تولد نطفه راه یا یعنی اصل نمی در آن پیدا میشود و مقدار بقیه غیر متساوی میگردد و ضرر آن همین است که نمی پیدا میشود  
و سبب آن اکثر در مجری اپی دو دمس است هر گاه سخت صلب شده باقی ماند زیرا که سبب صلابت آن خون در غده با کم میرسد  
گاه گاه بسبب هم هر دو غده مولد لعاب بن که در فکین نیم این ض پیدا میشود و چند وجه آن ظاهر نیست لیکن در شرح  
اکثر چنان غیرت که با این ض هم منظر الانشین میباشد اگر از غشائین یکی صغیر شود و دیگری بر مقدار طبیعی خود ماند نقصان  
تولد منی صاحب آن نه نیاید زیرا که یک بقیه که خود خواهد کرد اگر هر دو صغیر شوند درین وقت با ضرر کار تولد منی متعین میشود  
علاج این مرض هم علاج است فقط فصل نهم در غشائین و آنرا با می پریشنی آتش کش یعنی زیادتی مقدار انشین  
گویند و گاهی سار کوسیل آتش کش یعنی زیاد شدن گوشت اندرون بقیه که منسلع شود هم گویند و گاهی همراه آن آب هم  
در خرد پاشین پیدا میشود و درین وقت هم کرده میشود از سار کوسیل و غشائین بر پنج قسم است و حالات و علامات و معالجات  
اقسام مذکور اکثر مختلف بودند و اول پشیل یا می پریشنی یا سچیل سار کوسیل گویند و آن یا طری مقدار است که بعد از مخرن  
باقی میان دو رقتن هم در بقیه مجری اپی دو دمس و دو هم میباشد و بقیه بصورت بیضاوی خود سخت گشته مستوی السطح بر  
صورت سطح بقیه باقی میان دو رقتن در دم بود و گاهی همراه آن آب هم در خرد پاشین آید یا یافته میشود و درین وقت با میزد  
سار کوسیل میگوند و درین وقت مقدار خرد پاشین غشائین هم میگردد و عند الفخر ظاهر میشود که در آب مذکور صلابت بقیه از آب جدا نمیشود  
میگردد و بدون غم فرق در زیادتی مقدار خرد پاشین یا مقدار انشین میتوان کرد و این آب در دم مخرن بقیه پیدا میشود و اگر در  
خصیه بود و از دم خارج نگردد فائیدن جدا شده ریزد درین وقت غشائی خرد پاشین هم می چسبد و از آن اکثر و منسلع و خرد پاشین  
و از آن غشائی خصیه و خرد پاشین خود بسبب هم یک افتاده دمل گشته بسببی خارج میل کرد و بعد بوسیده و شقی  
کردن اغشیه بسببی خارج منقبض میشود و در بنجالت نیم دمل مذکور تبدیل و سچیل میگردد و انگور از خصیه پیدا شده تا بالائی صلب می  
و گاهی منسلع نیم زاید در دهن نیم می آید گاهی نصف بقیه خود از دهن نیم بیرون می آید و درین وقت گاهی آنرا فکس کش  
و گاهی هر یک آتش کش میگویند و درین وقت اکثر در یک بقیه مرض پیدا میشود و بقیه دیگر هیچ میانم العلاج اکثر از بنش  
عصا بطلکن آلوده بر آن صحت میشود و اما هر گاه همراه آن آب هم در خرد پاشین آید یا یک اول آب مذکور را بزرگ شود و کار  
بر آورد بعد عصا بطلکن آلوده بر آن نهند و مادام که فکس کشی نیم زاید را داخل بود این بیکرانی میشود و لیکن گاه گوشت نازک پاره

بسیار از آن جدا شده

فصل نهم در غشائین



زیاده از این قسم بیرون آمده باشند درین وقت اول از کار گوشت زایل را بریده تا دهن زخم برآمده کناره های جلدار  
از زخم را بیدار و خفیه جدا کرده بعد آن عصا بشکل کبوده بران بندند تا جلدار از گشته زخم را پوشد و صحت حاصل شود و هم چو بر کل  
پرترنی آفتش است و این قسم سهولت در قویین یاده دیده میشود و ایضا خاصه در کسانی که ضعیف خون شان قوی گز  
بود گاهی چو بر کل خفیه شان میریزد و اول چو بر کل در مجری اپی دوس پس از آن جبل الانشین نفس نشین میریزد و علامات  
اکثره مجری اپی دوس افسان سختی ورم یافته میشود و عند الغز قدری در محسوس شود و این جنس نشین من است در مدت درازتای  
زیاده میگردد اما هرگاه چو بر کل خفیه در درین وقت هم گاهی هم حار پیدا شده از آن پسین نخیه غشای آیدار بر خفیه میپسند و زخم  
پیدا گردد و مثل قسم اول بعد انفجار گاهی گوشت و وادو گاهی نفس خفیه و زخم می آید و این قسم گاهی بعد از آن که هم پیدا  
و از آن همیشه آب قوی جاری میماند و این قسم خطرناک است اکثر همراه آن چو بر کل در اعضای دیگر هم میریزد و از آن پس  
پیدا میشود و گاهی این قسم تا مثانه و تا غده های عنق مثانه و گاهی تا گردن هم میریزد و درین قسم هم در هر دو بیضه در هر دو مجری  
اپی دوس یافته میشود لیکن یکی کم و در دیگر از آن یاده بود و العلاج علاج خاص آن نیست آنچه در دل و در میوه میل و عن  
و سرپای پوفاسفکات لایحه غیوه او و بیضه شان لایحه نادر که در هم نوشاند و از او بیضه درین قسم نفع کمتر ظاهر میشود و اما اگر  
چو بر کل نفس اپی دوس خفیه نخیه باشد در اعضای دیگر بدن نیافتاده باشد و همچنین این قسم تا مثانه و غده های عنق مثانه  
و گردن رسیده باشد آنرا قطع کنند لیکن اکثر این علاج هم نمیخورد و بسبب منتشر شدن چو بر کل در اعضای دیگر نفس نفس  
پاک میگردد اما قسم ثالث که سفکات ای پرترنی یعنی بادی مقدار انشین که بعد از آن کشاکش آخر در جبهه ترش می پیدا میگردد  
و درین قسم ثلث کشاکش یک نوبت خفیه گاهی در تمام جسم آن میریزد و در صورت اول سختی ورم موضع خاص ممتاز میگردد و در صورت  
ثانیه تمام خفیه متورم دیده میشود و گاهی همراه این قسم هم آب در خفیه خفیه پیدا میگردد و علامات اول زیادتی مقدار  
خفیه و خواه ستوی بود یا جابجا مقدار آن بادی و کمی محسوس گردد و چنانکه در سرطان سخت یار میشود لیکن بیضه سرطان سخت  
حادث نمیکردد و درین قسم سختی مثل صلابت غفروف یافته میشود و عند الغز در محسوس گردد و لیکن بسبب یاده شدن مقدار  
خفیه نفس تمدد و تحمل گزده تا بیضه محسوس میشود و درین قسم تل پیدا میگردد و اکثر این هم در یک بیضه عارض میشود و گاهی در هر دو  
حاکم گردد و چون موضع خاص بیضه دوه کشاکش نیز سوائی محل انصباب مواد در موضع دیگر بیضه که عند الغز نیست صلی آن  
محسوس میشود و زیادتی مقدار این قسم سختی بیضه میباشد و مجری اپی دوس یافته میشود و العلاج کند هم علاج خاص آن نیست  
خبر اینکه آنچه تا بیه وادویه در علاج قسم شری آن نوشته خواهند شد آنرا به بل آن استین عصا بشکل کبوده درین قسم هم مفید است اگر  
مرهم سیما قبل استین عصا به خفیه الیه عصا نادر که بر بندند نفع خواهد بود و چون که در تحصیل این قسم شلش و شوار می افتد  
از آن فقره ضروری البیان است پس بدانکه قسم اول جبل الانشین غلط و ورم زیاد پیدا میشود و قسم ثانی غلط جبل الانشین کمتر  
میباشد اما جایی که چو بر کل نخیه در مجری می هم و زیادتی مقدار زیاد و دیده میشود و قسم ثالث جبل الانشین حال صحت خود میباشد

[illegible]

تقریر بحسب مقدار و در  
تقریر اعتبار فی حدیث

من وادع

گویند سبب آن یاده پیداشدن آب پیداشدن این آب در غشای آند در بعضی پیداشده در زیر لپان مجتمع میگردد و اکثر تولد آن  
در وقت تشوید اول در سن طفلی تا گذشتن شش ماه بر ولادت دوم بعد تمام شدن سن نمو که آن حتی پنج سال از طبعی است سبب  
گاهیم مجرب از من بعضی چنانکه گفته شد گاهی که سبب ظاهر نبوده اما آب پیدایش خود در ملک گرم مثل سن و ستان این مرض یاده پید  
میگردد و بعضی میگویند که هرگاه بر طبع فاسد شد مورث حیوانات تا به سبب و در چنانکه در آخر برشکال بود پس کسیکه درین حیوانات مبتلا  
میشوند اکثر ایشان هم این مرض پیدا میشود چنانکه در شکم ایشان آب پیدا میشود و در اطفال صغیر آب و نیم پیدایش می آید که در غشای آب  
پیداشده گردیده نشان آن نقطه دوم آنکه گردیده در جمل لاینین و در و از آنجا تا جواب تن جوان منتهی شود و چون آنجا رسید بر اگر  
راه نزول خصیه نباشد آب آنجا رسیده متوقف میشود و اگر راه نزول بخصیه می جواب نباشد آب آنجا رسیده متوقف میشود و اگر راه نزول بخصیه  
می رسد شکم میریزد باز از شکم در بعضی می آید و در کبار و رجال همیشه آب گردیده در جمل لاینین متقی نمیشود و علامات  
هرگاه با اطفال عارض شود بعضی که مقدار شش و پرو در خشان می شود و هرگاه آنرا نمکند در کم پیدایش که سبب تفتاح  
آن قدری در محسوس گردد و اگر راه جمل لاینین کشاده باشد از عمر کردن با گشت آب بالا می رود و بعضی می شود و چون سبب  
باز دارند از آب در کم می آید اگر آب یاده مجتمع باشد در بعضی در جمل سخت بینای لیکلین دست نهادن معلوم میشود که حتی آن  
مشک پر آب است که بالینت پیداشد و چون طفل گردیده مقدار آن یاده میشود و بخلاف نزول معاکه آن وقت گردیده طفل یاده از  
شکم در بعضی می آید از آن وقت گردیده مقدار بعضی یاده میشود و وقت سکون گردیده از عمر کردن شکم میریزد و چون آب پیدا می گردد زیادتی متعلق  
از زیر بعضی شروع میشود و چون معاف و آید زیادتی مقدار از بالا پائین می رود و چون طفل او در کمره تاریک برده چنان پس خصیه را  
از پیش خصیه بیند آب مری میشود و چون این مرض بر رجال و کبار عارض شود مقدار بعضی یاده میشود و از عمر کردن در محسوس گردد  
یا بسیار کم محسوس شود و در زیر مقدار بعضی یاده میگردد و در پیش این مقدار از لایه بیضاوی بود و بصوت ناشیاتی باشد و گاهی  
بسیار زیاد و مقدار از جمل سبب چون آنرا از سر گشتن نمکند چنانکه سبب پر آب تفتاح میشود و هم چنانکه در زیر بعضی پید  
آنجا حتی بعضی هم در و با آن محسوس میشود و چنانکه آب است حتی و در و از آنجا ناشی می شود این سبب است مرضی که نقل آن زیاد  
مقدار متناهی پیدایش هرگاه جمل لاینین محسوس کنند و شخص بیاضات محفوظ از و محسوس میشود بخلاف نزول معاکه در آن  
جمل لاینین غلظت زیاد محسوس میشود و در میان آن شکم میریزد و مقدار بعضی می شود بخلاف نزول معاکه در آن شکم کردن  
معاف بالا می رود و مقدار از زیر بعضی می گردد پس اگر بعد از امتحان غلظت معانی است شباهت در شخص باقی ماند و در کمره تاریک مرضی را  
برده روشی پس خصیه آن نهاده از پیش خصیه بیاضات ظاهر گردد و در آن وقت بدون آب شوی در آب محسوس خوش باشد و از آن  
یقین میشود که آب است و علاج هرگاه در اطفال این مرض پیدا شود آب سرد نه یا با سکه که بختی بر بعضی چنانکه تا سبب آن سرد  
و قوت در بعضی آید و تولد آب متوقف شود و اگر از این کار به نیاید میو یا میو یا س یک گرم و سبب این یک تا پنج است و آن  
آب ساده و کلکه و پاره بان تکرار بر بعضی بند و بار این و از این چنانکه از استعمال آن آب متولد نمی گردد و آن را دیگر

پیدا نمیشود و اگر او فرول به غیبه میریزد بحال استخوان طفل کشاده باشد چیزی که قلیل لشقل بود مثل کلوئی ترادر آب بسیار ترن  
 مذکور نماده مثل لنگ پارچه بر آن بندند تا آب سرد شود و اگر از این صیحت نشود از خون جوف را آب از طریق خصیه بیرون رند هرگاه  
 این ضایحه جانج کبار جال قدر اول مفر را بینه که مریض لنگ بندد تا از او بیشتل کم متاوی شود و هرگاه آب بسیار زیاده شود  
 درین وقت تدبیر اخراج آب نمایدند بر روی شتر زیرا که از استحال و در شتر با وضو او درین ضایحه منفعت نیست بطریق این نیست که  
 تفحص ضیق کنند از دست اگر ضیق طبع باشد چنانکه ششیر جای آنها گفته شده درین صورت جایگزین طبع پر آب باشد و آن به شتر  
 مقیم بود آنجا شتر خل کنند لیکن او خال شتر لحاظ و او ضرر است و آن یکجا یکجا شتر نیز خال از عروق کبار باشد و آنکه  
 بعد از خل کردن شتر بسوی بالا برانند که کتله بیضیه ان محفوظ ماند و خصیه خمی نشود و بعد از این بیهوده آب بیرون آید اگر بعد  
 از این سیر باز آب پیدا نشود بهتر است که بعد از سه ماه محتاج بسوی این بخواهند ششیر لنگ از این بیزل تنگ شده مریض در خواست  
 نماید که تدبیری سازند که باز آب از طریق نیاید درین وقت بعد از آوردن آب باز رویه را قله و بیچینه هستند که آنها را در بعضی میزنند  
 اول آنها و اول از ششیر او درین است پس اگر کم آید آب خارج شده باشد و درم و اگر یک یا دو آب خارج شده باشد چهارم و  
 مذکور در طریق انداخته ششیر را در یک ظرف قرار دهند و در آنجا که در آنجا مذکور در تمام طریق منتشر شود و تا ششیر در آنجا نماند و در آن وقت  
 باز از طریق بیرون رند و فایده این بیشتر است که از تمام حال این و او هم حاد و در طریق پیدا خواهد شد بعد از آن طریق با هم ملحق شود  
 و محل جمیع آب باقی خواهد ماند پس اگر ضیق شدت کند بعد از این عمل پسند آب سرد نماید یا با سرکه مخلوط کرده بر رویه بچکانند  
 و واسی میوینا و افوقی بنخه بالا برانند تا از این احتیاج علاج نیست که این هم بعد ده و از ده روز خود را بلی میشود  
 ایضا از او بیاضه قایم مقام ششیر او درین نک سلفاس است که یک سوم از آن هشتاد و نسل آب ساده جلوده بندد و از او در طریق  
 بعد از آوردن آب مثل ششیر او درین سیر ساخته و که شرب پورثین است که از نیم او نسل یکا و نسل از آن طریق بعد اخراج آب  
 از او سیر ساخته لیکن ششیر او درین سیر بهر بقوی درین باب است که فصل یازدهم در مجموع شدن خون و کلیه ضعیف  
 یعنی اغشیه و نفس بیضیه آنرا بافت کر یک نیمه او سیر ساخته و نسل از این جن هم ششیر او درین سیر میباشند زیرا که باقی مقدار  
 بالیت اینجا هم میباشند لیکن گاه در مکره تاریک بیمار را برده چنانچه پس خصیه ششیر او درین سیر ششیر او درین سیر ششیر او درین سیر  
 چنانکه وقت بودن آب در این ششیر او درین سیر ششیر او درین سیر ششیر او درین سیر ششیر او درین سیر ششیر او درین سیر  
 فی اغشیه الانشین است کرده میشود و سبب آن سبب سیران صدمه شرب غمزه و گاهی درین سیر ششیر او درین سیر ششیر او درین سیر  
 مانیت هرگاه ششیر او درین سیر ششیر او درین سیر ششیر او درین سیر ششیر او درین سیر ششیر او درین سیر ششیر او درین سیر  
 عرق از عروق جبل الانشین بهر سبب کشق شود این ضایحه پیدا میشود و گاهی سبب کشق شدن که هم  
 چنانکه نزل و الیاء نوشته شده درین ضایحه مقدار بیضیه زیاده میگردد و یو مایه با بتدریج زیاده میشود و هرگاه بیاضی یا جوش  
 ناشپانی و چون جبل الانشین را بهینه مقدار اصلی شود بخوبی محسوس میشود در که هم مقام از جوش آن لحاظ فریاد و مقدار بسیار چنانکه

فصل یازدهم در مجموع شدن خون و کلیه ضعیف

نزول معبود و مدت مای در از مثل سال و سال این خون غشیه بفریق و سیال میا باشد و از غشیه احساس کردن با گشت  
در آنهم می مثل می مشک آب محسوس میشود و از بخت و شخص آن اشتباه راه می یابد لیکن چون در اسباب آن غشیه کند از حد و ثبات  
بعد یکی از اسباب ثلثه مذکوره و از ندادن دوشی پس بیضه نه دیده شدن دوشی آن در حقیقت میفرقی توان کرد با کجای بعد از آن  
این خون منجر میشود و از آن قاعین جدا میگردد و درین وقت مقدار بیضه نسبت سابق کم میشود و در مقامات مختلفه آن غلظت و صلابت  
و از و یا مقدار روین صغیر مقدار دیده میشود یعنی جایی که خون منجر بود و آنجا مقدار از زیاد و با صلابت میا شد و جایی که آب فایز  
است لیس قلیل مقدار بود و چون ثبات با بخار شد اکثر درین وقت هم پیدا میشود و چون کم پیدا گردد تب می یابد چنان که قوت پیدا شدن کم  
می آید پیش ستور و امیل جلدیه در جانی از خطیه تنوید شود و جلد بالایی آن قوی در خشان سرخ میگردد و بعد از آن بر جلد سفید  
هم پیدا میشود پس شق گردد و هم خارج میشود لیکن بعد از آنهم حتی باقی میماند و مقدار بیضه صغیر میگردد و بسبب بقای صلابت نسبت  
آنچه توان منجم شده باقیست از آن صلابت موجود بود و العلاج چون ثابت شود که خون قوی در بیضه جمع است و داخل کردن  
نشتی و کواکب از این بر آن بر آن پارچه شکل او و نداده بر بندند و هرگاه خون منجم شود و آب از آن جدا گردد درین وقت خرطیه را چا  
کند خون منجم آب از آن بیرون زن لیکن این عمل یکبار خرطیه صاف نشود بلکه مکرر جا بجا حاجت بیچاک کردن خرطیه و پاک کردن  
خون می افتد اما اگر یکبار جلد خون منجم و آب را بر آن از آن زمان پارچه شکل او و نداده بر بندند که از این تبریر  
و هم تازه پیدا میشود و بسبب منخرطیه متصل و یک ذات میگردد و آینه جانی نزول و اجتماع خون باقی نمیداند فصل اول در  
در مرض و ریجیل الانشیم این ریگهای بسبب کمزوری وسیع و بسبب ثقل نشین بسیار طول میشود و چون در  
از و یا در دوق و تحت نیاید بسبب ثقل و هم نفس خف می یچید و در آن از التواء عقود بر آن پیدا میشود و آنرا با بخت لاشن و  
نشین نیکو کسانیکه پیش از آن همیشه ستر میمانند و ایشان همچنین فصل دوم اکثر این مرض پیدا میشود و کسانیکه همیشه غلظت  
ایشان منقبض میمانند و ایشان کمتر این مرض حادث شود و این مرض در سرد و جانب جمل الانشیم پیدا میگردد و لیکن اکثر  
در جانب راست شود زیرا که ورید این جمل در از دست تا گره ریه خون را بر روی از بیضه میبرد و ورید جانب راست پس بسبب  
طول آن خون آن یاده میماند و هم بسبب نیکو در مجاد قوون همیشه بر آن میماند و آن ورید را فراموش و غریب کنند پس بسبب آنهم  
در جبهه این خون آن تا نر و توقف راه می یابد تا اینکه از ندادن شدن ثقل دم رفته رفته در آن ضعف و مرض پیدا شود و علامت  
اول قریب جمل الانشیم قدری لیسنت و غلظت به نیست مثلث یافته میشود و چون بیمار به نیست متعلقا غشیه خون بالا رود این غلظت  
کم میگردد و چون بیمار بر خفته قائم شود فوراً غلظت مذکور بر مقدار خود و میگرد و گاهی همراه آن در در انشیم یافته میشود و آن در  
تا گره و هر چند آنکه در مرض جبری الی و دوس میشود و چون طبع منقبض شود این مرض زیاده میگردد و چون این مرض در بر ترمان غلظت  
نخوبی بیضه تنین میبرد زیرا که یکی از غشیه آن خون کم میبرد و هم بسبب هم خون از بیضه بخوبی بالا میبرد و اندک بیضه لازم خفیت میگردد  
و گاهی مرض النجولیا از آن پیدا میشود زیرا که از ضعف جریان منی عارض میشود و بسبب آن شتوت جمیع ضعیف میگردد و چون قوت

فصل اول در امراض خفیه

در علاج



یعنی که تپش در کوزه قطره تابست قطره باشد یا همراه سفوف کنتیبه و س که گرسه شور در زبان عربی باسمه و ایچ است از نیم  
 گریه یک کرین و از این سکه با رنجور است و همچنین مرکبات آهن مثل سکه سبیل همراه سکه ناکس و ایچا یا سکه کنتیبه و س که نبوشانند اغوا  
 مقویه خوراند و تا تک سرب هم درین قضا در فضیله است نوشانیدن خون جگر با سرب فیر فاسفس است در هوای صاف  
 و شبنم گوانیدن مفید است و سببی دیگر از سیلان می آید که بکول کسانیکه رسن و خونی عری پنج سالگی قدم بیرون نهاده  
 ان عارض میشود و این بلغث انگشت نشوینش معنی عدم توت ناستند آن وقت شب بصوت خفلام میباشند بلکه قبل از طلوع آفتاب  
 از منی خارج میشود و جماع کردن بان نموده و این خنک ملک هندی بگانه یاده میشود و اصل دران مکروری وضع میباشد که  
 امراض چند حال عیش و شغل و هم مزمن بیضه یا از سوزاک از تنگ شدن مجری بول یا از دم غده که پیش نشانه میباشد از مرض  
 و ریدل الانشین یا از در بیضه که بطریق نور انجیاس پیدا شود یا از صغیر شدن بیضه علاج آن علاج امراض مذکوره است بعد آن  
 تقویت بدن مفید است هم از نشاندن در آب سرد فایده حاصل میشود و اگر درین مرض هم قوت شب خفلام شود و باریک شود  
 و او وید و دیگر قوه در کور شدن نبوشانند لیکن آنچه بسبب صغیر شدن بیضتین پیدا شود لا علاج است قند کز فصل چهارم  
 در قوت و نقصان شهوت باه و این مرض بلغث انگشت نشوینش معنی عدم تقویت هم نشوینش معنی قوت و این معنی قوت و این  
 نبودن ناستند مراد از ان نیست که خواهش جماع کم باشد یا ناستند لایق زدن بازی نبودن این برین قسم است باعتبار سببها  
 یکی آنکه انجالت بسبب اشتغال خیال فکر در علوم یا عبادات و صناعات بود و بسبب آن خیال خواهش بگریز دل پیدا نشود  
 و هم آنکه از شربت محنت و مشقت بدنی قوت عضلات و مشقت جسمانی صرف شود و برای جماع باقی نماند و بسبب آن خواهش  
 جماع نکند سوم آنکه بسبب کثرت جماع و مباشرت بانسوان قوت کم شود چهارم آنکه نفرت از نسوان بطبیعی بود و درین قسم هم  
 بر سبب علامت آن خواهد بود و العلاج از هر سبب باشد برین کون آن پروازند و آنچه بسبب مقتضای طبع خاص شخص  
 لا علاج است تا آنچه از کثرت جماع متضرر شده باشد بر این آن استعمال میسر نشود جماع ضرورت آن نیست که مدت مدید خود را از  
 جماع و صحبت انسوان باز دارد و آنچه در علاج سیلان می برای تقویت نوشته شده آنرا با استعمال خود آورد و قوی در نقصان قوت  
 نیست که در آن شوق و رغبت بر جماع میباشد هرگاه که خواهی جماعت میکند لیکن این اولاد نیابد و بسبب سبب در آن آنکه  
 که این کس قبل از جماعت کثرت و مباشرت نسوان کرده باشد بسبب آن غده های بیضه خالی از مایه و نه بیضیت  
 شد باشد بسبب آن که نون مایه می صالح پیدا میکنند و گاهی بسبب هم مزمن بیضه گاهی بسبب هم مزمن مجری بی و کوس  
 هم می خراب و بیضیت پیدا میشود و از ان ایق تولد تولید نیابد قوی در نقصان قوت نیست که در آن می پیدا میشود خواه بسبب  
 طبیعی یا بسبب که مرض از امراض غده بیضه العلاج هر جاکه سبب شخص شود برین کون کوشش و اگر طبیعی بود لا علاج  
 است و بعد رفع سبب مرض ای تقویت همان بیضه را که در سیلان می برای تقویت نوشته شده قند کز فصل پانزدهم  
 و صغیر غلقه و خیش لقبه آن و آنرا زبان انگشت گریه می روز یکبار سکه کون یا بی تختانی و هم سکه کون و و کسری متعطل

فصل چهارم در قوت و نقصان شهوت باه  
 در قوت و نقصان شهوت باه  
 در قوت و نقصان شهوت باه



اول و سکون ثانی نامند و آن صند و غلقه ضعیف ثقیله است که بسبب آن پس حشفه غلقه منقطع نشود و آن بر دو قسم است یکی غلقه  
و خورش است که بسبب آن قضیب کبر نمیکرد و صغیر میماند زیرا که خون از غده وایمی غلقه و صغیر آن در حشفه قضیب کمتر آید و گاهی  
ضیق ثقیله آن بجا رسد که از خروج بول هم مانع شود و گاهی مانع نشود لیکن نیامدن آن پس حشفه و همیشگی پوشیدن آن بر  
غلقه حشفه غده هائی که چاک که بر کناره حشفه بود صاف نمیشوند و آخر بسبب آن هم پیدا میگردد و گاهی در میان حشفه و غلقه  
پیدا میشود و بطا هر وقت آن صفت بل بود لیکن گاه از نشتر کشیدن در آن سنگ نریه با یافته میشود و یا بچه و اکثر و شایع است  
فیض آید از زیر غلقه بیا چهار سنگ نریه برسد و گاه در سن آورده بودند و زیاد ضرر آن در سن طفلی جوانی میرسد اما در سن طفلی آن  
است که بسبب ضیق غلقه و نه انگار زیاد با ایشان میرسد زیرا که قضیب ایشان بار بار ایستاده میشود و متغیر میگردد و از اذیت  
آن بگذرن نشان که متعدی شود و از آن ضعف در شانته می آید و بسبب آن بول ایشان جاری میشود و گاهی بول از هم میماند  
میگردد و گاهی از اذیت نشانده میشود که آن چنان خجاست که حلقین پیدا میشود و اما اینکه چگونه نسبت این عارضه و حلقه  
میشود پس دلیل آنست که هرگاه غلقه قطع گردد میشود و عارضه حلقه در سن جوانی پس بسبب آنکه اکثر توجه بسوی این عارضه  
میان و بار بار پوست بر آن میزد و از مالیدن دست اندازی میاید پس غلقه قوه عادت جلق زدن پیدا میشود و هم در عالم خواب  
از اذیت آن آزار میبرد و میشود و جوانان که بول خود و گاهی خورش است که مانع از قوت و فرزندان میگردد زیرا که چون ثقیله تنگ  
شود و وقت انزال جماع منی در غلقه ماند و خارج نشود زیرا که وقت شست و تنگی آن زیاد میگردد و چون جماع خارج شود ایستاده  
رفع گردد و منی از غلقه است ته ته بر می آید از این بسبب منی وقت جماع در رحم نمیرسد و پس ولاد پیدا میشود و چون صاحب این مرض  
مرض سوزاک پیدا شود و بسبب متغیر بسبب آن گند گردد و از غم کردن غلقه بسیار متاخر میشود و هم دوم از آن است که بعد از  
بطور مرض و اذیت شود و آن اکثر بعد سوزاک پیدا میگردد زیرا که چون در آن بار بار و هم بر یکس میبرن حشفه میوکس میبرن غلقه  
پیدا میشود از ماده و هم آن میوکس میبرن غلقه غلیظه است این مرض پیدا میکند و گاهی بسبب پیدا شدن ثبوت از شش شدن  
و ترقین میوکس میبرن غلقه متوم شده تنگ میگردد و السالاج علاج عام است که غلقه از کار و بسیار حشفه نایاب  
و اذیت قضیب بر طرف نگردد و آنچنین غلقه بسبب پیدا شدن ثبوت از شش شدن میوکس میبرن بسیار باشد و در آن  
علاج اورم و ثبوت نمایند حاصل شانزد هم در پارانی سوزن و آن است که غلقه از شش قضیب نایاب باشد و بلکه بسیار  
خطرات رسیدن پس حشفه تنگ گردد و بار حشفه آسانی نیاید و از آن نیست که از این در دو هم حشفه زیاد میشود و بول  
به شواری می آید این مرض اکثر از اطفال کسانی را افتد که غلقه آن از ساق ضیق بود و اذیت از غلقه پس حشفه و اذیت  
آن جاریست که هنوز آن بجای خود بسبب ضیق اصلی دشوار گردد و گاهی در جوانان هم این مرض میرسد و وقتیکه تنگ  
یا سوزاک هم حشفه پیدا میگردد و برائی میماند هم غلقه را پس حشفه کشیده می بیند بعد از آن چون خواهند که بجای خود آید  
و علاجش آنست که اول دست حشفه نماند و غمگند تا آنچنین در شش نماند و در حشفه غالی شده و تنگ گردد و در حشفه آنرا

[illegible]



حالت خواب از منی بگویند و آن بر دو قسم است یکی آنکه با قوت قوت بود و هرگاه جماع بار آورده خود کند در آن برودی منحل نمیشود  
 این فی الواقع مرض نیست لیکن اکثر سبب آن قلت مشقت جسمانی میباشد که از آن خواب ثقیل نمی آید و سبب یاد خواب  
 کردن آرام نمودن مجمل خواب میشود زیرا که در خیال اکثر خیال انسان یاد می آید و شغل و هم سبب یاد خواب خوردن و هم خوردن  
 اغذیه مقوی مثل زرد و بنفشه مرغ و یک قسم هم می آید که از انزال بانشاید و سبب کثرت خلام میشود و از انزال و جماع و تحمیل  
 و افعال عورات و از زیاد صحبت و کلام کردن با عورات خصوصاً که کلام مثل مضحکه و خنج و دلال باشد هم این حالت پیدا میشود  
 از خوابیدن بر پشت متعلق هم اکثر خلام میشود و از اینجا بعد مرض نرسید و گاهی از اذیت قضیب چنانکه در امراض غلفه نوشته  
 و هم جلق زدن هم از متوهم شدن مجری بول که قریب غده پیش مثانه است هم از سوزاک هم در مرض من من مجاری و گاهی  
 از اذیت آن خلام میشود و این هم از امراض است العلما مات عموماً علامت این مرض این است که اول در خواب خواستش شتوت  
 میشود و من بعد می بیند که با عورت جماع میکند پس منحل میشود و اکثر فریاد انزال یا همراه آن بیدار میشود و گاهی قوت انزال  
 نماند لیکن صبح هرگاه از مجمل خواب برخیزد و جامه خود را منی آلوده می یابد می داند که تخلم شد و علاج اول از تقوی مخصوص میباشد  
 پس بفرم آن پروازند مثلاً اگر از قلت مشقت جسمانی بود امر مشقت فرایند و زیاد شوی درین وقت مفید تر باشد زیرا که سبب  
 بدن مانده و ضعیف میشود و از آن خواب ثقیل می آید و اگر سبب کثرت خوردن اغذیه بود و مقدار غذا تقلیل نمایند و اگر خوردن  
 اغذیه مقوی خاصه بود و من آن خوب بقول در غذا زیاد خوردن و اگر کلام و صحبت کردن با عورات این حالت پیدا شده باشد  
 ترک کلام و صحبت و اگر عورات نمایند مشغول بکدام صناعت شغل که منافی اول بود سازند و اگر خوابیدن بر پشت متعلق  
 بود بر پهلوی خوابانند و بر کمر چیزی مثل غلوه که بران شیم چیده میباشد بربندند تا که در عالم خواب هم گاه بر پشت متعلق آید و خلدن  
 و اذیت آن بیدار شده باز بر پهلوی آید و اگر از اذیت غلفه بود غلفه را بپزند تا اذیت قضیب برطرف شود و اگر سبب جلق زدن بود  
 ترک فعل مذکور و خود تقوی و باغ و خلع کوشند و اگر سوزاک یا در مجری پی و دوس بود علاج هر یک از آن کوشش چنانکه در  
 جامی خود نموده است و اگر در مجری بول که قریب غده پیش مثانه میباشد حادث شده باشد در آن قاعاطی خوراندن از انزال  
 آن کاشک محلول آب بندر یعنی زرافه تا محلول من رساند و طریقی است آنست که قاعاطی خوف که برای اینکار مخصوص است در آن  
 قطعه سفنج با کاشک محلول تر کرده نماده از خیر می مثل میل باریک از آن گرفت تا قطعه سفنج تا آخر سر نیویسد که متصل مجمل  
 و هم است آنرا آنرا خوب نمکنند که از آن قطره چکیده مجمل مقصود نیز در وقت که بعد از آن سبب برای تقوی قضیب و قضیب  
 آب سرد نشانند و اگر ضعف بوده باشد علاج تندستی از هم خوراندن اغذیه مقوی و نوشانیدن او و تقوی مناسب  
 مریض فرایند و در همه اقسام نشانیدن برومانی و شایسته وقت خواب مفید است که از آن دماغ را آرام میسر است و اذیت کم  
 فصل ششم در سبب انزال و اکثر سبب آن علاج آن پیشه نکرده فصل است و هم در کثرت انزال و انزال  
 و این را پراپا نیز برایت لاش گویند یعنی همیشه ایستاده ماندن این مرض اکثر سبب کثرت خوردن در جماع در زمان قلیل مثل شب

فصل ششم در سبب انزال  
 فصل ششم در سبب انزال

و احدها پدید می آید زیرا که مخارج را از آنم ازیت میرسد پس متاخری شده این تشنج خاص پدید می آید و گاهی بسبب سید  
صدیده ضرب و سقوط و ناقص شدن مخارج هم این مرض پیدا شود چه بعد متاخری و ناقص شدن تشنج پدید می آید علامات  
اول از اینم نفوذ است که بلا شروت و بی اختیار پدید می آید و چون تشنج در جمیع قسم تشنج در دوا و زیت می شود درین تشنج هم ازیت  
در قریب پنج ذکر می باشد و قیصیب بسیار سخت و لمسه آن حار بود و قریب پنج ذکر تم ثقل یاده محسوس میگردد و در وقت بول  
کردن ازیت در در می شود و در دل مرض خوف زیاده می باشد از نیکه انجام آن چه خواهد شد علاج بردانید با سیم مقدار کثیر از  
تنگی گریز چهل گریز از سته چهار بار بمهر آب ساده بنوشانند و در آب سرد می بیند انشانند و گفته که **باب سیم در امراض مختصه نسوان**  
**فصل اول در شرح اعضا مختصه نسوان** و آنم شش است بر چند فصل فصل اول در شرح اعضا مختصه نسوان که از آنم تشنج  
گویند و متعلق بولادت اند یعنی فصل فطرت پیدایش آن برای ولادت و الباقی نوع انسانی است و اول از جمله اعضا مختصه  
نسوان بیان اعضا مختصه است که از دیدن ظاهر می محسوس میشوند و آن فرج است که مرکب است از اعضا مختصه است که اول آنها  
لبه های کلان اند که از انبربان لائن لبیسیا میگویند و در لبهای خرد و آنرا لبیسیا منوره خوانند و منوره لبه های خرد است  
که گویند چهارم ثقبه که از آن بول می آید پنجم پرده که برابر اول و دوم و سیم می باشد و وقت نفوذ ضامن بکارت همین پرده شق میشود  
این اعضا از انبربان لائن لوانه فتنه و اول و سکون لام و براتق و او ثانی و سکون الف یعنی دروازه است و بیان هر یک از این  
نیست که لبهای کلان فرج که در هر دو جانب آن می باشد این پرده هم که یک انداز جانب خارج آنها جلد بدن آمده و در جای  
داخل آن میوکس می بین است و در میان آن هر دو غشای پشته دارد و هم عضله قلابه شراپین عروق و عضلات غده ها  
موجود بودند و این هر دو لب جانب علی که متصل بطرف عانه اند غلیظ می باشد و در جانب سفلی تنقیق و تنگ اند و در جانب سفلی تنگ  
این هر دو متصل شده اند از انبربان لائن میگویند و پنج کاف عربی و کسیر هم سکون یابی تختانی و سیمین جمله سکون او و رانی جمله  
پنجمی را و یعنی گوشه نامند و در میان کیست و مقده پنجم مسافت است از ابروی نیم فتنه بانی فارسی که سراسر جمله سکون یابی تختانی  
و کسیر نون قح یابی تختانی و سکون می بین گویند و مقده دینامند و در مقام کیست و یک میوکس می بین است و در آنرا شریک پنجم فاف  
و سکون رانی جمله و کسیرین می بین سکون یابی تختانی و نامی شانه فوقانی یعنی خارجه و دینامند و در وقت ولادت اکثر دران شق  
واقع میشود و فایده این میوکس می بین است که هرگاه وقت ولادت طفل اینجا میرسد و چون که کیست و سخت است و سیم و سیم و سیم  
اینجا تنگ است لذا دشواری در برین آمدن راس واقع میشود و در آن وقت این میوکس می بین سیم میگوید و سبب آن اس طفل  
بر می آید و اندرون لبهای کلان لبهای خرد اند که بسیار دقیق بودند و حقیقت آن نقطه میوکس می بین غلیظ است این هر دو لبها  
خرد و مثل خرطوط خارج بیضه حال اند و لبها که این هر دو لبهای کوبک قریب محراب عانه و جانب علی خود متصل شده اند اینجا  
بطرفه یعنی منفره یافته شده است آن در حقیقت شش قیصیب است یعنی آنچه در قیصیب است و در آنم است و از نیکه یک جسم عضلی که  
قصد جدا بجا از زیر مجرای بول می باشد و در بطرفه نیست باقی بهر آنچه در قیصیب است در نسبت بهین سبب بطرفه بجا ایستاده میشود

باب سیم در امراض مختصه نسوان  
فصل اول در شرح اعضا مختصه نسوان

چنانکه فی سبب ایستاده میشود و زیر نظر نقبه آردن بول نسوان است و از زیر این نقبه پرده که بر راه ولادت که راه ناکوید  
نبربان انگریزی و جینه نقبج و او فتح جیم منقوط و سکون یا می تختانی و فتح نون سکون یا اما اندر آن شروع شده و آن فتح  
سین بسیار تقرب محل اتصال لبهای کلان بجانب سفلی رسیده بنحویکه بر جانب آن شکل بلال مری محسوس میشود و  
حقیقت آنهم میگویند میر نیست فقط در این پرده همیشه را بکار یافته میشود ولیکن گاهی بسبب امراض و خل کردن انگشت  
علاج هم گسسته و نابود میشود و نه از نبودن آن حکم بر عدم بکار تازن مطلقا نباید کرد و گاهی این پرده چنان صلب و غلیظ  
گردد که از ایلاج و دخل کردن هم گسسته نمیشود و گاهی این پرده چنان راه را بنه میزند که راه رحم تمام بنده میشود و بسیار کوهک  
راه باقی میماند که از آن فایده راه حاصل نمیشود و چون این پرده بسبب خل کردن اگر گسسته شود در آن وقت قدری رحم و قعر  
کناره آن در آنجا حادث میشود و بعد از آن هم در راه ناکوید و کوچک یافته میشود و آن فی الحقیقت ثابته شدن رحم و قعر  
بکارت میباشد و قدر که از این تشیع بقیه نام نهانی که از خارج غیر محسوس اند نوشته میشود پس یکی از این عینه است و آن هم  
انگریزی را توله چین است که از این راه از رحم خارج فرج طفل می آید و این مجری از فرج تا رحم رسیده است و در عارضه زن  
خلف مثانه پوشش معاشی تقیم میباشد و آن در حقیقت مثل نبوده و در مجنون است لیکن با الطبع منضم نمایند و قدری  
خوار است و مرکب است از دو قوس قوس تختانی که قریب معاشی تقیم بود و خرم یاده است و دو قوس فوقانی که قریب مثانه  
تقم قایل است از بخت در ابدان مستعد القامت و کامه الموطول قوس تختانی که زیاده خوار است تشیع پنجه یا تشیش پنجه  
زیرا که بسبب خرم در از می آن رحم آن می آید و قوس فوقانی تا چهار پنجه طولی میباشد و در عرض خود مساوی است لیکن قریب  
فرج قدر ضعیف و قریب رحم قدری زیاده و بیع است باقی تمام مسافت مساوی است آن را زنده غشا مرکب است از پنجه بالا  
همه بود غشای عضلی است که عضلات آن قابض بی اختیار است و دوم که متوسط است و آن غشائی است مولف از تشیع  
آورده و ریشه های عصبی از نبربان انگلش بگیتل تشوکیه الف و سکون یا می تختانی فتح رای حمل و سکون کان فارسی  
و فتح تاسی شانه فوقانی و سکون لام و کسری شانه و ضم شین مجر و سکون و او بمعنی می است که ایستاده شود و اطلاق آن بر  
غشاینا نیست که وقت جماع چون بسبب کثرت تشیع آورده خون در آن زیاده می آید این غشا سخت ایستاده میشود پس  
غشای عضلی که بالای آنست آنرا غم میکند بسبب آن ضیق درین غشاینا میشود و از آن این مجری قریب تشیع که در آن  
تنگ میشود و از آن لذت طرفین حاصل نمیشود و اندرون مجری ناکوید زیر مجر میگویند سیم نیست و در طول آن در دو جای تشیع  
است در عرض آن مورب چین های کثیره اند که بسبب آن مجری ناکوید وقت حمل زیاده کویر طولی میشود و دوم درین یکس میسر  
غده های کوچک زیاده اند خصوصا جای که از رحم قریب شد و آنجا غده های بسیار یافته میشود و وقت ولادت احباب است  
ازین غده های زیاده پیدایش میشود و بسبب آن ولادت سهل میگردد و دم از آن رحم است و آن عضله است که در آن بنشیند  
که اصل منی و ماده کون چنین است از دوری زن آمده میماند و بعد از آن شدن از طرف مرد در آن چنین متکون میشود و این

ترتیب فضل میکنند و چون جنین کامل انکلفت شود او را از خود بیرون کرده تا خارج فرج میسرانند با جگر صوت آن مثل  
 و صورت منقرض است و تا وقتیکه عورت باکره بود عضو مذکور در طول خود سه انچه و در عرض خود جایگزین زیاده عریض است و در  
 و در ضخامت و عمق یک انچه بود و چون درین وقت بدریه تشنج قطع گردد وزن کتک از یک و نشت یک نیم آونس میباشد و  
 محال نهم در عانه در میان معاشی مستقیم نشانه است و در محل خود بدریه را بطایم میان چنانچه دور باط از آن نامشانه رسیده  
 آنرا مریضه کوزه اندود و در باط از آن نامعاشی مستقیم رسیده آنرا بسته اند و از هر پهلوی رحم یک یک باط عریض شده تا عانه رسیده با  
 غشائی آبدار که در عانه است مرتبط شده اند و فی الواقع این باط عریض هم غشائی آبدار است که بالای رحم است بلندترین  
 بر تمام رحم قوی شده از هر دو پهلوی آن مثل خمر طیه عریض شده برآمده در عانه رسیده از غشائی آبدار عانه مرتبط گشته است  
 و درین باط عریض رحم تعلقات مثلثه آن میماند چنانچه آئیده مذکور خواهند شد و بدریه این را بط رحم بجای خود قایم میماند  
 و رحم بمقتضای خود نامعاشی مختلف میدارد چنانچه محل قاعده آنرا که غلیظ و مدور و مقوس است فندس یک کشته و سکون نون  
 ضم و ال و سکون سین جمله نامند و از آن سرین است و از آنجا معاشی آنرا با دمی بفتح باسی موحده و سکون الف و کسر  
 و ال هندی و سکون یائی تختانی معنی بدن و جسم نامند و عنق را نیک بکفر و سکون یائی تختانی و کاف نامند و درین از  
 اس یوشرس بفتح مد الف و سکون سین جمله و هم یائی تختانی و سکون او و تائی هندی و فتح رائی جمله و سکون سین جمله معنی  
 و درین رحم گویند و آن از سه جسم مرکب است اول که بالای همه است غشائی آبدار بود و دوم غشائی عضلی قابضه است که آن بسیار  
 غلیظ و محکم میباشد که بسبب آن در رحم ضخامت میباشد و غشائی مذکور مرکب است از عضلات کثیره که در طول و عرض توین  
 آمده اند و هم از ریشیه های کثیره و عصب پیئی نیک و هم از عروق و شریانین صغیر و هم غشائی میوکس میباشند و ریشیه و غشائی  
 اول در رحم است و آن قریب غشائی درین رحم چین است و بطن رحم یعنی جوف آن که در غشائی نشانه مذکوره یافته میشود و بسیار صغیر  
 و از غشائی مثلث قریب میباشد چون بشارت میست آنرا کشاده می بیند و معلوم میشود که قریب هین رحم مجری طولی ضیق  
 است و آن هر قدر که بسوی بطن رحم میرود وسیع و کشاده میشود و جای که هر دو ساق طولی با خط ثالث در آن خود متصل  
 اند بجائی زاویه اتصال مثل ثبیت قرن در هر دو طرف پیدا شده و این مجری بر ثبیت قرن مجری بیضه رحم ملحق شده مجری  
 گشته اند و مادام که جنین در شکم و از اول سکون آنرا میماند اینجالت را نیز بان نگش فندس بکفر و سکون یائی تختانی و فتح تا  
 نشانه فوقانی و سکون سین جمله گویند پس در خیال رحم در عانه جنین میماند چنانکه آئین در خمر طیه خود میماند بلکه بالاتر از نشانه  
 معاشی مستقیم میماند و چون متولد شود بعد از اوت قدسی قدری بریزد و درین وقت عنق و درین آن کثیره قاعده آن صغیر  
 و قوی میباشد چون آن قریب سیزده سالگی رسد زمان رحم بجائی اصلی خود در میان نشانه و معاشی مستقیم میاید و بر ثبیت منقرض  
 میگردد و در وزن خود تا هشت پوند و نیم میباشد تا اینکه در حوض جاری شود و آنرا از آن میگرد و در بعد از اوت وزن  
 از آن نیم پوند و در وقت مدح حوض که کثیره و نیم شود و در آن کشاده میگردد و میگرد و میگرد و بسبب زیاد

آمدن خون در این وقت خاص رنگ میوکس میبینیم سرخ میگردد و چون غده های میوکس میبینیم از آمدن خون متمسک  
شده که بیشتر شوند از بسبب آن میوکس میبینیم جایجا بر سر غده ها شقی میشود زیرا که در این وقت بسبب آمدن خون میوکس میبینیم  
زیاده تر و ضخیم میگردد و بسبب آن در آن شقی واقع میشود و از شقی شدن آن خون حیض جاری میشود و همچنین گاه حمل ظاهر میگردد  
ضخامت و حجم رحم زیاده میشود حتی که در این وقت از نیمه آلتا تا یک نیمه آثار در وزن ظاهر میشود و این یادتی بتدریج حاصل میشود  
زیرا که در این وقت برای تربیت طفل خون در رحم زیاده می آید و بسبب آن مقدار جنین رحم بزرگ و پیشرو و حجم در حالت حمل  
در رحم کمیشوند و عضلات جدید پیدا میشوند تا که بروقت ولادت یاری بر سهولت تولد دهند و چون مقدار رحم کمیشود  
در این وقت بسبب یادتی مقدار از جایی خود که در آن میماند حرکت کرده بالا میرود و در این وقت طول میشود پس تا آن  
میرسد اسمائی کوچک بر آن می آید بالا میرود چون جنین خارج شود از رحم بر پشت مقدار جنین است و منقبض شده و میگذرد و در وقت  
قریب مقدار خود می آید عضلات جدید که در حال حمل پیدا شده بودند غائی و نابود میشوند و چون جنین قطع شود و زایش میگیرد  
رحم منقبض میشود و از متعلقات رحم سه عضله اند که ذکر آن ضرورت اول فلوین ثوب نفیج فلوین لام و سکون او و کسری ای  
موجده و قح یائی شناه تختانی و سکون نون و خم تائی هندی و سکون او و بای موجده بعضی مجری که آنرا فلوینس حساب  
حکیم در شرح دیده ظاهر کردند و در او ری بضم الف و سکون او اول قح و او ثانی و کسری ای هله و سکون یائی تختانی منقبض  
بعضی است و حجم بل رحم که از رحم رسته البهاسی کلان فرج آمده و این را از او جدا کنند که بعضی باط مؤرست که مثل شتر  
در و ضخیم است میمانند این هر رسته تعلقات رحم در میان باط عرض رحم منقبض در توی آن میمانند و ذکر این باط در شرح رحم شده  
و نا فلوین ثوب پس مجری است که بعضی زین را از او دور می آید از خصی که گرفته در رحم میمانند و این مجری هم در  
بین بسیار رحم یکیک میماند و بسبب مساحت قریب چهار پنجه طول است و از رسته خشاک است و آنچه بالای است  
غشائی آید از او دور و آن غشائی عضلی که عضلات آن قلابی بعضی اختیار اند و اندرون زیر این هر دو میوکس میبینیم لیکن غشائی  
عضلی و میوکس میبینیم این مجری از رحم چنان متصل اند که گویا از این رسته اند زیرا که بیشتر نوشته شده که جوت رحم میبینیم مثل  
و هر دو را و یقاعده آن در آن رسته متصل از این مجری شد و از این طریقی این مجری را باطن رحم چنان متصل است  
که گویا هر دو واحد اند و لیکن جائیکه فلوین ثوب از رحم خارج شده اینجا بسیار رفیق است مثل شتر و از او دور و وسیع است  
و بر سر جانب وسیع آن که خارج رحم است برگ های متعدد اند چنانکه بر سر کل شتر میباشند از این سوارین مجری از چیری متصل  
بلکه مثل گل شتر و شگفته غشائی آید که رباط عرض است همیشه در آن کشاوه میماند فقط یک برگ آن متصل از او دوری  
میباشد باقی برگ های آن در آن قلابی احدی کشاوه و مفتوح میمانند چون بعضی در او دوری کامل و پیدا میشود این  
درین مفتوح فلوین ثوب بر او دوری می آید و بان میباید آنرا از پیچ برگ های خود میگیرد و از آن جذب کرده بعضی از رحم  
می اندازد و اما او دوری پس آن هم حسب عدد و دانم یک یک زان در پلوی رحم میماند مثل بعضی در آن و این هم در حالت تولد

باز متعلقات رحم که در رحم

در شرح رحم





ناتوانی زن نیز سبب آنست که قبل از جریان حیض بیضه منویه در او وری طیار میشود و لذا ممکن است که در آن زن از ملاقات  
 باردار شود و هم در هفته اولی بعد از جریان حیض ممکن است که باردار شود چه درین هفته چون من اندام نهانی و رحم و غیره زایل  
 میشود و بیضه منویه که در او وری قبل از جریان حیض طیار شده بود درین وقت بسبب واکم و انقباض طریق در رحم می یزد هم متن  
 منی مرد در رحم بسبب واکم و از یاد مقدار رحم منی میشود و پس سبب قیام منین حمل مستقر میشود و بعد از هفته اولی از ملاقات  
 زن و زن باردار میشود زیرا که درین ایام بیضه منویه در او وری بسیار ضعیف میباشند قابل اشتقاق نبوده و مادام که او را بیضه منویه  
 در او وری نشود در رحم می آید و با منی مرد ملاقی نمیشود و مستقر در حمل متوقف بر تلاقی منین است و قدری از اشتقاق در حیوان  
 انسان نیست که در وقت سیحان شهوت حیوان غده بانی کوچک رحم و جبین که آب پیدا میشود در آن بوی خاص پیدا میشود  
 که از بوییدن آن زن را شهوت جماع پیدا میگردد و گاه قبل از این طبع وقت اشتداد شهوت زن هم در طریقات رحم غیره بود  
 خاص پیدا میشود لیکن فی الحقیقت آنست که از بوییدن این بوی خاص دل زن را شهوت جماع پیدا میشود و در انسان اگر  
 یافت میشود سبب تنفر مرد از عورت میشود و تذکره فصل دوم در بیان جریان حیض و آنرا بلفظ لایق این چنین  
 گویند یعنی آنست که حیض هر ماه بدانکه هر گاه دختر قریب بلوغ میرسد یک گره افین و یک لینی بیضه منویه که در او وری  
 غشایی آن می یزد درین وقت غلوین ثوب را آمدن بیضه منویه زیر غشایی و وری خبردار شده بر آن می یزد و آنچه درین  
 گره آن محیط شده آنرا میگردد و از آمدن بیضه منویه زیر غشایی گرفتن ثوب محل بیضه منویه را با وری از ویت میرسد  
 قریب بشق شدن میگردد و از امتدادی شدن و وری خون کثیر در او وری و غلوین ثوب رحم فرج زیاد می یزد درین وقت  
 و تقریباً هر اکثر عارض چند عارض میشود مثل اینکه جمی بسبب اجتماع خون کثیر و غشایی ناکوره می یزد و از ویت و اندکی بار  
 طاری میشود و در عانه بمقابل خرم قدسی تو و غشاست و سختی پیدا میگردد و در فقاظه بجائی که در سیم قطن سرین پس در  
 شمع میشود و فرج قدری خارش و حکه محسوس میگردد و در فرج قدری غشاست و سرخی بر جلد آن ظاهر میشود و در شمع  
 قدری صلابت پیدا گردد و پس یک ذرا سخالت ستمه ماند بعد از قدری طوبت سفید از فرج جاری میشود و من بعد از آن  
 قدری سرخی پیدا گردد و این سرخی ترقی کند تا اینکه مثل خون خالص آید و از دو روز تا چهار روز اکثر بلوغ و خون خالص ماند  
 بعد از سرخی کم شود تا آنکه زفته زفته باز طوبت سفید می یزد و نظر آنهم متوقف شود و عواض مثل حمی و غیره که پیدا شده بودند  
 همه برطرف شوند و مرضیه صحیح گردد و باز چون عین ماه آینه در آن جاری شود و عواض مثل دل شدت نمیکند کسی را  
 باکل از ویت نمیشود حیض جاری گردد و کسی همیشه قدری از ویت وقت آمدن حیض میشود لیکن با وتی مقدار هم  
 و او وری و اندام نهانی وقت جریان حیض از ضرورت بر کس میباشد این امر طبیعی است و جریان حیض در هر ماه به وقت قمر  
 و معتاد هر کس میشود مادام که عورت تا سن پنجاه سالگی یا چهل پنج سال برسد لیکن گاهی وقت جوانی هم سبب اسباب طبیعی  
 مثل باردار شدن یا مضع شدن برای طفل مانع از جریان حیض میشود و این هم مرض نیست از امور عادیه و طبیعی است و اکثر سوا

فصل دوم در بیان جریان حیض

آن با سبب دیگر جوانی پیدا شود مرض خواب و واسطہ است و اگر آن نسبت و هشت روز است پس مثلاً اگر چہ اگر  
 حیض جاری نماند نسبت و سہ روز نیاورد و نسبت چہارم باز می یزد کسی از آن کم و زیادہ می شود مثلاً بعد چہارہ یا نوزدہ  
 آید یا بیشتر ہفتہ می یزد کسی در ایام حمل در وقت صناعیت ہم موافق عادت حیض جاری می ماند و کسی کہ ضعیف و مریض بود  
 در ایام اوقات جریان دم طست فقط بطوبت سفید رنگ می یزد یا بل سبزی یا سرخ رنگ نبود کسی از حیض عوض حجم از عضو دیگر  
 مثل سہ می یزد یا این گوکہ در ایام مقررہ بطور قی الہم می یزد از او کثیر نیست شش انگشت یعنی تمام حیض نماند و کسی از عورات چنان  
 عادت بود کہ حیض ہر وقت متعاد و مقرر می یزد لیکن ماہی زیادہ و در ماہی کم می یزد چون عورت قریب سن پاس می رسد و  
 او را خلل عادت خود حیض می آید یعنی خلل ایام متعاد می آید و ہم کم می یزد و گاہی بسیار زیادہ آمدہ بنہ شود و چون  
 مطلقاً جریان حیض نہ شود و عضا می نمانی و حجم و اووری و وجینہ و غیرہ صغیر خورد میشود یا بکمالہ مقدار خون حیض طبیعی  
 موافق اعتبار ہشتاد و نعل است لیکن انچه تجربہ حکمای متاخرین بگلستان مقدار طبیعی ثابت شدہ زیادہ از چہار انگشت  
 یا شش انگشت و بیش مجموع خون حیض می یزد باقی بطوبت کثیرہ ہمراہ آن می باشد اگر از آن زیادہ آید مرض خواب و بعد اما انیکہ انچه خون  
 در ایام متعادہ می یزد بطور حین خون است یا نہ پس قریب حق نیست کہ خون است لیکن مختلط است از طوبات رحم و وجینہ انچه  
 بعضی حکما از عدم انجماد آن بہ دلالت کردہ اند بر اینکہ خون نیست غلط است زیرا کہ اول ہر گاہ بدینہ خوردہ میں از ابتدا خون  
 بدون آن ثابت میشود و دوم آنکہ ہر گاہ ان خون بکمالہ تدبیر از رحم بگیرند شل خون نمیشود و عدم انجماد آن مختص بسبب آب است  
 طوبات و نیزات ہمینہ میباشد و ایضا دلیل بروم بودنش نیست کہ ہر گاہ زیادہ آید یا جلد جلد آید چنانکہ انچه تیز از او کثیر  
 وجینہ است بر آن خون نمیشود و در وقت ان خون شہد میشود و قدر اما انیکہ دم حیض از کجا می یزد و چگونہ می یزد پس بدانکہ خون  
 از سیکس میبرن حجم می یزد گاہی از سیکس میبرن وجینہ ہم می یزد چنانکہ بآب نشتاد و علی القاب یکبار از انچشم خود میباید  
 فرودہ بودند و اما انیکہ چگونہ می یزد پس شش انگشت است کہ چون خون کثیر بسبب وسعت اووری در رحم و غیرہ اندم نمانی و جمیع شش انگشت  
 سیکس میبرن رحم زیادہ میبرن و وسعہ ہائی کو چاک کہ در سیکس میبرن حجم انچشم میشود و با بجا بر سر غدد ہائی چاک  
 و دیگر با سیکس میبرن کو سبب شدہ متلاشق میگردد و عروق صفا کہ در سیکس میبرن مذکور اند ہم شش انگشت میشوند از ان  
 سبب خون از رحم جاری میشود و ہمین سبب وجینہ ہم می یزد چون خون از رحم جاری شدہ متلاشی آن کم شود و سیکس میبرن کو  
 بعد خالی شدن جوہر حالت مقدار اصلی خود و میکند چون دم و خامت این عضا فرج شود و راہ کشادہ گردد و وجینہ منویہ  
 اووری بدینہ ظوین ثوب در رحم می یزد و بعد ملاقات از منی مرحل مستقر میشود و تبارک ہند حسن الخالقین فصل ششم  
 در حکمہ خارشش فرج و این انبربان گاش پر و شش انگشت کو اینی خارش فرج نامند و این مرض گاہی بطور مرض متقل  
 و گاہی بطور عرض علالت در امراض دیگر یافتہ میشود و ممکن است کہ ازین منی اول عمر تا آخر آن حادث شود لیکن اکثر عورتا  
 عجزانہ را عاقل میگردد و بعضی میگوند کہ شہادت نسبت ابکار زیادہ عارض میشود و اسباب ہر گاہ متلاشی مرض پیدا شود

بیمہ در امراض عضا مختصہ انفسل سوسہ حکمہ خارش

خون جریان از کجا و چگونہ می یزد

فصل ششم در حکمہ خارشش

خون

بترتیب امراض دیگر نباشد و گاهی سبب آن ظاهر نبوده درین وقت بدانند که سبب آن ذیبت و ضعف ریشیه های عصاب و ضعف  
قوت عصبیه میباشد لایعوج گاهی بسبب امراض هم عارض میشود مثل اینکه تخم از جای خود برود یا زخم برود و این آن افت  
سرطان الرحم پیدا شود یا مرض سیلان طوبیت سفید بود یا دم من آن تخم که آنرا جنت گویند پیدا شود و درین وقت مرض  
خارش فرج یا سوزش و حرقت خواهد بود و گاهی در مرض بواسیر و گاهی در قریب یا تخم فیض گاهی در ایام حمل میشود و کسی از  
خورات در وقت جنینال همیشه خارش فرج میماند و اینک طفل متولد گردد و از نفاس سیلان طوبیت سفید که بعد ازین منقلا  
حالی خارج شود آن زمان این شکایت بر طرف میگردد و گاهی قوت قریب جنینال طبعی که سبب یاقوتی عمر نباشد و هم این مرض  
پیدا میشود و گاهی قوت پیدا شدن کرم صغیر در معانی تخم و گاهی سبب یابیطین سی سبب فسادن پیش بدن گاهی  
در خارش عام بدن هم این مرض پیدا میشود علامات عمده علامت نیست که خارش و حرقت و حرارت بران موضع بود و قوت  
سوزش و گرمی اندرون موضع هم محسوس شود و از خوردن شایه حاره این ذیبت زیاد میشود و همچنین پوئیدن لبها  
و از نشستن قریب این ذیبت زیاد میگردد و خاصه این علامات در مرض مستقر که سبب ذیبت عصبانی میشود  
یافته میشوند و درین مرض عورت را ذیبت بسبب خارش می زیاد میماند که سبب آن شب روز محروم از خواب میباشد  
در میزای این ناهنجور میگردد و از هم هرگاه سبب ذیبت عصبانی بود دران علامات ضعف و کمزوری بزرگان لب بود و در  
لاغر میشود و طعام نخوبی مضطرب و تشری در حده زیاد پیدا شود و هوا شوکم یاده حرکت میکند که قبض میماند و هرگاه  
این مرض با امراض دیگر یافته شود درین وقت با هر مرض که بود علامات این مرض موجود بود و العلاج اول سبب دریافت  
باز آن که کوشش کنند پس اگر سبب عصبانی بود تقویت بدن از خوردن غذای قوی و تقویت کوشش و غذا که دران  
توابع حاره بوزن خوردن و همچنین بطون چای و کافی نوشاند و شیر گاؤ از هم فضل است و اگر نخوردن کچم طبع مایل شود  
که با آب زخم ساده درست کرده بخوراند تا توابع حاره همراه آن نخورده شوند و هرگاه محتاج نوشاندن مل شود سلفیه  
سلفیه آف سودا نیم تخم درم روزانه سه بار نوشاند درین مرض سبب مل از هم فضل است و دیگر او سیسله بارده مثل  
بکینشیا سلفاس هم بخوراند و از خارج در اعمال و تفریق ضرورت یک یک است و از هم کس نافع نمیشود و اندک تر از او بیشتر  
میشوند و این موافق و مفید افتد آنرا استعمال زن تا صحت شود و پلبای سیسٹیس نیم آونس در بنبت آونس آب حل کرده پارچه  
در آن تر کرده بر فرج نهند و بعد یک پلبای سیسٹیس یک و نعل و نیم او پیچیم یک و نعل در بنبت آونس آب ساده حل کرده پارچه در  
تر کرده بر محل خارش نهند و پلبای سیسٹیس نیم آونس و شوشن و پیچیم یک و نعل در بنبت آونس آب حل کرده پارچه در آن  
تر کرده بر محل خارش نهند و بعد یک پلبای سیسٹیس یک و نعل و نیم او پیچیم یک و نعل در بنبت آونس آب ساده حل کرده پارچه در  
یک و نعل در بنبت آونس آب ساده حل کرده پارچه در آن تر کرده بر محل خارش نهند و پلبای سیسٹیس نیم آونس و شوشن و پیچیم یک و نعل در بنبت آونس آب حل کرده پارچه در آن  
تر کرده بر محل خارش نهند و بعد یک پلبای سیسٹیس یک و نعل و نیم او پیچیم یک و نعل در بنبت آونس آب ساده حل کرده پارچه در آن



نشانه و بجا بر روی آب گرم پنبه ای چسبیده و پیش از آن در دست آورنش به حکم کرده پارچه در آن تر ساخته بر محل درم  
 نهند نوع دیگر علاج سفید خونی است در دست آورنش به حکم کرده پارچه آن تر کرده بروی گذارند و چون گرم شود و خونی  
 به مقام می رسد همین باقی باشد که شکاف خود و یک گرمی یک آن تر آب به حکم کرده به مقام خارش ملا سازند و در غده از داخل  
 کون تو ابل حاره چنانکه نمایند بکوبند و به کاه و به غلظت که تقاسا سازند و گاهی به نخل میشین بسیار عظیم می شود و میگوید و میگوید که نوبت آنجا  
 و غفن شدن رحم در آن می رسد خصوصاً هرگاه بکند هم سبب آن بدن مرطوبه و کثرت ریا نشانی گاهی بعد از این در هرگاه وقت  
 زاییدن بهر بامی فرج او تفتخیزد و رشت آن ریم پیدا شود پس در وقت ورم بسیار عظیم میگردد و گوشت فاسد و متعفن میگردد  
 و گاهی هم فرج با سبب مذکور و در اول فصل هم تا این مرتبه می رسد که گوشت فاسد و متعفن میگردد و در این وقت آنچه علامت پیشتر  
 نوشته شده اند بقیه است معهود بود و هم چنان سخت هم از آن بود و در عظم فاسد و متعفن میگردد و گوشت فاسد و متعفن میگردد  
 پس اگر این مرض اخیر رسد در این وقت اول فرج را صاف نمایند از آب گرم بمید مرطوبه و اگر لازم بود بهر آب که در آن کاشک  
 ورم گوشت آن مرده است و داغ کنند تا عفونت و زهر گوشت فاسد و متعفن بجای دیگر شود و بعد از آن و به نخل و غلظت  
 مثل لایک شپاس بهر یک که در آن پارچه تر کرده باشند که گوشت فاسد و متعفن می رسد یا از غلظت و نخل طیار کرده بر آن نهاده و قدری  
 مثل گوشت و شیر و زرد و بهر مرغ که از آن در خون قوت آید بخورند و پور وین شراب نوشانند و از او بهر که میسر شود  
 یا سنگ پست و ناسب نباشد و در محل بود و از مرطوبه را در آن فصل و تخم و در مرض و جینه آن بر تفتخیزد اول آنکه  
 پرده بکارت که بر دهن آن می باشد گاهی چنان سخت بود که قیض آن خل نمیشود و آنرا بلفظ انگشت از پرده بکارت بکشند  
 یعنی معده و یا صغیر بود و بقیه فرج از صلابت پرده بکارت باین صلابت در آن ثقبه کوچک بود که از آن ورم طشت خارج  
 میشود و بسبب آن این را هیچ کفایت معلوم نمیشود و اما هرگاه که از او ورم نزدیک شود برود و از ترمان و لایک و معده شود و یا  
 علاج میشود و این مرض هم یک سبب عسر است لیکن گاهی چون مرده و ثقبه کوچک فرج منحل شود و از آن نمی رسد و جل  
 مستقر گردد و در این صورت لادت دشوار میشود و علاجش نیست که از انگشت یا کارو یا قراض آنرا بر سرند و پارچه ابرو  
 شیرین آلوده در دهن نیم دارند تا صحت شود و در آنست که دهن آن نباشد از خشایک از ثقبه بول زن بریده تا قیضیت  
 که میگوید همین در مجل اتصال بهر بامی کلان فرج در جهت پهل است می رسد هرگاه مریمات مجبیه وقت سست و غلظت  
 آگاه میشوند که دهن فرج نباشد آنرا از جوع بسوئی علاج میکنند و علاجش نیست که از پرده بکارت بکشند و دهن آن  
 پارچه در دهن تر کرده و در دهن نیم نهند تا صحت شود و لیکن گاهی مریمات را از آن اطلاع نشود بلکه هرگاه صبر جوان میشود و  
 جریان حیوانی یا آنرا از آن تکلیف پیدا میشود که علامت در دهن یافت میشود تا حیض جاری نگردد و دختر نمیدانند  
 که سبب چیست زیرا که او معتاد بدو نیست و آنرا نمیدانند البته از وقت خود را بیان میکنند و از آن مایه خون در رحم  
 مجتمع میشود و از آن جینه ورم و مقدار عظیم میگردد و صورت شکم در دهن میشود و آنرا از آن مایه خون در رحم  
 مجتمع میشود و از آن جینه ورم و مقدار عظیم میگردد و صورت شکم در دهن میشود و آنرا از آن مایه خون در رحم

فصل در امراض خفیه نسوان  
 که در جینه است



میشود و هر کس که می بیند بجهت آن می کند و در بعضی کزوری و حرارت و مزاج پیدا میشود و رنگ چهره زرد و شعله طحال  
در خنجر کمر و در جوان غشائی مذکور را شوق گفته اند و آن سبب بدو که جمیع است قریب است چهار آثار بیرون می آید و گاهی بخون مثل  
و باجم هم خارج میشود العالاج از پیرپ غشای شوق که در خون فاسد بر اندر راه کشاید لیکن گاهی درین مرض بعضی کردن  
غشای نوزان مرخصیه هلاک میشود زیرا که آنچه خونی و در بدن فاسد باشد و بعضی کردن غشای چون بواسطه میرسد از رسیدن بواسطه  
و عفونت آن نوزاد میگرد و چنانکه از نشان بواسطه است که عفونت بدن جوان مرده و عفون از راه میسازد و چون فساد و عفونت  
نوزاد زیاد میشود و هر آن چون بدن میرسد از آن برود می هلاک میگردد و در اندر گاه راه شوق کردن غشائی مذکور نماید  
که کار بولکانش یک حصه یا چهل حصه با سوده یا زعفران شیرین صاف بختی ازین آب روغن لؤل بر غشائی مذکور اند از آن بعد  
شوق نماید و بعضی که نوزاد و سوسه ازین آب یا روغن کار بولک گرفته اند و بعضی را در رحم رسانند و بعد آن علاج میشود  
بجوشیده بدن را زعفران غلیظ واد و ویتقوی و در شستن در بواسطه صاف نمایند و سوم اینکه میگویند جمیع جینه باجم میسازد  
و از آن راه بن گزیده و آن از دیدن محسوس میشود و علامت آنست که در سر انگشتان از اجزای گزیده از سر پوی قری قدری شوق  
گرفته و بهین تا بخونی جدا گشته پس پدید آن بر طرف شود و راه کشاده گردد و بعد پاره پاره بخون شیرین لوده در ورم جینه گزیده  
نادر میگردد و چپ فقط گفته فصل ششم در ورم شش یعنی ورم میگویند جمیع جینه آن بر ورم است حاو که آنرا الکبوت مینامند  
و سر کبوت آنرا انیک گویند و آن که حاد است ابکار را نمیشود و مگر قبلت و جوانان را زیاد عارض میشود و سبب گاهی سبب آن  
و اودت بود زیرا که اکثر درین وقت از طفل متولد میگردد و میگویند جینه تهر می شود و ایضا اکثر جماعت ورم هر گاه که جمیع  
بازن جمیع جماعت نماید و بقوت تضییع و فرج دخل کند باجم از قوت خول تضییع جمیع مرض پیدا میشود و بواسطه سوزاک  
هم از بدن سردی بیدار چنانکه نان مغلسان اکثر این حالت پیش می آید که سبب خوردن غذای ضعیف و مکرر نشیند و سبب  
کثرت مشقت فرصت چنان میسر میشود که بدن فرج را از اندرون بیرون صاف کنند و لباس موافق تدارک فصل میسر شود  
یا از بدن لباس کمر متعذر و جامه که پوشیده اند تر میشود و بحالت رطب بودن آنهم پوشیده باشند تا بدن خشک میشود و از  
سری در خون سبب این مرض پیدا میگردد العالاجات اول ورم پیدا میشود و میگویند جمیع جینه خشک سرخ بود و حرقت  
سوزش در باطن جینه محسوس شود و وقت ایستاده شدن لؤل در پیری نیم که مسافت فیما بین فرج و قعد است معلوم شود  
هر گاه نشیند یا بر آید در ورم پیری محسوس میشود و آب ضبط بول نماید جلد بول می کشد قری حرارت در بدن یافت  
و در کمر و سرین ساقها در محسوس شود و بعد میگویند ملائم و تمیز و در وازان رطوبت سفید غلیظ که سفیدی آن مثل  
سفیدی بالائی شیر را بخلر باشد جاری میشود و چون رطوبت زیاد آید حرارت و در کم میگردد و بد آنکه هر گاه لؤل  
سفید غلیظ مثل خلر آید باید دانست که از جینه حلی نیز بر که در جینه تیراب است که سبب آن رطوبت باشد و بخلا  
رطوبتیکه که از جم آید چنان مثل آب قیق میباشد زیرا که در رحم الکلی یعنی که با و اجزای حلی اند که با نیش آن رطوبت رقیق میشود

فصل ششم در ورم شش

و



و بعد از وصف فرق در طوابع جبهه هم توان کرد و در اینجا تا قبل از میسر که گوید در وجه عدم انجماد خون جبهه نوشته شده که  
از سختی تیراب یعنی ترشی جبهه منجمد شود و اگر از ترش خون اگر ترش شود و اینجا میگویند که تیراب و جبهه منجمد طوابع است  
ببیند بعد از جبهه جوشش است که ترشی جبهه چون با خون آمیز و فایسب آن با تیرمییای شی دیگر میگردد و ازین سبب منجمد میشود  
چون طوابع میوکس میبرن نیست لکن طوابع مذکور به آئینش تیراب و جبهه منجمد میشود و بعد از آنکه درین مرض ممکن است  
که از علاج صحت کامل حاصل شود و البته نام این کرد و لیکن اکثر نیست که از حاد و اکیوت مزمن کرانیک گردد و خصوصاً وقتیکه حصول  
نفث بی آنکه مرض کلیشه زایل شده باشد جزی جاری شود و درین صورت عوارض باقیمت قوت یافته باز شدت میکنند و مرض  
طویل مدت میگردد و العلاج اول از همه بهل چند از مسهلات باره مثل میگنیشیا ساغاسل سفوف جلیک پوئی و نهایتاً یا کپور  
سپنج من بعد از آب گرم روزانه چهار بار نشانند که از آن نفث بسیار حاصل میشود و زراته هم از آب گرم مفیدست و اگر در  
زیاده بود از آب پوست خشکاش رفته و بعد از آن صورت مقدار آب گرم در یک مرتبه از نیست آوش نباشد آب مطبوخ محرم کما  
هر قدر ممکن شود در روز شب نوشاند تا میوکس میبرن ملایم شود و طوابع را ازین که از آن صحت میشود و نوشاندن  
ایک کواندین قوت بقدر زاید شلاینج گریز نیست گریز نوشاندن چنانکه در زیر نوشاندن مفیدست چون عوارض مزمن  
حاد که خفیف شوند و صورت مزمن پیدا کنند آن وقت مقویات میوکس میبرن بهتمال رن چنانکه قسطنطنیه نوشته خواهد شد و اگر  
قسم دوم از آن مزمن یعنی کرانیک است و آن اکثر از اول کرانیک یعنی خفیف العوارض میباشد و گاهی بعد اکیوت یعنی قسم اول  
حاد مزمن میگردد و التسبب سباب آن کثیرند که معدوم میشوند و حال اینست که آنچه زن از سباب ضعفه ضعیف گردد و سبب  
این ضعف میشود یا به شدت یاریدن سردی و تولد فرزند و غیره و این مرض مثل نرله که مزمن میوکس میبرن نفث خلق  
پیدا میشود لکن آنرا از زبان انگلیس کثرت کثرت یعنی نرله و جبهه میگویند و اکثر سبب سیدن سردی پیدا میشود و بداند که میوکس میبرن  
جبهه هم مثل میوکس میبرن نفث خلق همیشه قدری طوابع پیدا میکنند لیکن گاه زیاده پیدا کنند آنرا آن مزمن میگویند و  
چون میوکس میبرن جبهه درین مرض بنید اکثر نیست آن مثل بنید صحت میباشد لیکن گاهی فرق هم در آن یافته میشود و آن است  
که چنانکه جبهه درین مرض متصل شده از آن قریب میوکس میبرن جبهه سرخی و غلظت و نیست یافته میشود و بهما بخالین طوابع  
سفید میوکس میبرن پیدا میکنند و این طوابع قریق بزرگ خفیف تقریباً شدت علامات اول از نیست که طوابع سفید  
مثل خفیف تقریباً میوکس میبرن پیدا میکنند و اگر یک مینامند یعنی آب سفید از اول مرض مزمن میوکس میبرن پیدا میکنند و آنرا  
مات بر آن گذارد و از آن ضعف و کمزوری پیدا شود و چون علاج میکند تا در آن وقت تمام کمزوری و ضعف بر بدن غالب شود  
و مرض میگوید که در در کم خفیف همیشه مینامند و ضعف زیاد است که هیچ مشقت اگر چه در آن هم باشد از من نشود و وقتها بسیار طول  
و غذا بخوبی هضم نمیکرد و ترشی هوا و مزه زیاده پیدا میشود و اکثر خفیف شکم ماند و انقباض طبع بود که هیچ کار خوش نیامد  
گفته اند و لیکن چون جبهه درین مرض همیشه می یازد این سبب علاج بسیار دشوار میشود و چنانچه آن همیشه مزمن را مد میسر

و عوارض قوی میگردد و ندرت آن تاخیر میشود و مدت زمان مرض میماند العلاج هر قدر که سبب ضعف زن معلوم شود  
 بدفع کردن آن کوشش کنند بعد از آن علاج تنهائی نمایند و مواشیل نیکه اغذیه جیده تقویه خون مثل شیر گاو و گوشت خالص و زرد  
 مرغ خوراکند و کسینین هر کبات این سبب نباشد و شایسته در هوای صاف خوش مرصیه را دارند و امر نمایند که از جماع اجتناب  
 و زرد و اولاد زیاد خواهد شد و در آن شب چهار بار و آب درفشانیدن در میان نیم ساعت تا یک ساعت بسیار مفید است  
 و گاهی سایندن آب سرد و در یک راقه سفید است بعد از مقویات میکس میسرین استعمال ریشمال نیکه ششانی یک و درم در آن  
 ساده که بنیشت آتش باشد حل کرده از آن راقه نمایند و در هر بار مقدار آب ز راقه کم از سبب اولس نباشد ایضا لایزالک سلفاس  
 از چهار گرمین ده گرمین بنیشت آتش آب ساده حل کرده ز راقه نمایند ایضا لایزالک از طبخ بارک که بنیشت آتش باشد ز راقه نمایند ایضا لایزالک  
 از طبخ کوه کرس یعنی اوک بارک ز راقه نمایند ایضا لایزالک از فوشن اوک بارک یعنی تقوی مازوی بنبر ز راقه نمایند ایضا لایزالک سلفاس  
 و گرمین بارغن کوه کوه یک گرم بود با هم مخمیه غلظه درست سازند و بخوریکه طریقه ساختن غلظه در فصل سابق یعنی حکم فزج نوشته  
 و از فزجین هم گذارند تا آنجا که دانه همراه طبوبات و حینیه هم بر تمام میکس میسرین و حینیه ریخته شود و اگر رغین کوه کوه موجود  
 بر بی بند و حینیه هم از یک حصه فون کنبج بقدر ضرورت آن مخمیه هم رغین درست ساخته او و تیشیان آن مخمیه شیان درست  
 سازند ایضا لایزالک سلفاس ششانی که از آب این بریان کرده باشند و از یک یک از فون لایزالک میشد و او فون بر  
 باریک ساخته و از آن یک گرم گرفته همراه بنیشت آتش آب ساده که یک گرم بود با هم ساخته بدفع ز راقه در حینیه رسانند  
 و باید دانست که آب سرد بهتر است لیکن هر که را آب سرد خوش نیاید و از آب یک گرم ز راقه نماید فصل نهم درم میکس میسرین  
 درم که آنرا از بریان انگلش بوئرس کاسار یعنی ز کام هم در لغت لاشن ایندو میسرین یعنی درم اندرون هم میگویند و این هم درم  
 است یکی حاد که آنرا اکیوٹ نامند و درم نرم که آنرا کرونیک گویند سبب هر دو قسم واحد بودند لیکن بحسب شدت فزج آن  
 فرق در اکیوٹ و کرونیک کرده علاج هم بحسب آن مختلف میشود این مرض اگر بسیار قلیل میشود و شیشات و ات البعل را  
 زیاد عارض میگردد و او پنجاه اسباب یاده مورث این مرض میشود عادت استسقاط است که بار بار زن باردار میشود و با بچه  
 می اندازد و هم از کثرت مباشرت هم از رسیدن مری و تری بدن میشود و گاهی از ماندن در جای که آنجا در زمین مکان است  
 زیاد بود یا از شستن بنفشان روغن فرش سنگ بسیار سرد بود و هم از نشستی شدن و حینیه هم هر گاه ماده تشنگ زدن خون  
 آید و هم در حالت ثقه بدون بعد زوال مرض هم از کمزوری بدن خون مثل نیکه سفیدی دروغ غالب شود چنانکه در مرض طحال  
 میباشد و هم هر گاه زن چنان ضعیف شود که عوض خون در حوض طوبت سفید آید و در خیالت هم این مرض پیدا میشود و هر گاه خون  
 حیض در اول مرآه بعد از آن دو یکا بند شود و از آنهم گاهی این مرض عارض میگردد و العلما مات در قسم اول مقدار هم زیاد میگردد  
 و نقل سوزش و رعان و زیادتی مقدار آن محسوس میشود و از عمر کردن نیز ناف در معلوم میگردد و در کم و سرن ساقین هم در دنیا  
 و تب می آید و گاهی ز حیر هم بار بود و بار بار بول می آید و گاهی یک و سه سال یا پیش یک و قبض طبیعت میماند و چون در حوض

درم میکس میسرین

فصل نهم در درم میکس میسرین



آنرا اگر کم کرده بپر کنند و بعد سر دوش آن را کاغذ خالی کزده دوی اندک و را کہ بصورت قلم است در دین جم کنند و در جم صلی  
 زنک سلفاس شب بامالی باطوبت در جم آتھتہ بر میو کس می بین جم منشتر شد و موثر شوند نوعد بگر ثاتک لیش و گدین جم  
 در ام روغن کوکو تھتہ از ان فیتلہ بصفت مذکورہ دست ساخته در دین جم کنند و اگر ازین سیر نہ نشود و حمل کاشک نقرہ بکمال  
 سبکی و جالاک در دین جم انداختہ فوراً بر آن زند یا فیتلہ سخت از پارچہ دست کردہ در آبکیہ کاشک نقرہ بقدر اکثریت در آن حل کردہ باشند  
 مذکورہ در دین جم اندازند و باز بر آن نقد کہ فصل ہشتم در اثر غشای یعنی در جم جم جم و این جم از غشای عضلہ  
 غلیظہ رحم شروع میشود و تا غشای میو کس می بین و غشای آبدار میرسد و گاهی خاص در غشای عضلی می باشد التیب اکثر  
 سبب آن انسداد خون جنین بعد جریان آن می باشد باین نحو کہ کسی اخون حیض جاری شود و بعد در آن چون یک وریا چند  
 ساعت بگذرد سبب غیظ و غضب یار سیدن مری یا کثرت مشقت و غیرہ ازہر سبب انسداد کہ باشد و در آن بند شود و از ان  
 این جم پیدا بگرد و زیرا کہ درین وقت خون کثیر در رحم می آید و چون خارج نشود و از ان جم پیدا گردد و گاهی از دم میو کس می بین جم جم  
 این غشای متورم میشود و گاهی از دم و جبینہ جم از متعارف ہر گاہ بقوت بسیار کثرہ شود و گاهی از رسیدن صدمہ ضرب و سقوط کہ  
 از خارج رسد جم این جم پیدا میشود و گاهی از سقط حمل ہر گاہ قوایل بند یعنی لاش طین سقط نمودہ باشند جم این جم حادث میگردد  
 الاملا مات مقدار جم زیادہ میشود و چون دین جم را بندند جم در آنجا محسوس شود و جم از جای خود فروتر آیدہ باشد و از  
 غیر کثرت بتقابل جم از خارج در زیادہ محسوس شود و در پنجم و حال بدین دو ضربان یادہ سبب کثرت خون محسوس گردد و کثرت زیادہ  
 کہ جم کم گردد و در دین جم و سوزش یادہ محسوس میشود و از قیامت جم وقت قیامت زیادہ میگردد و لندہا جم جم همیشه بر بلنگ خون  
 افتادہ ماند و گاهی پامای خود بطرف فوق میکشد و این قوی بود کہ دم قریب غشای آبدار میرسد کثرت اوقات در جم کیفیت نشخ  
 انقباضی چنانکہ وقت ولادت طفل میشود محسوس گردد و چون برای تمیز نشیند و اسہال شود با سوزش پیچ میشود چنانکہ در حال  
 ہیض می آید و بار بار بول کند طاقت ضبط ندارد و کثرت بخار جم میماند قوی تنوع داشته باشد لیکن این علامات از اول مرض در دستہ فوق  
 بر قوت خود مانند بعد از دین جم طوبت مثل طوبتیکہ در دم میو کس می بین جم خارج میشود و جاری گردد و درین وقت باید دانست کہ  
 جم تا میو کس می بین جم رسد و انجام این مرض نیست کہ یا از علاج صحت باید یا نشی شود و دم غشای آبدار طین یا دم میو کس می بین  
 جم کثرت جم جم صلابت بخشی در جم باقی ماندہ علاج مرضیہ آبار ام تمام بر بلنگ دارند و در سبب چهار ساعت و سہ با  
 در آب کثرت نیم ساعت نشاندن بسیار مفید است کہ از ان در کثرت شود و برای داخل کردن سبکی کہ آید دیدن حال ندرون صحیح  
 در فرج سہولت میشود چنانکہ داخل کردن آن سہولت در تشخیص مرض علاج حمل میشود پس آن مذکور را داخل کردہ توسط آن دستہ و درین  
 چسپا تمیز لیکن این تدبیر قوی جان برست کہ در بسیار شدید بود و ہر گاہ ضربان زیادہ بود و عانہ بتقابل جم حمل حساس صلابت  
 چسپا تہ اگر طبع قبض بود و سہل بار بول می کشید یا سلفاس نوشانندہ اگر خود اسہال بود و چشپ زیادہ باشد از قوا آب گرم کہ بقدر  
 یک تا بار بود و ہند و اگر ازین قوت نفوذ نشود و دستہ در زیر این تدبیر را عمل آن نہ و غشی مرضیہ بسیار سبک بود مثل شیر گاؤ تنہا یا ہر

فصل ہفتم در اثر غشای



بر آن چسبناک از سر کار که چاک شقی بائی خرد متعدد کرده و پهن تا از آن خون قاری بیرون آید و بسبب آن ورم بر او  
 شود و اگر زخم عمیق بود و درین صورت اصل کاشک نفوذ بر زخم نهد و بگرداند که از آن بهین زخم نفوذی ضیق و خشک میشود و یک  
 در میان اصل کاشک نفوذ بر زخم رسانیده باشند تا صحت شود و لیکن این وقت که زخم خفیفی خور و میباید شد لذا هرگاه سختی مذکور  
 محسوس شود و شیاف که از پنبای ابو دایله و بکک غیر و سانسنه باشند در ورم زخم شستن بسیار مفید است و اغذیه حیاتیه خورند  
 و او به باضمه غذا و مقوی بعد از شستن پنبه رو بر بکشند و سرال میشد را با پنجه تلخ بوزن مثل حشیش و قصبه لزریره و سنک و ناسک  
 حال نوشاتند تا بر تقویت خیم معین شوند و از بهضم شدن غذا خون جدید در بدن پیدا شود و درین وقت روغن جگر باغی شفا  
 مفید است و قدر فصل دهم در ورم بیضیتین زن که آنرا اووری بر بان انگلش ورم آنرا او و بیضیتین زن است و آنرا که شفا  
 بر ورم بود و حاد و مزمن که آنرا از بان انگلش سبب کیوژ نامند و مزمن که آنرا که آنیک گویند و این شتمانی عام است از نیکه از اول مزمن  
 بود یا بعد از حاد و مزمن شود و ورم حاد آن کمتر دیده شده و این ورم در هر دو جانب وقت احدی که عرض میشود و نسبت جانبین  
 در او وری جانب بسیار زیاده عارض میشود و سبب آن بخوبی تحقیق نشده الا ممکن است که گفته شود که چون پس او وری بسیار  
 معامی میم واقع شده و آن همیشه ملو از فضول بر زیر پانده و صفا هرگاه قبض شود و سرد و پیدایش و درین وقت او وری بسیار  
 فرا حمت و غمزه نماید از آن متاوی شده باونی سبب شود و سبب دیگر و سبب گاهی بسبب سیدن صده ضرب و سقوط طو  
 بسبب نهادن و دای حاد و بر ورم زخم از بند شدن در ورم یکدم سبب بعد جریان آن و فقه ورم از سوزا که ورم  
 ورم غشائی آید که در توی آن او وری یافته شده ورم حاد آن پیدا میشود و علامات چونکه علامات ورم آن با ورم زخم  
 تقریباً مانند اول علامت و فارق آنرا باید دانست آن غیبت است که در ورم او وری هرگاه زخم را به تیر بر ورم آن ورم بود و ورم  
 غمزه کند بر ورم آن اثر در ظاهر نشود و لیکن گاه بر پهلوی ورم که دیواره جنبه است از انگشت غمزه کند و مقام او وری در ورم سوس  
 و از آن دانسته میشود که ورم او وری است ورم زخم نیست ورم هرگاه بر عانه از خارج غمزه کند و مقابل محل او وری در ورم غمزه  
 میشود و اگر رفیه بر پله باشد از بالای عانه وقت غمزه کردن بخوبی محسوس شود که او وری متورم شده و ایضا درین ورم گاهی  
 در ورم متورماند و گاهی با ورم شدت کن و ایضا اکثر علامات ورم زخم مثل درد و کم و حالت ساقین بار بار آمدن بول و قوی و قوی  
 و همیشه موجود بود و خصوصاً در هر جانب که او وری متورم میشود در ورمی در همان جانب موجود بود و اگر چه وقت تیر بسبب  
 که شکم بر ورم و جانب او ورمی مثل میشود و اویت درین ورم گونا میشود و لیکن هرگاه ورم در جانب بسیار بود درین وقت غمزه  
 اویت بیشمار میشود و خصوصاً که بر از سخت بطور رسد و آید و بسبب فرا حمت سده او وری متورم و غمزه متاوی میشود و جمی حاد  
 درین ورم میباشد چنانکه در ورم زخم بود و گاهی درین ورم هم پیدا میشود ورم مذکور و لیکن در ورمی درین وقت جمی بطور قوی بر ورم  
 می آید و این ورم گاهی بسوی معامی تقسیم و گاهی بسوی جنبه منفر شده ورم خود را در عضای غایبه می اندازد و این بهتر است  
 و از آن در عارض خفت میشود و گاهی بسوی غشائی بدست منفر شده ورم را در آن می اندازد و درین وقت جمی عارض شده

فصل دهم در ورم بیضیتین زن







و این مرض مشابهت با اجتماع آب در حقیقه مردان فرقی با اعتبار سبب است و این مرض را نربان انگشلی و درین چهره نیمه  
و سکون و اوایل و کثیرا و ثانی و سکون یای شناه تختانی و کسری حملی فتح یای شناه تختانی و سکون نون یعنی سلع اووری  
نماند السبب پیش نیست که این جسم بیضی که در حقیقه نرسیده و بعد کبیر شدن زاندر و ن جرم اووری که غیر نیست  
تحت جلد حقیقه مدتها شقی میشود و بعد شقی شدن جلد حقیقه شقی جسم بیضی که شقی شده و سفید و زرد و از جسم بیضی  
خارج شده و در بعضی جای فلونین ثوب در حرم می آید از جلد بیضی که از آن محل مستقر گردد و اگر اجتماع بینین نشود از جرم خارج  
شده دفع میگردد پس گاهی این جسم بیضی که در حقیقه نرسیده و کبیر شده شقی میشود بلکه فتنه زده مقدار آن کبیر را نیست و در آن چنان  
زیاده میگردد که بنظر شناه کبیر بر آب میشود و در تمام شکم منبسط شده تا اووری دیگر میرسد و این نربان انگشلی و درین چهره نیمه  
یعنی حرطیه اووری زیر که هرگاه درین مرض باریقه فتنه آب را بیرون آرند اووری مثل حرطیه باقی میماند و در آن حرطیه بیضی  
مانند پنج مثل شیر و سرش یعنی در شقی میماند و گاهی مثل سرش مخرج به شیر یا سرش مخرج بخون یا سرش مخرج به چربی  
صورت یافته میشود و گاهی در مانیت اندک و در بعضی از اعضای انسان مثل شحریا دندان یا قطعه استخوان یافته شود و از  
پایتن این جسم و نهفته میشود که در اینجا داده کن چنین بوده لیکن خراب شده و خلقت کامل نشده بلکه بعضی از اجزای آن متولد  
شده باقی خراب گشته و این مرض بیشتر آن که پخت عجایز عارض نمیشود بلکه زندهای جوان درین مرض مبتلا میشوند و از ایشان  
چون کسی که از سن ۱۰ تا ۱۵ سال تا چهل سال بماند و از آنجا که در حقیقه نرسیده و از آنجا که پخته و در عارض میشود و گاهی فی را که  
شود و در آنست با شقی جسم هر چه درین مرض مرخصه و از آنجا که در حقیقه نرسیده و از آنجا که پخته و در عارض میشود و گاهی فی را که  
راج و گاهی بیضی و درین شوق و در حقیقه نرسیده و از آنجا که پخته و در عارض میشود و گاهی فی را که  
اما بعد از چهار ماه و یک چنانچه اووری شقی و زیادتی مقدار محسوس نمیشود و چون اووری تا مقدار طفل کوچک است و  
در حقیقه شقی و در حقیقه نرسیده و از آنجا که پخته و در عارض میشود و گاهی فی را که  
یک چنانچه اووری شقی و در حقیقه نرسیده و از آنجا که پخته و در عارض میشود و گاهی فی را که  
شده تا اووری چنانچه کبیر رسیده و درین وقت صورت این مرض مشابهت با شقی العلامات در ابتای مرض زیاده  
مقدار اووری محسوس نمیشود و چون مرض بدتر گردد اووری در تمام شکم منبسط میگردد و لیکن صورت آن مدور میباشد  
تفاوت محل چهره و آن صورت تمام صورت منفرج که صورت خاص نیست میباشد و آنکه در محل شقی خاص بقیام جسم بود  
و گاهی آن در تمام قسمت بود و درین مرض شقی در تمام عانه عام بود و هرگاه در محل انگشت بر عانه زنند سوائی حجم گردان آواز هوا  
از معاصی پیرو درین مرض زندهای عانه آواز جسم است می آید و درین مرض هرگاه در انگشت به تیغ خود حرکت بر عانه کنند  
مشکک بر آب محسوس نمیشود که از ابلت انگشلی و کثرت شقی یعنی حرکت آب درین و بسیار میماند چنانچه اووری شقی بسیار  
تفاوت محل که در آن حرکت آب محسوس نمیشود و با جلد ابتدای مرض بجز زیادتی مقدار گاهی تیغ علامت نبود لیکن گاهی جلد علامت

و دم اووری که سابقا نوشته شده اند موجود بودند و اکثر درین مرض در حوض بر وقت مقرر بیاض زیر که اووری ثانی که هیچ است  
 کاخود میکند مگر هرگاه مریضه از زیادهی مرض یاده کز و ریشود و آن زمان در ورور گاهی کمی و گاهی چندان مطلقا پیدا میشود و از زیادهی  
 مقدار اووری زیاده تکلیف تنفس میشود و گاهی از مزاحمت غمگزن آن معاشی مستقیم را تبض شکم پیدا میشود و گاهی مثانه منفر  
 شده بار بار بول قلیل ارفع میکند و تاب ضبط بول در مثانه نبود و گاهی از منفر شدن عنق مثانه تحت آن حبس بول عارض  
 و در مثانه بول مجتمع گردد و درین وقت دوسو ذی جمع میشود یکی زیادتی مقدار اووری و دوم زیادتی مقدار مثانه از اجتماع بول  
 و درین صورت تنفس ایضا کمال ذیت میشود و گاهی از غم مزاحمت ووری با کز و ریشود و منفر شدن آن بول در کز که پیدا میشود و از  
 کم پیدا شدن بول و هم از منفر شدن شریان کثیر و غلیظ که در پان خون می آید و از آن نامی بر نماند و وقت خون به شواری میشود  
 ازین سبب آب کثیر از خون جدا شده و غشائی خانه را مجتمع میکند و درین وقت بدن لاغر میشود و غده هضم نگردد و خواب نیاید  
 و وقت زکوة کز وری مرتبه قصوی میرسد اگر تدریجاً مناسب نگردد هلاک میگردد و العلاج از او تدریجاً مسهل مدته درین مرض فایده نیست  
 لیکن اگر در اوایل مرض مریضه جوع کند و درین وقت از نوشیدن دوید که ماده را در عروق جذب میکنند مثل سکه پوره ایوه و غیره  
 پشاسیم و کلورید آت پشاس البته میدست که قدری فایده ظاهر شود و از زیادهی مرض بازماندانی الواقع از اوید درین مرض فایده  
 ظاهر میشود پس هرگاه بیند که بعد از تمحال اوید نیکو حال اوید موقوف کرده مرض ابر حال خود کند و از  
 باز زیاده شود چون تمام شکم عاصم گردد و تنفس شواری ظاهر شود و درین وقت اول جلد شکم از نشتر چاک کرده بعد بروکاز و غیره  
 مجری و انبساط قهری را در شکم نخل کرده آب را از شکم بیرون راند و هرگاه قصد بیرون آوردن انبساط قهری بر آید شکم تمام  
 اول جلد شکم از دست محکم گیرند پس یولار ابر از تابه های خارجی در شکم داخل نشود و الا دم غشائی آید و یا یاده در شکم پیدا شود  
 مریضه هلاک خواهد شد بعد از پاره شکم صاف گزیده و درین محکم گزیده بر آن پارچه شکم آلوده نماند و نه پنجم را بر ابر کرده و بر  
 پارچه شکم آلوده نماند بالا آید آن پارچه عرض کبیر بر تمام شکم بیند تا شکم حرکت محفوظ ماند پس گاهی ازین تدبیر حرکت کلی میشود  
 و اکثر آنست که باز آب جمع میگردد و مرض خود میکند و باز موافق تدبیر اول اخراج آب کرده میشود و چون مکرر همین عمل را  
 کرده شود مریضه از بلل غر و ضعیف و کمزور میگردد و لکن ضرورت است که تدریجاً آب جمع شود و آن نیست که بعد از آوردن آب  
 از شکم و کینو لا اندرون خریطه اووری است بذریعہ زرقه از راه کینو لا یعنی انبساط قهری و کینو لا درین خریطه خصیصه زن رسانند و بعد  
 و قیقه از راه کینو لا بر اند و فایده آن نیست که از کینو لا وین و دم پیدا شده خریطه بیضه که خالی است بضم و کینو لا خواهد شد و  
 بسبب آن آب مجتمع خواهد شد چه حمل آن باقی خواهد ماند لیکن باید دانست که این عمل در رجال بیفایده است و در نسوان بسیار  
 خوف ناک است زیرا که هرگاه از آن دم پیدا میشود و این دم تا غشائی آید و میرسد از آن زن اکثر هلاک میگردد و لکن تدبیر است  
 که عوض آن شکم را از زیر ناف تا شخوآن نه چاک کرده هرگاه اووری ظاهر شود در آن شروکارانه اخته قدری آب بیرون آید و  
 مقدار آن کم شود و ملاک کم کردن پس وری را کشیده از وین پنجم بیرون آرند و اصل آنرا از خریطه شیمی ضبط و بسته اووری را به بند

فصل در دوا و زحمات و در وصف غرضی آید از علم

[illegible]

فصل سیزدهم در جنبان حیض

تأخره حیض

و اگر او حال قاعا طایفه ممکن نبود آب گرم نشاندند تا بول میوه و شکر خارج شود و هرگاه عوارض اخلاص مرض بر طرف نشود و او ایستد  
 همراه آب قصبه از زیره یا دیگر دوائی تلخ نوشانند تا ماده غلیظین را که از عروق خارج شد ریخته است باز پس عروق فرستد و غذا  
 درین مرض خفیف باشد مثل شیر شور یا ورنج و نان چپاتی از آرد گندم و باره با فعل خوراند و هم آنچرا بارد با فصل باشد مثل  
 سرد یا شجوبی قیق که آنرا از آب لیموی کاغذی ترش کرده بابت سرد نموده باشند بنوشانند و قطعات برف در دهان بگذرانند  
 زیرا که ازان در منفعت حاصل میشود و کی تسکین عیش و دم آنکه بسبب نهادن برف در دهان توی هم ساکن میشوند و بعد از آن  
 کلی مرض علاج تندتری فرمایند که فصل سیزدهم در جنبان حیض و آنرا از بان گلش انور یا بید الف و کسریم و هم  
 نون و سکون و او و کسری مملو قیج یا ی شناه تختانی و سکون الفانی معده و شستن حیض معناه همراه گویند چند اطلاق  
 جنبان بر عدم ولت حیض هر دو میشود لیکن مراد اینجا آنست که مطلقا نیاید و آن بر سه قسم است یکی آنکه در آن ماده حیض مطلقا  
 پیدا نشود یعنی خون جسم و او در می غیر حج هم نشود و دم آنکه خون جسم آید و جمع گردد لیکن خارج نشود و دم آنکه خون جسم آید و جمع  
 گردد و خارج شود و حیض موافق معناه خود آمده باز یکم هم بسبب در آن بنشیند و حال قسم جداست چنانچه قسم اول که در آن گاه  
 از اول حیض نیامده باشد بسیار کم پدید میشود و بیش گاهی نقصان که از اعضا از اعضا مختصه عورت میباشد مثل اینکه جسم  
 یا او در ی یا جنبه نبود یا عضای مذکوره در عدد موجود نبند لیکن مقدار کم باشد چنانکه حال عضای دیگر است مثلاً کوری  
 یک است یا یک یا بعضی انگشتان یا اس جغیر بسیار پس برین منوال جسم یا او در ی یا جنبه جغیر نبند چنانکه وقت آن  
 در شکم یا در اول طفلی بودند و گاهی همه اعضا بر مقدار طبیعی بودند و با اینهمه هم در حیض نمیشود و قاعده جریان حیض اکثر آنست  
 که از سن یازده سالگی تا سال چهارم حیض جاری میشود لیکن گاهی حیض بزودی جاری میشود و گاهی بتأخیر می آید یعنی تا سه سال  
 یا زیاده ازان هم گذرشته در و ظهور نیاید پس اگر تأخیر در و شود و آنرا از قسم اول نباید شمرد بلکه در آن انتظار در و نمایانند که خواهد آمد  
 چنانکه گاهی دندان بزودی بروز میکنند مثلاً از ماه چهارم یا پنجم بر می آید و گاهی بعد از شش یا هشت سال یا دو سال بیرون آیند  
 با جمیع سبب تجربه ثابت شد که هر که حیض نیاید کمتر باردار میشود و دم که در آن خون در عضای مختصه عورت می آید  
 مجتمع گردد لیکن در حیض ظاهر نمیشود این قسم البته گاه گاه دیده میشود و سبب آن گاهی انسداد و جنبه میباشد چنانکه در فصل  
 امراض جنبه نوشته شده و گاهی جنبه کشاده بود و بر پشت خود لیکن درین جسم بند بود خواه بسبب میوکس میمیر که آنرا از اول  
 فطرت زیاده متصل بود یا بسبب بدن شدن جسم درین جسم بند شده باشد چنانکه بعد از ولادت طبیعی یا بعد از سقط که هم میشود  
 بند گردد که بسبب آن اتصال کامل شود و قسم ثالث که در آن بعد از ظهور در و جریان حیض بند میشود و این هم اکثر دیده میشود  
 سبب آن گاهی تأثیر کفریات نفسانیة مثل غیظه و غضب زیاد و سرور و فرحت و غم اندر و بد چهره در داغ این امور میشود  
 مبتذل منقیر قوت میشوند و گاهی سیدان سردی بدن و گاهی از تنبلی و کمزوری خون هر گونه بیماری سخت که در آن خون  
 و بدن ضعیف گردد و هم در ضل لیمون پوریا که در آن سفیدر و بیخیز خون همراه بول نیامده دفع گردد حیض بند میشود و یا

شاید آن در مرض تپق هرگاه چوب کل در خون نبرد و هم در مرض البیون یوریا که مرض برایست صاحب است بخوبی  
شده لیکن این مرض مثال آن اندام تدریج میشود یعنی اول کم شود و تدریج کمی بسوی اندام رجوع میکند و بعد در دم او  
هم این مرض پیدا میشود و گاهی هرگاه بار اول اکثر اعضاء بعد از آن چند ماه نمی آید و همچنین چون زن کتخا شده باشد و نیز در دم  
شود و بعد از آن چند ماه خون حیض نمی آید و ممکن است که در اول بسبب یاقی شرم و حیا که از کیفیات نفسانیة حیض بند شده باشد  
و زمانی بسبب کم شدن قوت و متادزی شدن عضای مختصه و ذات بسبب جماع بند شده باشد و هم بسبب باردار شدن  
اکثر حیض بند میشود لیکن آنچه باین سبب آید خرابی شود تحت مرض خلل نمیکرد و محتاج علاج نباشد العلامات عمدت  
علامت آن بند شدن جریان حیض است که محتاج علامت دیگر نیست العلامات قسم اول آن لایق علاج نیست و قسم ثان  
تفحص سبب نماید بعد بر رفع آن پروازند مثلاً اگر بسبب بند شدن جنین بود تدریج کشادن آن چنانکه در ذیل امراض آن نوشته  
شده عمل آنرا و اگر از بند شدن جنین هم بود و اندکی کم می بین درین وقت هرگز از این بیشتر یار و یار بکشاید بعد فیتله برین  
کنیز یا از بر روغن فیرین لوده در دهن هم گذارند تا ختم مندمل شده و پس از آن بسبب شدن رحم دهن رحم بند شده  
باشد و نشان آن هم موجود بود و آنجا بند فیتله و کار هرگز از کشاده من بعد فیتله روغن آلوده در آن نهد و گاهی در بعض عورات رحم  
و اووری موجود بود لیکن جنین نباشد درین وقت چون کم از فرج دور و از دستای قیمتن است از اندرون معای مذکور شود و  
از آنجا از سر آن رحم را کشاده فیتله روغن آلوده در آن نهند و اوام که زن لایق جاری ماند حیض ماند فیتله در آن آشته باشد  
لیکن باید دانست که این هر برای شالست و هم حیض مفید نیست اما باین علاج اکثر زن می میرند و یا نماند با بجز قسم ثالث اگر جنین  
بند شود و در طریقه قوی سمیه فریب درین وقت مندمل نمیشود لیکن باین جهت بود که خون صغیر از جگر پاک کند و رحم را بزرگ  
و هم مدد و توشل بل ایستاد و یا فرود بود و غائی الیوریا بول وقت شب خوراند و صبح آن سنگینش یا سفارش باب حاکمه نوشا  
و بهر جهت که این سهل از قریب یا هم مقدار جبران حیض نوشاند و بعد فراغ از مندمل در آب گرم نشاند و زانه سه بار و همچنین در آب  
گرم زرا قه نمایند باید دانست که از قوت مزه ای حباس حیض کمتر شود و از کمزوری زیاد و اکثر محسوس میشود و آنچه بسبب آن میشود  
یو یا باشد آن اول علاج امراض مذکور نمایند زیرا که محسوس است از خود جاری خواهد شد و این امراض از این نظر حباس نکند زیرا که  
وقت قاعدی در چوب کل در خون کثرت و غفالت المده خون که ماده حیض است خارج میشود و در البیون یوریا سفید بیضیه که  
البیون است از خون در بول خارج میشود و بسبب آن تمام خون آن نافه پاک میگردد پس اگر درین وقت مایه جراحی حیض کرده شود  
از جریان آن صحت کثیر و مغرت زیاد پیدا خواهد شد آنچه حباس محض بسبب کمزوری بود درین وقت از مرکبات حار و تند  
نوشاندن مثل ستوری فیری که از نیم کوشن تا یک کوشن باشد نوشاندن اینها مانند نان ناک سرپ نوشاندن و عدد یک میر پیری  
و یو و این نوشاندن و کبر سیمین پیار و ای نافع است درین وقت و هم به این مقویات مدرات حیض مثل نخون بود و نیز که آنرا  
آویشن روز سیری نامند و در قطره یا الوم رو نادر و در قطره نوشاندن یا الوم پیما از و در قطره تا پنج قطره و سیرپ تا یک کوشن



او اگر کثرت بلا و نایب گریں در روعن کو کویا چربی یا روعن کنجد که انقضای غشیه شفاف درست ساخته و روغنینه شد و اگر  
از این بر فایده نام حاصل نشود و چنانکه کثرت انس از کای یعنی چربی که قند بنشیند قطره همراه اسپریت نایب که تیر که از نیم گرم  
نایب که ام بود همراه آب ساده که از یک انس تا دو انس باشد تخم خجسته خوراند و اگر درین دو اسپریت جونی پر قشمتی شرب  
است نیم گرم اضافی کرده نبوشند کمال نافع است اگر این واسطه می نشود و فوین خالص یک و گریں تنها یا با جونی شرب که از  
نیم آونش یک انس بود تخم نبوشند الاضالها بنسکی شراب ز نیم آونش یک انس گرفته باشد مثل آن آب ساده تخم نبوشد  
از آن فوراً حیض جاری میشود و هر که محتسب از شراب باشد و را باید که آنچه درین غیر شرب برای اجرائی حیض مجتنب نموده باشد  
اندا از جنس سبب گرفته نبوشند الاضالها ایونیا کار بناس پنج گریں آب نفوق بودینه بنه که یک انس و حلا که بود نبوشد  
نوع دیگر اگر کثرت با می سائیس که گریں کثرت بلا و نایب گریں همراه اگر کثرت نشین یک اگر کثرت کثرت نبوشد  
روزانه سه بار خوراند الاضالها بویون یعنی سها که صاف و گریں با یک انس آب نفوق بودینه حلا که روزانه سه بار نبوشد  
نوع دیگر اگر کثرت با می سائیس یا صمغ عربی محلول آن آب تخم حب بسته خوراند الاضالها اگر کثرت و گریں بویون پنج گریں  
ایر و شیک یک گریں با تخم تخم بعد چهار ساعت نبوشند تا خون بخونی جاری شود و صحت شود و تخم تخم تخم  
سبب آن بسیار و شواست زیرا که وقت فرج حیض خون کثیر در جمیع اعضای غشیه لولن مجتمع میگردد و ازین سبب در این  
اینکه در جمیع است یا در یکس میبیر آن یا در او دری یا در غشای آبدار آن مشکل میشود پس این وقت بی غرض تا آنکه علامت  
بر او احد نموده علم حاصل کنند السبب سبب در آن او را در اعضای غشیه لولن میباشد خصوصاً در جمیع علامات است بدین  
درین هم هرگاه اسپیکولم در جینه و خل کرده می بینند در جمیع زیادتی مقدار و درم ظاهر میشود و چون از انگشت نمکنند برین هم  
در محسوس شود و کاک که در جمیع بقاات غشیه آن در محسوس گردد و در عاقل معلوم میشود که غشیه شرجی نقیاضی برای دفع  
مواود در جمیع یافته شود و درین هم خاص یک بنفشه قبل از جرجین در ویدامیکرد و در جمیع همراه آن میباشد و در عاقل ضربان او  
وقتی توجع هم بود و در غشیه بسیار ستادی میباشد و در محل که در جمیع و حصول ساقین یافته میشود و کثرت و اسپریت هم همراه آن شدت  
میکند و گاهی خروج متعده هم بآن یا از بود و جرجین غشیه در عواض ظاهر شود و کثرت خون جرجین بر اثر شرجی یا بلکه قدری  
آمده باز نبند میشود و بعد از آن یکبار بقدر زیاد دفع میگردد و درین وقت همراه خون قطعات میو کس میبیرن هم زوده شده  
دفع میشوند و چون در جرجین بند میشود بعد از آن طوبت سفید یاده از میو کس میبیرن هم میی بدو علامات هم میو کس میبیرن  
هم موجود و بعد از علل اول سبب آن در یافته بعلاج هر دم که یافته شود و پروازند چنانکه سابقاً نوشته شده لیکن وقت از این  
خاص چنانکه قبلاً اول تدابیر برای شکیبایی جمع نوشته شده اند استعمال زن لیکن قس که هم دو اگر در آن شراب است مثل  
شراب جونی یا اسپریت نایب که تیر نبیند که آن منفر خواهد شد بلکه علاج باره از تخم تخم تخم و نوشانیدن مسهل بارد  
مثل سنگش یا سافاس نیند و چون که در قس هم اذیت و اسهال و قهقهه یاده میباشد پس چنانکه از آب گرم گرفتن بسیار نافع است

در



و اگر ام با معاد هم از آن میرسد و شیاف از پلبای ایو و اید و اکثرا کثرت هکاک یا روغن کوه دست ساخته بر وزن نیم گرم که در آن  
بسی مفید است و اگر در زیاد بود پلبای ایو و اید و گریه اکثرا کثرت با و و ناز و گریه گریه گریه همراه روغن کوه یا  
محلول یا روغن کنجد تخم شیاف درست ساخته نه نیم گرم که بسبب و خضرم بود و آن از روغن بسیار بود و آن بسبب  
و آن میلان هم بود و اجای خود بهیچین یا بسیار یا گون شدن آن باشد بهیچین یا صغیر بود و آن هم باشد  
بی آنکه از اجای خود حرکت کند العلامات از ویدان در روغن خراج ظاهر شود که هم بهیچین است یا بل شده و بجای خود نیست  
یا در آن تنگ صغیر است بعد هرگاه وقت در غرض قریب بشود و خون جمع گردد و در مجمل گردد و عارضه پیدا میشود و چون در  
ظاهر شود و خون بسیار قلیل می یابد و مادام که در و جاری ماند و قاعیم بود و پنا کلا قول بوده العلاج هرگاه در قیسم در شمع  
شود و تدبیر که در قیسم اول برائی یکین نوشته شده اند و آنرا احتمال آن در هرگاه در غرض قطع شود و هم را بجای خود آید  
بعد آن بیشتر از این پیچیدگی که الف و سکون یا می تخانی و خون و قیسمی است یا می تخانی و سکون یا می تخانی  
و سکون و او و تاسی پندری و قیسمی است یا می تخانی و سکون یا می تخانی و سکون یا می تخانی و سکون یا می تخانی  
یا می تخانی و سکون یا می تخانی و سکون یا می تخانی و سکون یا می تخانی و سکون یا می تخانی و سکون یا می تخانی  
تا بطین آن رسانند و این میل از جانب راس خود و قیسمی در و جانب قاعه خود و غایتا باشد پس از جانب قیسم خود و هم  
داخل میشود و از جانب قاعه خود بسبب غلظت بیرون هم یا ماندن آن نمیرد و بعد داخل کردن این میل در هم شیاف  
از پلبای ایو و اید و اکثرا کثرت هکاک است کرده در و چینه بالا قیسمی است یا می تخانی و سکون یا می تخانی و سکون یا می تخانی  
حدوث و هم بوده از آن منی محال شود و مرغی را بعد این هر دو عمل بر کیفیت متعلق بر لپک خواباند و هرگاه در آن هم صغیر  
و گاهی این صغیر بخدی بود که اگر کین شون مشهور است و آن داخل میشود پس اگر چنان بود در آن فقیله از چیزی که بعد  
طلب شدن مقدار آن کین شود و نه مثل این شنج شنج که آنرا از آن سفنج میسازند باین نحو که قطره از آن سفنج بیده در آن کوه  
بر آن مثل آن قرار می یابند و بالا می خیزد و شیمی می بندد و بعد از آن خشک میکنند چون خشک شود مقدار آن  
صغیر و خط را از آن دور کرده میل ناکورا است است در و در آن هم می اندازند پس هرگاه طوبت هم بآن میرسد سفنج  
عظیم قطع شده کین هم میشود و بسبب کین شدن هم آن هم کین می شود و سفنج میگوید و در و قیسمی است یا می تخانی و سکون یا می تخانی  
سنی یا نکلون نبران گلش گویند خاصه آن نیست که چون خشک شود صغیر گردد و چون تر کرده شود کین هم میشود و از و چینه  
در نیکار اعانت کامل در تو بیع و در هم محال میشود و مثل این است در و چینه است که از شفا و چوب آن  
پندریه بود در دست کرده و گوش می اندازند و خاصه آن نیست که در آب چون تر شود بسیار ختم میگردد و اگر از آن هم فقیله ساخت  
در هم پندریه بر تو بیع هم خواهد شد و گاهی این هم صغیر را کین شدن هم منضم شود و صغیر گردد و در و چینه است یا می تخانی و سکون یا می تخانی  
تست که آنچه و اگر مسن صاحب و فقیله برائی نیکو تر بود و در و چینه است یا می تخانی و سکون یا می تخانی و سکون یا می تخانی



عروق جذب شود و مابقی بکیم گردد پس این کیم گاهی از راه فلوین و گاهی از راه خلیج میشود و گاهی در دیوار و جنبه  
 وکل پیدا کرده از آن جاری میگردد و گاهی در دیوار معاشی و هم مل پیدا کرده از آن با هسار خلیج میشود و علاج اول  
 مرضیه ابالاتی بلنگ است یعنی که او را در آن آرام معلوم میشود و از راه برسی هر گونه حرکت منع کنند من بعد به بتی که اگر هنوز خون  
 در سیمیل انقباض باشد و ابتدای مرض بود و بودن خون در راه انقباض است و نه میشود و از آنکه هر آن من زیاد میگردد و پس قین و  
 تیر عین کند تا خون کم نرود و برسی این مقصود با یکد پاچه بآب سر و تر کرده بر محل من نهند یا قطعه برود در پارچه بسته بر آن گذارند  
 و بر آفتاب قلیل منع و حج لیون مرکبات آن دیگر عذرات حج حسب سبب خوراندند و هر گاه انقباض خون بند شود و آن استه میشود  
 از توقف من بعد خاص درین وقت از آب گرم در وقت برین تکیه سازند و کیلومل و دو و گریز یا بیع یا نصف گریز یا فوخت  
 بعد چهار ساعت مرضیه نوشانند و اگر ضعیف و لاغر باشد عوض کیلومل بلومل خوراندند تا جوش من پیدا شود بعد آن  
 ایو و ایو شپا سیم همراه کم دوائی تلخ نوشانند و بعد نفع شدن در دو دیگر اعراض منزال و سید هر که من نوشانند اگر پیشیا  
 بر شواری آمده باشد گاه گاه قاشا طیر حمری بکمال احتیاط انداخته باشند بول محبتس نگردد و همچنین اگر بر از شواری آمده باشد  
 حقه از آب گرم ساده یا روغن میدا بخیر آن یا کرده و مندر بر که شرط علاج نیست که مرضیه از بلنگ حرکت نکند پس درین  
 بول عانت و تحریک چگونه بول بر از خواهد آمد و ایضا هر گاه بول و بر از بکمال اذیت آمده باشد درین وقت مرضیه را از منرا  
 که خود قصد اذیت بول دفع بر از کنند بلکه اذ خال قاشا طیر و اذن حقه اخراج فضول کرده باشند و غذا بسیار لطیف و تین و کیم  
 باشد مثل شوبای کیم منصفه یا بخینی یا شیر که آب منروج باشد بمقدار تحلیل چند یا بر مرضیه خوراندند و بعد حصول صحت چون  
 زمانه جبران حیض ثانی باز قریب شود و در آن وقت سبب محدث مرض ابال ضرور و در کنند سبب استعداد مرضیه من من عروق  
 کنند قند که باید است که این مرض هم از جمله امراضی است که در تحقیق متاخرین انگلستان از چند روز ظاهر شده اند از ذکر آن  
 کتب طبعیه عربیه و هم کتب طب قیم انگلیزی خالی اند و این مرض اکثر زنان را میشود لیکن سبب عدم دریافت حقیقت آن  
 پیشتر منصفه فصل شافرو هم در افراط سیلان طشت و مراد از آن است که خون در مقدار خود زیاده از احتیاج  
 بطور و شل پیدا یا یا هم جریان من زیاده از متاد بولند پس چنانچه من نان عادت است که در ماهی کم و در ماه دیگر زیاده می پیدا  
 بعضی را همیشه از اول مرتب است اکثر عوارض زیاده می زیاده می متاد و باید در مرض منخل خود ایدش و اینهم برود هم  
 یکی تا که در وقت ایام متاد زیاده از متاد و ایو دم آنکه در غیر وقت متاد و آید اول را منوراجیا یعنی جاری شده  
 باشد ثانی را منوراجیا یعنی جاری شدن خون زخم باشد و قوت بریان انگلشن مندا السبب منقول است و از  
 خون پیدا میشود چنانکه در سل و البیوم منور باد و هم طحال و کلوز و ز معنی مرض سفیدی خون یا دیگر امراض منوعه سفیدی  
 خون اند خون قین و سفید میشود و گاهی از کیفیات نفسانی مثل غم و غصه فرج زاید و خفت غم و هم خون بیشتر جاری  
 میشود و گاهی این سباب گاهی سبب قطع من واقع میشوند و آن مذکور شد و گاهی از کثرت جماع و گاهی از قریب من یا

عروق جذب شود و مابقی بکیم گردد پس این کیم گاهی از راه فلوین و گاهی از راه خلیج میشود و گاهی در دیوار و جنبه  
 وکل پیدا کرده از آن جاری میگردد و گاهی در دیوار معاشی و هم مل پیدا کرده از آن با هسار خلیج میشود و علاج اول  
 مرضیه ابالاتی بلنگ است یعنی که او را در آن آرام معلوم میشود و از راه برسی هر گونه حرکت منع کنند من بعد به بتی که اگر هنوز خون  
 در سیمیل انقباض باشد و ابتدای مرض بود و بودن خون در راه انقباض است و نه میشود و از آنکه هر آن من زیاد میگردد و پس قین و  
 تیر عین کند تا خون کم نرود و برسی این مقصود با یکد پاچه بآب سر و تر کرده بر محل من نهند یا قطعه برود در پارچه بسته بر آن گذارند  
 و بر آفتاب قلیل منع و حج لیون مرکبات آن دیگر عذرات حج حسب سبب خوراندند و هر گاه انقباض خون بند شود و آن استه میشود  
 از توقف من بعد خاص درین وقت از آب گرم در وقت برین تکیه سازند و کیلومل و دو و گریز یا بیع یا نصف گریز یا فوخت  
 بعد چهار ساعت مرضیه نوشانند و اگر ضعیف و لاغر باشد عوض کیلومل بلومل خوراندند تا جوش من پیدا شود بعد آن  
 ایو و ایو شپا سیم همراه کم دوائی تلخ نوشانند و بعد نفع شدن در دو دیگر اعراض منزال و سید هر که من نوشانند اگر پیشیا  
 بر شواری آمده باشد گاه گاه قاشا طیر حمری بکمال احتیاط انداخته باشند بول محبتس نگردد و همچنین اگر بر از شواری آمده باشد  
 حقه از آب گرم ساده یا روغن میدا بخیر آن یا کرده و مندر بر که شرط علاج نیست که مرضیه از بلنگ حرکت نکند پس درین  
 بول عانت و تحریک چگونه بول بر از خواهد آمد و ایضا هر گاه بول و بر از بکمال اذیت آمده باشد درین وقت مرضیه را از منرا  
 که خود قصد اذیت بول دفع بر از کنند بلکه اذ خال قاشا طیر و اذن حقه اخراج فضول کرده باشند و غذا بسیار لطیف و تین و کیم  
 باشد مثل شوبای کیم منصفه یا بخینی یا شیر که آب منروج باشد بمقدار تحلیل چند یا بر مرضیه خوراندند و بعد حصول صحت چون  
 زمانه جبران حیض ثانی باز قریب شود و در آن وقت سبب محدث مرض ابال ضرور و در کنند سبب استعداد مرضیه من من عروق  
 کنند قند که باید است که این مرض هم از جمله امراضی است که در تحقیق متاخرین انگلستان از چند روز ظاهر شده اند از ذکر آن  
 کتب طبعیه عربیه و هم کتب طب قیم انگلیزی خالی اند و این مرض اکثر زنان را میشود لیکن سبب عدم دریافت حقیقت آن  
 پیشتر منصفه فصل شافرو هم در افراط سیلان طشت و مراد از آن است که خون در مقدار خود زیاده از احتیاج  
 بطور و شل پیدا یا یا هم جریان من زیاده از متاد بولند پس چنانچه من نان عادت است که در ماهی کم و در ماه دیگر زیاده می پیدا  
 بعضی را همیشه از اول مرتب است اکثر عوارض زیاده می زیاده می متاد و باید در مرض منخل خود ایدش و اینهم برود هم  
 یکی تا که در وقت ایام متاد زیاده از متاد و ایو دم آنکه در غیر وقت متاد و آید اول را منوراجیا یعنی جاری شده  
 باشد ثانی را منوراجیا یعنی جاری شدن خون زخم باشد و قوت بریان انگلشن مندا السبب منقول است و از  
 خون پیدا میشود چنانکه در سل و البیوم منور باد و هم طحال و کلوز و ز معنی مرض سفیدی خون یا دیگر امراض منوعه سفیدی  
 خون اند خون قین و سفید میشود و گاهی از کیفیات نفسانی مثل غم و غصه فرج زاید و خفت غم و هم خون بیشتر جاری  
 میشود و گاهی این سباب گاهی سبب قطع من واقع میشوند و آن مذکور شد و گاهی از کثرت جماع و گاهی از قریب من یا

واللفظ اع حیض هم خون زیاد می آید و گاهی در دم و درم خصیصه و درم میو کس می بیند رحم هم خون حیض زیاد می آید و قسم  
ثانی اکثر بسبب سرطان الرحم و بواسیر رحم که فی الواقع آن قسمی از لحم است که غیر با سوار است و آنرا زبان انگلشن پائی می نامند و  
آن هم حیوان بحری است که بصورت خیلی که غذای مشهور است میباشد زیرا که این لحم که در رحم یافت می شود چون آنرا از  
خون و آب که در آن میباشد صاف کرده از آب بنویزند بصورت خیلی مذکور میباشد و آن فی الحقیقت غشای خانه دار میباشد  
که از میوکس می بیند پیدا میشود و اصل آن در میوکس می بیند میباشد هم قریب سقوط حمل و گاهی بعد سقوط حمل خون زیاد  
می آید اما قریب سقوط پس سببش آنست که چون زمان سقوط قریب میشود شیمه که غشای بالای جنین است و بر تن او  
جنین باقی میباشد از میوکس می بیند رحم جدا میشود و درین وقت عروق که در میان میوکس می بیند رحم غشای مذکور متصل  
بوده است میشود و از آن خون ریخته در رحم جمع ماند و بعد جدا شدن تمام غشای مذکور از رحم جاری میشود و این امر طبیعی است  
لیکن گاهی با وجود جدا شدن غشای مذکور با تمام از میوکس می بیند رحم هم این خون جاری میشود و این امر غیر طبیعی است  
و بسته میشود و لیکن جریان خون کثیر بسقوط پس سببش آنست که گاهی قدری غشای شیمه بعد سقوط در رحم باقی ماند  
و بسبب آن رحم متعادی میگردد و بسبب اذیت آن خون کثیری آید حتی که گاهی زن هلاک میشود و مذکور ايضا گاهی شیمه از  
اول نکلون جنین متصل بدین رحم میباشد و این امر غیر طبیعی است زیرا که امر طبیعی آنست که شیمه از جانب عده رحم متصل بود  
از درون آن دور بود و با حمله هرگاه درین صورت خاص جنین کثیر میشود بسبب آن و بدن رحم کشاده و دست میگردد و درین وقت شیمه از میوکس  
می بیند و بدن رحم جدا گردد و بسبب آن خون در ایام حمل جاری میشود و علامات عده و اظهر علامات آنست که خون کثیری در  
و این گاهی بتعاطر دفع میشود و گاهی اول تقاطع بود من بعد یکبار مقدار کثیر منجمد شده و دفع گردد و گاهی این قدر زیاد می آید  
که مرخصی بیوش میشود و ماه بماه از زیاد آمدن خون مرخصی یا ضعیف و کم و در میگرد و بعد آن کمتری در و سر وقت است و ضم  
غذا و عدم شهتا و تنوع وقتی و زیاده یا ریاح در بطن و تبخیر شکم پیدا میشود و در چنان ضعیف میشود که از ادنی مشقت مانده گردد و  
علامات مایه نولیا از قسم انضی بار و دل بستگی و هم اعراض شیرین یعنی تهتات رحم از قسم خفقان غشای عرض میشوند و بهترین علامت  
استحسان جهت تشخیص سبب آنست که مرخصی را یا آرام داشته اول دواای حالبس خون مثل گالاک است و نشانند پس اگر بعد  
این تدریج حجت شود و بعد حرکت هم باز خون نیاید باید دانست که از اسباب غیر و سیه بوده و اگر بعد تدریج حجت شود و  
انحرکت کردن باز خون جاری شود باید فهمید که از دم رحم یا سرطان رحم بوده و العلاج اول تفحص سبب نموده باز اگر سببها ممکن  
گوشند که اصل العلاج از آنکه سبب است و علاج عام آنست که گالاک ایستاده گرین همراه نبات یا شیون نبات حاکمه که موافق این مقدار  
بخوشانند یا همراه روغن و ارچینی که یک درام بوده حاکمه بخوشانند نوع دیگر سلفیوکل ایستاد و رویشیک است قطره همراه آب  
ساده بخوشانند و اگر انیم وجود نبات پلبای اسپییاس از پانزده گرین تا بیست گرین همراه آب ساده حاکمه روزانه سه بار بخوشانند  
و اگر از نیمه نمیشود بسبب آنکه رحم ملائم و بدن آن کشاده بود و درین وقت باید درین رحم را با یک تشنج منقبض و مجتمع سازد مثل اگر

پیشینه و بهترین طریق استعمال آن درین مرض آنست که بکیرند سفوف ارگت ده گرین کاکائیت ده گرین و هر دو با هم آمیخته هر دو آب ساده روزانه سه بار نوشانند و این دوا اگر چه هر دو قسم نافع است لیکن بسبب بی تشنج و تشنجی بسیار فایده است فواید بکیرند سفوف ارگت نیز در ام سفوف و در چینی کپورند ده گرین نبات سفید ده گرین اودیبه با هم آمیخته از آن دو حصه ساخته بعد از دو یا سه ساعت یک یک حصه بخورند و این دوا هم هر دو قسم نافع است لیکن برای تشنجی نافع است و چون هم اول فرنان جوان را که با هم صحبت دارند زیاد و عارض میشود بسبب آنکه اعصاب ایشان از کثرت محاسن ضعیف میباشند و اندک گاه در وقت در وحی ایشان یک هفته باقی ماند و بر مایه شپا سیم ده ده گرین و زانه سه بار نوشانند تا از آرامسانی اعصاب ایشان قوی شده از حدوث مرض بینی حاصل شود و از ادویه و ضعیف تر آنست که آب گرم در شانه حیوانات پر کرده و در آن آبسته بر محل قطن کرد و در میان موضع کلتین یکس از نفع دیگر پارچه در آب سرد تر کرده بر جانه بمقابل رحم نهادن هم زرقه از آب سرد و تشنج قطع یزد و در جنبه فید است که از تریاق که آب بسیار گرم کرده شود و هم خون بند میگردد و در این علاج ضد علاج اول است نوع دیگر آن کک ایست ده گرین با حک کرده در ریه زرقه در جنبه ساینده سرین بالا کرده تا نیم ساعت بر پشت مستقی مرضیه را دارند اگر ازین تدبیر هم فایده حاصل نشود آن کک ایست با چربی بزور و خون کتید حک کرده یا بار و زن که کو آمیخته از آن شیان بلوطی چنانکه طریقه یا ختن آن مکرر نوشته شده درست ساخته در جنبه یا در دهن رحم گذارند و گاهی مرض چنان صعب بود که هیچ دوا نباشد و در مرضیه را کک ایست در وقت باید که از دیگر تدبیر بکنند و بهترین تدبیر درین وقت آنست که پارچه های صاف را در جنبه نهاده بقوت و تسهیل کامل جنبه را بکنند و در وقت باید که اول پارچه را در سر که خالص تر کرده بر دهن رحم نهادن بعد پارچه های خشک پس آن داده و جنبه را بکنند چنانکه جای در ورید شود پس مرضیه را بر پانگ دارند و از حرکت هر گونه منع کنند و درین وقت هم کاکائیت نبات سفید یا هر دو یک عروق را ننگ کنند مثل کاکائیت و پکیاس آب شپاس مرضیه ابار بار نوشانند و طعام بار و بالفعل خورند لیکن غذای قوی مثل شیر و شور بانوشانند اما آنچه از آن در خون گرمی پیدا شود مثل لحم و ابار و چاره از آن اجتناب نمایند فصل هفتم در بدوی طوایط رحم و آنرا باخت انگلش فی مژدوس چار جیس یعنی بدوی طوایط سائمه رحم نامند الا سباب اکثر سبب آن کم آهن و کم ش و باقی ماندن آن در رحم بود بهر سبب که آمد و گاهی بسبب خفگی شدن طوایط و هم که در رحم میگویند بهرین رحم خارج میشوند و بهر سبب که آنها خفگی شوند و در رحم مانند زیر که عفونت و تن ریهان طوبت میشود که با خون قتلط بود پس هرگاه این طوبت خفگی میگیرد بسبب احتباس آن خون متعفن میشود و بسبب آن متن عفونت و آن طوایط شومس میگویند و گاهی بعد سقوط حمل هرگاه شیره از میوکس بهرین رحم جدا شود و غذای آن که از رحم میرسد بسبب جدا شدنش از میوکس متعفن و ملائم نمیشود سائل میگردد و درین وقت هم متن عفونت میباشند و ایضا بواسطه یاسقوط طهرگاه شیره هم خارج شود و لیکن قدری از آن در رحم باقی ماند از آنهم این شکایت پیدا میشود و هم بعد ولادت چون جریان نفاس نشی میرسد و قلیل غلیظ مثل گلابی یا ماکل بسیار آبی و در آن وقت هم عفونت پیدا میشود و هرگاه در رحم زخم کند که از قرضه میگویند یا سرطان باشد هم درین مرض مداخله میشود

در بدوی طوایط رحم

و درین هر دو مرض هرگاه خون با طوباب جمیع متفرق شده بسبب احتباس در جمیع یا در قسم باقی ماند متعفن میشود و الاغلا العلامات  
 انچه طوباب از جمیع خارج میشود متعفن نشود و در صورت خود و اتفاق اسباب مغیره و محذره مختلفه بودند مثلاً انچه جبهه فیض آید سیاه  
 میباشد یا مثل آب گوشت بود و انچه بسبب جمیع میکس میسرین جمیع بود و آن با طوباب جمیع و گاهی خون جمیع متعفن باشد انچه بعد از  
 حمل یا ولادت طبعی یا در شایه با انچه در حین آید میباشد لیکن همراه آن قطعات خون جمیع میسرین جمیع انچه از جمیع یا سرطان از جمیع آید  
 در آن مثل آب گوشت متعفن گاهی طوباب ایل بسیار میشل و در وی گاهی زرد آب خارج میشود و فرقی در قرصه جمیع و سرطان  
 بچند وجه کرده میشود اول از انچه جمیع قرصه متعفن و عفونت مثل عفونت لحم باشد و سرطان به بوی خاص است بعد از مرگ  
 مرضی و تجویز او را که تمیز میشود و طبیب کامل آنرا بخوبی میداند که بوی سرطان چه میباشد بوی مذکور و سرطان میباشد و حال  
 آن عارض شود دوم بزرگ و بوی که چون بعد از خال سپیکو لم به پیتر و دم سختی سرطان در جمیع موجود میباشد سوم بحیثیت  
 در زیر که در سرطان جمیع همیشه میماند بخلاف قرصه که در آن جمیع باشد و طبیب العالج علاج عام نیست که انچه را دود  
 که بوی غش از ایل میکند آنرا استمال آنرا مثلاً کار بولک لیسیدیک ورم و در شفا و انس آب ساده حلقه یا پیاس بر کینا  
 از بنیت گریز گریز در بنیت آونش آب ساده بحساب یک گریز یک گریز یا یک گریز جمیع گریز آونش آب حلقه و این بهتر است از بنیت  
 نیم ورم در بنیت آونش آب حلقه یا کاشیش گریز آونش ورم در بنیت آونش آب خوب حلقه و بقی در پاچه صاف انداخته قطر  
 کرده یا آونش و دوی کلورین تا سوزن زیکه روم تا دود ورم حسب یا دوی که را شیشه بنیت آونش آب یا بولکین یک گریز روم تا دود ورم  
 در بنیت آونش آب ساده حلقه یا مان یک لیسیدیک روم شب یا فی خام و دود ورم در بنیت آونش آب ساده حلقه یا زین او و  
 هر چه مناسب مقام و اندک گرفته بقی در بنیت آونش آب در هر بار بزرگ و بقی در بنیت آونش آب در هر بار در جبهه ساند و کلرین  
 را خفیه میکنند بعد از کامل کرده بسبب خاص مرض زمین زنده و بقی آن کوشش نماید مثلاً انچه بسبب طبع طبع بود  
 یا بسبب شیر مرده باشد و آن دوائی که جمیع را جمع و مقبض ساخته خون جمیع را خارج سازد بنوشانند مثل گشت و گریز  
 بولکین یا آب ساده بعد شش شش ساعت بنوشانند و انچه بسبب جمیع میکس میسرین جمیع بود و آن علاج ورم مذکور  
 چنانکه بجای خود نوشته شده است انچه بسبب قرصه و سرطان جمیع بود و آن انچه در امراض مذکوره علاج نوشته خواهد شد  
 از دود و بقیه اغذای جید و قوی خون خوانند و دوی قوی که مورث تقویت کننده مثل کچور شیل کاوریتان پیاس کینوین  
 فصل سیم در آکل و حرم و انچه قسمی از جمیع و قرصه است که بزبان شود و در هم بزبان او باشد عارض میشود لیکن بنفشه  
 متعفن نشده بقیه میکس که بسبب آونش و تشنگی نازیلین مرض پیدا شود و این مرض اکثر عشق ورم جمعی افتد و کنا و  
 رخم مذکور در دانه دار میباشد چنانکه در محل گریه و شوش نشان ندانمای موش میباشد مانند آونش زبان اگر نری و دانه  
 یعنی رخم شایه بگنیده از دندان موش نامند و این رخم بظاخر خشک و درخشان بود و گاهی آن گوشت لایم بصورت میکس  
 متعفن میشود و چون این علامت دیده شود و چون طوباب یا ایل بمرخی خارج میگردد و چون این رخم

فوق در جمیع و سرطان

فصل سیم در امراض غده



و نمک کنند عذیم الحنجره و در آن خم در و نیاید باشد اگر بود مثل سوزش بود اما زیاد از دیت نازان نید باشد این زخم روزی بر روز زیاد  
 میشود و گوشت غنق و در آن خم را بنحور و تا اینکه بجرم آن منتهی شود و تا این مان خون منقبض برابری پیدا شد از آمدن خون  
 مذکور مرخصه روزی بر روز ضعیف میشود و در جگر آن خراط پیدا کرد و دولاغری بر آن غالب شود و انجام منقبض آنست که ضعیف  
 و کمزوری هلاک شود یا در آخر مرخصه غشائی آید از شود و در آن مرخصه پیر و العلاج علاج آن دشوار و زیاده سبب شوائب است  
 که چون در منقبض دیت نید شد از او ایل مرض مرخصه جوع بسوی طبیب نیکان تری بری کرده شود که مرض یاده کند و چون  
 زخم زیاده ناقص میشود سبب تکلیف آنرا از آن جوع بسوی طبیب میکند و درین وقت چاره کار نبوده با بجهل اگر در ابتدای مرض نید  
 اصل نایک کیشد که آنرا اصلاح کرده باشد و اولیو بنود بگیرد و پند بر بستر منجمه در نایک کیشد که او یکپولم و کل کرده باشد  
 آن سر قلم مذکور را بر زخم منجمه بعد از آن آب سرد بر زخم را بر آن رسا شد و بنیاد آب و امی مذکور به جوع دیگر رسد یا ال  
 کاشک نقره بر زخم منجمه پانکه در علاج زخم منجمه نوشته شده تا زخم منجمه نشود و چون زخم زیاده شود درین وقت استعمال نیر را  
 کاشک نقره در آن نقصان بسیار میشود و درین وقت مرجمه شیان که در علاج زخم منجمه نوشته شده استعمال آنرا در این منجمه شیان  
 با کله که برانف میشود و در آن زخم شایندن لایک آرسنک بسیار فایده حاصل میشود پس یک که درین منجمه آنرا استعمال آنرا در  
 آنچه برای تقویت مرض منجمه بود مثل روغن جگر یا سی و یک پسر شیل وین غیره مقویات نوشانند و اغذیه جیده صافه خوراندند  
 مرض منجمه پدید شود اگر مرخصه غشائی آید از شود و آنچه در علاج آن نوشته شده عمل آنرا چون این منضم طول کشد لا علاج  
 بود تا زخم فصل نوزدهم و حکمت الزحم یعنی خارش که در زخم پیدا میشود بسبب گاهی منجمه که منجمه یا در زخم منجمه منجمه  
 و قتی که منجمه ضیای در آن کبیر شده قریب جلد را بر زخم رسد و گاهی منجمه میوکس میبرن و منجمه خا که گاهی وقت  
 جاری شدن رطوبت منجمه بسبب حدت آن زخم خفیف پیدا شود و گاهی منجمه خرد که منجمه بسبب سیلان طوبات زخم  
 اینجا حادث میشود و گاهی بسبب علاج انگشت خود یا شیان صافه که منجمه بالاناسل بودند و زنان عقیل باید کار بسبب  
 نبودن شوهر آنرا بعمل می آرند زخم این مرض پیدا میشود العلامات اول از زخم خارش است که در زخم پیدا میشود منجمه  
 امراض حادث گرد و علامات امراض مذکور بر آن شاید بودند و آنچه از فعل خود مرخصه بود و در آن سبقت فعال در منضم ال  
 زخم درین منقسم قوت ساقط میشود و کمزوری زیاده موجود بود که اعراض اینجولیا مثل کثرت فکر و خوف و انجمه طبع و گاهی علامت  
 بسیار معنی ختنای زخم مثل تشنج و غفلت و خفقان آنچه در امراض غصه بانیه یافته شوند در اینجا موجود بود العلاج اول  
 تشخیص سبب منجمه و رفع آن پروانه مثلا اگر بسبب زخم زخم یا در زخم منجمه بود علاج او زخم و سیلان زخم که  
 بجای خود مستطورت پروانه و علاج عام آنست که در آب سوخته روزانه نشات و آب سرد و جینه بر زخم را بر رسا  
 من بعد مخدرات مثل برواید شپاسیم آب ساده کوزه نوشانند و عذیم بر واید شپاسیم بر او کلول باید ریخت با حکم  
 نوشانند ایضا لاهر واید شپاسیم بر او اکثر کثرت تبسلسل کاکه یان و گریین باشد نوشانند ایضا لاهر واید شپاسیم بر او

حاصل نوزدهم در حکمت الزحم



چنانکه پیش از این ذکر کرده بودیم بنوشته بودیم که غلبه بر غلبه قوت برک قوت سیم چهارمین سوره آب ساده یا باجر یا پند شاک  
 محلول آب نوشان غذا بار و بالفعل بالقوه مثل نان یا پنجه سوره شیه گاو یا حیض قهر یا دفع ترش یا غرورات بارده خوراند  
 لیکن بار و بالفعل و از گوشت ساده و زرد و بهر نوع یا هر غذایی که در آن توایل حاره باشد چنانکه ضرورت و هر جا که  
 از کله خویش مرض پیدا شده باشد در آن مرض را مشغول بکاری سازند مثل تعلیم علوم یا اشتغال بدوختن غیره تا خیال را  
 از دلش برود و از کار بخوشد از این فصل پنجم در فساد بیرون زنان و آن نیست که نظریه ایستاده میشود چنانکه  
 قضیب بی آن ایستاده میشود و سبب ایستادگی آن بانست که آنچه جسمی که در قضیب مرد است در نظریه زنان هم هست  
 که در آن خون کثیری آید و سبب آن ایستاده میشود و این عضو در بعضی صغیر و در بعضی عورات کبیر میباشد چون آنرا بان و حرکت  
 و بند چنانکه در خلق زدن حرکت میدهند در آن خون کثیر آمده ایستاده میشود و با حکم سبب آن گاهی حکم فرج و گاهی سبب حکم  
 رحم میشود چنانچه گاهی از اویت آن حکم رحم هم پیشی و گاهی سبب یاده یا ییدن آن چنانکه بعضی عورات برای لذت خود  
 آنرا میمالند و گاهی این عضو چنان طولی بود که از فرج خارج شد از لباس پوشیدن ملحق میشود و از تصاق و مطاکا که آن را ایستاده  
 میشود و گاهی از اتفاقات و تشنگی لباس پوشیدن یا دست خود را بر آن تادیر یا تادیر آن گرم و متادیر می شود ایستاده  
 میشود و گاهی سبب است که فعل عورات بدکار است هم ایستاده میشود حتی که بعضی عورات نظریه خود را در فرج زن بگیرد و طویل  
 داخل میکنند علامات ایستادن بطور علامت کامل است اما علاج در اینجا هم اولی خاص سبب نمود و رفع آن پر دانه  
 پس آنچه سبب امراض بود و علاج امراض معدوم و مشغول شود و نیز از عادت پیدا کرده باریست خود بود و در آن ترک عادت مرض  
 نماند و بعد علاج عام نیست که آنچه در حکم نوشته شده مثل برادر یا شاک یا ش غیره اویت مخدیره نوشتن در آن هم شود و از آن  
 ازویت و ایستادگی کم شده بطرف کرد و در آنچه سبب یا آتی مقدار نظریه بود که سبب مطاکا و ازویت نظریه در آن ایستاده  
 میشود و در آن قسم خاص نظریه را از کار ببرند چنانکه در مردان خفته میکنند مرضی رفع شود و در فصل سیم پنجم انقلاب رحم  
 و آنرا بلوغ گشتن از قوت آن است و نیز میماند یعنی انقلاب شدن آن در مردان از انقلاب است که قهر رحم و قاعده آن از جانب  
 باطن خود از رحم بیرون آید چنانکه در جامه بعد و ختم انقلاب پس از آن درین صورت فندرس که قهر رحم است بسوی قدام  
 بیرون می آید و هم بسوی خلف می رود و در هاست این انقلاب مختلفان گاهی فندرس یعنی قاعده رحم بالتمام بیرون می آید و  
 گاهی فندرس از آن بیرون آید لیکن هر چه بجای خود ماند سبب گاهی بیرون دانه این مرض میشود و قوتی که ولادت بکمال تشنگی  
 شود که از آن بچشم و جبین زیاد کشاده شوند و از تشنگی و در اقصای عصب پیچی شیک فندرس هم همراه طفل بیرون آید و قوتی که  
 سیمیه همراه طفل خارج نشود و بار رحم متعلق مانده و بعضی تعلق برای جدا کردن آن قاعده قوت زاید صرف کرده آنرا بیرون  
 همراه آن فندرس از رحم خارج میشود و هم هر گاه سیمیه در سیمیه رحم پیدا شود که از آنرا بان گشتن بی بیرون میشود که پیشتر  
 تادیر رحم آید و از اویت آن رحم بر بی قوت کردن سیمیه و نیز در جمع و متعقب شود درین وقت هم فندرس همراه آن بیرون می آید

فصل پنجم در فساد بیرون زنان

فصل سیم در انقلاب رحم

بعض رحم در مانی بالتام تمقلب میشود السلا مات چون می بینند رحم در جبهه یافته میشود بجائی خود و نباشد و گاهی حتی  
و بر فرج یافته میشود چون این مرض بعد از ولادت حادث شود و فوراً این تمقلب مقدار رحم بسیار کمیشد ساعه دیده میشود و اگر  
بر آن چند روز یا یک ماه بگذرد مقدار آن کم میشود و چون انگشت در وضع انداخته ببینند رحم بجائی خود نبوده و گاهی بر عاده  
بجمل رحم انگشت زده آتماع صوت کند و از جسم صحت که از آنجا می آید منع نشود و هم اینها چون هم تمقلب برین قشطن  
سفرجل میباشد که قاعده غلیظ آن بجانب من فرج بود و اس صغیر آن بسوی داخل مانده باشد چون آن را انداخته برود  
آن بگردانند و من رحم یافته نشود بلکه جای که آن نفیس خود و تمقلب باشد آنجا میل از فرا صحت و من تمقلب هم منوع  
شده بالانسد و در خانه و در سرد و جانب در و با تمقلب شش شود و هم این در و در سردی که در ساقین می رسد و آن کیست  
رحم بسیار خارج میشود و چنانکه در افراط طهرت می آید از آن مرز قیاس بسیار ضعیف و از آن سگیده و رنگ چهره زرد میشود و من شکو  
می کشد چنانکه بجا فرج و دم کثیر از دم رحم اینجا است طاری میشود و بعد از آن خون خفوت قوت و چون رحم بر می آید ستان  
و راه فقرن شود و میشود العلاج اگر بعد از ولادت اینجا است پیدا شود و فوراً اطلاع بآن حاصل گردد و تدبیرش سهل است بآنکه  
یک دست بشکم نهاده خانه را قوت بخشد از دست قوی بگیرد تا که رحم بالانسد و دست دیگر را بر رحم تمقلب نهاده بقو  
بسوی باطن فرج کند تا فندس بجائی خود رود و من رحم بر بجائی خود آید و اگر دست در زیر انقلاب گذاشته باشند  
تدبیرش دشوار است زیرا که در من رحم بعد انقلاب جای که بوده باشد آنجا تنگ میگردد و من نبود که در آن فندس برود پس این  
بهتر است که قول مرخصه اکلار فام یا آتیه بر بایند و بعد فندس تمقلب از داخل خوب نمکنند و بیخ یا آنچه خورن را بوی  
بود خارج شده مغز علیله غرو خالی شده محمول گردد پس آنقدر که محمول لا غرض شود باشد آنرا همیشه سبب از انگشت یا میل سبب  
اندرون رو کند و اگر در یک در کار سر انجام نشود و رایام متحد درین عمل را اختیار کنند تا که انقلاب بر طرف شود و گاهی سبب  
رابط رحم و زیادتی خفاست سختی هم رحم و زخمهای کیوس سبب رحم چنان میباشد که از این سبب هم کار بر نیاید چه برای آن  
دشوار بود پس من قوت ناچار برای فرج کردن از قوت دایمی که بدتر از موت است این سبب را بعمل آید که جای که قبلاً هم  
است آنرا یک روز از خطه ببینند و روز دیگر فندس تمقلب از کار و بعد تا ازیت بر طرف گردد و اگر در من بیرون هم  
لیکن من از آنکه ازیت هم چاره نیست فصل بسبب و دوم در فتور و فرج رحم و آنرا بر آن گشایش بپوشد یعنی خروج رحم  
از بجائی خود و آمدن آن در جبهه نبیند و گاهی هر رحم از فرج خارج میشود بسبب اصل سبب آن بهر خفای رابط هم است  
که سبب آن در بجائی خود نماند از یاده تقیل شدن هم است چنانکه در دم رحم بسیار کم باشد که سبب آن رابط آنرا بر جای خود  
نماند و سبب از سبب بعد از آنکه آنچه از همه کثر سبب آن واقع میشود و نسبت که درین بعد از ولادت نبوده و از پلنگ خود  
مشغول کار و بار خانه خود شود و هم زیاده ولادت چنانچه زن را که در آن مبتلا میشود و هم زانی که بعد از محنت میشود  
بار برداری بیشتر میکنند زیاده در من مبتلا میشوند و هم سبب سبب آن حدیثی که گاهی بر رحم چنانکه در حال خطه قوی







[illegible]

مفت محمد رفیع الرحمن







بیرون آنرا فکد کز فصل بستی و کشت ششم در بوا سیر و بشور و توشه که بر جسم هم پیدا میشود و این مرض در ورم غصه  
 ورم هم و وقت یادتی قبل از خون در هم پیدا میشود و هرگاه زخم یا خراش بر میوس میبینیم هم هم قدر در آن وقت اکثر عروق  
 که در جرحت بودند و بیخ و دراز شده صحت بوا سیر پیدا میکند گاهی میوکس میبینیم و لایم و کثیر المقدار ورمش شده در آن وقت  
 توشه پیدا میشود و این را نبر بان اگر نریزی بالی کین من آن اگر چه بوا سیر است لیکن صحت بوا سیر میباشد العلامات این  
 مرض مذکور محسوس میشود و وقت در جرحش زان خون کثیر جاری میشود مثل فراط طمش و در میان اوقات در وحوض اول  
 ثانوی آب سفید جاری میماند العلان اگر زخم باشد علاج زخم و اگر ورم غصه بود علاج ورم غصه اگر ورم هم بود علاج ورم هم  
 نمایند و علاج عام نیست که هرگاه زخم نباشد زان نکاشته و غن کوکوشیان درست ساخته قریب به جرح من آن که از آن منع  
 زاید حاصل میشود و اگر زخم هم باشد شیان از لیمبائی ایو دایث و هلمک بار و غن کوکود درست ساخته استعمال آن در هرگاه بالی  
 باشد یعنی شکل توشه بود آنرا از اصل کاشاک نقره و اغ دهنه تا گوشت مذکور بریده شود و اگر بعد آن مرض ایل نشود و در آن  
 خون و گوشت زیاده بود چنانچه بشکلی بزرگتر که بر سر آن پنبه حمل بسته بود بر توشه مذکور طلا ساند تا بگذرد و جمع عضو و تقویت  
 را از آن و رساند و جسم مذکور خشک شد بریز فصل بستی و هفتم و نهم و نهم و درین مرض هم هوای کثیر پیدا شد و کثیر  
 و این مرض کمتر از حمل مشابه میشود و آنرا اگر نریزی شش شش آن توشه برین میماند و غنی زیادتی مقدار هم بسبب زیاده شدن هوا  
 در آن استیب گاهی حمل مستقر میشود و چون یک ماه بر آن بگذرد و ورم که بسبب حمل و تب و کبیره بود و میرود و بیرون هم نیاید  
 بهما بخار آب فاسد و غن میشود و بسبب فساد و عفونت آن هوا پیدا گردد و گاهی بعد سقوط حمل قدری از شیان باقی مانده قبل  
 خروج آن هم و در هم بند شود و بسبب آن قلمه شیان کوره فاسد و غن شود و از فساد و عفونت آن هوا پیدا میگردد و گاهی در ورم  
 میوکس میبینیم هم هرگاه هم هم بند شود و آب زان جاری نشود و غن که بر سر هوا پیدا میشود و بعضی اطمینان میکنند که ممکن است  
 که میوکس میبینیم هم خود هوا پیدا کند چنانکه در ختنه و زخم دیده میشود که گاهی طین مرصه بسیار متفخ میگردد و باز ضعیف میگردد و بی آنکه  
 ریاخ از ورم یا مقدار خارج شوند لیکن این امر در جرح ثبوت کامل نریزد چنانکه است که با سبب گیریم این متفخ شد باشد العلامات  
 سختی بر عانه و حمل هم از خارج محسوس میشود لیکن چون انگشت بر آن زده صحت را بشنوند آواز جسم بر هوا می آید آواز جسم صحت  
 چنانکه حمل سمع میشود و بتر ازین علامت فاروق در میان حمل این مرض نیست چون انگشت انداخته بر هم هم حساس است  
 و از خارج هم هم کرده هم را حرکت دهند مثل سلمه یرو بالا حرکت میکند و دانسته میشود که هم است در وحوض و درین صحن بنام شیان  
 و ازین سبب بیتگان میدانند که حمل است و چون گاهی درین هم میشود ازین سبب مرصه دیگران میدانند که این  
 حرکت میکند و گاهی چنانچه متفخ شد بالا میرود که صورت حمل کامل از آن هوا پیدا شود و بلاوات مشابه میشود و چون فداخ  
 هم زیاد شود و تنفس مرصه مسخر گردد و در اعضا طین مثل گره و مثانه و معاسی هم متفخ پیدا شود و از آنها ازین اعضا  
 موافق ضرر عضو پیدا میشود مثلاً از نماز گزیده بول کم پیدا شود و از نماز مثانه بول بدشواری آید و از آنها از معاسی هم و از آن

فصل ششم در بیان احوال و مشاغل و عادات و رسوم و آداب و تقاضای این شهر

عالمستان و مسیحیان و ملل و ملوک







بیشتر یا او عارض این امراض میکنند تا آنکه چون مدت ما خود را بپایان این امراض نرسد از رفته رفته این عارضه اندکی بیشتر  
و بسبب این امراض مذکوره پیش می آید و گاهی میگوید که راه معده من بند است چیزی از منی معده فرو نبرد و گاهی میگوید  
که دلم گلو بستند و از بر می آید چیزی نخورده میشود و گاهی میگوید که شکم من سلبه پیدا شده و گاهی بنابر ذکرهای پیشین  
یک جانب بدن شده و گاه از یک طرف بدن ستر خا ظاهر میگردد و گاهی مرض فضا نظره و گاهی اذیت و مرض ساق ظاهر میگردد  
بهر مرض که تراض میکند بسبب یاد فی فکر خیال و تیت در آن عضو پیدا میشود و عارضه مذکور در بعضی میگردد و گاهی در شش  
بر سه ظاهر میشود و این نحو که ساعت دو ساعت سه وقت آید و با و آید و باز دفع شود و گاهی نفس بصورت ریه و گاهی در  
و گاهی عارضه گاهی نفس متعجب گاهی نفس کی که بعد از کثیر طفلان را عارض میشود و گاهی فواق و گاهی نفس صمد که معمول  
و متاسفین میکنند پیدا میشود و این علامت اکثر درین مرض یافته میشود و چون بیشتر یا بر این صورت شود و مریض میگردد  
که مر از آن بسیار اذیت میشود و غرض ازین کلام و اظهار آن بود که تا و دیگران متاسفند شوند و بر آن ترحم و در قضا  
ظاهر کنند و از مهارت مرضی طبیب حاذق بفور دیدن صورت مریضه و شنیدن کلام آن میداند که از یک مرض است  
مبتلاست چه او میداند که صورت خاص مریضه درین مرض چه میباشد و بدانکه اکثر سبب مریضه درین چنان بود که یک  
بر یکتیرین افتاده باشد و شعله علیا قدری طویل و گنره میباشد چون کلام کند چشم ریه ناکر و توبه میشود و جواب  
کلام تمام نمیدهد بلکه بلا وغم اقتدا میکند یا کلام کمال استیسی و پوشیدگی نماید و برخلاف عادت اصلی صحیح خود کلام  
میکند و آنچه اظهار شدت مرض و اذیت خود میکند و ظاهر مرض چنان شدید نبوده و از نیمه دانسته میشود و در این بیان اظهار  
بسبب بیشتر است العلاج علاج وقت دوره و کثیر نوشته شده از آنجا بقتید و علاج نمایند یک تریه متعلق وقت و  
اینجا نوشته میشود که هرگاه بیوشی ظاهر زیاده تشنج کثیر بود و تنفس بشواری گرفته باشد درین وقت دهن بینی علیا را بقتید  
نیک کنند تا هوا مطلقا اندرون نرود و چنانچه در تریه تشنج بر طرف میشود و بهوش آید و فریاد میکند که بگذارید و الا  
جان من میرود آن زمان دهن بینی را و اگر اندر نبرد تا تشنج رفته و مریضه بهوش آید تشنج در بهوش کردن و در تامل  
و سبب مرض کنند پس اگر امراض محتمل یافته شوند علاج هر مرض موافق آنچه در ذیل هر یک نوشته شده نمایند و باقی  
بمعلاج تدریجی پردازند و بخورانی غلیظه و ادویه مقویه چنانکه مکرر تصریح آن کرده شده کسی را که بسبب عارضه  
میسوی امور خانه شده باشد آنرا مشغول با امور خانه داری سازد و در بواسی صاف پیاده بگرداند و آنچه از آنجا  
باشد کتبی ایش کرده و بپندد و آنچه از اثر خانه انی بوده باشد در آن ناچار است لیکن برای تسکین اذیت مریضه از مرکبات  
زنک مثل اوکساید آف زنک یا زنک لیسین یا زنک سلفاس و همچنین مرکبات حلیت خوراندند و اگر عادت نوشیدن  
چای یا کافی بود آنرا ترک کرده بجایش شیر و نفوذ کو که همراه شیر نوشاندند که فصل ششم در سعال که در آن  
این مرض در مسوان پیدا میشود و آنچه اذیت شدید از آن مردان میرسد زنان را نمی شود زیرا که مجرای بول در مردان طویل و

فصل ششم در سعال

ازین سبب بول تاویر و مجری ایشان میماند بدشواری خارج میشود و مجری بول زنان قهیر و جمع است از خجسته بول ایشان  
بسیار است می آید و در سوزاک زیاد اویت وقت بول میشود و علاوه ازین در زنان غده موسوم در زبان انگلیزی به سینه کش گفته  
گفته شده مردان میباشند و درین مرض متورم میگردد و در زنان مردان را زیاد اویت میشود و نیست و هم خجسته زنان خارج  
نیز چنانکه مردان میباشند درین مرض متورم میشوند از رگها که گفتند یا در جوان میرنگین عیون آن و در زنان فساد از مجری بول پیدا  
شده و در مضامی دیگر ایشان مثل وجینه و فرج و رحم و فلویین ثوب و اووری میسر و از آن در این اعضا هم تورم پیدا میشود  
اما در رحم و اووری فساد و کتله میسر و در فرج و وجینه اکثر سبب است سبب آن ورم درین اعضا پیدا میشود ازین سبب علاج  
قدیر سوزاک زنان نهیب است مردان و شواری است و این مرض در اینها نام دارد و از میان گاهی سوزاک در زنان از وجینه شروع  
میشود و زیرا که اول زهر آن از منی در وجینه می آید پس سبب آن وجینه و درین فرج متورم میشوند من بعد از آن زهر فساد  
آن در مجری بول ایشان میسر و گاهی اول از مجری بول شروع میشود و از آن در فرج و وجینه میسر و اطلاعات هرگاه این  
مرض حادث میگردد بود ورم میگویند مجری بول و فرج و وجینه و رحم پیدا میشود و خواه از وجینه شروع شود یا از مجری بول  
بعد آن در وقت و سوزش در وقت بول و بار بار آمدن بول پیدا میشود و من بعد آب غلیظ تمام با بصر از راه بول و فرج جائیکه  
این مرض سیده جاری میشود اگر مرض فرس و کراتیک بوده باشد در آن اویت کم محسوس شود اما گاه گاه وقت بول قدر  
سوزش معلوم میشود و کین آب سفید از مجری بول فرج جاری میگردد و در سوزش مجری بول متورم میشود و این سیلان با سیلان هم  
پنجاه شش میشود و گفته شود اگر در دو فرج بینا باین وجه که چون درین مرض مجری بول زن از انگشت عمر کنند  
قدری آب سفید بر می آید بخلاف سیلان آنکه کم در آن از مجری بول آب نمی آید و علاج هرگاه مرض حادث و سیل بار و  
مثل بگینشیا سلفاس نوشتند و ششوی قیق و آب طلیح کتان و تخم تخم می خورند و آنچه اوید و علاج سوزاک مردان نوشته شد  
و مثلاً با زنان اینچاهم نوشتند اما چون در سوزاک زنان ورم در وجینه پیدا شد پس از آنکه در آن آب طلیح بپوشانند  
و وجینه بزرگتر از منی آرم فحش حال میشود و هرگاه این مرض فرس بود و منی خفیفه لا عرض باشد درین وقت آنچه در  
پایه جاری شدن آب سفید از رحم نوشته شد مثل آنکه در سوزاک نشوان قیق گیرین کاشکاب نمره و آب همتا که یک  
او شش بود و نمره پاچه در آن تر کرده آنرا بطور شایع تخم یا فیتکه که غلیظ که غلظ آن موافق وعت و وجینه باشد و دست  
در وجینه نهند تا دیوارهای وجینه از خود جدا کنند باعث سرعت حصول صحت است فک که فصل ششم در بیان کیفیت  
سوزاک در کرم بدانکه هرگاه جسم ضیای و موسوم بگنیز یا بیکل در اووری قریب جلد رسیده شش میشود و از آن تر شده  
جدا شده به جلد اووری می آید و آنرا فلویین ثوب جذب میکند چنانکه گفته شده پس در راه مجری کور قدری سفید می رسد  
پیدا شده که در زده کور میپوشد و چنانکه در وجینه مرغ ششاید و در سینه که در زده میباشند فرق است که در سینه مرغ  
تقدیر است که یک زاده است سبب اینکه در این وجینه جدا شدن از کرم مار چری دیگر بطور غذا چگونی بدن ما و میسر

فصل ششم در امراض مختلفه زنان








پس از آن غشائی ثالث شامی از قبیل غشا بطور تجربی غشائی رستہ و در اثر شدہ تا جائیکہ جسم بیضی کوچکی شکل  
 از میو کس میسرین جسم مرتبط است میرسد و درین شاخ گمائی کثیر و بیاض شامی این شاخ میو کس میسرین جسم حواس و  
 متعلق میشود و جائیکہ با جسم متصل شدہ اینجا جسم موم بلغت ہندی بتول و بلغت لائن پلاستیکانہ پدید میشود  
 ایندم غشائی کہ افین و سیکل از غده ہای میو کس میسرین جسم میرسد و چون این شاخ پیدا شود غذا ای جسم مذکور نیز وجود  
 این تجربی از عروق جسم میو کس تا ایکس تا ایکس شکم کشادہ و غیر مستطور بودہ اما بعد از انجالت غشائی بالائی کہ در آن مانع پدید  
 عریض و وسیع شدہ از ہر سوئی بین و بسیار می آید تا ایکس جمیع اعضا شکم محیط شدہ متصل میگردد و از آن شکم بند و مستطور میگردد  
 و درین اتصال صورت پدید میشود و در آن شاخ مذکور بیاض شدن بعد درین شاخ غشائی ثالث کہ متصل جسم است از شکم  
 جنین غیر کامل الحاقیت میرود منت یک شریط پدید میشود مثل انچہ درین شاخ در حصہ اندرونی آن کہ در شکم است خریط پدید  
 می آید و جسم میگرد و پس درین خریط کہ در حصہ بیرونی آن از شکم پیدا شدہ و آنرا اپنل از اپنل و سیکل کہ معنی خریط برآمدہ از  
 میگوید و جسم جنین پدید میشود و آن تا ماندن جنین در شکم کارگزیدہ میسازند و این ہر دو جسم را اپنل و سیکل کہ معنی خریط برآمدہ از  
 در صاحب بہار میسازند و این شاخ در شکم بعد مسدود شدن شکم از حالت اولی خود بسیار ضعیف میگردد و حتی کہ جنین کامل  
 چون بعد وضع و تشنج دیدہ شدہ مثل رباط نشان آن یافتہ میشود و نشان مذکور را یونگلیس میگویند یعنی تجربی بولن بعد از  
 شاخ مذکور کہ خارج شکم است ہم غیر میگرد و در آنرا بلغت ہندی نال گویند و سہ اثر کہ متصل جسم است آنول نامند بعد در  
 شاخ غشائی مذکور کہ خارج شکم است اثرین و اورہ پیدا شدہ ہماہنگ جنین میرسد و خون را در کیش میرسانند و بعد  
 غشائی اول کہ عریض و وسیع شدہ شکم محیط شدہ بود بہ مقام سر جمع شدہ بر این شاخ غشائی ثالث و از رتبط میگردد  
 از آن مجل حواس شاخ مذکور از میو کس میسرین جسم کہ آنرا بلغت ہندی آنول گویند ہم میرسد و محیط میگردد و تا آنجا رسیدہ باز  
 میگردد و از آن یک غشائی دیگر کہ محیط جنین بیاض پیدا میشود و این غشا سہرہ تمام جنین محل و محیط میگردد و درین غشا آب کثیر  
 پیدا میشود کہ در آن آب این مضطربہ و تگون جنین جنین میماند و تا انجالت جنین نشان نہاد بکاف نشان اعضا میسازد و  
 در آن بیاض چنانچہ تا چہل روز بخیر را کس کہ پیدا شدہ باقی نشان اعضا یافتہ میشود و تا ماہ ثالث از ہر سو بر صفہ حواس و جنین  
 بلکہ در ہر جانب آن کہ کہ افین و سیکل متعلق شدہ بود و ہماہنگ جنین بر این مضطربہ مثل میباش را با جمیع گذشتن سہ ماہ کامل کہ  
 غشائی انسانی تمام میگردد و آن زمان باطن جسم از ہر سو جنین مثل و لاتی میشود و تا تمام مدت خلقت کامل انسان کہ سہ ماہ  
 کس ممکن نبود کہ حکم کند باینکہ در شکم بہرہ یاختہ و جنین سہ ماہ گذرند و ہماہنگ وجود آیند و صورت انسانی کامل گردد  
 آن زمان اطلاق لفظ جنین طفل بر آن صحیح بود و طفل سہ ماہ حسابی و سہ ماہ از پنج تا شش ہفتگی و تا چہار ہفتگی  
 پیدا شدہ و اول تگون از جمیع اعضا طفل کہ پیدا شدہ و بعد از ثالث کہ دیگر اعضا ہم وجود و بزرگ شدن زیادتی طفل  
 کم میسازد و درین وقت کہ بعد سہ ماہ است چون جنین بپنجدین بطور آبگینہ دقیق بود پس آن جسم دیدہ میشود چنانکہ پس

در این شاخ غشائی ثالث شامی از قبیل غشا بطور تجربی غشائی رستہ و در اثر شدہ تا جائیکہ جسم بیضی کوچکی شکل  
 از میو کس میسرین جسم مرتبط است میرسد و درین شاخ گمائی کثیر و بیاض شامی این شاخ میو کس میسرین جسم حواس و  
 متعلق میشود و جائیکہ با جسم متصل شدہ اینجا جسم موم بلغت ہندی بتول و بلغت لائن پلاستیکانہ پدید میشود  
 ایندم غشائی کہ افین و سیکل از غده ہای میو کس میسرین جسم میرسد و چون این شاخ پیدا شود غذا ای جسم مذکور نیز وجود  
 این تجربی از عروق جسم میو کس تا ایکس تا ایکس شکم کشادہ و غیر مستطور بودہ اما بعد از انجالت غشائی بالائی کہ در آن مانع پدید  
 عریض و وسیع شدہ از ہر سوئی بین و بسیار می آید تا ایکس جمیع اعضا شکم محیط شدہ متصل میگردد و از آن شکم بند و مستطور میگردد  
 و درین اتصال صورت پدید میشود و در آن شاخ مذکور بیاض شدن بعد درین شاخ غشائی ثالث کہ متصل جسم است از شکم  
 جنین غیر کامل الحاقیت میرود منت یک شریط پدید میشود مثل انچہ درین شاخ در حصہ اندرونی آن کہ در شکم است خریط پدید  
 می آید و جسم میگرد و پس درین خریط کہ در حصہ بیرونی آن از شکم پیدا شدہ و آنرا اپنل از اپنل و سیکل کہ معنی خریط برآمدہ از  
 میگوید و جسم جنین پدید میشود و آن تا ماندن جنین در شکم کارگزیدہ میسازند و این ہر دو جسم را اپنل و سیکل کہ معنی خریط برآمدہ از  
 در صاحب بہار میسازند و این شاخ در شکم بعد مسدود شدن شکم از حالت اولی خود بسیار ضعیف میگردد و حتی کہ جنین کامل  
 چون بعد وضع و تشنج دیدہ شدہ مثل رباط نشان آن یافتہ میشود و نشان مذکور را یونگلیس میگویند یعنی تجربی بولن بعد از  
 شاخ مذکور کہ خارج شکم است ہم غیر میگرد و در آنرا بلغت ہندی نال گویند و سہ اثر کہ متصل جسم است آنول نامند بعد در  
 شاخ غشائی مذکور کہ خارج شکم است اثرین و اورہ پیدا شدہ ہماہنگ جنین میرسد و خون را در کیش میرسانند و بعد  
 غشائی اول کہ عریض و وسیع شدہ شکم محیط شدہ بود بہ مقام سر جمع شدہ بر این شاخ غشائی ثالث و از رتبط میگردد  
 از آن مجل حواس شاخ مذکور از میو کس میسرین جسم کہ آنرا بلغت ہندی آنول گویند ہم میرسد و محیط میگردد و تا آنجا رسیدہ باز  
 میگردد و از آن یک غشائی دیگر کہ محیط جنین بیاض پیدا میشود و این غشا سہرہ تمام جنین محل و محیط میگردد و درین غشا آب کثیر  
 پیدا میشود کہ در آن آب این مضطربہ و تگون جنین جنین میماند و تا انجالت جنین نشان نہاد بکاف نشان اعضا میسازد و  
 در آن بیاض چنانچہ تا چہل روز بخیر را کس کہ پیدا شدہ باقی نشان اعضا یافتہ میشود و تا ماہ ثالث از ہر سو بر صفہ حواس و جنین  
 بلکہ در ہر جانب آن کہ کہ افین و سیکل متعلق شدہ بود و ہماہنگ جنین بر این مضطربہ مثل میباش را با جمیع گذشتن سہ ماہ کامل کہ  
 غشائی انسانی تمام میگردد و آن زمان باطن جسم از ہر سو جنین مثل و لاتی میشود و تا تمام مدت خلقت کامل انسان کہ سہ ماہ  
 کس ممکن نبود کہ حکم کند باینکہ در شکم بہرہ یاختہ و جنین سہ ماہ گذرند و ہماہنگ وجود آیند و صورت انسانی کامل گردد  
 آن زمان اطلاق لفظ جنین طفل بر آن صحیح بود و طفل سہ ماہ حسابی و سہ ماہ از پنج تا شش ہفتگی و تا چہار ہفتگی  
 پیدا شدہ و اول تگون از جمیع اعضا طفل کہ پیدا شدہ و بعد از ثالث کہ دیگر اعضا ہم وجود و بزرگ شدن زیادتی طفل  
 کم میسازد و درین وقت کہ بعد سہ ماہ است چون جنین بپنجدین بطور آبگینہ دقیق بود پس آن جسم دیدہ میشود چنانکہ پس


# نقشه متعلق صفحه ۲۰۹




۱۵ تصویر پیرچین در دهانه رحم



۱۲ تصویر پیرچین در دهانه رحم



۱۱ تصویر پیرچین در دهانه رحم




۱۰ تصویر پیرچین در دهانه رحم




۱۳ تصویر پیرچین در دهانه رحم


۱۴ تصویر پیرچین در دهانه رحم




۱۴ تصویر پیرچین در دهانه رحم



۱۶ تصویر پیرچین در دهانه رحم



۱۷ تصویر پیرچین در دهانه رحم




۱۸ تصویر پیرچین در دهانه رحم



۱۹ تصویر پیرچین در دهانه رحم



۲۰ تصویر پیرچین در دهانه رحم




۲۱ تصویر پیرچین در دهانه رحم




۲۲ تصویر پیرچین در دهانه رحم




۲۳ تصویر پیرچین در دهانه رحم



۲۴ تصویر پیرچین در دهانه رحم



۲۵ تصویر پیرچین در دهانه رحم



۲۶ تصویر پیرچین در دهانه رحم



۲۷ تصویر پیرچین در دهانه رحم



۲۸ تصویر پیرچین در دهانه رحم





و جنین در ماه نهم در شکم مادر بیشتر پدید آید که از آن صورت برضای او می حاصل میشود و بر این هیئت رحم تمام و کمال بر آن  
 مشتمل میگردد و آن هیئت نیست که جنین بسوی سر رحم و سرین بطرف فندس بوزد و چون تقاضای منتهی شوند بسبب آن  
 محل نخ جنین بر زمین می رسد و ساق کبیر شکم می رسد و ساق صغیر بسوی ساق کبیر می آید و در دو سه روز دست بسینه چسبید  
 بوزد و با نیطو که یک ندر بالای زند و دیگر بود و مرفق اندرون عرض شکم باشد از آن خارج نبوند و در بین این فصل کعبه  
 یک گیرنده بود و از فصل نو و شش طفل بر این هیئت در شکم مادر می آید اما آنکه چنانکه طفل بسوی منقل بسیار می آید و  
 نبود پیش می آید بسیار است اقرب است که این هیئت یا بسبب تحریک رحم بود یا بسبب اینکه جنین بر این هیئت آرام  
 می آید حاصل میشود و متذکر فصل سی و دوم و علامات حمل بدانکه چون حمل قرار گیرد و اگر فین و سیکل در کم کناره رحم  
 متعلق شود و چنانکه پیشتر نوشته شد و در این وقت از او دم نرمان گاش نامند و نور درین وقت در رحم تغییر واقع میشود و این  
 خون کثیر در آن می آید و رحم آنرا ناکبیر میگردد و فندس قدری پیش آمده بالای شان آید و رحم فرو تر رود و از آن بوی  
 و جینه قدری کشیده و سخت محسوس گردد و در آخر رحم قدری به شان رود و بسبب بالا آمدن فندس این دل علامت حمل است  
 لیکن این علامت را هیچ معلوم نشود و خبر اینکه قدری شکایت یافوت بول میکند که بزرگاری مایه یابی یا بار می آید اما این  
 حاصل را معلوم میشود که بسبب آن خود را حاصل دانند پس چنانکه طبع است لیکن این علامت لازم و خاص نیست زیرا که چنانچه  
 طبع شد اگر اسباب میشود و هم گاهی کسی را تا گذشتن دو سه ماه حمل کسی را تا شش ماه کسی را تا آخر مدت حمل آب سرخ می آید  
 و گاهی یک هفته ای دو سه ماه از انیت رحم طبع میشود من بعد جاری گردد و گاهی بسبب امراض جریان جنین بند شود  
 و گاهی زودتر از این جنین می رسد که حمل قرار گیرد و گاهی وقت رضاع که اکثر حباس طبع بود زن باردار میشود پس این علامت  
 را با علامات دیگر از میان طبع دل باید شمرد و از علامات تویدیک که از آمدن نیاید جنین رشد لال کامل بقیه و لازم نیست  
 من بعد در معده بسبب همدردی رحم خرابی و فساد پیدا میشود و از آن توقع قوی اول عارض گردد و خصوصاً وقت صبح  
 این علامت گاهی زودتر از وقت شروع حمل تا دو سه ماه پیش از آن می آید و گاهی تا آخر حمل مانند و بعضی گاهی این علامت  
 یافته شود و در بعضی عوارض در اول حمل این علامت یافته شود من بعد در حمل ثانی و ثالث نبود لیکن قاعده است که تا  
 پانچ هفته این علامت یافته شود تا آنکه فندس از محل شیوان عانه بالا رود و آن زمان قوی ساکن میشود و گاهی بندرت  
 یک دو هفته این علامت موقوف شده باز عود میکند و گاهی سوزش محل معده محسوس میشود و چون زن مریض کن  
 اتصال آب کثیر از او من خارج میشود و گاهی جشائی ماض می آید و قوی از اغنیه خادقه الاکل تنفس شده بسوی اغت  
 رویه فاسد غیبت میکند و گاهی این علامات در حمل اول بون من بعد در حمل ثانی نبوند و گاهی در دهن اوجاب و ده پید  
 میشود چنانکه در قلاع پدید میگردد و این هم بسبب همدردی رحم باید دانست و گاهی چون بول جالی را در شیشه صاف گفته  
 نگه دارند و در زیر آفتاب بیدار در وسط قارور چشم غریب مثل ضباب یا پنبه فوشش یابد میشود و چون سه روز دیگر

فصل سی و دوم در علامات حمل

تویدیک که از آمدن نیاید جنین رشد لال کامل بقیه و لازم نیست

بر آن بگذرد و آنرا بنیت جسم مذکور طافی بر سر بول یافته میشود و در ششتم چنانچه طافی بنشیند و در این اباغت انگشت نیش بنشیند بکلفت و سکون یا بی ثناته تحافی و سیم هله و کشتی هندی و سکون یا بی ثناته تحافی و نون معنی مشابه بر پینه بینا مندر درین وقت رسوب بچین زیر بول یافته شود و چون این جسم غریب با تمامه نشین گردد و بعد از آن جسم دیگر نفید بالاسی بول بری آید که چون آنرا از خورده مین بپزند ریزه های فاسفت کلاهم دیده میشوند بعد از آن بول فاسفت مشفق گردد و شراب شود لایق استدلال باقی نماند لیکن این علامت هم گاهی یافته میشود و گاهی نه و اگر یافته شود تا ماه چهار یا چهارم بود در پستان چنانچه تغییر پیدا میشود مثل اینکه جالی از پستان خود از نیت و گاهی در قلیل و گاهی زیادتی مقدار دریا بد اما چون دوسه به سه تقریر عمل بگذرد در پستان قاری صلابت ظاهر گردد و محسوس شود و چون ماه چهارم بگذرد شیر هم در پستان ظاهر میشود و از دیدن شیر بنیدگان را یقین حاصل میشود که حمل است لیکن بر آنهم و شوق کامل نباید کرد بلکه آنرا هم از مصیفات باید شمرد زیرا که ظهور شیر در پستان هم مخصوص حمل نیست بلکه گاهی شیر در پستان آبکار و گاهی در پستان عجائز و زانی پستان حامل هم پیدا میشود و در حلقه سی هم تغییر واقع میشود مثل اینکه رنگ حلقه قوی میگردد و دو گرد و حلقه ناک سیاهی مایل نسبت به رنگ اصلی حلقه در وقت خالی ماندن از حمل بوده ظاهر میگردد و بعد از شش ماه چنانچه حلقه ناک که در حلقه می باشد نشانها چنان ظاهر میشوند که گویا قطرات آب بر آن افتاده اند و سبب آن رنگ آن جای که نشان قطرات آب است شقیف نیلایم که وجود این علامت را برای وجود حمل از علامات قویه باید دانست و بر عاده حلی از ابتدای فرج تا شش خطی سیاه پیدا میشود و گاهی این خط تا شکم رسیده تمام بدن در رنگ حلی آن قیظ ظاهر میشود یعنی جا بجا قاری سیاهی غالب میگردد و خصوصاً اگر چشمان و بر خساره ها تا اینکه گمان مرض کلاه کرده پیدا میشود لیکن این رنگ بعد پیدا شدن طفل بطرف میگرد و چون که حمل مابین آنرا است است بنا بر آن فقره از امراض ضرورت اند باید دانست که رحم در حمل هر چند که میشود لیکن صورت جسم در آن صورت متغیر میگردد و سیاهت بخلاف او را و او را میثانی است که در آن رحم بر این صورت بگیرد و مگر بعضی امراض خود جسم را سیاه آب و سیاه در رحم یا حبس طشت البته رحم هم بگیرد و درین وقت فقره در حمل امراض خاص ضرور بود و آن نیست اگر نه او را رحم جمع بود و وقت زدن انگشت بر آن آواز جسم بر پی خواهد آمد بخلاف حمل که در آن آواز جسم صمت می آید و اگر اندک و حمل و اجتماع آب در رحم یا او را هم حمیه بود درین وقت بعد از راه چهارم یک است بر رحم از خارج نموده نمکنند از انگشتان دست دیگر رحم را حرکت دهند اگر در رحم جنین بوده باشد سبب این تحریک در آن خطر آب ظاهر شود و بخلاف او را هم رحم اجتماع آب در آن دیگر طریقی است که زدن بار دار را بعد از راه چهارم بر پانگ نشانده امکنند که قاری بیشتر دارند شده در میان قاعدگی شود پس دایره را بنماید که انگشت خود را در فرج داخل کرده برگردان رحم رساند چون انگشتان بر غرق رحم که حمل ماندن طفل است بر سر دایره از سر نامل خود طفل را بسوی بالا دفع کنند چون جنین شکم اندرون آب همیشه سماند از جنین با دنی دفع بالا خواهد رفت و باز از بالا نیز به سجای خود خواهد آمد و طریقه دیگر آنکه دایره از سر انگشتان طفل را

بیالادفع کند و دست دیگر بالای خانه جلی نهاده از بالا بسوی تحت طفل را دفع کند و درین وقت چون طفل در آب می افتد از هر دو تحرک یک سهولت در آب مثل غلغل از زیر پیا و از بالا بسوی تحت حرکت خواهد کرد و اوقتی که آن صاف و آید معلوم خواهد شد که چیزی ثقیل فوراً از زیر بالا رفت و باز بجای خود آمد و این علامت مخصوص حمل است و در غیر آن یافته نمیشود و چون که حرکت طفل را از جنین جدا کرد چهارم حساس می کند تا گاهی درین هم اشتباه بود زیرا که گاهی بسبب باد و املازمه مرض هر یک با هم زن میگویند که حرکت طفل محسوس شد و فی الواقع حرکت نبض با جمله حساس حرکت جنین از بعد از چهارم پیش می آید اگر پیش از راه چهارم کسی حساس نماید بگوید لایق اعتماد نبوده و مگر وقتیکه قابله و اوقی برایت بعمل آورده حرکت جنین را دریافت بگوید قابل وثوق خواهد بود و آنچه از همه درست مال بر حمل اقوی بود آنست که آنه قیاس انصوت را بر دل جنین نهاده و تمام حرکت قلب جنین نمایند و این را از شنیده میشود و از بعد از چهارم تا آخر مدت حمل تا گاهی در جانب است خانه و گاهی در جانب چپ آن مسوی میشود و هر طرف که دل جنین آنگاه یافته شود و آواز آن مثل صدای ساعت بسیار که چاک می آید و نسبت حرکت جنین مادر حرکت قلب جنین بسیار سریع و متواتر می باشد مثلاً اگر جنین مادر در یک لحظه متولد با حرکت کت قلب جنین یکصد و چهل یکبار در شصت بار در آن مدت حرکت خواهد کرد و با جمله آنچه علامات وجود حمل مذکور شد در این علامات بر سه علامات اولی است موافق آن حکم حمل عدم حمل باید کرد و اول از همه شنیدن آن در قلب جنین دوم از شنیدن حرکت طفل هرگاه حساب تجربه از خداوند است بر خانه و تحرک طفل حرکت از او یافته بگوید و اقوال و جود جنین در کفم نماید سوم هرگاه قابل انگشت عرقی نهاده بسوی بالا دفع کرده و از خارج خانه از دست بسوی تحت دفع کرده حرکت آنرا دیده بیاورد که قابل اعتماد خواهد بود فصل فی فصل سی و سوم در بیان مدت حمل انسان بدانکه مدت حمل انسان یکسان نیست کسی زیاده یا کم میگوید و کسی کم لهذا جبرین در تعیین ایام حمل اختلاف بسیار است و هر کس موافق تجربه غالب خود تعیین میکند لیکن اکثر آنست که دو صد و هفتاد و سه روز غلبه است مدت حمل انسان است و از آن کمی و زیادتی اگر بسبب خطای حساب باشد حمل میشود زیرا که اگر روزی تا پنج هفتاد و هشتاد و سه روز باشد در آن وقت نیست اما هرگاه محسین ساختن روز معتدل است و شوار بود پس حسابش با این محک کرده میشود که از روزیکه حیض آخر منقطع شده و طهر شروع گشته از آن روز ابتداء حمل قرار میدهند لیکن ممکن است که حمل در هفته قبل از جریان حیض مستقر شده باشد یا در هفته اولی بعد از قطع حیض قرار نگیرد بلکه در هفته که فیما بین هفته قبل جریان حیض هفته بعد جریان طهر میشود حمل مستقر گردد زیرا که ممکن است خون طهر تا چهار یا ده روز منقطع شود و درین هفته که هفته جریان حیض است زن بامردم بهتر شود و باردار گردد و همچنین ممکن است که بعد از قطع حیض در هفته ثالث آن که آن هفته قبل جریان حیض و وقت زیادتی و کمال گردان و سبب است پس مستقر شود پس سبب این سبب زیادتی و کمی ایام بسبب خطای حسابی واقع میشود و از آن نسبت باین میسرند که گاهی ایام حمل دو صد و هشتاد و گاهی دو صد و نود و محسوب کرده اند و برای رفع این خطا جبرین در تقیید دیگر برای

فصل فی موسم در بیان مدت حمل انسان



مستقر کرده اند که هرگاه قدس بعد از چهارم از عارضه بالا می رود در آن وقت حرکت طفل مادر را محسوس میشود پس روز اول حرکت چنین را از مادرش دریافت می شود که نصف مدت حمل قرار داده بر آن حساب تولد را منطبق سازند یعنی ازین حساب حساب تولد قریب خواهد بود و از آن است که میشود که مدت حمل انسان زود و صدمه و نقصان و ستمه تا دو صد و هشتاد و روز زیاد نباشد و هم هرگاه روز و مقاربت مرد و بان که در آن حمل مستقر شد و یاد بود و از آن ابتدای حمل قرار داده میشود و درین غالباً از دو صد و هشتاد و روز زیاد نمیشود و در این مدت وضع و مایع میشود و قدس فصل سیم در اعراض حوامل فصل اول معالجات آنها از جمله اعراض که کبلی عارض میشوند و توجع و نفی و آن مادام که کبریا اعتدال از آنرا و قدس فصل سیم در طبیعت در وقت حمل و از امور عارضه کبلی و اندر و دلی علاج آن میشوند که از آنهم نقایس بدن حاصل میشود و اما هرگاه روز زیاد شود چنانکه طلق آب و طعام در معده قرار گیرد یا صغیرا هم اکتفی دفع شود و هوای درین عفن گردد و بسبب اینکه از شکم شکم و زیر بدن غذا بخون ایشان عفو نیست پس میشود و گاهی در معده ایشان در دشتید هم پیچیدگی و درین وقت علاج و در حین میشود لیکن باید دانست که در علاج حوامل اکثر عارضه و دوا سی و واحد و تدبیر واحد کنند بلکه تفنن را اختیار کنند زیرا که بجهت ثبات شده است که چنانکه حالات و خواست باوشکایت های حوامل مختلف میباشد همچنین ارتفاع از او و هم مختلف بود کسی را که هم دوا نافع است کسی را که هم ضرر است که دوا سی و واحد برای دفع شکایت خاص هر یک نافع شود و لهذا اینجا دوا و دیکر ترشوند تجربه کرده هر که را در حق کسی نفع یابد استعمال آن را در شکایتی از دوا سی و تلخ مثل نفع کلنیا یا شین نفع ظاهر میشود و کسی از نوشیدن طبع چای گرم بر نداشتن میگردد و کسی از خوردن طعام حار با فضل کسی از خوردن طعام با فضل کسی از خوردن قطعه برغ ازین شکایت نجات مییابند اگر ازین تدابیر کار بر نیاید و نوبت استعمال دوا رسد و به اینجا تفنن نوشتن را شلا بسم الله هشت گزین تاده گزین آب ساده کلکوره روزانه سه چهار بار نوشانند و آبیکو اوناچا و هم گزین همراه آب ساده نوشانند و ایضا سفوف کلنیا و سوفا کار نباس از پنج گزین تاده گزین خوردانند نوع دیگر یا شین و سیانک یا شین و دیلو و دو سه قطره آب ساده نوشانند و ایضا روغن کر یا سو و دو قطره بهر آب که در جیشین آمیخته خوردانند ایضا آب ولایتی نوشانند و مفید بود و سیب نیکه در آن کار بانک و شایع تیراب زغال آبی نوع دیگر که بسیار مجرب است صفته ساینک یا شین تیراب لیموی کاغذی سی و شش گزین شربت نبات یک آونش و دو آونش آب ساده کلکوره در بوتل نهاده بر آن هم این دوا بنویسند تا غلطی واقع نشود و بعد شپاسانی کار نباس شین و در سه آونش آب ساده کلکوره در بوتل دیگر بنهند و بر آن هم دوا سی و چهار آونش بنهند و بعد از بوتل اول دوا سی و چهار آونش بنوشند بعد از آن بوتل ثانی دوا سی و دیگر را بنهند و بعد از آن شپاسانی کار بانک یا شین از آن شین و در دوا و بعد پیچیدگی و از آن روز افزاید و اگر حال محتمل است به سه حال شربت بنشیند شربت موسوم شربت شین یک و دو آونش بنوشد یا شربت براندی یک و دو درم باد و سه آونش آب ولایتی کلکوره بنوشانند و هرگاه هر دوی قفس شکم

فصل سیم در اعراض حوامل فصل اول معالجات آنها از جمله اعراض که کبلی عارض میشوند و توجع و نفی و آن مادام که کبریا اعتدال از آنرا و قدس فصل سیم در طبیعت در وقت حمل و از امور عارضه کبلی و اندر و دلی علاج آن میشوند که از آنهم نقایس بدن حاصل میشود و اما هرگاه روز زیاد شود چنانکه طلق آب و طعام در معده قرار گیرد یا صغیرا هم اکتفی دفع شود و هوای درین عفن گردد و بسبب اینکه از شکم شکم و زیر بدن غذا بخون ایشان عفو نیست پس میشود و گاهی در معده ایشان در دشتید هم پیچیدگی و درین وقت علاج و در حین میشود لیکن باید دانست که در علاج حوامل اکثر عارضه و دوا سی و واحد و تدبیر واحد کنند بلکه تفنن را اختیار کنند زیرا که بجهت ثبات شده است که چنانکه حالات و خواست باوشکایت های حوامل مختلف میباشد همچنین ارتفاع از او و هم مختلف بود کسی را که هم دوا نافع است کسی را که هم ضرر است که دوا سی و واحد برای دفع شکایت خاص هر یک نافع شود و لهذا اینجا دوا و دیکر ترشوند تجربه کرده هر که را در حق کسی نفع یابد استعمال آن را در شکایتی از دوا سی و تلخ مثل نفع کلنیا یا شین نفع ظاهر میشود و کسی از نوشیدن طبع چای گرم بر نداشتن میگردد و کسی از خوردن طعام حار با فضل کسی از خوردن طعام با فضل کسی از خوردن قطعه برغ ازین شکایت نجات مییابند اگر ازین تدابیر کار بر نیاید و نوبت استعمال دوا رسد و به اینجا تفنن نوشتن را شلا بسم الله هشت گزین تاده گزین آب ساده کلکوره روزانه سه چهار بار نوشانند و آبیکو اوناچا و هم گزین همراه آب ساده نوشانند و ایضا سفوف کلنیا و سوفا کار نباس از پنج گزین تاده گزین خوردانند نوع دیگر یا شین و سیانک یا شین و دیلو و دو سه قطره آب ساده نوشانند و ایضا روغن کر یا سو و دو قطره بهر آب که در جیشین آمیخته خوردانند ایضا آب ولایتی نوشانند و مفید بود و سیب نیکه در آن کار بانک و شایع تیراب زغال آبی نوع دیگر که بسیار مجرب است صفته ساینک یا شین تیراب لیموی کاغذی سی و شش گزین شربت نبات یک آونش و دو آونش آب ساده کلکوره در بوتل نهاده بر آن هم این دوا بنویسند تا غلطی واقع نشود و بعد شپاسانی کار نباس شین و در سه آونش آب ساده کلکوره در بوتل دیگر بنهند و بر آن هم دوا سی و چهار آونش بنهند و بعد از بوتل اول دوا سی و چهار آونش بنوشند بعد از آن بوتل ثانی دوا سی و دیگر را بنهند و بعد از آن شپاسانی کار بانک یا شین از آن شین و در دوا و بعد پیچیدگی و از آن روز افزاید و اگر حال محتمل است به سه حال شربت بنشیند شربت موسوم شربت شین یک و دو آونش بنوشد یا شربت براندی یک و دو درم باد و سه آونش آب ولایتی کلکوره بنوشانند و هرگاه هر دوی قفس شکم

علاج و تدبیر در حوامل فصل اول معالجات آنها از جمله اعراض که کبلی عارض میشوند و توجع و نفی و آن مادام که کبریا اعتدال از آنرا و قدس فصل سیم در طبیعت در وقت حمل و از امور عارضه کبلی و اندر و دلی علاج آن میشوند که از آنهم نقایس بدن حاصل میشود و اما هرگاه روز زیاد شود چنانکه طلق آب و طعام در معده قرار گیرد یا صغیرا هم اکتفی دفع شود و هوای درین عفن گردد و بسبب اینکه از شکم شکم و زیر بدن غذا بخون ایشان عفو نیست پس میشود و گاهی در معده ایشان در دشتید هم پیچیدگی و درین وقت علاج و در حین میشود لیکن باید دانست که در علاج حوامل اکثر عارضه و دوا سی و واحد و تدبیر واحد کنند بلکه تفنن را اختیار کنند زیرا که بجهت ثبات شده است که چنانکه حالات و خواست باوشکایت های حوامل مختلف میباشد همچنین ارتفاع از او و هم مختلف بود کسی را که هم دوا نافع است کسی را که هم ضرر است که دوا سی و واحد برای دفع شکایت خاص هر یک نافع شود و لهذا اینجا دوا و دیکر ترشوند تجربه کرده هر که را در حق کسی نفع یابد استعمال آن را در شکایتی از دوا سی و تلخ مثل نفع کلنیا یا شین نفع ظاهر میشود و کسی از نوشیدن طبع چای گرم بر نداشتن میگردد و کسی از خوردن طعام حار با فضل کسی از خوردن طعام با فضل کسی از خوردن قطعه برغ ازین شکایت نجات مییابند اگر ازین تدابیر کار بر نیاید و نوبت استعمال دوا رسد و به اینجا تفنن نوشتن را شلا بسم الله هشت گزین تاده گزین آب ساده کلکوره روزانه سه چهار بار نوشانند و آبیکو اوناچا و هم گزین همراه آب ساده نوشانند و ایضا سفوف کلنیا و سوفا کار نباس از پنج گزین تاده گزین خوردانند نوع دیگر یا شین و سیانک یا شین و دیلو و دو سه قطره آب ساده نوشانند و ایضا روغن کر یا سو و دو قطره بهر آب که در جیشین آمیخته خوردانند ایضا آب ولایتی نوشانند و مفید بود و سیب نیکه در آن کار بانک و شایع تیراب زغال آبی نوع دیگر که بسیار مجرب است صفته ساینک یا شین تیراب لیموی کاغذی سی و شش گزین شربت نبات یک آونش و دو آونش آب ساده کلکوره در بوتل نهاده بر آن هم این دوا بنویسند تا غلطی واقع نشود و بعد شپاسانی کار نباس شین و در سه آونش آب ساده کلکوره در بوتل دیگر بنهند و بر آن هم دوا سی و چهار آونش بنهند و بعد از بوتل اول دوا سی و چهار آونش بنوشند بعد از آن بوتل ثانی دوا سی و دیگر را بنهند و بعد از آن شپاسانی کار بانک یا شین از آن شین و در دوا و بعد پیچیدگی و از آن روز افزاید و اگر حال محتمل است به سه حال شربت بنشیند شربت موسوم شربت شین یک و دو آونش بنوشد یا شربت براندی یک و دو درم باد و سه آونش آب ولایتی کلکوره بنوشانند و هرگاه هر دوی قفس شکم



[illegible]



هنگامی که بزرگوار یک و دو ماه بعد از آب ساقه نبوشانند یا با فیهام حمله گیرین نبوشانند لیکن بدین ضرورت شایسته این است که  
را بخورند و از خارج آب حبابون و آب فیون یا هم آمیخته بر محل درد مالش سازند یا پلستر از باد و نادرست کرده بر محل درختند  
و اگر خود ایندن افیون یا مار فیهام و افق مزاج نبود قدری مار فیهام یا آب حمله بزرگوار را قه سوزنی از جانب خوشی بدن بجا  
میسازند تحت جلد رسانند و گاهی ازین وجاع بطور تلخ میشود و چنان شدت میکند که نبوشانیدن کار آید و این بیشتر  
از بستر گرفتن می گیرین نبوشانند و چاره نبود و از آن سکون نشود و این جمیع با و در اعراض میشود و ذکر و از جمله امراض  
سیلان طشت است که در وقت حمل افتد باید دانست که بعد از استقرار حمل و بند شدن جنین بعد از چهارم گاهی قدری قدری خون  
می آید و از آن خون سقوط حمل پیدا میشود و اکثر سبب آن تقاربت و جماع میباشد و گاهی بسبب سبیل شدن ضرب و سقوط و گاهی  
نوشیدن مسهل قوی تلخ و گاهی خوردن مقدار کثیر از کنین مثل آنکه پانزده یا بستر گیرین یکبار خورده شود و گاهی از بالا بر  
دو قه یقوت و گاهی مشقت کردن بجهت کثرت جرم رسد و گاهی بر دشمنی شقیل گاهی بسبب سوزنک یا اگر کثرت سوزنک  
در وجهین میباشد و درین وقت از وجهین افیت جرم میرسد و گاهی از امراض و تیشیل حصه جمیع سرخ که در آن رنگ بدن سرخ میشود  
و همچنین این هر مرض که از آن زن حامله ضعیف و کمزور گردد و گاهی بسبب کیفیات نفسانیه مثل خوف و غم و هم این ضعیف  
و اصل سبب کمزوری جرم میباشد خصوصاً کسی که مرض تشکاب بود یا درین مرض مبتلا میشود و علامات اول در  
جرم و کمزور ساقین یافته میشود چنانکه وقت وضع حمل میشود و این درد گاهی تلخ و گاهی کثیر میباشد لیکن با و در عادت میشود  
یعنی شدت و خفت در آن بود چنانکه تشنج بود زیرا که تشنج سبب تشنج میباشد من بعد آب سرخ قری می آید بعد  
خون خالص جاری گردد پس اگر تا این رسید خود بند شود یا از علاج محبتش گذرد و ملق شود و اگر از علاج هم نرسد و خفت  
سقوط حمل پیدا گردد درین وقت قبل سقوط در قوی میشود و متواتر زیاده میگردد و هم درین وقت ازیت در بول و بر باز پیدا  
میشود که حامله بار بار برای بول میرود و برای دفع برازی نشیند و بار بار حاجت بول و بر باز میشود و خون کثیر می آید  
آن حمل ساقه میگردد و گاهی چون برای بول کردن یا برای دفع برازی نشیند و دوم یعنی حمل ساقه میشود و اگر اول و دوم  
بود یعنی حمل کثیر یا به یاد و ما بود در خیالات گاهی حمل از جرم خارج شده و در جیب می آید و در آن باقی ماند چون ازیت جرم  
بر طرقت میشود پس تشنج آنهم قوت میگردد و سبب آن درد و سیلان و هم هم نرسد و لیکن از قوت قریب جرم در وجهین  
باقی میماند و بعد چندی متعفن فاسد میگردد و در طرقت متعفن بدرنگ که مایل بخاکستری و هم مایل به سبزی بود و از آن  
جاری میشود و گاهی سمیت این لحم فاسد در خون حامل هم میورث میشود و از آن تب پیدا گردد و بر جلد بدن داغها  
سرخ پیدا میشوند و گاهی بعد خارج شدن او و هم چیزی از متعلقاتش مثل غشا در قه باقی ماند و سبب آن جرم متعلق  
شده بار بار تشنج میشود و تشنج آن خون کثیر خارج میگردد و گاهی کثرت جری این خون جاری میگردد که حامل را خفه  
و غشی پیدا شود و گاهی بسبب کثرت جری این دم سمیر و گاهی در بعضی زنان او و هم از جرم و وجهین بر و خارج میشود



بکشد و اگر درون رحم بود و گشت بفرستد مثل دوشه گریز نبوشتند تا بدینجه ایجا تشنج در رحم اخراج نماید بعد از او و بعد از او  
 عفوشت که در علاج کینه نوشته شد و اندازد آنرا بر اندیشه زرقه در پنجایم تعمال آمد و هرگاه اثر حمل متعفن باشد و خون در  
 جنین سیده باشد درین وقت چیزی که زهره زکوره را قتل کند و خون را صاف نماید بپسند و این ترکیب بهترین ترکیب است  
 خون و قائل زهره است که گویا آب پاشا سحرش مثل کینین سلفاس حسب حاجت از هر یک گرفته همراه آب ساده نوش  
 و هم برای صاف کردن خون او و سیده مدینه نوشاند تا خون صاف شود و هرگاه زن عادت سقوط پیدا کند در آنوقت  
 بهر ایت فرمایند که هرگاه باردار شود از ابتدای شروع مدت حمل تا وقت عادت سقوط خود را از اسباب موثره این صحن  
 دور دارد و راحت نگذارد و اختیار کند و ایضا از جمله امراض جنالی خفقا است و اکثر سبب آن اینست که چون رحم در وقت  
 حمل کثیر شود و اکثر اعضا مثل سینه و اسهال در ازای رحم بالا میرود پس از اثر مزاحمت و غیر آنرا خصوصاً هرگاه در وقت  
 درین وقت بهر از یاده پیدا گردد و قلب متعفن میشود و سبب سردی و گاهی بسبب حرکت توپ فضل که در شکم میکنند و اثر  
 از بیت آن بدل میرسد و فغان پیدا میشود و علامتش آنست که هرگاه بسبب پیدا شدن مواد راضعیه و سلفیه و کواکب  
 آب پودینه نیز آمیخته نبوشتند و همچنین آب پودینه و سلفیه و کواکب که در شکم درین وقت مفید بود و چون بسبب خفقا  
 گاهی وقت شب خواب نمی آید و اندام برای آوردن خواب دوا می باشد لی سواش یعنی لایکه او پیای سدی می شود و تشنج  
 یا ماریا بقدر اقلیل نوشاند و گاهی از پودینه عرق ایونیای قوی هم حرکت قوی میگردد و وقت پیدا شد خفقا  
 کم میشود باقی حمل زوال آن بعد ولادت میشود و قدر فصل سی و پنجم در بیان کیفیت ولادت جنین  
 و آنست که ولادت باراده و اختیار جنین نمیشد چنانکه در بعض کتب طبیعه عربیه است بلکه با سباب دیگر میشود که اول  
 آنما تشنج عضلات بی اختیاری رحم بود اما این تشنج چهار اول یا وسط مدت حمل بطور طبیعی نمیشود چنانکه در ماه نهم یا دهم  
 پیدا گردد پس تعلیل آن تشنج سبب طایفه میگردد که چون جنین کامل الخلقه و القوت میشود و کارش در رحم ماندن چنانکه  
 تشنج در سر خود نمایند و این امر مقتضای طبیعت اشارت و تشنج در خارج است که چون تشنج میشود و عروق صغار  
 که غایبه آن میباشد تشنج میشود اما این امر در رحم تشنج میشود بلکه هرگاه جنین کامل الخلقه شود و سرش در عرق رحم  
 می آید و غشائی بیرونی آن که پر آب است از سطح داخلی رحم متصل میگردد و در رحم هم زیاده تغیر از حال طبیعی او میشود و غلظت  
 رحم بسبب کثرت تمدد و ریادی مقدار تبدیل بوقت میشود و در صورت تشنج عرق ظاهر گردد و تشنج اینک بهر صورت تشنج  
 میشود و درین آن کشاده میگردد و درین سبب اگر چند روز دیگر مقدار آن کبیر و جسم آن قریق شود و خون اشتقاق آن  
 غالب گردد پس غشائی پر آب که محیط جنین و متصل سطح رحم میباشد از جانب درین رحم که کشاده است بسبب تشنج  
 دیوار از رحم قدری دراز شده و درین رحم نمی آید پس از آمدن آن و در رحم که کرب و ادیت در رحم پیدا شد تشنج در  
 شروع گردد و مادام که جنین خارج نشود تشنج موقوف نگردد و سبب دوم تشنج که همیشه از خون سیاه در رحم تشنج

فصل سی و پنجم در بیان کیفیت ولادت جنین



میشود و دلیل بران نسبت کہ ہر گاہ بخود حیوان را چنان نہ بگذرد کہ سواران نرسد درین وقت خون در بدن حیوان معلوم می  
میکرد و بخود سیاه شدن خون در رحم آن تشنج پیدا میشود و چون باز گوی آنرا بکشایند کہ سوار بدش رسد خون سرخ گردد  
فورا تشنج آنهم برطرف میشود همچنین چون جنین کامل الخلقیت شود خون سیاه زیادہ در عروق رحم مجتمع میگردد و زیرا کہ درین وقت  
چون جنین کہ پیشو و برای خود غذای کثیر میخواہد پس خون زیادہ در رحم میرود و از ان انچه خون سرخ بود در غذای جنین صرف  
میشود و انچه خون سیاهی بایل بود در عروق رحم باقی ماند و از ان بر نیاید عدم دفع و چون این خون سیاه مجتمع میگردد و اول  
برای دفع کردن آن رحم تشنج میشود و چون چند بار در ان تشنج حادث گردد آن زمان غشائی پر آب کہ محیط جنین است بسبب  
تشنج مجتمع شدن رحم قدری از اندرون رحم پیش آمده و درین رحم می آید پس از آمدن غشائی مذکور در دہن رحم تشنج  
آن زیادہ میگردد تا آنکہ تشنج عضلات آن جنین خارج میشود و ندیب ثالث نسبت کہ چون جنین کامل الخلقیت میشود  
اووری یعنی خصیہ زن بخوابد کہ در کار خود کہ ایجا کردہ افیدن و بکل یعنی پیدا کردن جسم بیضیوسی است مشغول شود زیرا کہ  
ابتدای استقرار حمل تا وقت کمال خلقت و تکون جنین او از کار خود مطلق ماندہ بود و چون جنین کامل الخلقیت شد با تداو  
بکار خود بخوابد پس در وقت بذریعہ عصب سمپدی ششک خبر بہ خلج میرسد کہ اووری بخوابد کہ بکار خود مشغول شود و درین وقت  
نخاع افانہ قوت حس و حرکت با عصاب رحم مینماید و چون بذریعہ ریشہ ہائی اعصاب نخاعی حس در رحم خصوصاً  
بفہم آن قوی گردد و رحم متاوی میشود و از تادی آن تشنج در عضلات رحم واقع میشود و تشنج آن جنین خارج گردد و دوب  
دوم در ولادت مادر و ہر عضلات شکم بود بر این تشنج و حقیقتش نسبت کہ چون تشنج رحم غشائی پر آب کہ جنین محیط است  
شق میشود و آب از ان خارج گردد درین وقت عضلات اختیار شکم بارادہ ماورین مجتمع شدہ رحم را غمض میکنند و بسبب آن  
رحم قوت یافته جنین را از خود دفع میکند سبب سوم امور نفسانیہ مثل خوف و غیرہ ہم درین باب مداخلت دارند چنانکہ  
دیدہ شدہ کہ ہر گاہ وقت شدت در فزہ دایری آید حاملہ مطمئن نمیشود و فوراً در قون ساکن میشوند و ہر گاہ باز کلمات خود  
انگیز گفتہ شد باز در شدت میکند همچنین ہر گاہ کلماتیکہ باعث برنگختن طبع بوزگفتہ شوند یا آواز سخت و قوی مثل  
صدائی رعد یا تفنگان فغہ گوش حامل سبز و دومی جنین متولد شود اما این تشنج چگونہ شروع میشود پس بدانکہ اول تشنج  
از فہم رحم شروع میشود و از ان تا عنق رحم تا فندرس برہمورت و دایرہ بذریعہ عضلات بی اختیار یہ رحم کہ در عرض رحم  
بر دور آن آمدہ اند متصاع شدہ میرسد چون تا فندرس رسد و در بسیار قوی میگردد و تا فندرس رسیدہ تشنج در عضلات رحم  
رحم از جانب فندرس شروع شدہ تا فہم رحم میرسد و انچه تشنج در عضلات عرضیہ از فہم رحم شروع گشتہ و متصاع شدہ تا فندرس  
رسیدہ بود ہر تشنج عضلات طولی باط میشود تا آنکہ فہم رحم رسد و جنین متولد شود آخر ان دفع میگردد و درین تشنج  
عضلات طولی فہم رحم را بسوی فندرس میکشد و عضلات عرضی رحم را بخود مجتمع میسازند پس جن کشاکن ہن رحم کشادہ میشود  
و بعد کشادہ ہن رحم اول غشائی پر آب از دہن رحم بیرون می آید و بسبب آن ہن رحم وسیع میشود تا آنکہ دہن رحم و جلیہ

هر دو یکسان میشوند درین وقت غشای مذکور شش میشود و آب زان جاری و خارج گردد پس از خروج آب رحم بر چنین شکل میشود  
 حرکت و آبی طفل بند گردد و درین صفت ظاهر میشود که قابل شدن باینکه طفل از حرکت خود می آید نشانی زیرا که حرکت طفل هرگاه  
 بند میشود پس چگونه خروج آن از حرکت خود صحیح خواهد بود و قد بر فصل ششم و عقرب یعنی باردار شدن زن و بلوغ  
 انگاشتن نشانی آن آیم می معنی نیاید از شدن زن گویند و این مرض گاهی از طرف مرد و گاهی از طرف زن بود و بعضی از اسباب  
 در امراض مرد و زن بیشتر نوشته شده و اینجا آنچه خاص از طرف زن بودند نوشته میشوند به آنکه اصل سبب آن همانست که از تفرج  
 منی مرد و زن در رحم مانع شود یا ضعف و کمزوری و زنی مرد و زن پیدا کنند و این گاهی در وجینه و گاهی در رحم و گاهی در او  
 منی خصینه زن میباشد مثل اینکه در وجینه پرده بکارت چنان سخت بود که از ایلاج دیگر مانع شود خواه در آن ثقبه کوچک بود  
 که از آن جنین جاری شده باشد یا مطلقا مسدود بود و ثقبه هم نبود و این دانسته میشود و از نیامدن جنین پس این پرده  
 اکثر از ملاقات منی مرد و زن در رحم مانع میشود و گاهی پندرت منی مرد و زن راه ثقبه کوچک در رحم رسیده باعث استقرار  
 حمل میشود و گاهی خود وجینه محروم بود مثلاً فرج میباشد از فرج شروع شده قدری اندرون رفته محروم میشود و  
 غالباً درین صورت رحم و ادوری هم نمیباشد و این نقصان فطری میباشد چنانکه در کسی جنین انامل و در کسی یک  
 یا یکپا نیباشد و گاهی کسی بعد از دم حاد و گاهی بعد از ولادت میوکس میبیند و جنینه جدا شده مجری وجینه با هم متصل  
 میشود و از آن راه وجینه مسدود میگردد و گاهی فطری وجینه چنان ضعیف میباشد که از آن سیلان طمث میشود لیکن منی از آن  
 در رحم نمی رسد و گاهی منی در وجینه خصوصاً در رحم آن چنان زیاد میباشد که چون مرد قصد ایلاج کند زن از آن متنازع  
 و وقت ایلاج اینقدر شرج و درد و وجینه عادت میشود که سبب آن زن تاب مقاربت نیارد و درین صورت گاهی با  
 فرم وجینه شور یا سست باقی نماند و چنانچه آنرا مس کنند زن متنازعی شده و فرای یک و گاهی بشور و سست با نماند  
 لیکن در جائی خاص از آن چنان جس قوی میباشد که از آن پس آن زن متنازعی میگردد و اکثر اخیالت و زنی دیده شود  
 که وقت ولادت و فرم وجینه آن رحم آمده باشد و چون این رحم منحل شود و بر آن گوشت سخت میرود و در اینجا جنین قوی  
 میگردد و سبب آنکه آنچه ریشه ای اعصاب جنین در میوکس میبیند آمده از آن ریشه عصب منحل و موصوف درین گوشت  
 زاید سخت میگردند و از جنین منقبض شدن ریشه مذکور همیشه باونی سبب آن متنازعی میشود همچنین از فساد و طوبی  
 وجینه مثل اینکه زیاد غلیظ و تنج شده باغ از نفوذ و کروی منی مرد و در رحم شود و هم عقرب پیدا میگردد و گاهی ترشی در رحم  
 زیاد شود که منی مرد را فاسد سازد و یا از پاره شدن فرج و وجینه از آب سرد و هم منی که ورشده عقرب پیدا میشود و گاهی سبب  
 قلع یا احتباس جنین و سبب عقرب خروج جنین و بار و آمدن جنین سبب فرط سیلان جنین اند سبب عقرب واقع میشوند  
 و همچنین هرگاه در سیلان طوبی سفید و غلیظ واقع شود و آنچه نیز اب در رحم است زیاد شده مورث فساد منی شود  
 از آنهم عقرب پیدا گردد و همچنین از مقاربت بی وقت هم عقرب پیدا میشود زیرا که وقت مقاربت طالب ولادیک هفته قبل از آن

فصل ششم در عقرب یعنی باردار شدن زن

و یک هفته بعد آمدن حیض است پس اگر در میان این دو هفته مقاربت کند مقاربت بیوقت و ضعف رحم خواهد بود و اگر  
عقربا خواهد شد و گاه از زیاد مقاربت کردن هم عقربا میشود و همان داخل کردن انگشت در فرج بطور ابلاج ذکر کرد  
و اذن از آن چنانکه بعضی از زنان بمقابل جلق مردان از انگشت خود صحت جماع پیدا میکنند و گاه هر چند را که غیر ذکر فرج  
داخل کرد و صورت جماع پیدا کنند از آن عقربا میشود و از ترقه و زیاد آرام و ترک ریاضت هم عقربا میشود و شاید  
سبب آن زیاد خوردن و کم مشقت نمودن بود که بسبب آن گرفتن سیکل جدید نمیشود زیرا که مناضین و زنان  
کم بایند و در پی پیشه در ایشان اولاد زیاد پیدا میشود و هم از فری و زیادتی شحم در شکم بدن عقربا میشود و در مرض  
آتشک هم اکثر سبب عقربا میشود زیرا که هرگاه از آن خون فاسد میگردد و پس آنچه که از این سیکل یا او دم یعنی ماده بین  
پیدا میشود ضعیف و کمزور بود و غالباً بعد چند هفته یا چند ماه ساقط میگردد و این قسمی از عقربا است که در آن اولاد نمیشود  
العلاج در حال و اسباب مرض خور کامل و نفیض نمایند پس از آن آنچه لا علاج است مثل انعام و جنبه و رحم و او و  
در آن مجبور است بقی آنچه اسباب قسم امراض اند و در آن علاج امراض مذکوره فرمایند مثلاً آنچه از تنگی ثقبه و جنبه بود آنرا  
بیشکاری و بیع سازند خواه از انگشتان یا به نادن قلم آنجی که غلیظ و ضخیم بود و آنچه بسبب تشنج راه و جنبه بود در آن آنچه  
شور و سسهای خرد بود آنها را بر آرنج خواه از کار و یا از قراض یا از داغ کردن باصل کاشک فقره تا شور و سسهای خرد  
شده بیرون آیند و آنچه از اذیت جنتیاس عصب بود آنرا با تخم صلب میوکس میبرند و از کار و دو روز سازند و آنچه  
کم کنند جس باشند از ادویه مثل افیون و بلادونا آنرا آب ساده ساییده و نماد سازند و درین وقت نفیض نمایند غالباً  
همراه آن اذیت جنتیاس او وری هم خواهد بود پس اگر ثابت شود از اذیت این اعضا هم نیند و بیشتر یا این حالت بیشتر  
هم پیشاید و آنچه از دیگر امراض بود علاج امراض مذکوره فرمایند چنانکه در ذیل هر یک نوشته شده و آنچه بسبب غلظت طوب  
و جنبه زیاد پیدا شدن ترشی در آن یا بسبب شستن آب سو پیدا شده باشد در آن از آب نیم گرم امر شستن نمایند  
به هر یک نافع خواهد بود و بعد از آن علاج سیلان طوبت آنچه نوشته شده استعمال آنرا و آنچه از غلظت طوبت رحم بود در آن علاج  
سیلان رحم فرمایند و آنچه از مقاربت بیوقت بود در آن امر فرمایند که در هفته قبل حیض و در هفته بعد جریان حیض مقاربت  
کند و در غیر این اوقات جماع نکند و آنچه بسبب زیاد جماع کردن شده باشد بتفکیل مباشرت در آن فرمایند و آنچه از  
او خال جسم غیر ذکر و فرج عقربا شده باشد در آن تبرک فعل ناجایز نکند سازند و آنچه از ترقه و ترک ریاضت باشد  
در آن امر بشقت کم خوردن نمایند و آنچه از زیادتی شحم بود اگرچه لا علاج است لیکن فرمایند که آنچه از خدیجه شحم خوردن  
ترک کند مثل حلادی و شیاخی لعانی و می و روغن ار و آنچه از آتشک بود در آن علاج آتشک نمایند و فم فصل سبی و فم  
در بیان استقرار حمل ثانوی بالاسی حمل اول پیشتر در بیان گرفتن سیکل نوشته شده که تعدد آن باعث تعدد  
حمل است و از آن مستفاد میشود که یکبار تعدد حمل مستقر شوند اما اینجا ضرورت است و جهت استقرار حمل ثانوی بالاسی حمل اول

فصل بیستم در استقرار حمل ثانوی بالاسی حمل اول

نوشته شود پس بدانکه ممکن است که مادام که ماده خلطی چنین که از کرافین بسپک پدید آمده در رحم مستقر گشته چندان که پیشتر  
که تمام طین رحم را محلول سازد و محل دیگر هم مستقر شود و اگر چه اکثریه نیست که دوری بعد استقرار محل کرافین بسپک را پدید آید  
لیکن ممکن است که بعد از پدید آمدن خلطی در بعضی جای چنین هم تا آخر زمان محل می آید همچنین کرافین بسپک هم پدید آید  
هم باید دانست که گاهی در رحم و تخمینه میباشند و در میان طین رحم یک پرده در طول میباشند که بسبب آن رحم منقسم میگردد  
میشود و گاهی این پرده تا وجینه هم میرسد و بسبب آن وجینه هم ذات تخمینه بود و این امر در بعضی حیوانات خصوصاً مادر  
قسم غزال اکثر و اظهر و در انسان اندر است بالجمله گاهی زن ذات تخمینه اول در یک جوف رحم خود حاصل میشود و بعد مدت  
در جوف طین دیگر آن هم محل مستقر میگردد و بسبب آن محل بعد از قرار گیری و کین زمان اسکان استقرار محل ثانوی بالای محل اول  
تا دو ماه است زیرا که تا ختم شدن دو ماه او قوت چنان که پیشتر شد که تمام طین رحم را پر میسازد و بعد آن آمدن بسپک در رحم را دور  
و همچنین داخل شدن منی مرد در رحم ممکن نمیشود قبل تمام شدن دو ماه قاعدگی در هم رحم هم میماند و در طین رحم هم  
چنان وسعت خالی میباشند که متعلق شدن کرافین بسپک بجای ازلان ممکن بود و هر چند این امر نادر است اما آنچه مشاهده  
نشد که زنی در جوف دشت و غشای هر یک علیحده بود و راه هفتمگی از آن ساقط شود و دیگر بعد چهار ماه از سقوط پدید  
در بینندگان میگفتند که دو محل جدا بود و لیکن ممکن است که یکبار هر دو مستقر شده باشند اما در سقوط و ولادت تفاوت وقت شد  
باجمله در تعیین این امر که هر دو محل یکبار مستقر شده بودند یا دو بار بسیار وقت است و اکثر بسبب وقوع غلطی در حساب تخمالات  
میشود و لذا بنده را باید که ولو در این بنده که آیا کامل الحالت است یا نه اگر صورت آن صورت کامل الحالت باشد در محل بالا  
محل محسوب کند و الا بدانکه غلطی در حساب است باجماع هرگاه محل متعذر در شکم بود علامتش نیست که در نهایت صورت رحم  
بالضرف و فرق واقع میشود مثل اینکه عرض شکم یاده میگردد و عمده علامت نیست که هرگاه چهار و نیم ماه از شروع حمل بگذرد  
و حرکت در تن پدید آید و قیاس الصوت را برین بسیار عامه تحمل مانند چنین نموده او از دل چنین را بشنود و اگر از نیم و چهار  
آواز قوی و یکسان آید یا فرق در عدد و قرات یافته شود مثل اینکه از یک جانب یک صد و چهل بار و یک دقیقه و از قلب  
شنیده شود و از جانب دیگر یک صد و سی و پنج یا بجهت تفاوت ثابت شود ازین دانسته خواهد شد که چنین اندک  
یک جانب حرکت قوی بود و در جانب دیگر ضعیف مثل آواز بیدار شود یا بدینست که یک جانب است خفیه که فصل سی و نهم  
در علامات قریب وضع بدانکه چون هفت و دو هفته در ولادت باقی ماند و در بی رحم تمام شود درین وقت رحم از بالای شکم  
حانه می آید و آنچه قبل از آن در حال اوتیت میباشند کم میشود و در شکم گشادگی محسوس گردد و عرض آن تکلیف در آمدن بول ظاهر  
میشود و همچنین وقت تیز تر هم اوتیت در و میشود مثلاً بار بار می آید یا نمی آید بسبب انقباض معاشی میم و اگر اعتدال برض بود  
اوتیت بواسطه شدت میکنند بعد از رحم قعدی قدری شروع میشود بسبب تیز رحم و این را در کاف میگویند زیرا که درین  
در فندس میشود و فی الواقع این درد یا بسبب انقباض معده یا معاشی است یا قیاسی قیاسی که پراز ریاخ شود و فندس میباشند

فصل سی و نهم در علامت و قیاس

یا بسبب اینکه چون خون سیاه در رحم مجتمع میگردد بسبب آن فساد می شود و بیشتن می شود و بخلاف در و صادق که آن از رحم شروع می شود  
و نافذ می رسد و این در و گاهی شدید و گاهی خفیف بود لیکن با نظام کمی و زیاتی آن می باشد باین سبب حامله می ماند که  
در رحم قریب است اما این در و پی در پی می شود و می ماند بلکه گاه گاه می شود و بعد از در و صادق از وین رحم شروع شده تا فساد  
می رسد و ایضا از رحم و عانه تا کمر منتهی می شود و با نظام بطور دوره شدت و خفیف آن ظاهر میگردد و بر می گس می بیند و بیشتن می شود  
بلکه بیشتن می شود زیرا که بسبب آن می گس می بیند و بیشتن می شود و بیشتن می شود و بیشتن می شود و بیشتن می شود و بیشتن می شود  
ولادت شروع می شود و ولادت راسته و چپانه در جلد اولی است که درین رحم کشاده می شود و در جبهه ثانی از وقت افتتاح وین رحم ولادت  
چنین است و در جبهه ثالثی است که در نیمه بعد ولادت خارج شود و رحم مجتمع گردد و بیان در جلد اول تحصیل ابتدای این در و جبهه شوار  
زیر که در و کاذب و صادق مخلوط می باشد از آن سبب تفرد شوار می باشد لذا باید دانست که اصل در و در و صادق از رحم  
شروع شده تا فساد می رسد و از فساد تا وین رحم باز پس می آید و هم این در و صادق نسبت در و کاذب شدید می باشد  
با و در و نظام می آید مثلاً در و پاره و قیقه ساکن شده باز شدت میکند و چون در و صادق شروع شود و قدری در وین رحم کشا  
گردد و غشای جنین دیده می شود و در وین وقت انگشت دست انداخته می شود که غشای شیمه که بالای جنین است از پشت  
محسوس می شود و بخلاف در و کاذب که در آن نه افتتاح می شود و نه غشای رحم از انگشت محسوس میگردد و چون حامله بار اول بار و شوار  
در وین وقت که نه رحم آن قریق و کشیده محسوس می شود و اگر چند بار بار داشته باشد که نه رحم آن در وین وقت به غلیظ  
و ضخیم می شود و محسوس می شود و پس گاه چند بار در و صادق و نه غشای رحم منقضی شود و قدری غشای جنین ملو از آب پیش می آید  
و چون این غشای پیش می آید در حامل حمل اولی هم که لبهای رحم آن قریق و دیده شده بود و اکنون غلیظ نمایان شوند چنانکه  
لبهای رحم حامله قدیم غلیظ محسوس می شود و در وین گاه در و ساکن می شود و آب که در غشای ملو شوار می شود پس می رود و غشای  
از آب دیده می شود و در وین وقت چون انگشت امتحان کنند زیر غشای جنین در و محسوس گردد و چون بیشتن می شود و در و شدت کند  
بسیار پس می رود و آب پیش می آید و از زیر غشای ظاهر شود و غشای پر آب بیشتن می آید و این که در وین حالت فم رحم پاره می شود  
میگردد و چون و بعد فم رحم زیاد شود و فوراً حامله از زنده می آید بسبب آنکه قوت کشادن عریضه عریضه رحم چنانکه قوت کشادن عریضه  
عریضه قاری از زنده پیدا می شود و خواه در وقت بلز بود چون سده غلیظ فم حاج می شود و یا در وقت بول چون جگر بزرگ می آید در وین  
همراه رطوبات که از رحم می آید قدری سرخی هم ظاهر می شود و این خون بسبب شکافتن عروق می گس می بیند و هم می آید و در وین  
این علامت را از علامات قوی قریب وضع می دانند و من بعد بیشتن می شود و در و قوی شود و غشای پر آب شکافته گردد و در وین طو  
جاری شود و این خرد در جلد اول است و در وین در وین شوار بود زیرا که بسبب آن می نشد در و کاذب بار و صادق ابتدا  
می باشد لیکن اکثر از وقت شروع شدن بیشتن در و صادق تا آخر شش ساعت می ماند تا کی که بار اول حامل شده در آن مدت  
این در و جبهه نایست چهار ساعت می رسد و گاهی غشای پر آب بسبب صدمه بیشتن قبل کشاده شدن در وین رحم شکافته گردد

و کاهنه در زمان اولی ششانی

آب از آن جاری میشود پس طفل تا فم رحم متصل میشود و درین وقت هم مدت این درجه طول میکشد زیرا که قیاسی فم رحم  
کاهنه ششانی بر آب بود طفل برای این کار مخرج نشود و درین وقت نوبت مردن چنین یا بیوش شدن آن در رحم بود و اول  
تجربه گفته اند که هرگاه در پیراوی طولی اندک بود و جات دیگر قطعه اندک بود و در جات دیگر طولی اندک  
شده میباشد برای ولادت میشود و از آن سهولت در ولادت گردد و چون در جات اولی قطر اندک بود و در جات دیگر طولی اندک  
میداشند زیرا که درین صورت در درجه اولی اعضا سافله رحم مثل جینه مخرج خوبی کشاده و میباشد برای ولادت میشود و با همه  
هرگاه مدت درجه اولی تمام شود و درجه ثانی شروع میگردد و درین وجه در درجه اولی میباشد چه در درجه اولی کاهنه  
در و شدید میشود حاله با و از دقیق و بلند فریاد میگردد و درین وجه با و از غلیظ که پاشی فم که درین چنین معین بود و از آن میگردد و در  
بار بار چنین فم می آید و وقت شدت در و چون قدری در و ساکن شود چنین باز پس و و چون بار بار در و درین رحم می  
و از آن فم میشود و بسبب انقباض استخوان قحف چنین قدری زیر و بالائی یکدیگر می آیند و بسبب این مقدار آن منقبض میشود  
و جلد راس مستخری میگردد و درین وقت چون از گشت دست تخان کنند جلد راس چنین مستخری میشود و بسبب  
استرخائی جلد زیر و بالا شدن استخوان قحف راس بود که بسبب آن حجم کاهنه سر صغیر میشود و جلد راس بر آن مستخری  
گردد پس بجای هر در درین درجه طفل زیاد پیش می آید تا اینکه در و جینه کاهنه تا فم مخرج میرسد و طفل آن چنین  
که وسعت بین الفرج و المقعد است می افتد و از آن پشیم سبب میشود و معانی مستقیم چون انقباض گردد که مقعد را  
و درین وقت روتی چنین بجانب پشیم میباشد و پشت سر آن بجانب علی فم که از گشت و در و بائی متواتر میباشد و درین  
قدری قدری از فم بر می آید تا اینکه تمام و کمال از فم خارج شود و مادام که سر تمام و کمال از فم بیرون آید  
پیشتر می آید و چون سر تمام و کمال از فم بیرون آید و درین وقت نور از چنین مایل بصوتی ساق میشود و خواب و  
ساق امین یا ایسر و بر پلوئی خود میگردد و زیرا که درین وقت سر و منکب سهل میشود پس اول یک منکب بیرون  
می آید بعد منکب ثانی بر آید و چون سر و منکب بر آمد و ولادت شود دیگر اعضا سهل میشود و آنچه درین سر طفل و فم می آید  
اول در و شدید میشود که حاله کمال بیاب میگردد و معالشی مثل نبضه باشد و اگر یک در و مثل آن باز آید و سر بیرون  
می آید لیکن اینجا راس قدری در و ساکن میشود و بعد آن شدت میکند و درین سکون است که تا درین مدت این  
فم کشاده شود و اگر از انقباض آن از شدت فم سر طفل بیرون آید و انقباض در و درین واقع میشود اگر چه در و ولادت  
اول گاهی فم ششانی و پشیم شگافه میشود و چون قوت بر آمدن منکب درین وقت در و از زمان خروج راس هم  
زیاده میشود و بعد آن چنین با تمام بیرون می آید و همراه آن آنچه رطوبت سابق باقی بوده و هم چون که وقت جدا شدن  
میشود از فم خارج شده جمع بود و بیکی آید و بعد آن در و ساکن میشود و درین راس منکب میگردد و کاهنه یا و پشیم است و درین وقت  
فم غشائی طفل که در فم باقیست مثل میشود و فم میگردد و چون بر مانده دست نهاده شود و احساس کنند که فم بیرون



مادر و باطن است محسوس میشود و این خود درجه ثانیه است و گاهی ششم هم همراه طفل خارج میشود و درین وقت درجه ثانیه  
از شش هم سر کشیده و درجه ثالثه است که در آن پیش خارج شود و در ابتداء این درجه زده دقیقه است و دقیقه ششم که برای خارج  
جین شده بود ساکن میشود و بعد از شش شروع میشود لیکن شدت آن مثل شش درجه ثانیه نیست پس این شش یا بارش  
نمایان غشائی که محیط طفل بوده و در رحم باقی مانده و هم پلاستیک از رحم خارج شده و در جینه آید و بعد از آن گاهی تا مدت دراز در جینه  
مانده و گاهی قری در جینه ماند و شش در جینه شروع میشود و غشائی مذکور از آن خارج میگردد و گاهی با خارج آن حاجت  
میسوی و شکافی افتد و چون بعد خارج شدن غشائی مذکور پلاستیک جسم را بدین نسبت سابق که در آن غشا بوده اکنون  
جسم صغیر صلب محسوس میشود و قند فصل سی و نهم در وضع و ولادت و این را لغت انگلیش پانزدهمین فصل جدا  
شدن طفل از بطن مادر مینامند بدانکه ولادت جنین طبیعی است برای حیوان انسان همیشه بطور مرض نباشد و محتاج بر  
خصوص طبیب نیست بلکه آنچه قابل میکنند کافی باشد لیکن هرگاه بر غیر طبیعی واقع شود یا قاعده نیست و موجود نباشد یا موجود باشد  
اما ناقص بود درین وقت ضرورت است که جمیع بسوی طبیب گردد و شود و لذا ضرورت است که طبیب آن نیم عالم بود تا در وقت ضرورت  
خارج شود و کار را با تمام رساند و باینکه آن تدبیر ولادت را انجام دهد و شش که تا حدی ناقص نماند پس بدانکه هرگاه در طبیعتی حمل  
تمام شود و قریب وضع ظاهر گردد و درین وقت واجب است که لیکن طبع حامل بطور مانده تا معاشی تقسیم و ایما بر وقت ولادت  
از فعال خالی مانده پس طبع جنین و واجب است که در وقت تقاضا شد باشد و آب گرم تنه یا از جنین بیخیر داده باشد یا غن بیدار بخیر نماید  
قلیل نباشد که از آن بلعیت یکجا جابت شده باشد و روغن بیدار بخیر درین وقت برای این کار از دیگر سہلالت فصل است  
و ایضا حامل را امر فرماید که خود را از طبع بیارای تصور کرده بر پانک نماند بلکه بخیر و بطور استحاضی کند و در کار و بار خائف  
مشغول شود زیرا که اکنون جنین از علی برآمده و بسبب آن بدن بسبب گشت و حرکت بران دشوار نیست زیرا که از حرکت  
شغال با امور خانگی دلش از خیالات و خوف از ولادت باز میماند و چون در کاذب که از انضباط معده و کثرت ریح  
قولون و غیر معاشی تقسیم میشود و شروع گردد و درین وقت چنان کند که اگر در وقت جنین در در بطرف میشود و آرام می آید پس  
اگر بعد گرفتن قند و صاف شدن امعاء هم در کاذب باقی بود و فیون خالص یا یا فیا آب برنج نخیده حاکم و بطور زراقت در  
شکم رساند که از آن هم در ساکن میشود و هم خواب می یابد هرگاه در و صادق شروع شود و آنوقت پرستاران حامله را باید که  
فیته یا رشته قوی و معتد اض یا کار که نیز نباشد و آب گرم و آب سرد و پارچه چادر برامی تن بشکم مادر جنین و چند روال  
خورد و موجود دارند و هرگاه نوبت بطلب طبیب رسد آن زمان قاعده طبیعی که بر بان انگلیش آنرا ایلا شکک گاه ششتر نامند  
افیون و مار فیا و قدری اگر گشت میناسازند و بطور شروع شدن در و صادق قدری روغن بیدار بخیر نوشانند یا از آن  
حقنه دهند تا معاشی تقسیم صاف شود اگر قبل آن بر اثر جمولی هم خود آمده باشد زیرا که ازین تدبیر و امر حاصل میشود  
اول صفائی که بسبب آن هم در ولادت طفل بر از هم خارج نمیشود که باعث تنفر بینندگان میشود و هم بسبب آن قضا

فصل سی و نهم در وضع و ولادت

کامل



بابت هم در این فصل از آنکه در فرج و ولادت  
 سر طفل معانی مستقیم از آنست که در این فصل از آنکه در فرج و ولادت  
 نیم حجم احساس کنند که هم عضو از اعضای طفل اول محسوس میشود و سر یا پا یا دست یا پهلوی پس اگر سر طفل پیش آمده باشد  
 زیر ناکش جسم مدور و عظام کانیه سر محسوس خواهند شد و درین وقت باید دانست که ولادت بطور طبیعی است در آن  
 هیچ اندیشه نبوده و محض قابلیت برای آن کافیست و اگر عضو دیگر محسوس شود درین وقت ضرورت است که دکتر صاحب شود که  
 طلب کرده شود و با لجام چون بپند که جنین از جانب سر می آید مادرش را بشارت میگویند و طمأنین سازند که هیچ اندیشه  
 نکند هر گونه خیریت است تا در اول او قوت آید و خوف بر طرف شود و بعد از آن بگویند که تا زیادتی و شدت در بر پلنگ  
 نه نشیند بلکه در خانه خود حرکت کند و با هم را میان خود کام کند تا دل مشغول ماند و در آن درجه اولی منقضی شود و بعض  
 قوایل بی علم آنچه حامل را درین وقت میگویند که درین نفس خود را بنده کرده و بر وقت شکم را سخت کرده و بسوی ال نوح  
 کند نشاید و درین درجه این فعل مفروضه جایز نیست زیرا که درین درجه کشادن رحم ضرورت است و آن بقوت رحم کشاده میشود  
 زور و قوت مادر را در آن دخل نیست و همچنین چون این در دو شج درین درجه تبارخی میشود بعض ناخبر به کار میگویند که اگر  
 یا هر دو ای که در رحم پیدا میکنند برای دفع کردن جنین بنوشانند جایز نیست زیرا که از استعمال این ادویه درین درجه  
 چون جنین قبل از افتتاح رحم بقوت تشنج رحم بیرون آید فهم رحم شق میشود بلکه درین وقت عوض آن از آب گرم و معانی هم  
 حقه دادن بهتر است که از تشنج و درد متواتر پیدا میشود و از حامله پرسند که بول کرده است یا نه اگر نکرده باشد اگر نکرده  
 بول کند و بار بار بول کنند تا نشانه خالی ماند و اگر خود بول نیاید باو خال قاناطی میوه می آید تا نشانه بول آمدن  
 نشانه بیرون آمدن و گاهی در آخر درجه اولی در کش ران چنان تشنج و در قوی میشود که از آن زن بتیاب شده و فریاد میکنند  
 درین وقت هم حقه از آب گرم دادن و بعد از آن مار یا یا فیون و آب برنج مطبوع حکم کرده و معارسانیدن باعث دل  
 یا تسکین این حج میشود و گاهی از مالیدن بارست هم درین در آرام ظاهر میشود باقی امر بجهت گذر از آنکه بدون ولادت  
 هر گاه بقی ماند و بعد از آن جمله بر طرف خواهد شد و گاهی در آخر این درجه لب زیرین رحم که نسبت لب بالای آن تشنج  
 قدری دراز می باشد با وجود ضخامت خود که این وقت بسبب تشنج و آمدن غشائی جنین پیدا کرده و در میان سر طفل و عظم  
 می آید و بسبب آن سر را ضابطه کرده مانع از خروج میشود پس اگر چنین بود قابلیت را فرمایند که از ناکش دست لب مذکور  
 را قدری بلند کرده و در تار میان سر و عظم مانع از ولادت سهل شود و گاهی درین درجه بعد کشاده شدن دهن رحم  
 غشائی جنین پر آب از دهن رحم بر می آید تا شق نمیشود و در آن وقت که شق شود چه جمله کار ولادت بدون شق شدن  
 آن بنده می باشد اگر چنان بود که بالایی و حتی اطراف سر قراض یا کار و پر ناکش سبابه بخوی گیرند که از سر آن قدری سر  
 بالا بود تا در وجهه رحم از آن زخم سر پس غشائی مذکور را از آن آهسته شق کرده و دهن و گاهی درین درجه رحم چنان  
 سخت می باشد که با وجود تشنج متواتر و تشنج و کشاده نمیشود و از آن حامله بسیار از پت میسر و کار ولادت بنده می باشد

اگر چنین بود درین وقت مادر را شایک تنها باشد و هم حمله گرین باب حمله ده نباشد تا ریه او آن بلا شود و ناهنجار گریز  
نوشانند تا شش عضله عریضه را کم و از آن حجم متشنجی شده وسیع گردد و نوشانیدن این هر دو و مجموعه آن خورانیان  
هر یک مفروضه بهتر است تا کار نام نویانی که از آن حجم تنجیم میشود و در هم ساکن میگردد و این مختار حکمای ولایت است  
و همچنین درین وقت کلول بائید ریث نوشانیدن هم مفید است چون دهن حجم کشاده شود و جنین تا پری نیم رسد  
و این وقت شروع در جبهه ثانیه است حامل را امر فرمایند که شکم خود را سخت کرده و نفس را بندد و برای دفع کردن جنین زود  
بسوی سفلی کند و اینجا تا که بعضی اطباء میگویند که قاری تا انتقاص دهن و جبهه سطر فل را از بروز و خروج منع کنند تا قبل  
التفات نیست زیرا که ازین فعل تشنج رحم زیاده میشود بلکه نسب آنست که اگر از اندک خود سراز فرج خارج شود و همچنین بعضی  
نادان میگویند که چون جنین قریب دهن فرج رسد بروی فرج را از دست سبب کشند اینهم نشاید و ضرورت نیست زیرا که  
بعد سرنسب که از آن کبیر است هم خواهد آمد پس توسیع از دست تا کجا مفید ممکن خواهد بود و چون سطر فل از فرج خارج  
شود و فوراً بپسند که رسن سوره و گردن جنین است یا نه چه اکثر درین وقت جوئی مذکور گردن جنین می آید و از آن حال طفل  
مثل کسی بود که حلقه و گلویش انداخته کشیده باشد و قوی که روی جنین سیاه میگردد پس اگر چنان بود فوراً رسن مذکور را  
آهستگی از بطن مادر کشیده و دهن را از منکب جنین آزاد نماید و آرد و ده دهن تا ستر می گردد و هر گاه سطر فل از فرج بپسند قابل  
درست نمود را بر عانه نهاده و غر کند و در دهن هم را بر اخرج جنین پس هر گاه بیند که تشنج در هم برای دفع کردن جنین شروع  
شده همراه آن دست خود را هم بر حجم نهاده و غر کند و بقوت گرداند لیکن جنین را از فرج خود نکش و آنرا من نکند تا خود  
پیدا شود الا در وقتیکه در بیرون آمدن تاخیر شود بدان که جنین پاک خواهد شد آنرا ان بکشد و چون جنین تمام از شکم  
دیگر بیرون نرود و لا محاله جنین است و از آن دانسته میشود که قوی است و بر قدر که می بیند بهتر است که بسبب آن بر او  
ری آن می رسد و خون صاف میگرد و پس آنرا از خون و آب جدا کرده و بیند که بلغم در دهن و بینی آن است یا نه اگر باشد  
و بان بینی را صاف کرده و دهن را بعد از ستر آن دو نیم آنچه یابسته آنچه که شش رسن سوره آنرا از شش یا رسن غلیظه که از  
شش دست ساخته باشد و عقده داده و ضبوط بر بندد و لک سینه از جاسی مشدود کند شش رسن سوره مذکور را از طرف  
دیگر که در شکم است نیز محکم بندد بعد از در میان این هر دو شش رسن مذکور را از کار دیامتر احسن که تیز باشد برید و قطع  
کنند و فایده تیز نبودن آنست که تا وقت قطع نگردد بلکه از شش و کشیدن بار بار جدا شود و بسبب این ذات عضله ای  
کوچک شرایین تشنج شوند و بسبب آن دهن شرایین بند شود و زیاده خون جاری نگردد و اگر طفل پیدا شود و بخوبی در  
تنفس هوا نکشد و گریه کند در بحالت قطع سوره تاخیر ضرورت زیرا که تا حال رطبه طفل کار جوئی سوره که آنرا رسن سوره یا لک  
پا ششگاه میگویند و هم تا حال قری خون از ریه ستر می آید و می رود پس در بحالت تا وقتیکه ریه کار خود نمیدارد و اگر چه  
از رسن سوره موقوف نشود رسن سوره را قطع نکنند و عوض قطع آن دیگر ندانند که جنین تنفس بوزایل آید مثل اینکه

رسن سوره را از شش احسن یا کار جوئی قطع نمایند

و این

بر روی طفل از زمین خود بنزد و قوت یکبار بهوار بطور بیخ رسانند یا بر سرین آن دست زنند یا آب سرد بر روی آن بپاشند تا بر روی تشنج پیدا شده هوا بکشد و اگر از زمین تا بر سر هر جای که ظاهر نشود در آب گرم طفل را یک دقیقه انداخته و از آن بیرون آورده فوراً آب سرد بر رویش پاشند تا هوا بکشد و اگر از زمین هم هوا نکشد درین وقت گشت در دهن طفل انداخته به بتندیک بلغم است یا نه اگر باشد درین را اول از آن صاف کرده و دهن و گک بینی را هم دیده اگر بلغم مانع از تنفس و صاف کرده و دهن و اگر بلغم مانع از تنفس این اعضا نباشد زبان طفل را گرفته بیرون از دهن کشند و تدبیر غرقی بعمل آرند تا وقتیکه آواز حرکت طفل مرقوم نشود تدبیر غرق را مکرر بعمل آورده باشند حتی که گاهی تا نصف ساعت این تدبیر کرده میشود و بکشد طفل هوا نفس میکشد با لحاظ هر گاه بسبب کشیدن هوا از حیات طفل مایوسی بود درین وقت از زیاده مشقت کردن و استعمال تدبیر غرق برای زنده ماندن طفل و هوا کشیدن آن نفس خود را باز دارند که احیای نفس عظیم است و چون طفل هوا نکشد و در دهن سکه هم حرکت ضربانی نبود و در خیالت هم رسیده و قطع کرده زبان طفل را از دهن آن کشند تا بر غرقی بعمل آرند که گاهی از آن نفع ظاهر میشود و اینجا امر قطع سکه بسیار قهت که قطع کردن آن باین خیال بوده هوا و خون از آن در بدن طفل می آید تا هر گاه که تشنج آکن شد اکنون ضرورت آن نمائده پس بنفایده اتفاق پیوسته باشد که از اتفاق آن بعضی تدابیر همیشه معجزاتی ظاهر می شود و تشنج میگویند که زبان طفل را کشیده هوای خارجی را در دهن آن فرو آورند و در دهن طفل بقوت دم کنند بعضی بذر می بینند که کوچک را سانس در دهن و در بدن طفل تخمیر میکنند لیکن این تدبیر در انسان تدبیر است و گاهی جنین با غشای محیط خود که بر آب است پیوسته میشود و چون از محل گرم جدا شده در هوای سرد محلی را فرو در دهن کشاده هم میکشد پس درین وقت آب که در غشای جمع است داخل شکم طفل میشود و از آن ضربی که در اندام هر گاه چنین اتفاق افتد فوراً غشای را شقی کرده آب از آن بیرون کرده و پسند تا اینجا میان ولادت بر خط طبیعی بوده که در آن رحم از قوت خون جنین را از خود بیرون میکند و محتاج مدد دهن نباشد تا هر گاه دهن هم کشاده و غشای محیط طفل شقی گشته و آب از آن جاری شده رحم جنین مثل گشته باشد که یکبار به سبب ضعف که تشنج های درجه اولی در رحم حاصل شده از کار خود باز مانده تشنج پیدا میکند تشنج ضعیف میشود که بسیار آن خروج طفل ممکن نبود و در او تیره مستهلک ولادت نباشد و عمده آنها اگر تشنج است که از آن هیچ گریز نماند اگر آب را قوی بود و تشنج بر آب نباشد نباشد یا از نیم دم هم اگر تشنج یک تا یک درم کوفته در دهان او نشاند آب گرم از سبب دقیقه نصف ساعت تکرار بعد سر و شدن صاف نموده نگه دارند و بعد از نیم ساعت یکبار اولش از آن نباشد تا که رحم قوی شده و تشنج قوی پیدا کند و چون در قوی ظاهر شود نوشانیدن اگر تشنج موقوف سازد و بگاه طفل بر پیچیدم آید و پیچیدم کشاده نشود و در خیالت زن بسیار ستاوسی میشود و در خیالت قبل درین حال روغن سیاه اندودان غشایه نیست لیکن عمده تدبیر این است که کار را فایده نیم درم بر پاره پاشیده قریب بینی داشته بپاشند و تشنج بپاشند و تشنج قوی که کرده و از این

کلان فام را ضروری و ولادت آسان دارند

و امر محال میشود یکی استسین در درد دوم پنجم سبب آن برودی مسترخ و کشاده میگردد و باید دانست که کار تمام را با ضرورت ولادت استعمال آرند که از آن گویا بسیار محال میشود پس از وقتیکه در دواوق شروع شود تا فراغ از وقت ولادت و برآمدن غشای محیط هر وقت که در وادیت زیاده شود یا که هم عضو کشاده نگردد این دوا را بویانند که از آن استسک در درد و توسیع اعضا محال میشود و بسیار دوائی نافع است و هم باید دانست که چون از ولادت طفل فراغ محال میشود حامله را چنان راحت و آرم می آید که گویا در بهشت است لیکن بعد چند مدت که زیاده از بهشت و قیقه نباشد باز در وقت تشنج که از درد ولادت کم بود پیدا میشود و اگر این درد خود پیدا نشود بالائی رحم از دست می کشند یا بران مالش سازند تا تشنج پیدا شود و اگر ازین تدبیر تشنج پیدا نشود و غشای محیط و غیره بیرون نیایند درین وقت سراسر امل دست بالا زیر مانع فرو برده و نیز انگشت هر دو دست را بالائی رحم نهاده برود و دفع کنند تا از رحم غشای مذکور خارج شود و چون از رحم غشای مذکور خارج شده در وجینه آید درین وقت غشای اسواق وضع و جینه بکشد یعنی چنانکه در تشنج وجینه نوشته شده که آن چهار است از جانب تخانی خود پس اول این غشای مع بلا سندان بالا بسوی زیرین کشند تا در رحم آن آید و چون در رحم آن آید از تحت بسوی فوق کشند تا از فرج خارج شود و گاهی بعد ولادت بسبب تشنج عضله عرض که در وسط است رحم بصورت دو شیشه ساعت میشود یعنی در میان آن ضیق و بر دو جانب آن عرض و کبیه میشوند و درین وقت غشای محیط طفل در وسط آن که ضیق از تشنج شده تشنج میگردد و خارج نشود و از آن خون کثیر خارج گردد و مادام که این غشا نه بر آورده شود خون بنده در درین وقت تدبیر محصور درین است که دست خود را با استسکی در وجینه انداخته بجای انگشت در رحم انداخته تمام دست در آن داخل سازند پس بعد غشای مذکور و پلا سندان اگر قه از رحم جدا ساخته اند بقدر اجتماع و انداخته رحم بیرون آرند تا که رحم غشا و پلا سندان و دست را خود دفع کنند زیرا که درین دفع کردن رحم مجتمع و منقبض میشود و بسبب آن خون بنده میگردد و اگر باراده خود درین حال دست خود را برودی از رحم برآند که رحم مسترخ مانا مجتمع برای دفع نشود و خون کثیر خارج خواهد شد و در آن خوف هلاکت است و چون غشای مع بلا سندان با تمام خارج شود خون هم بنده میگردد و تشنج هم بر طرف میشود و هرگاه غشای مذکور از رحم جدا شده در وجینه آید از او بر تو بچید و با هم ساخته است و بسته بکشد تا تمام غشای پیچیده مع بلا سندان برآید و چیزی از آن در دهن رحم نماند و الا بعض اوقات قدری ازین غشا در دهن رحم یا در وجینه باقی ماند تشنج پیدا خواهد کرد و از آن جریان دم کثیر خواهد شد و چون غشای خارج شود دهن فرج را از رمال پاک کرده رمال صاف دیگر بر فرج نهاده به بیتا اگر خون کثیر بعد از نیمه آید باید دانست که قدری از غشای مذکور تا حال در رحم باقیست یا خون کثیر در آن منجوشه است چنانکه گاهی بسبب نادانی قوای بدن پیدا میشود هرگاه وقت بدون غشا در رحم رسد و اگر قه میکشد و بسبب آن غشای محیط منقلب و متغلب میشود و قوت کشیدن قابل بیرون می آید یا بلحاظ چنان ثابت شود که بعضی از غشای مذکور یا خون منجمد در رحم موجود است پس درین

باید که قابله دست خود را در رحم داخل کرده شخص نماید بر آنجه که باشد آنرا از رحم جدا کرده آهسته آهسته موافق هدایت سابق بیرون آورد و درین وقت رحم را از خارج هم غمزه کرده باشد تا غشای خون هر چه در آن باشد آنرا دفع کند بعد از آنکه مال صاف از خارج بر محل رحم و دیگر مال صاف چند تا کرده بر دهن فرج گذرشته بالای آن چادر دراز چند تا کرده بر شکم در چنین بندند و اگر فصل سرما باشد پارچه که بر دهن فرج می نهند گرم کرده بندند که از آن قدری آرام حاصل میشود و پارچه فرش رطوبت یکن بود آنرا دور کرده فرش یا بس گسترند اگر بعد از خیال کمزوری غلبه کند و بسبب آن خواب زیاد مضطرب آید زیاد بود خاصه هر گاه برای تسهیل ولادت اگر کث نوشتانیده باشند درین وقت یکچراو پیامی یا لایکه او پیامی شری میس بست بست قطره نبوشانند یا دو گریب افیون خالص در آب حل کرده نعل آن دور نموده نبوشانند و گاهی از ولادت فرشتت شق میشود و درین وقت چونکه ورم بر دهن فرج و اندرون زیاد میباشند ازین سبب تخم قلیل هم زیاد معلوم میشود و چون ورم دفع میشود مقدار تخم هم محسوس گردد با بجمله اگر تخم کوچک باشد برای آن صاف کردن و شستن از آب گرم روزانه دو سه بار کافی میشود و اگر کافی نشود روغن کاربو لک باین خود درست سازند که کاربو لک ایستریک آونس و چهل آونس روغن کنجدی حل کرده بگذارند و از آن روزانه دو بار بر تخم مذکور طلا سازند و استعمال این دهن برای تخم صغیر و کبیر هر دو کافی میشود و نوزائیده را هر قدر نمایند که قدری بر پیامی خود نخسپد تا آنچه رطوبات از رحم خارج میشوند بی آنکه بر تخم رسد بالا بالا انهم و جبهه بر پارچه بزنند و الا از مورا کنایه بر تخم افیت خوابا شد و در پرسیدن تخم هم تاخیر خواهد شد لیکن گاه تخم چنان کبیر شود که بدقتن آن حاجت فتنه پس اگر چنان بود روز اول آنرا با وزند که از آن نبودی صحت حاصل میشود و در هر حال خواه تخم صغیر بود یا کبیر صفای شستن آن از آب گرم ملخو گذاشتن مفید بودن بعد چنین از آب نیم گرم غسسل دهند اول صابون را که برای شستن بدن بکار می آید در آب حل کرده پارچه فلافل یا اسفنج بآن تکرده از آن جلد بدن طفل را خوب مالین غسسل کنند و از آب صاف بشویند پس از پارچه ملائم خشک کرده اول پارچه نازک سوراخ کرده بالای ناف بیندازند رسن ناف را از سوراخ مذکور بیرون آورده پارچه را بر آن بچینند و بالای آن پارچه طویل ملائم نماده بخوی ببر بندند که اثر غنیز آن قدری بر ناف رسد تا بسبب آن وقت که بکشد طفل معای صغیر در سوره نیاید و بعد چند روز رسن سوره بخوی آید و اگر در افتادن آن تاخیر شود روغن کاربو لک موافق نسخه سابق بر آن چکانند یا مرهم اوکسایید آن رنگ بر آن طلا سازند یا فلافل یا بانات سوزانیده خاکستر آن بر محل سوره پاشند تا خشک شده بقیه بعد لباس موافق فصل پوشانیده و کفای مادرش دهند که اگر جمی مادر او آرام آید و پستان مادر درد بانث و بندد که فوراً طفل حله را خوابد و کبیر و درین عمل سه فایده حاصل میشود اول اینکه گاهی حله شری صغیر میباشند لیکن از کبیرین طفل کبیر میشود و دوم آنچه شیر در پستان هست در آن قوت افعال هست از نوشیدن آن سهال میشود و آنچه در شکم طفل بر اثر سیاه یا سبز بود بسهولت خارج میگردد سوم آنکه از افیت پستان بسبب کبیرین طفل پدید میشود شنج رحم مادر و آندن خون کثیر از آن دفع میشود و اگر از نوشیدن شیر مادر تخم شود سهال نشود

۱۰  
 قریباً تمامت افریقہ  
 افریقہ کی اسی اڑھائی سو  
 اڑھائی سو سال پہلے  
 ہی چھوڑ دی گئی تھی



سالم و زنده ماندن پس از غلبه نفس اماره بر نفس نبویه اگر ولادت در عرض بدن واقع شود مثل اینکه یک دست برگیرد یا از جانب  
 پهلو تولد شود یا شکم را برآید یا از پهلو یا از گاه از سفل بدن در طول پیدا شود این بر سه صورت می باشد  
 یکی آنکه سرین بیرون آید و دم آنکه یک پایا برود و بیرون آید و سوم آنکه زانو برآید لیکن برآمدن سرین ازین صورت باشد بر سر  
 زیرا که از برآمدن آن راه برای خارج شدن سر می باشد و بر آن قدری مقدار برآید است بخلاف خارج شدن زانو  
 یا چلین چنان هر دو نسبت راس منفرجه می باشد پس برآمدن آنها برای خارج شدن راس مفید نخواهد بود العلامات  
 هرگاه ولادت از سرین باشد چون در صدق شدت کند و درین رحم کشاوه شود و درین وقت چون انگشتان را بفحص نمود  
 کند زیر انگشت چشم می شود و مقدار در صلب محسوس نمیشود بلکه وضوح آن حس می شود که کثیر الحکم اندرون آن قدری صلابت  
 و در راس محسوس میشود و چون بعد از آن رفته رفته انگشت را برگیرد و پیش آن گردانیده حساس کنند نشان مقعد و سیم و کمر  
 خصیصه اگر جنین طفل باشد و آفرج اگر دهن باشد محسوس گردد و چون انگشت را پس مقعد گردانند آنگاه آنگاه بچشم  
 محسوس میشود و این مورد بر تجربه کار ظاهر میشود و همچنین هرگاه بر عانه حامله که خمیده و سینه نبوده و دست نهاده از انگشتان  
 سر طفل بسوی فوق از خارج محسوس میشود و چون آنکه مقیاس القوت را نهاده اول حرکت طلب شوند آواز خواه در جانب  
 یکین ایستاد بسوی فوق قریب ناف حامله محسوس میشود و چون درین رحم کشاوه شود و یک سرین طفل از آن خارج گردد  
 آنرا از انگشت حساس کرده بود و پس هرگاه این سرین بر پشیم می آید از فرامحت آنگاه عانه خروجش ممنوع میشود و بعد  
 بسبب تشنج رحم سرین جانب دیگر از پشیم خارج میشود و بعد سرین که اول از رحم برآمده بود خارج میشود و بعد سرین  
 که اول از فرج بیرون می آید شکم همان بر جانب هم اول پیدا میشود و شکم جانب آخر مثل سرین آن جانب زیر استخوان  
 عانه رسیده قدری ممنوع از خروج میشود بسبب فرامحت آنگاه عانه و بعد خارج شدن شکم جانب دیگر بر می آید  
 و است که این ولادت که در آن اول سرین برآید بر پهلو طفل میشود و آنگاه درین تنگ بین از فرج بر می آید و خود و بر جانب  
 شکم را بر پشت خود مستقلی میشود و بعد سر از فرج خارج میگردد لیکن درین شکل راس طفل به تنواری خارج میشود زیرا که  
 رحم تا این مدت که تنگین خارج شوند بسیار ضعیف میگردد و تشنج آنهم کم میگردد و گاهی مطلقاً تشنج نیکند ازین سبب این  
 شکل ولادت خوف برای طفل است لیکن اکثر نیست که تا خروج راس هم رحم باز خود را مانده بین سالم تولد شده زنده میماند  
 اما هرگاه تشنج رحم نباشد و ولادت آن اکثر از یک دقیقه تا ده دقیقه است پس آنچه با جنین بیرون آمده محتاج ترویج میباشد و ازین  
 که سر و درین آن در فرج انقباض کشیدن ممکن نباشد و اکثر در خیالت رین سته که جری ناف است هم بسبب تشنج راس طفل  
 نباشد یا است که از آن خون در بدن جنین میسر ازین سبب تشنج کشی باشد که او را جرح مخوف کرده باشند پس در خیال  
 باید که اول تفحص کنند که در جری ناف حرکت ضربانی هست یا نه اگر بود هیچ اندیشه نکند و در پی تدبیر شود اما گاهی جری  
 ناف کشیده میباشد و بسبب آن تشنج ضعیف یا معده میشود و درین وقت جری مذکور را از جانب دیگر کشیده میشود



سازند و چیزی مذکور را کشیده در پهلوئی و جنبه یک طرفه کرده و پسند بر کمرم جانب که خواست و اگر حرکت مجری مذکور  
مطلقا معذور بود و فوراً بچرا بپای و نازد باین نحو که یک دست خود را بر قاعی طفل نهند و از یک دست خود را بر روی جنبه  
گرفته بکشند لیکن دست نکشند و الا ممکن نیست که بیرون آید چه پیشتر گفته شد که جنبه چهارم را دست بلکه اول از بالا بسوی  
زیرین کشند تا جنبه در رحم و جنبه سیاید چون در انجا رسد اکنون از زیر بسوی فوق کشند تا از فرج بر آید و مجربین میگویند که هر  
بطل را از محل قضایش قدری غم کرده از استخوان خانه جدا کرده و پسند بعد از آن در پیچیده و آنرا از بالا بسوی زیرین و آن  
رحم و جنبه کشند ازین ولادت سهل میشود و هرگاه ولادت از جانب زانو بود و آن بسیار قلیل میاشد و دانسته میشود با یک  
متجان انگشت معلوم میشود که چیزی از سر کوچک است و هم فصل که بر و ساق مضوم محسوس میشود و هرگاه ولادت  
از جانب جل باشد اینهم از متجان انگشت صاف ظاهر میشود که در پیش بسیار غمیش آمده و چون زیاده تخصص کنند  
عقب و دست می آید و از آن تعیین میشود که جل است دست نیست درین هر دو شکل هم تامل کنند که خود پیدا شود و بنما  
که برای مادر خوبی نیست خبر آنکه ولادت البته در مدت طویل خواهد شد بل برای جنین البته خوف است زیرا که سر بعد بر خارج  
خواهد شد و خروج آن بعد همه اعضا بتانی و تا نیمه خرد عظیم است چنانکه پیشتر گفته شده لیکن باید دانست که درین شکل جنین قهر  
که بتانی آید بر سر از سینه بر سر آید زیرا که هر قدر که بتاخیر آید راه برای خروج راس مهیا خواهد شد و درین شکل هم ولادت  
بر همان نهج میشود که در شکل اول ازین شکل یعنی ولادت بر جهت سرین میشود و گفتار و ایضا باید دانست که چون درین  
شکل هم بعد کشادن دهن رحم تاخیر و ولادت بسبب ضعف رحم بود و اعانت از نو شایسته اگر گشت و غیره او و پاره ولادت  
فرمانده و اگر از جهت ضعف پیدا نشود و سرین اول برآمده باشد از رحم درین وقت دست و جل کرده انگشت بسیار دست است  
را بر جل سر استخوان ساق یا فخذ نهاده استخوان مذکور را از آن گرفته موافق هدایت سابق بر هدایت رحم و جدار و جنبه از بالا  
تحت و از تحت بسوی فوق کشند یا چپ بر ساق طفل بسته است بسته موافق هدایت بکشند و گاهی از آنکه آهنگی هم کشند  
لیکن در آن خوف رسیدن ضرر و نقصان طفل میباشد هر دو تا بهر اول اولی اند لیکن این تدبیر قوی باید که چه قریب فرج  
بود اما هرگاه سرین جنین قریب رحم بود قریب فرج نیامده باشد شش رحم متوقف شود درین وقت دست در رحم انداخته انگشت  
دست پای طفل را کشیده بعد از آن آهسته آهسته کمال حقیقا کشند تا که مفصل رگه متخلع نشود و هم ازین شش اعانت  
رحم مقصود بود و اینکه تمام کار رحم را خود گفت و از دست گیرند ایضا باید دانست که گاهی ولادت بر این صورت میشود که هر دو  
دست طفل بر دو جانب راس طفل میباشد پس اگر چنان بود و دستها را از سر جدا کرده مقابل سینه نهند فقط ایضا باید دانست  
که درین شکل چون جنین پیدا شود و گریه نکند نفس نکشد درین وقت هم آنچه برای نفس کشی و گریه کردن تدبیر پیشتر نوشته شد  
اند اما از اینجا هم عمل آنرا گفتار فصل پنجم در غرض ولادت و آنرا بلغت انگشت و زنی کثرت یعنی بعضی ولادت با  
زاینده آن بر دو قسم بود یکی آنکه از جهت آلات و امراض حامله بود و هم آنکه از جانب جنین بود اما آنچه از جانب مادر

فصل پنجم در غرض ولادت

چنین بود پس یکی از آن گشت که درین جسم نرودی کشاد شود و ایندهم طریقی است که هم نرودی کشاد شود و اینک  
در تشنج قوی متواتر شود لیکن گاهی با وجود تشنج و در قوی در امتحان دید شود که از پشت ساعت تاده ساعت هم  
نیشود لیکن اکثر احوال در زنانیکه یا صغیره العمر از سیوه سال تا پانزده سال عمرشان بود یا در کبیره السن که از سی و پنج  
سال عمرشان تجاوز بود و محل اول حامله شوند یا پیش و پس درین هر دو صنف هم بدشواری کشاد میشود و نشین  
موافق زمان سابق این بود که از نشتر بر بدن هم جایجا خراش پیدا کرده و بعد تا قدری خون از آن جاری گردد و یا اگر  
نشانه هم که گریز خوشانند تا غشیاں پیدا شود یا آب گرم نشانند و درین زمانه بهترین تدبیرش نیست که کار فاسد  
و کلورل باشد و ریش نشانند و از آن بجوی مقصود حاصل میشود و گاهی هم بسبب سخت شدن گوشت آن که از پیش  
از هم محل سابق بود یا بسبب استعمال اصل کاشک نقره و زخم هم کشاد میشود و گاهی بسبب سرطان هم کشاد  
و مراد از آن نیست که هرگز مطلقا کشاد نشود بلکه گاهی درین امراض در انفتاح هم چندین تاخیر میشود که حامله ضعیف  
ند و از دست که درین وقت اعانت هم کنند یا اینکه قلم آنخی در آن نشاند تا بهر زخم شدن آن و درین هم کشاد گردد  
یا با اینکه است و گوشت هم است آنجا از نشتر قدری قطع کرده و بعد تا سختی بر طرف شود و در سرطان اکثر محل مستعد  
لیکن گاهی با استمرار حمل سرطان چنان کبیر بود که هیچ نوع هم کشاد نکرده و درین وقت چهاره ازین نیست که بر عارضه  
هم شکم اشتی کرده هم را هم در وسط او شق کنند پس دست در آن انداخته و به رابیر و آنرا و گاهی بهر هم هم پیش  
بعد استقرار حمل اکثر یکس میبرن هم زوده کرده و هم عضلی آن با هم و صق میشود و بعد به شدن این هم درین هم  
چنان مسدود میگردد که هیچ گونه در آن راه باقی نماند و از آن وقت ولادت عسر پیدا میشود و درین صورت با یکدیگر  
به تئیه که محل اصلی هم که با بود و آن دانسته میشود و از نیکه به گاه تشنج و در قوی شود و محل اصلی هم آن اثر انقباض و دفع  
محسوس شود و آن موضع قدری از اثر دفع بر جای میماند و نشود و درین وقت بر آنجا از سر کار قدری زخم کرده و بعد  
کشاد کرده و اگر هم هم هیچ حیاطا بهر شود پس هر جا که از هم در جنبه قریب بود که انگشت بآن اول برسد بر آنجا از هم  
تا یکا پنج شش کرده و بعد بهر هم کردن آنج در آن پیکرده و بعد گاهی در زنانیکه کمتر ولاد ایشان شده باشند  
اکثر محل شکم ایشان بسیار نخل و متفرخی باشد و بسبب آن هم او هم قوی نبود و بسبب ضعف گاهی درین هم  
قفا قطن میگردد و در فندس آن بیشان می افتد و چون وقت تشنج طفل بسوی قفا قطن میرود و راه و جنبه نمی آید و ولاد  
نشود و در پیش نیست که حامله را بهر شقی کرده فندس را بسته بهر بجایش آورده بالاسی شکم یا بر طول  
بر بند تا باز فندس بر شان نیفتد و استرخاشی شکم نفع گردد و هم در جنبه آید و گاهی و جنبه فطری صغیر میاشد و بسبب  
همه فندس آن تشنج و شوارد و از آنهم ولادت عسر میشود و از آن خود و بیع شود و حامله ضعیف میگردد و ولاد اعانت  
آن درین وقت ضرور بود و تدبیرش نیست که اول رغن گرم مثل رغن سیاه یا رغن کتان گرم کرده و در جنبه ساندند

آن میگویند میباید که شش و سیع گردد و اگر غلبه شود و کار تمام بویاتند و کلوریل بایند و ریت نوشاتند تا حاطه شش و سیع  
شده ضعیف گردد و پس اگر باینهم و سیع نشود و طفل در وجینه باشد درین وقت از پیش هر طفل تا آخر درین وجینه  
سرکار و تنه میگویند میباید که ریش را شش کرده و درین زمانه سیع شود چنین پیدا گردد و چون درین وقت از طفل  
اویت خروج هر طفل خون کثیر در وجینه جمع پیدا شد از جهت از نرم مسطور خون کثیر خارج میشود و آنرا دیده و خایف نشود بلکه  
از خارج شدن خون کثیر درین وقت غرض و خالی شده و سیع خواهد شد و چون هر طفل بر این نرم در خروج مرور خواهد کرد و بسبب  
تقلیل آن این نرم خود تنگ خواهد شد و گاهی نرم سیع بسبب بشدن که نام نرم سابق مندرل مسدود میگردد و از آن جهت که  
طایفه میشود و تدبیرش نیست که هرگاه چنین در هر فرج رسد از سر کار و درین فرج را کشاده و دهن و گاهی بسبب پرده بکار که بسیار  
غلیظ و سخت بود و چنانچه بعضی نسوان پیدا شد و بچه فتنه که پاکت گیر راه در آن نبود که از آن منی مرور نموده و منی مستقر نشود که  
ولادت آن شش نمیشود و مانع از ولادت گردد و درین وقت از سر کار و آنرا شش کرده و دهن و گاهی بسبب هر طفل در دهن وجینه  
لیکن برینم سیع نمیشود و آنهم اکثر در محل اقل عوارض صغیره و آنرا یک قیر العر میشود درین وقت هم کار تمام بویاتند و کلوریل  
بایند و ریت نوشاتند و لیکن گاهی نرم سیع در وجینه پیدا شد و بسبب یادنی صلابت آن بچه حیل و برینم سیع نشود و درین  
هرگاه هر طفل در وجینه تنگ شود و برینم اثر خفیه و انقباض خاطر زیاده رسد که بسبب آن برینم باریک دیده شود و لیکن کشاده  
درین وقت بر محل صلابت که در فرج است در پیلوی آن نرم و دهن تا برینم کشاید و بچه پیدا شود و تخصیص پیلو بنا برینست  
اگر درین وقت نرم در وسط برینم کشیده شود و موافق خط مستقیم پس از آن فرج و دهن یکسان خواهند شد و گاهی  
پای پین که در نرم کشیده و کبیر بود و همراه هر طفل که وقت ولادت از نرم خارج میشود از اثر خفیه راس شش از خروج راس از نرم  
برمی آید و در وجینه رسیده هر طفل را از خروج منع میکند برینست که شخص کنت اگر پایی پس خود شربل بود آنرا از  
نگیشت دست بسوی مانده دفع و باند کنند تا از همانست باز ماند و اگر بسبب اینکه طفل پیر آن آمده باشد از آن باند کردن  
پایی پس کنت نبود و بر محل پایی پس خیطه بسته پایی پس را بپزند و بر روی بریدن آن نخیر بنشاری و ولایت ساخته شده است  
که در یک طرف آن کشاده و نخیر یا تیر و ماد است و آنرا اگر کشیدند گویند آنرا بر پایی پس انداخته و در وسط آن پایی پس گرفته  
هر دو سر نخیر را خمداده تنگ میکنند از آن عروق و هم آن شکسته میشود و قطع نمیکردد و بسبب شکستن عروق و دهن نرم خود بند میشود  
و زیاده خون خارج نمیشود و گاهی بسبب سلع اووری هم ولادت دشوار میشود و چه او گاهی در خانه سیرند و از وجینه فرج است کرد  
مانع از خروج راس طفل میشود و این سلع گاهی مثل تخم سخت بود و گاهی لیس و پر آب میباشد پس هرگاه سخت بود درین صورت  
چون تشنج رحم ساکن شود آنرا از در میان وجینه و معانی هم بیرون کرده و بالا دفع کرده و دهن و دهن بر آمدن دهن تا بیکه هر طفل  
در وجینه آید و اگر لیس بود از طرف وجینه و کار انداخته آب آنرا بر آید تا مقدارش مخفی گردد و گاهی بسبب جراح مسدود و  
بیر از تیر و معانی هم ولادت دشوار میشود و درین وقت قنده داده معار خالی کرده و دهن و گاهی مشابه شش شده از جا

خود نیز آمده جسم را مانع میشود و از آن ولادت دشوار گردد و اکثر این حالت هم در زنانیکه اولاد کثیر از ایشان متولد شده و در  
 آن شکم ایشان تسخمی بود و جاذب میشود زیرا که هرگاه وقت ولادت قوت خود بر اعضائی سهل دفع میکنند برای دفع کردن  
 جنین درین وقت نشانه بسبب تسخرا از جای خود بر می آید و تدبیرش نیست که هرگاه تشنج جسم ساکن شود از قاعده طبعی موی  
 بول را از نشانه بیرون آن زمان مقدارش صغیر گردد و قابل فراحت باقی ماند و بعد آن قابل از انگشت خود از اندرون و جنین  
 نشانه را موی فوق در عانه دفع کرده ماند تا که طفل زیر آن رسد و گاهی بسبب سنگ که در نشانه پیدا میشود و هم ولادت  
 میگرد و زیرا که جگر مسطور بسبب انحراف عانه در وقت ولادت برگردن نشانه می آید و چون طفل بزخم جسم آید سنگ مذکور آنرا از  
 خارج شدن مانع میشود و درین وقت چون دایره از انگشت می بیند سختی یادم پس عانه محسوس میشود و بسبب آن طفل  
 موی سهل نمی آید تدبیرش درین وقت نیست که قاعده طبعی یا آهنگی انداخته حساس کنند که سنگ است یا نه اگر سنگ است آنرا  
 از قاعده طبعی مذکور از هم نشانه دور کرده و در آن اندازند تا که طفل خارج شود اما آنچه عسر ولادت بسبب جنین بود پس کلی زن  
 نیست که غشائی محیط غلیظه و سخت بود و با صفت تشنج های قوی و کشادن فهم جسم تشنج نشود و پیش جنین آمده مانع از خروج  
 شود و گاهی چنان غلیظه میباش که همراه طفل پیدا میشود و این عسر در رجه ثانیه بعد کشادن فهم جسم وقت بر آمدن طفل از رحم  
 ظاهر میشود و درین وقت ضرورت است که از غشا خارج شده مقدار صغیر گردد تا به سولت بر آید و چون غشاشک نکند مقدار  
 جنین کثیر ماند و علاجش همین است که غشائی مذکور را قدری تشنج کرده و دهنده دوم آنکه غشائی مذکور بر عکس اول رقیق گردد  
 بود و قبل از اینکه دهن جسم کشاده شود تشنج میشود و از آن آب جاری گشته عسر در ولادت پیدا میکند و زیرا که بر کشادن دهن جسم  
 غشائی بر آب معین میشود و بر طفل این در درجه اول ظاهر میشود که بسبب آن دهن جسم بشواری کشاده میشود و از تنه  
 مشوره اش یکی نیست که قابل از انگشت خود دهن جسم را در وقت سکون تشنج است تهسته باشد و چون تشنج عود کند  
 خود را از فهم بیرون آورد و دوم آنکه سفنج غلظه بسته در فهم جسم نهد و چون از تشنج بیرون آید باز وقت سکون آن در فهم جسم  
 و از بینیم حاصل میشود لیکن تدبیر جدید که از همه دفع بود و اکثر بارش صاحب بهادر آنرا ایجاد کرده اند نیست که مجری  
 چرم موی که آنرا را بر گویند و بقدر یک پنجه عرض بود و دست میسازند بر این نیست که یک جانب آن کشاده و آن بر  
 است و در جانب دیگر بند و آن قاعده نیست پس از جانب قاعده آنرا در فهم داخل کرده از جانب راس آب در آن بند ایجاد  
 منفی راست تا بسبب رسیدن آب مجری مذکور ضخیم شده و دهن جسم را کشاید و عوض غشائی محیط جنین بر آب کار و باند  
 نیست خود طفل را محکم از تنه ترساند و ایضا بویانیدن کار نام و نوشانیدن کلورل با نیتیه هم درین وقت مفید است  
 که از تنه هم از آن کم میشود و فهم جسم کشاده میگردد و سوم آنکه در غشائی محیط طفل آب زیاد پیدا شود چنانکه در انچه پیش  
 و گیریم گاهی آب زیاد پیدا میشود و علامتش نیست که مقدار شکم قلیل زیاد و کثیر یدیه میشود و هم کم لا نیم میباش و در  
 رحم زیاد و رقیق و بر آب میباش و بسبب آن وقت ولادت تشنج و در و کثیره و ضعیف بود و چون بفهم جسم تشنج نهاد

تنگ عسر ولادت و عسر خارج شدن

نیتیه  
صورت مجری  
قاعده مجری

احساس کنند و یوار رحم ترقی و زیاده و وسیع و لایم محسوس نشود و بدین مابین و سر آن دور تر محسوس گردد زیرا که بسبب کثرت  
آب جنین تا غم رحم نمی آید و تیسریش آنست که هرگاه تشنج شدت کند و غشائی محیط در غم رحم آید درین وقت که مال احتیاط نشود  
زیر سر انگشت بتابیه پنهان کرده تا غم رحم رسیده غشائی مذکور را قدری شق کرده و چند تراخته زفته آب از آن در هر روز  
خارج شده کم گردد و در طفل نیز آید چنانکه گاهی مقدار طفل بسبب زیاده پیداشدن آب در بطون دماغ گیر شود  
و آنرا بزلان انگشت آبی در دهان بکفایس یعنی زیادتی آب در بطون دماغ مانده و درین وقت استخوان کانه سر از مفصل بایستی  
جدا شده لایم میشود زیرا که غذائی حی بسبب انقباض عروق زیر آب بعظام و دماغ نمیرسد ازین سبب عظام لیم  
دماغ ضعیف میشود و در جبات زیادتی سر را در ج کثیر اند که در هر وجه نسبت در ج دیگر زیاده و کم باشد حتی که گاهی بست و در  
انجم و گاهی بست و چهار پنجه فیته که در سری آید و در بیخالت گاهی جنین از طرف راس و گاهی از طرف سرین پیدایشود و گاهی  
از طرف سر می آید از انگشت معلوم میشود که سر بسیار عظیم است و چون از جانب سرین بر آید درین وقت بیخالت که عظم  
است و شوار بود لیکن قاعده حص آن نیست که چون سرین و پا بر آید به بیخالت که بر مقدار طبیعی اندیا صغیر از آن اگر صغیر  
وانت شود که عظم است و هم چون بعد بر آمدن پا با سرین بر عانه ملاحظه کنند و انگشت معلوم میشود که سر بزرگ است  
بالجمله چون از راه سر این پدید میشود پس اگر قدری زیاده بود محتاج تدبیر باشد زیرا که درین وقت خود عظام لیم بود و  
غشیه راس و راس همه لایم بودند وقت ولادت از نقطه غم رحم و فرج منصفه طول شده و طول گشته خود پدید خواهد شد  
مادام که جنین نه جو نیز چهار ولادت که از خود شود و دیگر تدبیر نکند تا هرگاه بداند که جنین مرد پدید خواهد شد درین وقت  
از سر شتر جنین را از وسط آن قدری شق کرده و چند تا آب خارج شود و گاهی این آب تا مقدار دو آونابری آید اگر  
مقدار راس بسیار گیر بود که بسبب آن از جانب پا و اندیشه بود که رحم شق خواهد شد و او را پاک خواهد شد درین وقت جنین  
جنین زنده بود لیکن بداند که اول از حیات این جنین امید کمتر است و دوم اگر زنده هم ماند سیقتل و بخون خواهد بود پس  
حفظه مادر را مقدم داشته از حیات جنین را گذرنده از سر شتر و وسط جنین را شق کنند تا آب خارج شده به سهولت بر آید اگر  
این جنین از طرف سرین پیدایشود از کشته شدن آن رحم را آرام میزدند زیرا که از کشته شدن چون شتر شتر شده طول میگیرد و در  
میشود و او نیز رحم کم میگیرد پس درین صورت هم اگر جنین زنده بود و زنده ماندن آن خوفت بلاکت مادرش بود درین  
هر دو صورت شترین را شق کرده و چند تا آب خارج شده از صغیر شدن راس به سهولت خارج شود و لیکن در بیخالت که  
احتیاط کار در رحم از زنده ماندن او جینه و رحم نرمی و ناقص نشود و بدین که چون عظم جنین درین صورت بسیار  
میباشد ازین سبب با وجود بر آمدن جنین هم دست تا پس گوش آن میزدند و اگر چه درین وقت بعضی نشتر از درین جنین  
و بعضی از شتر آن می اندازند لیکن شتر است که درین وقت اگر پس گوش جنین نشتر از او تیرا وسط راس آن رسانند و بچشم  
گاهی تقارن بر محال خود منضم نموند بلکه شده میباشد و در هر جانب تقارن مذکور آب جمع بود و بسبب تعدد آن این



نیست بلکه ممکن است بر سرست که بود پیدا شود و خواهد دست یا شانه یا تمام بدن دو نشده بر آید السبب کاهی سبب  
 بخوبی ظاهر شود لیکن اکثر نیست که چون پلوس در وضع خود غیر طبیعی بود سبب این ولادت میشود و باید دانست که فقط  
 پلوس بر این انگشت اطلاق کرده میشود بر جوت شکم که چاک که از اوقاف ظاهر و عظام عانه و عظام نخچه محیط اند و اندرون آن  
 و امعانی که چاک و رحم یافته میشوند و وضع طبیعی آن نیست که عمق آن در طول چهار نیم انچه باشد و چون از آن کم شود غیر  
 خواهد بود و در صورت قصر عمق پلوس در عرض شکم طول میشود و بسبب تضائق آن جنین هم در آن بر وضع طبیعی خود غیبا  
 هر وضع طبیعی جنین نیست که از جهت طولی خود در میان جانب فوقانی و تحتانی پلوس ماند و درین صورت سر و سرین آن  
 بجانب فوق و تحت میمانند و هرگاه پلوس قصیر بود سر و سرین جنین هم در جانب یمن و یسار پلوس میمانند و عرض جنین  
 در میان فوقانی و تحتانی پلوس میماند و بر همین است در بطن عظیم میشود پس هرگاه وقت ولادت میرسد جسم جنین کوچک و  
 جنین است طبیعی خود که از آن در جهت طولی خود پیدا شود ممکن نباشد ازین سبب از جانب عرض جسد خود در رحم هم می  
 دوم آنکه عظام پلوس موافق وضع طبیعی خود بود لیکن غشای آب یا ده بود که سبب آن رحم عظیم و وسیع شود و بسبب  
 آب اثر غیر آن جنین نرسد و از کثرت آب جنین رنگین نبود که از جانب راس خود آید بلکه بر سرست که در آب بود بر بیان  
 در رحم هم می آید سوم آنکه رحم بر شکل وضع طبیعی خود که بودن آن بر سرست ناشیاتی است نباشد بلکه در جانب عرض  
 طولی گردد و در برین یسار عمق آن قصیر شود و بسبب قصر عمق رحم جنین هم در عرض رحم گیر شود و سر و سرین آن در جانب  
 یمن یسار هم باشند چنانکه در پلوس غیر طبیعی المقدار میماند و برین که همش بر این صورت بود همیشه ولادت جنین آن  
 بر سرست غیر طبیعی میباشد و بینندگان میدانند که چون پلوس بر وضع طبیعی خود است لهذا شاید بسبب عادت این ولادت  
 میشود لیکن چون غور کرده میشود دانست میشود که هم بر وضع و شکل طبیعی نیست فقط چهارم آنکه گاهی وقت سقوط حمل  
 چون بسبب امراض رحمیه سقط شود و رحم کمزور بود و تشنج آن بر او واقع نشود و جنین از جانب عرض خود در رحم هم می  
 اطلاعات اول شکل شکم بر خلاف شکل حمل طبیعی میباشد مثلاً شکم در عرض زیاده بود و چون از انگشت امتحان کنند  
 جنین دور تر از رحم محسوس میشود و چون بر عانه است مستقیم فکر کرده محسوس کنند در یک جانب عرض عانه خواه در یمن  
 یا یسار بر طفل محسوس گردد و در جانب مقابل آن سر جنین زیر انگشتان دیده میشود و چون تشنج قوی گردد و عقوبت  
 از جنین مثل منکب یا زانو در رحم هم می آید و درین وقت تشنج آن دشوار بود و تقریر ضرورت لهذا قاعده تشخیص آن  
 بر این نظر قرار داده اند که درین وقت اگر مقیاس القوت را بر عانه نهاده آواز دل جنین را بشنوند اگر منکب آمده باشد  
 آواز دل قریب باشد مادام که غلظت عانه سمع خواهد شد و درین وقت این ولادت غیر طبیعی باشد که از عرض جسد میشود  
 و اگر زانو آمده باشد آواز دل قریب باشد مادام که شنیده خواهد شد و چون آواز قریب است سمع شود بدانند زانو آمده ولادت  
 طبیعی است از جانب طول جسد است اگر چه آواز سمع نشود و بسبب اینکه جنین مرده باشد پس بنید اگر درین رحم منقطع

شکل پلوس بر وضع  
و مقدار طبیعی

شکل پلوس بر وضع غیر طبیعی



نشده باشد انتظار افتتاح آن کنند و اگر درین حجم کشاده و آب از آن خارج شده باشد درین وقت و در سه انگشت  
خود را در حجم داخل کرده عضو که قریب حجم آمده بر آن انگشت نماده آهسته آهسته نگه داشت را بسوی بالا رسانند و درین  
گفتند که آیا دست است یا بازیرا که اگر دست باشد گرفت و انگشتان و در انگشت شصت خواهند شد و از آن صاف و صاف  
خواهند شد که دست کدام جانب است و از آن ثابت خواهد شد که ضربی که در آن است و از آن جهت که ضربی است و در آن  
پایان هم ضرب خواهد شد پس اگر برای وقتش این امور و دست چنان بر کشیده و در دینیه هم از آن صاف و صاف نگه داشتند و در آن  
چون پاشی طفل را گرفته خواهند کشید این دست خود در حجم منقلب شده خواهد رفت العالیه باید دانست که برای  
حفظ مادر و جنین ضرورت است که قاعله یا دست که از قبل از نیکه آب از غشا خارج شود بداند که ولادت بطور طبیعی یا غیر طبیعی است  
چه اگر طبیعی باشد پس تا بپایان تا بودن آب در غشا سهل است و چون ثابت شود که غیر طبیعی است و منکب در حجم حجم می  
درین وقت تدبیر قلب آن که از ده سال یک و اگر صاحب ایجاد کرده اند و آن نیست که از سر انگشتان منکب را  
بسوی تحت حجم یا تهنگلی دفع کنند و بالای عانه مادر جایگاه ضربی جنین نمودار بود دست نماده بسوی سفلی بغیر و  
تا جنین منقلب شود و بر پشت طبیعی آید و دم آنکه دست در حجم انداخته آهسته آهسته غشائی محیط بر آب را از میگویند  
و بپایان حجم جدا کرده باشند تا اینکه انگشتان قریب پاشی جنین شد چون پاشی جنین محسوس شود فوراً از انگشت غشا را پاره  
پار گرفته بسوی تحت در حجم حجم کشیده آورده از آن در و جنینه آن را زیر که درین صورت مادر هم که انگشتان و قاعله غشا اند  
آب کم جاری خواهد شد و مادر هم که آب در غشا است قلب جنین سهل خواهد بود و اگر آب از غشا خارج شده باشد تدبیر  
اول ناممکن بود و این تدبیر را تدبیر برنگات بلغت انگشت میانه منتهی تا تدبیر ثانی البته ممکن است و یک تا قاعله  
جنین در محل وسیع حجم باشد که تریاک و قلب آن آنجا ممکن باشد و اگر در سفلی آمده متغیر شده مثل اینکه در مجرای  
و جنینه رسیده باشد در اینجا این تدبیر هم مفید نبوده و اگر قطع کرده بر آن زده و با آنکه هرگاه قصد قلب جنین کنند اول  
را کلاً رافام بویاند و بیوش کنند که از آن فایده قلب اوتیت و توسیع حجم هم هر دو حاصل میشوند و باید دانست که  
درین ولادت غیر طبیعی تشنج حجم بسیار ضعیف میشود و درین حجم قلب کشاده میگردد و پس از آن این حالت مشاهده  
برای اعانت آنچه تدبیر فصل عشر ولادت برای توسیع درین حجم نوشته شده اند آنها را اینجا هم بعمل آرند و هم در آن  
که مشاهده و معامی مستقیم را قبل قلب به بتدیه اگر هر دو خالی بود بهتر و الا بدخل کردن قاعله طبیعی شانه را از بول و  
باز در حقیقه معار از فضول برآید خالی کرده باشند و آنچه پیشتر تاکید نوشته شده که قبل جریان آب از غشا امتحان  
ولادت غیر طبیعی کرده تدبیر آن نمایند تا بر آن بوده که اگر بروقت تدبیر غفلت کرده شود و دست جنین خارج شد و در  
آید درین وقت بسبب غم و حفظ حجم و وجیه جنین اول پاک میشود و بعد پاکت آن پاکت مادرش مخوف بود چه  
ممکن است که بسبب قوت و شدت درد پاک شود یا از تشنج حجم شق گردد و از آن بمیرد یا جنین مرده در حجم تشنج

و در هر آن در خون مادر و شیر شده هلاک کند و ایضا باید دانست که چون جنین بر این طبیعت قدری از رحم برآمده میسر و پس اگر در عظام پلوس مادر نقصان و تغییر از وضع طبیعی نباشد بعد از این چون جنین ملائم میشود و بسبب آن از حرکت تشنجی و تشنجی تشنجی تا بپایان فرجه دیگر نمیداشد بلکه از خود پیدا میشود و آنچه دست آن خارج از رحم شده بود باز در رحم کشیده و داخل میشود و از آنجا سر باین سرین میخیزد و از آن ولادت حاصل بود بعد از وقت این دست از آنست و ولادت بطور طبیعی میشود و زیرا که از ملائم شدن بسبب مردن رحم بخوبی بر آن شکل دیگر و در تعلیبات متعدده آنرا طبیعت طبیعی می آرد و گاهی همین دست که اول برآمده بعد مردن همراه عضو دیگر مثل سرین یا سر اول برمی آید بعد از اعضائی دیگر برمی آیند و ایضا باید دانست که هرگاه عظام پلوس مادر تغییر می یابد درین وقت هم ممکن است که دست در رحم انداخته یا بی طفل را بکشند لیکن درین وقت گاهی طفل برخی آید بسبب اینکه از غیر طبیعی بودن خروج پلوس عظام آن برترنگ میشوند و از خروج راس مانع میگردد و پس هرگاه چنین صحت دیده شود باید دانست که هرگز چنین نده نخواهد ماند و برای حفظ مادر چنانکه در صورت عسر ولادت که کبر راس بود تدبیر اخراج مابینت از سر دیگر و انداختن یا هم بعد مردن جنین تدبیر اخراج و ماغ از سر کنند تا مقدار صغیر شود و بهتر تدبیر از شق کردن بطن یا قطع کردن جنین که ممکن باشد مقدار جسد و جنین را صغیر سازند تا سهولت بر آید و گاهی جنین در ولادت غیر طبیعی بر دست و پائی خود یکبار بیرون می آید یا بن نخوکه دستها بر پا یا نهاده و فرم رحم و هم در جنین می آید لیکن این بسیار نادر است اما در بحالت هرگاه تشنج قوی میشود و از تعلیبات حقیقه دست و پائی برآمده از رحم باز در رحم میروند و بعد آن از منکب خارج میشود و گاهی دست و پا انقدر در رحمینه آمده منفر میشوند که از تشنج قوی هم رحم باز پس نروند و هم اکثرین ولادت مجری ستر هم با دست و پا خارج میشود و بعد از آن جنین درین ولادت هلاک میگردد و علت سبب آنچه سباب در ولادت منکب او لا مذکور شد انداختن یا هم میباشند و تدبیر که آنجا نوشته شد انداختن یا هم بعمل آزند و گاهی جنین بر این شکل پیدا میشود که یک دست و گاهی هر دو دست بر سر نهاده می آید مثل کسیکه نزدیک شدن آواز سخت و دستها بر سر و گوش خودی ننهد تا آواز سخت را نشنود و این شکل هم طبیعی و هم غیر طبیعی است اما درین شکل جنین از خود پیدا میشود و الا قدری تاخیر در ولادت رو میدهد که بسبب آن مادر را اذیت میشود و لیکن جنین مادر هر دو سالم میمانند و از آنکه درین ولادت بسبب تاخیر اذیت مادرش میسر سازند هرگاه قبل از این جنین پلوس این طبیعت معلوم شود درین وقت هرگاه در تشنج نبود از انگشتان دست طفل را بسته تهته پس سر آن کزده و هنگامیکه درین فعل کمال احتیاط مری دارند درین باره که طفل بسوی خلف همراه دستها نروند و الا فوراً منکب بیرون خواهد آمد و ولادت غیر طبیعی خواهد شد پس باید که از انگشتان یک دست خود و دستهای جنین را پس سرگردانند و دست دیگر خود را بر عانة مادر جنین نهاده و حرکتی تا جنین از جای خود حرکت کرده پس سر و گاهی سر ستره که جبری برای رسانیدن خون در رحم جنین بود قبل از خارج شدن جنین از رحم بیرون می آید و این حالت را بلعنت گذاشتن میگویند و تشنجی پیشتر آمدن سر ستره و این گاهی قبل از جنین

و تشنجی

و غشائی محیط وقت شش و کشادن رحم محسوس میشود و گاهی پیش از سر یا سرین یا سنگ یا یا با خارج میشود و السبب  
یکی از آن زیادتی آب و غشا بود که سبب آن رحم بر شکل طبیعی خود نماند بلکه مسطح میشود و از زیادتی آب طفل و سرین از  
دیوار رحم دور تر میباشند پس هرگاه غشاشق شود یا شق نشود لیکن آب زیاد و بسوی رحم می آید درین وقت این مجری هم  
بسهولت همراه آب از جنین پیشتر فرم رحم می آید و هم آنکه این مجری زیاد و طویل بود پس هرگاه درین رحم کشاده بود و غشائی  
محیط شق شده از آن آب بقوت جاری شود درین وقت بسبب زیادتی طول خود این مجری هم همراه آب از جنین پیشتر  
بر می آید و هم هرگاه محل محل آن از رحم که آنرا نربان نگهش پاسند و بپندی آنول گویند از درین رحم قریب بود درین وقت  
هم همراه آب از جنین پیشتر بسهولت بر می آید چون قبل از جنین بر می آید ازین سبب بعضی از اعضائی جنین که بعد آن بر می  
آورد از خروج مانع میشود و هم آنکه هرگاه پلوس مادر بر شکل طبیعی نباشد هم این مجری از جنین پیشتر بر می آید زیرا که درین وقت  
خروج جنین پلوس غیر طبیعی که قهیر محقق بود و دشوار باشد و نسبت آن بر آمدن این همراه آب سهل بود و هم آنکه هرگاه که هم  
چنین از سران کوچک بود مثل سرین یا یا یا دست یا سنگ یا دل خارج کرد و همراه آن هم این مجری خارج میشود زیرا که در وقت  
بر آمدن عضو معلوم و سخت هم رحم و جینه باقی میماند و سبب بودن راه کشاده و خالی این مجری هم همراه آب خارج میشود  
العلامات ما دام که غشائی محیط جنین شق نشود و شستن آن دشوار بود اما اگر وقت شش جینه و حرکت ضربانی این مجری  
معلوم گردد و از آن دانسته خواهد شد که این حرکت مجری مذکور است و این حرکت مثل حرکت قلب جنین بسیار سریع میباشد  
اما هرگاه غشائی محیط شق شود و آن زمان بسهولت دانسته میشود که چیزی مثل حمل پیش از جنین می آید و در آن حرکت و ضربان  
هم بود و العلاج درین ولادت برای مادر جنین هیچ کلفت نیست لیکن برای جنین البته خوف هلاکت زیاد است زیرا که  
در نیال خنجر مثل کسی میباشد که درین آنرا بکشد و هوا را بخونش رسیدن ندهند و از آن خوف هلاکت بود و خصوصاً  
وقتیکه شش جلد پیدا شود و تا دیر بماند که درین صورت بسبب طول افتاد هوا بخون نمی رسد و اگر تشنج بتأخیر پیدا کرد و در وقت  
رفع نشود درین صورت قدری هوا بخون خواهد رسید و خوف کم باشد باطله ما دام که درین ولادت جنین تا درین و جینه  
غشای از اشتقاق محفوظ دارند که تمامی حفظ جنین درین وقت مخصوص این است که غشائی محیط شق نشود پس اگر غشای  
شق شود و آب خارج شده این مجری تا درین و جینه یا از درین فرج هم بیرون آمده باشد پس باید که در موت و حیات  
جنین تامل و نحو گفتند اگر مرده باشد و آن دانسته میشود از ساکن شدن حرکت و ضربان این مجری لیکن باید که حرکت ضربان  
مجری مذکور را تا دیر در درین تامل اعتماد بود و الا گاهی بسبب شدت در رحم حرکت باطل میشود و باز عود میکند پس  
تأیید شود که بچه در درین وقت حاجت که اسم اعانت نیست انتظار کنند خود خارج خواهد شد و اگر زنده باشد مادر جنین را  
بیشیت ساجد ساخته قابله را که گفت که انگشتان خود را در رحم انداخته مجری مذکور را از زنده جدا کرد و یک طرف در پهلوی ستر  
رغم کرده و در درین یار بسیار بعد انگشت خود را بر آن نهاده دارد تا که تشنج باز در رحم پیدا شود و سبب آن جنین بسوی

آید و مجری مذکور بسبب مزاحمت انگشت از جای خود بر نیاید ایضا قلمم هم می گوید که اگر از اثر گوشت گیرند که در وسط آن  
نقشه کوچکی می باشد و سر آن از خط ملائم و توکرده بر بند بند کوچک هرگاه از آن غایب باشد خواهند نمودی از آن قلمم اگر  
پس درین خط باشد و مجری مذکور اگر وقت از خط مذکور بسته سر خط را از نقشه قلمم بر آورده و قلمم مذکور بسته در محل  
گنجد و چون در رحم رسد جنین از رحم خارج شده در پلوس داخل شود قلمم را از خط مذکور خالی کرده بیرون بکشد تا بجز  
مذکور بطور ولادت طبیعی همراه شکم جنین بر آید و اگر مجری مذکور همراه جنین پیش از آن در پلوس آمده باشد و در کون آن  
نا ممکن بود درین وقت آنرا در یک پهلوی جنین کرده و درین وقت از اعضائی دیگر پیش آمده باشد مثلاً از سرن پیش  
آمده باشد درین وقت جنین را از آنکه موسوم به کار کشیدن برسی اینکار ساخته تقریباً حکیم است گفته باشند تا ولادت سهل  
شود و اگر پیش از آن آمده باشد درین وقت هم آنچه از اعضائی جنین باست آید آنرا گفته بکشد تا بیرون می رود آیا  
بترتیب که از آن خوف رسیدن ضرر باور بود زیرا عمل نیاز درین وقت حفظ مادر واجب است جنین که درین ولادت  
زنده میماند و تذکر ایضا از اقسام ولادت غیر طبیعی است که پلاستیک که آنرا بلوغ جنین گویند قبل آمدن جنین از رحم  
خارج شود و آنرا بلوغ انگشت پلاستیک یا پوئیا یعنی آغوش که پیشتر از جنین بر آید نامند و این بر دو نوع می باشد یکی آنکه بقا  
حمل یعنی با قات زنده و سفید و بیضه زن باکره می فرمید و رحم شود و از آن قریب فرم آن از رحم متعلق شود و دوم  
آنکه خاص بر فرم رحم شود و درین صورت چون مدت حمل کامل گردد و بسبب آن رحم وسیع شود و بسبب تمدن آن جسم مذکور  
از رحم تدریج جدا میشود و بسبب آن گاهی خون قلیل گاهی چنان کثیر می آید که حامله بزرگ میگردد و آن سبب تا حال بخوبی  
منکشف نشده که بسبب این جنین قبل ولادت می آید العلامات مادام که شکم صغیر بود و تخم و شوار بود که تعلق حمل  
از رحم و قدری است یا قریب فرم رحم لیکن هرگاه ماهه تقیم آید و مقدار حمل کامل گردد و ولایت ولادت شود قدری خون  
می آید و باز بزرگ گردد و بعد چندی بازمی آید و ازین استه میشود که تعلق حمل قریب از فرم رحم یا بر فرم رحم است و ازین  
شدن رحم چون پلاستیک قدری قدری از رحم جدا میشود و بسبب بستن عروق که در میان آن و بیوس می بینیم رحم  
متصل بود و خون جاری میگردد و هرگاه درین وقت که درین رحم مضموم و مسدود است انگشت در فرم رحم نهفته می  
پس اگر تعلق حمل بر فرم رحم بود چنانچه غلیظ تر از عروق در میان جنین محسوس میشود و اگر تعلق حمل بر کناره فرم رحم باشد  
از داخل کردن انگشت این شیء غلیظ بر کناره رحم یافته شود اما هرگاه وقت ولادت رسد و درین رحم کشاده گردد  
پس اگر جنین پیشتر از جنین جسم سهل بود و اگر از آنو یا منکب یا سرن بیاید و درین جنین جسم و شوار می باشد زیرا که  
سوائی راس جمله اعضائی جنین از سر کوچک ملائم می باشد پس بسبب آمدن اعضائی دیگر پلاستیک هم فرزند میشود  
بلکه هرگاه از انگشت را زده حساس آن نمایان بالاسیر و جوس شود و این ولادت برای جنین و مادرش هر دو قاتل است  
زیرا که چون پلاستیک از رحم جدا میشود و درین خون در بدن جنین بند میگردد و چون دم کثیر از جانشین پلاستیک از رحم جدا





میشود و لیکن بعضی خانهای آن که بران این خون بجز قیق بود وقت شیخ رحم چون خارج میشود پس گاهی زیاده و گاهی  
لیکن در روز اول به نسبت ایام دیگر زیاده می آید و چون روز دیگر این زخمها بند میشوند از آن قدری سرخی هم می آید  
و باقی خون بجز سیاه که در رحم بود و بجز آن خارج میشود ازین سبب روز دوم خون سیاهی مایل می آید و روز سوم خون  
خالص می آید زیرا که درین روز زخمها مندرل میشوند فقط رنگ خون در آب می آید پس هر قدر که مقدار خون در آب  
می آید رنگ کمتر میشود تا اینکه بمنزله شکر می شود و میگویند که در این حال صلی خود آید از آن آب خالص می آید که در رنگ  
و آن نبود و چون که این زخمها از خارج شدن میگویند سبب گاهی در آن می افتد و می آید  
یا بجز این خون بعد از روز دوم می آید و اگر آید چون نفاس نخواهد بود لیکن گاهی از غطای قوایل که دست خود را در رحم انداخته  
صاف میکنند یا شکم را بر روی میالند یا از رویه جایله قویید در رحم میسازند که آنرا بریان میگویند یا بخت اینها چهار گونه  
و سبب آن زخم تازه شده بار بار خون تا مدت درازی آید و گاهی بعد از شستن و دستبسته بر ولادت زن نوزاد و  
در وقت می آید و آنهم غیر نفاس است چنانکه گفته شده زیاده از دو روز نمی آید و هم در خون نفاس را هم خالص  
است که آنرا کسیکه بسیار دیده است می شناسد آن از قیاس بودی غرض نیست لیکن گاهی این خون بد بو می آید و بسیار  
می تخفیف شدن قیله غشائی می شود یا بود یا زخم هم بود که وقت ولادت شده باشد یا در رحم بود که ار شدت از دست ولادت  
پیدا شده باشد و درین وقت قیله غشائی قدری می آید و این خون بخیله باشد و علاجه اش آنست که آب نیم گرم در وعه یک  
با هم می آید از آن در رحم زرقه نمایند تا غشائی از رحم بر طرف شود و اگر سبب ورم رحم یا جراحت رحم بود علاج بر یک  
چنانکه پیشتر در فصول امراض صحبت نوشته شده بعمل آید اینها از اعراض نفاس نیست که گاهی بعد پیدا شدن جنین  
خارج شدن شیخه خون کثیر می آید که از آن لباس زن تر میشود و بالای بستر آن مثل دریا خون جمع می آید و از آن اول  
غشی بعد از آنکه زن صحل میشود و اکثر سبب آن سرعته و ولادت جنین می باشد چه درین وقت قبل از اینکه رحم مجتمع  
و منقبض شود از جنین خالی شده مستغرق و منقبض نگردد و مقدار آن که بلیز پس خون کثیر را بریزند زیرا که بعضیهای کثیر  
رحم جمع شده و تدریج جنین را دفع میکند خواه هر چه آن جمع میشود و از اجتماع آن عروق هم مجتمع میشوند و درین زخمهای  
عروق از اجتماع بند میگردد و چون درین عروق کشاده مانند خون کثیر از آنها بر می آید و گاهی سبب آن کثرت بر آن  
رحم یا در وسط آن شیخ عضله عریضه بود که آن شیخ شده بر حال خود مانند و از آن در رحم و بطن شیخ پیدا شده کشاده  
و از آن خون جاری میشود و گاهی بسبب تنج شدن خون در رحم شیخ در آن زیاده میشود و تا خون بجز را از خود دفع کند و از  
آنهم خون کثیر خارج میشود و هم هرگاه پلاستیک رحم یا قریب از رحم بود پس بعد جدا شدن آن چونکه جسم رحم منقبض  
میگردد و رحم آن کشاده میماند لذا سبب قریب بودن آن از رحم رحم خون کثیر از رحم جاری میشود و گاهی بسبب رهاوت  
و کمزوری خون زن جاده چنانکه در مرض برائت صاحب و اینها یعنی مرض سفیدی خون می باشد هم خون زیاده می آید و







قد فرغ من کتابی  
فی تیمم و دافات  
و غیره  
سنة ۱۰۲۵  
بدره  
فی جماد الثانی  
خواجه نصیر

اگر ای خون نفاس که بند بود یا قلیل متعفن آمده باشد و دست بار در روز و شب از آب گرم در حمام زرقه سازند و هرگاه  
 درم جل سختی و صلابت بر طرف شود و در آن با نیت پیدا کرد و فلان یا بس از سفیل جل از محل قدم تا علی آن بقوت  
 با اثر غریز و درم رست بعد از آن هرگاه فلان را کشایند که درم روغن شل روغن سیاه یا روغن بابونه یا روغن گل بر دستمال  
 بر جل متورم مالش سازند یا لایم که از آن درو پیدا نشود و بعد از آن پارچه فلان یا بس بر آن برینند و نمک شود  
 بعد از آن در آب حل کرده یا با می متورم را از آن نشویند و بعد از آن می و درم مرصع را خدای مقوی صالح مثل زرد بخت  
 مرغ و گوشت جید و خنی و شور باوشیر یا گاو سحران یا پنج خخته خوراند و از او تیه ایونیا کار یا س که چون مرکبات آب مثل  
 غیر می سفاس و شیر شیل فیبری ایست کنین ساینده اس نبوشانند میورا ناک ایست و ایلو ت نیم آتش شاتر و آتش آب و  
 حل کرده و شربت میوی کاغذی در آن تخم بقره مناسبت از آن نوشانیدن درین مرض درین وقت بسیار نافع است  
 لیکن بعد از سیور نمک را درین وقت از مقدار شود و قدری زیاده وین چنانکه درین نسخه نوشته شده و آما پیو که از فو  
 این جمی از عفونت و فساد خون پیدا شود و بعد ولادت عارض میگردد و گاهی ابلور بعدی یعنی از یک زن نوزائیده  
 یا یک زن نوزائیده توسط قوا بل و دیگر خدنگداران میسر شود و بیشتر میشود و هم سیکه در مرض سکا نشینا یعنی تب  
 یا تب سیر یا بعد از تب نفس چشم یا بری سلس بتلا بوده و قریب زن نوزائیده آید یا کسی از مصاحبان خدنگداران  
 بیمار آن نوزاد زن نوزائیده در ده اولی بعد ولادت آید از آن زن مذکور را بسیار بهر مرض مذکور بهر این تب پیش  
 و این جمی از بعد دفع تار و زخم میشود و اکثر از روز سوم یا چهارم شروع میگردد و استسباب سبب بعد از آن ولادت است  
 و سبب قریب آن رسیدن زهر خاص که مولد این جمی است و خون بد باشد علامات گاهی ابتداء از بروز میگردد  
 و اکثر قبل آن مرصع منضج الطبع بود و پیش قلبه خرد حساس اذیت مینمایند و در سیر این میشود و مرصع را از جیات خود  
 یاس بود و علامات نامتیری بر زبان می آید و شل اینک سیکه در این مرض زن مذکور از هم مانده و بعد از آن تب شروع میشود و  
 سبب گردد و جلد بدن یا بس بود و خون نفاس که جاری بوده بند میشود یا قلیل یا متعفن می آید و در پیشان میگردد  
 و پستان ملائم میشود و بعد چند روز از شروع شدن این جمی افعال تعفن جاری میشود و قی هم می آید و آنچه در بی خارج  
 میشود و مایل به سرخی یا سیاهی تعفن بر می آید و فی الواقع آن خون بیاض که از میو کس میبرند بعد جدا شده و سبب  
 ترشی بعد رنگ خود را از دستمال الوان دیگر بر می آید چون جمی تا نیم شود بر زبان سفیدی و مری محسوس میگردد و گاهی  
 سیاهی بر زبان دیده میشود و اما این علامت روی است و مرصع با سلامتی حواس کلام زیاده میکند و گاه گاه در اثنا  
 کلام ندان هم از آن ظاهر میگردد و گاهی بهر حرکت نبض در یک دقیقه تا یک صد و شصت بار و گاهی یک صد و پنجاه  
 بار میرسد و سیاه در آن مقیاس الحار از یک صد و دو تا یک صد و شش درجه میرسد پس هرگاه نبض تا یک صد و پنجاه  
 و یک دقیقه حرکت کند و سیاه تا یک صد و پنج یک صد و شش درجه رسد علامت روی باید است و این جمی اگر

از این است که گاهی شربت و خفت هم در آن میشود و گاهی در آن لرزه می آید بعد از حرارت حتی زیاده میگیرد و پس سیلان عرق  
شروع میشود و عرق کثیر می آید و نظام در حرارت از آن خفت ظاهر میشود و از آنکه در عرق حرارت جوش خون کم میشود  
و سیلاب از درجه از وی فروتر آید و گاهی در آن خفت نمیشود و دیگر علامات بدستور بر زیاده و شربت مانند پس عرق به جدار  
میماند تا اینکه مریضه از کثرت عرق و مهال ضعیف و کمزور میشود و این عرق تا آخر وقت حیات میماند تا اینکه مریضه بمیرد  
قرب مردن سیلاب از درجه صحت کم میگیرد و درین حین اجتماع خون در کدام عضو از اعضائی باطنیه یا ظاهره نمودن سیلاب  
مثل اینکه گاهی در دم و غشائی آید و در رحم میشود و از آن تا باز بطون رسیده در شکم عام میگردد و گاهی خاص در رحم بود  
گاهی در غشائی پهلوی و موم بپلور است و از آن ذات الجنین پیدا میشود و گاهی در دل و عضلات بدن مثل قلب و کبد و کوفه  
پیدا گردد و گاهی در و مانع و غشائی آن درم پیدا میشود و گاهی بر مفاصل استخوان دست و پا درم پیدا میشود و در آن درم  
ریم افتد و اکثر غشائی آید و در رحم درم پیدا میگردد و بالجمله چون یکی از این اقسام ظاهر شود درین وقت زیاده حال مریضه  
غریب میگردد و مریض بسیار شدید میشود و پس هرگاه درم غشائی آید یا درم رحم پیدا شود درین وقت همراه علامات مذکوره  
علامات و ارام اعضائی مذکوره هم پیدا میشود چنانچه بجای خود مذکور اند و مهال بی اختیار متواتر درین حین جاری میگردد  
و ضعف روز بروز زیاده میشود تا اینکه مریضه عاجز از تحمل میشود و در بر تبرید و بر باز میکند و نبض بسیار سریع و خفیف  
میشود و محسوس نگر و تشنج بی اختیار در جنین عضلات دست و پا پیدا میشود و گاهی آنرا قوا گویند و لفظی دیگر در سر سام مذکور  
شده اینجا هم یافته میشود و از آن گفته شود که چون درم و مانع و مخارج رسیده از آن هر دو کار خود را گذشتند و علاج  
اختلاف در علاج آن بسیار است بعضی خارج و کم کشیده و انسداد و انسداد و بعضی باقی علق و بعضی ازین انکار دارند و بر خوردن  
کیسه و انبوهی و اهرار دارند و بعضی میگویند که بخور نمایند این ایونیا کار نباشد و بارک دیگر نباید داد و برخی نوشانیدن  
روغن تارپین را نافع دانند و طایفه نوشانیدن باسی پلافیت آفلایم را باینکه سبب گریز از آن در یکایک این  
آب حل کرده و بعد از هر ساعت موافق این مقدار نوشانند بهتر است و بعضی سلفیورک ایستر را در آب مشروب میکنند  
می آید که کثرتش که در مثل نیکه از ده تا پانزده قطره در دو و آنرا آب پنجه و قشکی بجای آب ساده نوشانند  
منضمه میدهند و سبب عمل کمیاب او عفونت را از خون دفع خواهد کرد و لیکن حقیقت نیست که در جات این مریض کثیر  
هر که از اخراج دم فایده و دیده مریضه قویترش افتاده باشد اما هرگاه نبض ضعیف و مهال عرق جاری و شکم نفخ و کوفه  
ضعیف و کمزوری ظاهر بود هرگز خون بر نیارند و فصدانگیرند و آنچه علاج از همه بهتر است آنست که چون تب شروع شود  
اول مسهل قلیل دهند و مثل سلفاس یا سلفیت آن سوژا که آنرا آب حل کرده نوشانند یا فقط از آب گرم حقیقه  
و بعد آن از تخم گزنه حق آب پوسیده و سرکه بر تاشم کنند و اگر موافق قولون زیاده بود که از آن شکم نفخ و کوفه  
بود از آب گرم و روغن تارپین ترکیب کنند بعد از آن یک و گریز بقدر زیاده و کمی در روغن تارپین و فیون و کوفه

هشت تاده گریں همه را با هم آویخته از آن حب بسته موافق این مقدار بعد هر چهار ساعت بنوشانند روزانه سه بار و این  
دوا اعتماد زیاده است و ایمنی کار بناس و دیگر سنگونا یا نقوع سنگونا با هم آویخته وقت زیادتی ضعف و کمزوری نوشتا  
چون سال شدت کند آنرا بند نکنند بعضی میگویند که اینجا مسهل دهند لیکن بهتر نیست که آنچه از او تیه که قاطع سال  
نباشد بلکه قدری باز در نشل ستوری کر یا واسپریت کار فام واسپریت ایمنی ایر و شیک بنوشانند و اگر خشم  
فهم هم یار و حینه باشد برای آن از آب گرم و روغن کار بوکاک را قه و دهند تا بسبب آن رحم صاف شود و بر محل  
رحم روغن کار بوکاک ایلوث طلا سازند و در غذا اغذیه جیده بهیج المضمحل شیر و شور با می تخم تنها یا همراه نان برنج  
پخته بخوراند و هم هر عضو که با این جوی یافته شود علاج حاصل آن چنانکه در ذیل هر مرض نوشته شده فرماید و قابل را  
تخلیه کنند که هر گاه نزدیک که هم مرضیه که زخمی بود یا در قیپ سرخ یا در دم و زراع دست مبتلا بود رفته باشد بعد آن غسل کرد  
و لباس صاف پوشیده و درین روز نوزائیده آید تا که زهر بدن مرضیه و بدن صحنه سازد و این هم جوی چنان قوی و تیز است  
که اگر قابل نوزاد این مرضیه خدمت کرده بعد آن غسل کند و لباس خود تبدیل کند لیکن موی سر خود را نه تراشد بلکه بشویند  
اگر فانیاید بالفقره از آن این زهر در بدن صحنه نوزائیده شود و زهر پاشد باید که بعد از صحت این مرضیه چند ماه کار خود را  
تکرار کند تا زهر از بدنش برود و پیرستان از زهر نوزائیده را همانند و بهند که همیشه چون قابل آید دست آنرا از آب داغ  
و روغن کار بوکاک و آلیاوت ضرر و شوشید که اگر کدام زهر مرضیه در دستش بود باشد شسته شود و در بدن صحنه نوزائیده  
و هم از امراض نفسانک فیو که بهر هم و سکون لازم و کاهنا و کسیر و سکون یا می تخمانی قیج و او و سکون یا می تخمانی قیج و او  
شیر و پستان بعد ولادت عارض میشود و اکثر قاعده نیست که از بعد ولادت پستان تخم میشوند و خون در آن زیاد  
می آید زیرا که اکنون پستان عرض تخم و بهر جبین خواهند که در پس از ولادت آن قدری در و سر و حرارت تخم  
روزی سوم از ولادت میشود پس از آن شیر جایی گردد و بسبب آن جهت میشود لیکن گاهی از اختیاج خون کثیر و پستان  
و متادی شدن عروق و غده پستان روزی دوم در و سر شید و لوزه و بر و عارض میشود و جانی حرارت در جلد بدن  
زیاده میگردد و و طش مضطرب میشود و بعد آن عرق می آید و بهر عرق در و لیس هم میشود و از آن جهت که دوا العلاج  
هر گاه تب موجود بود و او تیه که جوش خون و حرارت کم میکند مثل سنگین یا سلفاس یا سلفیت آف سو و یا سلفیت  
یا زهر یا بهر قیج حاجت بنوشانند و بعد آن دوائی معرق دهند و در وقت بهتر از آنکه ایمنی یا سلفیت دوائی  
و هر گاه بسبب جگر یا بهر شیر و پستان تند و ولایت زیاد بود شیر را از پستان بهر حلیه ممکن باشد بیرون آید و بهر  
اخراج آن اگر شیش پست است پس اگر موجود نبود بول آب و لایتنی را یا بهر شیشه که قریب آن باشد از آب گرم نصف  
پیرکت را و نصف آن بخار آب گرم مانند جاده آب گرم را از آن دور کرده و بهن شیشه را بر حلیه شری نهاده آب سرد شیشه  
از نه تا از سه آب بخار که در شیشه است متکاثف و صغیر مقدار گردد و بسبب خالی شدن شیشه بخار آب گرم

در وقت پستی قابل







شود که درین رحم کشاده می شود و بعد کشاون و درین رحم غشای پر آب شق شده آب از آن خارج شود با آنکه  
حاصل ساقط خواهد شد و اگر در قلیل بود و بی در پی نیاید خون هم قدری قدری آید از آن است و میشود که در علاج تقوید  
از سقوط خواهد ماند و هم باید دانست که هرگاه در سه ماه اول سقوط شود و او هم با تمام و خود خارج میشود خون کمی  
لضعیف الخلقه بالتحسد و خوف ضرر آن کم بود اما بعد از سه ماه چون سقوط شود در آن اول چنین بر می آید پلاستیک و غیر  
در رحم مانند بعد از آن بشواری خارج شوند زیرا که درین وقت علق از رحم قوی بود و در قرب آیام ولادت چون خود از  
رحم جدا میگردد و ازین سبب به سبب ساقط خارج میشود و اینجاکمال دشواری بر می آید و در اخراج آن رحم ششج بانی قوی  
ازین سبب خون کثیر خارج میشود و سبب آن زن ضعیف گردد و گاهی پلاک شود و گاهی پلاستیک بعد سقوط بهشت و  
یا در روز در رحم متعلق میماند و غشای خود میگردد متعفن نمیشود اما اکثری بهشت که بعد از سه روز متعفن میشود و علامتش آنست که  
انچه مربوط به همراه خون می آید متعفن بود و گاهی قطعات غشای متعفن همراه خون می آید و چون متعفن شود و خوف آنست که  
زیر آن در خون مادر زخم افتد و خون پیدا کند و از آن آثار سیخ بر جلد ظاهر شوند یا دیگر اعراض پیدا شوند و علاج چنان  
علامات سقوط ظاهر شوند انتظار کنند که شاید ساقط نشود و درین وقت کم دهند که حامله بالای پانزده سالگی است  
و بانی خود را حرکت ندهد و هر سبب سقوط که یافته شود مثل اینکه اسهال باشد علاجهش نمایند و اگر شبیه بود که با شوهر  
خود هم بیشتر شود از آن منع کنند و افیون مقدار کثیر مثل دو سه گرین نوشانند یا الیکتر و سپاسی سدیوس سنی سنی قوی  
بعد نیم ساعت دو سه خوراک نوشانند تا تشنج متوقف شود و گاهی چنانچه او سپاسی یک دو سه با یک آنرا به پنج پخته شود  
زراقه در معده میسرسانند جایگزین افیون ممکن نبود و هم درین وقت نوشانیدن کلورل یا اتریتان  
بهشت گرین تانسی گرین بخورد و ساعت همراه آب بپودینه بنفشه بود و اگر در میان سه ماه حل قریب سقوط بود درین  
از نوشانیدن ادویه حار و دم نمایه بنفشه مثل پلیسپاسی ایستپاس از پنج گرین تا ده گرین همراه آب ساده یا  
با افیون محلول یک نوشانند یا مسکوک ایستپاس یا کالک ایستپاس نوشانند یا کالک ایستپاس یا افیون نوشانند  
و اگر بعد گذشتن سه ماه علامت سقوط یافته شود از نوشانیدن حایسات و نفخی مرطب نمیشود بلکه عانت بر تها  
بیشتر و با یک ارگت یا بورکس تنها یا همخوانوشانند تا در تشنج پیدا کند و بعضی از داکتران میگویند که درین وقت  
اول از روغن تاپین و آب ساده و معامی مستقیم زراقه و بنفشه و بعد از یک ارگت و بورکس نوشانند لیکن از استعمال  
ارگت که تشنج میشود از آن خون کثیر جاری میگردد و درین رحم کشاده نبود که چنین بیرون آید درین وقت تدبیری  
مفید نیست که اگر شاه گز رشته باشد از تشنج قطع نمیشود و سبب و جینه تراشیده در سر که تند تر گردد  
و جینه بر روی رحم نهد چه هرگاه در آن خون آید از آن تشنج ترشده منجم شود و خون که در آن منجم گردد از آن سخت شود  
پس سبب سر که خواست خونی خود خون را در جریان آن از رحم مانع خواهد شد و بر قسم رحم مثل در مسدود پدید آید





پسند که از آن حضرت انکاش قلم ساخته میبوسند یک ریش بگیرند و آنرا از تصرف تراشیده راس و قیچی و نیز در آن پدید  
 کرده بکمال احتیاط بجهت انکاشت بنا بر خود در رحم داخل نموده از ستریز آن غشائی چنین پاریده و پهن را تا این تدبیر را بخوبی  
 بعمل آرند و بسیار احتیاط نمایند زیرا که تا قبل ماه هفتم غمق رحم طویل میباش و بسبب این رسانیدن انکاشت و ستر قلم تا  
 غشاد دشوار بود و هم غمق رحم گاه گاه نزدیک داخل کردن قلم ببنی احتیاطی زخم میشود و اگر بعد از ماه هفتم این تدبیر کرده شود چون  
 درین وقت دهن رحم کشاده نمیشد ازین سبب بعد پاری شدن غشا و خارج شدن آب ستریز بر قلم می آید و  
 بدشواری خارج میشود و درین وقت خوف هلاکت مادر و جنین هر دو بود و اگر آب شکم مادر یا غشائی پهلوی آن یا  
 مجتمع باشد فوراً ازین تدبیر بسبب صغیر شدن رحم آرام بدارد و حامل میشود و هم آنکه انکاشت در دهن رحم انداخته میشود  
 آنرا وسیع سازند و غشائی محیط جنین را از دهن آن جدا کنند تا بکمال احتیاط تا در آن شق واقع نشود و جهت این کار  
 اول باضمای خود را تیرا کنند و چون غشا جدا شود آنرا بگیرند که در چند مدت قشج در رحم پیدا شده جنین بطور ولادت  
 طبیعی پیدا خواهد شد و سوم آنکه قلم نجی یا چوب پنبه ای که آنرا چوب گویند و زنان هندو از آن زیور ساخته در گوش خود  
 پیوسته و در آب مقدس آن خم می شود و در رحم نهند تا از رطوبت رحم تر شده و خشک گشته و دهن رحم را وسیع سازد یا چوبی  
 چرم مومی که آنرا از گاو بگیرند و آن مجری ساخته بآتش صاحب است آنرا در رحم نهند چنانکه قاشا طیر چرم مومی را  
 از پشلیت که مثل تار کهن بهای صاف و شستن آن از اندرون دران میباش خالی کرده و پیش از روشن کردن در رحم در آب  
 گرم آنرا تکرار خوب ملایم نموده و در رحم داخل کنند باین نحو که در میان دیوار رحم و غشائی پر آب رسانیده و اگر از آن  
 تا بعد مدت میسر رحم از آن متاوی شده چنانکه در دو هم از نهادن فیکله یا چوب یا سفنج در رحم یا از دادن زرقه آب  
 گرم در وجهینه روزانه سه چهار بار از ده دقیقه تا پانزده دقیقه بخوبی که صد آن بر قلم رحم رسد هم در آن تشنج پیدا میشود  
 و بعضی از آنرا که درین تدبیر میگویند که پنج دقیقه از آب سرد زرقه نموده بعد از آن ده دقیقه از آب گرم زرقه  
 نمایند تا رحم از سردی و گرمی متاوی شده تشنج پیدا کند و بپایان از تشنج آنکه آن مخصوص برای جذب شیر نیست  
 را در وقت حمل به پستان نهاده شیر را جذب کنند و مگر کشش نمایند تا از آن اذیت به پستان سبب بپدید آید  
 آن رحم متاوی شده تشنج شود و حمل ساقط گردد و ششم آنکه زنجیر برقی را بر رحم و قطران نهاده و آن از آن صفت  
 بر دو محل رسانیدن هم سقط است هفتم از همه اولی تدبیر بآتش صاحب است و آن نیست که صاحب موصوفه  
 اول قاشا طیر چرم مومی را چنانکه پیشتر شرط حال آن مذکور شد در میان دیوار رحم و غشائی پر آب می اندازند  
 تا از آن قدری قدری دهن رحم کشاده شود و قدری غشا در دهن رحم آید درین وقت غشا را شق کرده از آن  
 آب بیرون می آرند که از آن مقدار رحم صغیر گردد و پیش ازین وقت از پاره طویل بر عارضه ش میسانند و بندش محکم  
 از آن ستریز برگیرند و بالا نروند و بعد مجری ساخته خود را که ذکر آن فصل در ولادت و طبیعتی شد و هم رحم را نهند

بار بار بعد یک ساعت از آن آب در رحم میرسانند تا بسبب آن هر بار درین رحم کشاوه شود تا اینکه بقدر مقدار خروج  
چنین کشاوه شود و چنین بهبهولت پیدا گردد و در وقت چهار ساعت ازین تدبیر مقصود حاصل میشود پس چون ازین تدبیر  
مقصود حاصل نشود بذریعہ آلات مدود او را چنین را از شکم بیرون آرند پس اگر چنین لائق ولادت باشد اما بسبب بزرگی  
صغیر بودن پلوس مادر بیرون نیامده باشد یا از کمزوری رحم در ولادت تاخیر بود درین وقت طفل را از آله موسوم  
فارسی بنفش فاقه سکون الف و راسی حمله و کسر بین حمله سکون بائی موحده و بین حمله ثانی که بمعنی گیرنده است  
طفل را گرفته بیرون آرند و هرگاه چنین مرده باشد و خود بیرون نیاید درین وقت از آله ساخته حکیم قهطاط موسوم  
به ویک نیش بکسر او و سکون بائی شناهه تخانی و کاف و کسر تائی هندی و سکون بین حمله که بمعنی کشنده است چنین  
کشیده بیرون آرند و گاهی درین آله اندرون سر آن مثل کار تیر ساخته بود و از آن وقت ضرورت هرگاه چنین از بجا  
و دست و پلو بر می آید سر آنرا می بزنند و قطع میکنند تا با آسانی برگردد و گاهی برای خالی کردن چنین از آب هرگاه بسبب  
زیادتی آب سر کبیر باشد از آله کثرت و کار چنین را شق کرده از آن آب بیرون می آرند و گاهی برای آوردن دماغ از  
سر و بر آوردن ریه از سینه تا مقدار این اعضا صغیر شود بذریعہ آله موسوم به پرفر فیتر ففتح بائی موحده فارسی و سکون  
راسی حمله فاقه و کسر تائی حمله سکون بائی شناهه تخانی ففتح تائی هندی و سکون را که بمعنی ثقبه پیدا کننده است آنرا  
با احتیاط تمام در طفل داخل کرده میکشایند و از آن استخوان دماغ شکسته دماغ از آن سائل و خارج گردد و همچنین  
از آله مذکور گرفته و قطع کرده از سینه بیرون می آرند و چون بعد خارج شدن دماغ هم طفل بسبب بزرگی استخوان  
و سختی آنها و صغیر بودن پلوس بر نیاید درین وقت از آله موسوم به کمرینی شقی ففتح کاف و کسر تائی حمله و سکون بائی  
شناهه تخانی و کسر نون و سکون بائی شناهه تخانی ففتح الف و سکون تائی هندی و کسر میم و سکون بائی شناهه تخانی  
بمعنی فرسوده کننده استخوان اس استخوان کاف سر را فرسوده و باریک کرده و مثل سفوف کرده و دهنه تا ولادت آسان  
شود و قند که فصل حمل و پنجم در منج حمل بدانکه چون دانسته شود که بسبب صغیر شدن پلوس یا دیگر امراض که در طفل  
ند که رشد اندک زن حامله شود و بلاک خواهد شد درین وقت تدبیر مانع حمل بعمل آرند تا حامله نشود و اصل تدبیرش آنست که  
صحبت از شوهر خود ترک کند و اگر شوهر بزرگ قبول نکند چهار زن ممکن نباشد پس باید که در آئی که در آن گرافین بسکلی وجود  
نیباشد و آن از گذشتن یک هفته بطرف شروع میشوند و چون یک هفته در جریان حیض باقی ماند ختم میشوند پس در هفته  
اول بعد جریان حیض و در هفته آخر قبل جریان حیض از شوهر خود هم بستر نشود و در میان این دو هفته جماع جایز نیست  
اگر در آیه میکه جماع در آن برای این زن ممنوع است اتفاق صحبت شود فوراً بعد از آن آب سرد در فرج و در حینه بگریه  
از راقه چنان رسانند که تا دهن رحم رسد و هم فرج را از آب سرد بشویند زیرا که از آب سرد تنی مرد مرده میگردد و با بجای  
از راقه آب سرد و شب بمانی از نیمه ارم تا یک ارم آب سرد و حل کرده بذریعہ زرافه در فرج و در حینه رسانند یا میکا آب شیشا

فصل پنجم در منج حمل

از پنج گزین تا آن گزین و آب ساده که از دوازده تا شانزده یا بیست آونش باشد حکم ده آنرا اندر ریه زاندر و جینه تا هم  
رسات تا از آن چشم قبض و تنج شده اندر طوبیت در آن باشد آنرا از خود دفع کن و بیرون آید ایضا تا بدین  
و دیگر در ملک وراثت برای این کار مشهور است قطعه استخرا را در رشته بسته بعد از آنکه جماع در و جینه انداخته تا در هم  
میگذرانند و چون در آن میگردند که طوبیت را از هم بکشند و در رشته آنرا میکشند تا بیرون آید و کسانیکه ازین پیوسته  
هم پیوسته باشند پس بشویند و میگویند که فرقی نیست از قبل از جماع برون خود میوشانند و جماع کنند و آن وقت تا  
و کسیر را که کون یا بی شناه تخانی و هم سکون نون و کون شین مجر سکون یا بی تفرقه و کلام و سکون یا بی شناه  
فوج نامی به نامی و سکون یا بی شناه تخانی و هم سکون نون و کون شین مجر سکون یا بی تفرقه و کلام و سکون یا بی شناه  
آنرا میسازند و آن بسیار قوی و نازک کردن و پیوسته باشد که آنرا بر دگر قبل جماع میوشانند و آنرا با سطر و پیوسته  
و کسیر شود پس هرگاه مرد با چنینی که که کل برای او مضر باشد را ده جماع کند و خلاف مذکور را برود که خود میوشانند  
مشغول جماع شود و تا وقت اترال منی و خلاف مذکور را ندور در هم نرود و اگر اتفاقا جماع با اترال واقع شود و پیوسته  
انقطاع عمل پیدا شود درین صورت چون وقت جریان حیض قریب رسد قبل جریان آن شکم را در اندازد و سه روز بماند  
و او باید مدتی در حیض نماند تا حیض جاری شود که اگر همین وسیله همراه آن خارج شود و هر دو از مداخلات حیض که  
و پیوسته هرگاه اگر درین وقت حضور داده باشد که از آن در عضلات رحم نفوذ خاص خود را حاصل میشود و اگر ازین قبیل  
حیض جاری نگردد و وقتین حاصل شود و عمل مستقر شده درین وقت آنچه تا بدین برای مهتابی بین منی سابق نوشته شده  
از آنها را قبل از فتن که با بیست و یکم در امر غرض فصل اول در مرض فتن و آنهم شمل است بر پیوسته  
فصل اول در مرض فتن و آنرا برای آنکه یک یا بیشتر یا پنج یا بیست و سکون یا بی شناه تخانی و هم سکون نون و کون شین مجر سکون یا بی تفرقه و کلام و سکون یا بی شناه  
و سکون الف نامند و در وقت که یک یا بی شناه تخانی و هم سکون نون و کون شین مجر سکون یا بی تفرقه و کلام و سکون یا بی شناه  
و مانع که در کانه سر میاند و ریودل که در فضائی صاف میمانند و صاف و کینه امعا و مثانه که در فضائی شکم میمانند  
پس هرگاه ازین امکان حرکت کرده در جائی دیگر روند بران بهرینا صادق می آید زیرا که شل شاخ و دشت را جائی که  
بیرون فتنه لیکن در او در اینجا از بهرینا خاص نیست که امعا یا پیوسته بالا می امعا که موم با و پیوسته است از جائی خود  
جائی دیگر روند و چون ممکن است که این هر دو عضو در هر جا که از دیوار شکم بیرون آیند آنرا بهرینا و فتن گفته شود لیکن اگر  
نست که خروج آنها از همانجا میشود که از روی فطرت ضعیف است شل گردد و سر و یازیر عانه قریب از بیست و یکم  
هرینا نام خطی است که در آن عضو خارج میشود شل خطی معده و کبر و طحال مثانه و رحم و امعا و همه اینها خارج میشوند  
و این بنا بر آن گفته شده که در شرح احشای نوشته شده که غشائی که در اینجا که بر کل این اعضا آمده همچنین در جرم هر یک  
شده زیرا که بالائی همه پیوسته و هر یک از اعضائی مذکور درین غشا چنان میماند که گویا در خط اند و وقت خروج همه

باب بیست و یکم در امر غرض  
فصل اول در مرض فتن

هم

هر یک در خروید خاص خود که غشای مذکور است بر می آید لیکن اصطلاح اطباء چون غش میگویند اکثر مراد از آن همین  
 میباشد که امعاء یا او نیم از اجزای خود بیرون آید یا بجزه غش این خط غش جدید و قوی میباشند و در طول گاهی طویل و گاهی قصیر  
 بود لیکن اکثر طویل میباشد و بطول آن وسیع و عریض بود و چون نرسن شود این غش هم بسبب انقباض امعاء نسبت سابق  
 غلیظ و عریض میشود و گاهی بسبب غلظت غش این غلظت انقباض مواد در آن میباشد که از روم منفذ آن میسر نرود و گاهی  
 بسبب چسبیدن غشیه دیگر که در آن باشد و هم بسبب سختی مواد از اغشیه مذکور در آن غلیظ میشود و خریطه مذکور  
 غشای آبدار میباشد چنانکه پیشتر نوشته شده و صورت خریطه مذکور گاهی مدور و گاهی بشکل منفرج و گاهی طویل  
 با استداره مثل شتر خیار شبیه است و گاهی مقدارش قلیل بقدر آلوی بخار و گاهی تا مقدار سلسله انسان میباشد  
 جمیع اعضائی اندرون شکم انسان بیرون می آیند الا بکلیه سی آنرا ندیده که از محل خود خارج شده باشد زیرا که شکم آن و  
 هست و زیاده از همه معانی صغیر و از آنهم خاصه ای میم زیاده بر می آید و قولون کمتر می آید و اگر ای جمیع حاصل آن است و  
 بیسکیم است بر می آید و او نیم کمتر می آید و امعاء را لا سبب اصل سبب آن کمزوری و دیوار شکم میباشد  
 زیرا که ضعیف بود خواه ضعف طبیعی بود یا غیر طبیعی بود که بسبب امراض حاصل شده باشد مثل اینکه در جایی خاص  
 دیوار شکم مل بر آید و بسبب آن محل موصوف ضعیف شود و محل ضعیف یعنی مجری سته است که اگر چه بعد ولادت  
 مضموم و مسدود میشود لیکن التمام آن ضعیف است باونی سبب ممکن است که کشاده گردد و همچنین ثقبه که در آن غشیه  
 مردان میباشد پس آنهم اگر چه از رسن مذکور ملو و مسدود است لیکن ممکن است که از افتاد و ثقل کثیر کشاده گردد و گاهی  
 در سن طفولیت این برود مجری زیر جلد در غشای آبدار کشاده میماند و گاهی بسبب برود ثقل کثیر یا و ثوب قوی  
 یا ستر نه شری یا تر قوی خواهد بود دفع بر از باشد یا جهت ارتق بول بود چنانکه وقت تنگی مجری بول میباشد هم  
 فتق واقع میشود و هم هر گاه شخص فربه و چاق غلظت بسبب مرض لاغری و نریل گردد و بدین لاغری نشود و آنهم ضعف در  
 اعضائی آید و بسبب آن در محل سته و مجری رسن نصیه اکثر فتق واقع میشود العلامات علامت فتق است که  
 در جایی از مقامات مذکور مثل سلفه خرد یا بزرگ محسوس میشود و نیست آن بر یکی از بنیات ثلثه مذکور میباشد  
 چون مریض ایستاده شود یا سرفه یا نفس خود را حبس کند یا زور و قوت بدنی را و بر دشتن چیزی صرف کند این  
 جسم مشابه سلع در مقدار خود زیاده گردد و چون در حال نشستن یا بختی و آنرا غم کنند مقادیر آن ضعیف میشود و بسبب  
 آنکه در شکم می رود و باز چون ایستاده شود مقدارش زیاده گردد زیرا که از قیام مریض جسم مذکور از شکم زیاده بیرون  
 می آید و چون مریض بر رخت خود دراز شود جسم مذکور ناپدید میگردد و از خود یا بسبب غم کردن از ظاهر بدن شکم نرود  
 و باز وقت ایستادن ظاهر میشود و چون سرفه یا اثر سرفه در آن پیدا میشود و قدری همراه سرفه بیرون آید و سلسله  
 مثل نبض قوی دفع میکنند پس اگر در خریطه امعاء بود هرگاه انگشت بر آن نهاده احساس کنند جسم سته و سلسله

جمیع اعضائی اندرون شکم انسان بیرون می آیند الا بکلیه سی آنرا ندیده که از محل خود خارج شده باشد زیرا که شکم آن و



شود و در آن ارتفاع و انقباض نباشد چون سخن گفتند و انگشت زنت آواز می‌دهد و هم قراقران سموع میشود و چون  
چراغ در کمره تاریک پس خصیصه روشن کرده و خصیصه بنشیند اگر در معابر از نباشد مثل نزول الماء فی الخصیصه درین  
هم روشنی چراغ دیده میشود و درین وقت فتق از تنزول الماء ملتبس گردد و درین وقت بند ریخته آواز تقرقه توان کرد  
چیز در نزول الماء آواز جیم صمت خواهد آمد و در وقت نزول الماء آواز جیم ملو از هوای آید و همچون معا بود از غر  
کردن نور و شکم می‌دود با آواز قراقران چون پرده آویخته در فتق بر آید از نهادن دست در آن ارتفاع و انقباض نمی‌آید  
میشود و لیسنت آن مثل لیسنت استیج یا لیسنت آرگونم بود که باب کشرا و راخمیر کرده باشند زیرا که در آن چیزی نماند  
است و اثر غر انگشت هم بر آن میانند چون آنرا غم کرده بسوی طعن دفع کنند آهسته آهسته تبدیل می‌گردد و آواز قراقران  
همه آن نمی‌باشد مگر هرگاه امعانی خارج هم همراه آن آمده باشند درین وقت آواز قراقران سموع میشود لیکن اول  
دفعه در شکم رونده با آواز قراقران بعد از این پرده آهسته آهسته رفته رفته در شکم خواهد رفت و در اطفال فتق آواز شکم کم می‌شود  
زیرا که این پرده در ایشان بسیار ضعیف باشد و کبار البته آواز شکم در فتق ایشان آید و در جانب بسیار زیاد  
و دیده میشود زیرا که در اینجا لب این پرده زیاد بسوی تحت رفته است العلاج فتق با بر سه ششیم یکم کرده اند یکی آنکه  
الاقن قطن در شکم باشد آنرا بلغت انگشت می‌جویند نه بر نیامعنی اندرون رونده فتق گویند دوم آنکه در شکم می‌دود  
و آنرا از جوی جویند نه بر نیامعنی فتق که نه رونده یکم تدبیر در شکم باشد میگویند درین هم هم که ام در و فساد و فساد  
بیضه نمیشود نه از آن در فساد و نقصانی پیدا میشود بلکه چنانکه وقت بودن در شکم غداران فساد می‌شود و اینها  
بعضی میشود و فتق از آن خارج شده در قولون می‌رونند و دفع میشوند سوم آنکه در راه مختبس شوند نه قابلیت فتق  
در شکم دارد و نه زیر بقعه و مجری می‌آید و آنرا بلغت انگشت می‌جویند نه بر نیامعنی فتق که یکم غافرتون  
شود و درین هم گاهی قطن غداران ممکن شود لیکن دفع بر از آن ناعلمن باشد و گاهی حصول غذا هم در آن ممکن  
و درین وقت از نایابی غذا در آن فساد و موت را می‌یابد اما آنچه الاقن قطن در شکم باشد و آن تدبیری سازند که بعد  
و خل شدن در شکم باز بیرون نیاید و برای آن کمافی آهنی که مشهور است بعد و خل کردن فتق در شکم بالایی آن بنده  
لیکن درین کمافی رعایت بستن آن ضروریست پس احتیاط و رعایت ضروری آنرا فراموش نکنند الا بعد بستن آن  
اگر وقت برخواستن چون معاف و آید از اثر غم وضع کمافی نکند و متاد می‌شود و متوم خواهد شد و از آن آفات  
کثیره پدید خواهند شد پس طریقه بستن آن باشد ایضا نیست که چون از خواب بیدار شود قبل از آنکه نشیند اول معا  
در شکم خل کرده اگر حاج باشد الا نقطه کمافی نکند و را بستن پلنگ بنخیزد و مداوم کشسته یا ایستاده باشد  
نکند و را بستن الا فوراً معا باز فرو خواهد آمد اما پلنگ برای خسیپدن بر پلنگ آید بر تیر دراز شود و آنرا مان  
را کشاید برین طریقه التزم کند تا گاهی معاینه بر نیاید زیرا که از التزم این طریقه در اطفال جوانان که از سن نه تجاوز

مکروه باشد امید تو نیست که از نیامان او آید که پیش منم و شود و زیاده نفع این تدبیر مخصوص برای کسان  
 مذکور است اما کسیکه از سن و قوت تجاوز شده باشد در این منفعت مقصود نیست بلکه او را باید که مدت عمر گمانی  
 مذکور را بجهت دار و تاب بپایان آسایش آرام حال ماند و نقل زیاده نشود لیکن اگر بیمار خواهی که از قوت مأمون شوند  
 پس برای ایشان تدبیر دیگر مفید است و آن اینست که اول معاراض شکم کنند و بعد بقیه که از آن خنق خریطه می آید و دم  
 پیدا کرده و دهن را از دم مواد رنجیده و یارهای ثقیله با هم پیچیده شوند و راه سه و در و لیکن این علاج قوی باقی قوت  
 تازه و جدید بود اما هرگاه که گفته شده باشد و سبب آن خنق خریطه غلیظه و عریض شد باشد که سبب آن ثقیله بی سبب  
 گشته باشد این تدبیر هم مفید نیست و باید که درین وقت خوف نیست که در دم غشائی آید و پیدا شده و مرخصی بکند  
 گردد و اما آنچه نفع در شکم میوه و تدبیرش نیست که درین گمانی جسمی محض و خالی ساخته و خنق نهاده برینند تا آنچه خارج  
 شده در آن جسم خالی و آید و سبب آن از حد و است بیرون هم محفوظ ماند و هم آنچه خارج شد آید و زیاده از آن  
 بر نیاید و اگر گمانی مذکور موجود نباشد و امر را اینها که همیشه بران لنگ بسته باشد که از آن قتل کم محسوس گردد و قوت  
 هم زیاده نشود و اگر از شکم آید باشد بالا نرود و برای آن درین وقت گاهی از نوشیدن ایو و آب پیچاس نفع حاصل  
 میشود و سبب اینکه چربی آن بجزیب شد و از شکم خشک گشته و تدارکش ضعیف گردد و از آن وقت رسائی آن  
 کم میشود و قسم ثالث که در ثقیله محض است باشد سبب من خنق خریطه و از آن به بالا نرود و در شکم خل نشود  
 و آن چنانست که هرگاه برادر و عاقل و سبب آن خنق خریطه و سبب که در و یا مواد معارض زیاده بود و یا مواد برادر و  
 در معارض زیاده جمع شوند و سبب زیاده و قوت معارض آن معارض زیاده و سبب و عرض میشود و از آن خریطه انهم و سبب میگردد  
 پس خریطه مذکور در شکم میوه و زیرا که ثقیله که از آن این خریطه بر عاقل و بود مانع از خروج آن و شکم شود و سبب  
 بیرون ماندن معارض خون چنانکه باید آن نمیبرد آنچه که میسر باز پس معاودت تمام از آن نمیکند زیرا که  
 خنق ثقیله آن مانع میشود و برگردن خریطه کیفیت خنق و قوت طاری میباش که از آن دوران خون بند میشود  
 از بن شدن دوران خون هم در آن زیاده میگردد و سبب آن هم آب کثیر را و راجع باشد و در جسم معارض و هم  
 خریطه و در میان معارض و یار خریطه و هم در اغشیه و دیگر خصیه میزند و از رختن آن مقدار خریطه معارض خریطه خصیه  
 در آن خریطه معارض است که میسر و هم این آب خریطه معارض ثقیله که از آن این خریطه خارج شده و نیز آمده میسر  
 و از آنهم ثقیله مذکور تنگ میگردد و قوت میسر و باین سبب غشائی جید با معارض تا آنکه آنرا سبب آن  
 معارض میوه و قوت فاسد میگردد و از آن دم غشائی آید و پیدا میشود و مرضی بکند و در اعلا ماری علامت  
 این هم نیست که در ثقیله در محسوس میشود و این در چنانکه از کشیدن عرق و در حال انقباض بود و میباش  
 فی الحقیقت سبب آن کشیدن غشائی آید و پیدا شد هم این شی نازل بسوی خصیه و تدارکش زیاده و سبب

دریاده محسوس میشود و هیچ تدبیر هم نمیرود و از آن نوزاد آمدن بر سر است متعلقی و آمدن بر سر خروج ریا ح بند میگردد و از آن نوزاد  
 بر سر و ریا ح در شکم در دریاده میشود و آنچه علامت است قویج موسوم به ایلاوس یافته میشود مثل قی و انتفاخ بطن شدت  
 در شکم و آمدن بر سر در قی اینجا هم موجود بود و اندک علاج اول تدبیر داخل کردن آن شکم نمایند باین طور که ریه را  
 بر سر است متعلق خوابانند و پایی آنرا با شکم منضم سازند تا شکم سترخی شود و برشی نازل از انگشتان دست آهسته آهسته  
 اندر غمچیان سازند که آن شکم رود و اگر درین تدبیر هم در شکم سرد و مرض را در آب گرم نشاند تا بدن سترخی گردد و بعد آن  
 تدبیر موسوم به آکس نفث نامی هندی سکون الف و کاف و کسین جمله اول و سکون سین جمله ثانی که بمعنی خمر کردن  
 برشی نازل است بطوریکه آن شکم و در بار بعل آرد و اگر در شکم سرد و مرض قوی باشد و قتی که در آب گرم بود و در آن  
 گیرند و خون از شکم آید و تنی آتش بر آن نماند عشی طاری شود و بدن سترخی گردد و آن زمان فصد را بند کرده باز تکرار  
 تا شکم بعل آرد و این تدبیر قویم است و همه جا بعل آوردن آن ممکن است بالفعل بجای آن اگر کار ناموجود بود  
 آنرا بویانیده میبوش سازند تا بدن سترخی شود پس بپیرا کسین بعل آرد و اگر از نیمه فایده نشود و دانسته شود که معاد  
 زیاد است درین وقت از آله اس پیرا بپیرا را بخالانیدن سکون آید که در معاد و جذب کردن هوا از معاد بر کشند تا مقدار  
 صغیر شود و این عمده و دشوار است بعد از آن باز تدبیر تا کسین بعل آرد و اگر در معاد زیاد بود درین وقت ضیق ثقیله این  
 این خریطه بر آمده باشد از کار و کشاده خریطه را به تدبیرا کسین شکم داخل کنند اینهم عمده و دشوار است و را باید که با حقیقه  
 نام بعل آرد و اگر این قسم قریب الف از خروج و نزل باشد مثل اینکه دو سه ساعت بنزول گذرته باشد و توبت  
 پدید آید و من نرسیده باشد درین وقت بهتر است که فیون دو سه گزین نوشانند یا کار نام بویانند که بسبب آن  
 خواب ثقیل آید چه اکثر در حالت خواب خود بخوابد این معاد الا میرود و قدر که و آنچه در کتب عربیه طریقه قی ریجی فقی نامی و  
 فقی طمی در ذیل بیان فقی مذکور است مادرین کتاب آنها را در امراض خصیه نوشته اند و همچنین نوشته رادر ولادت طبعیه  
 جای که بدین چنین نوشته شده که ذکر کرده ام وقت ضرورت آن جوع کنند و قدر فصل و صم در حبه و ریا ح الا فقی  
 و آنرا بر بان انگلیزی کسین بکسری جمله فتح کاف و سکون نامی هندی و سین جمله بمعنی ج شدن مقدار ظاهر نمایند  
 و در زبان لاشن را کسین نفث را و سکون الف و کاف و فتح الف و کسرتای هندی و سکون یا می تخانه و  
 سکون سین جمله نامی و صم قفا ظاهر و اسم انگلیزی بهتر است زیرا که صم همیشه نمیشد گاهی در آخر مرض پدید میشود  
 و فی الواقع این مرض امراض اطفال است درین مرض استخوان بدن بسبب نیافتن غذای جید خاص و نرم  
 میشوند و این غذا فاسد و آلوده میماند و اگر کل است که از آن استخوان قوی میشوند پس این استخوان که میشوند خود  
 بسبب ثقل خود یا از ثقل بدن یا بسبب ثقل هوای خارجی یا بسبب کشیدن عضلات مثلاً غلظت قوه از ثقل خود که میشود  
 و استخوان قفا را از ثقل خود و از کشیدن عضلات بدن که میشوند و عظام ساق از ثقل بدن که میشوند و عظام

فصل دوم در نوزاد و راج الا...

از نقل هواج میشوند و بسبب آن عظام صدر و قفس پیش می آیند السبب سبب بعید آن ترسیدن تغذیه جثه  
 باطفال میباشد مثل اینکه طفل لبن صالح از مادر یا دایه خود نیابد بلکه عوض آن غذائی ناموافق خورانیده شود مثل اینکه  
 غذائی صالح برای طفل لبن است عوض آن اغذیه یاب که غذائی جوانان است خورانیده شود و هم از رسیدن سرد  
 بدن چنانکه اکثر اطفال کم ایگان یا بی احتیاطان را دیده شده که فصل سرد و لباس فصل گرم را میپوشانند هم از طوفان  
 زمین مکان بهم رسوائی مکان خرد که محقون و جردان بود چنان بود الا بق تصنیف خون خود صاف نباشد هم این خل  
 پیدا میشود و هم هرگاه بواسطه بیرون تاد و رات گرد مکان خراب بود و در مکان صفائی نباشد هم پیدا میشود و هم  
 کمزوری اطفال که طریقی بود و آن اکثر سبب کثرت مقدار سبب بویین میباشد چسبیب آن و هم ضعیف پیدا میشود و هم  
 هرگاه بویین ضعیف باشد یا شخ و قریب شخ باشد یا او وضعیف پیدا میشود العلل امارت قبل همه و طفل خاوت که در  
 پیدا میشود و زیاده که یک گاه گاه قدری کمی لیتن هم میشود و چون خواب بر پیشانی عرق می آید چون طفل را در کتاف  
 گیرند که می کنند و از آن استه میشود که در فاصل یا عظام بدن آن جائی در میشود که از بر دشمن زیاده میگردد و اینجا  
 چند هفته یا چند ماه مانده بعد آن قدری کم شخ گردد و گاه گاه دست مشابه با سمال که در بدنی یا پیش آن می آید  
 مقدار فاصل قدری زیاده و پُر در محسوس میشود و چون طفل نهوض و قیام کند حرکت استخوان ساقین مقوس  
 معلوم میشوند و هر دو از آن وقت قیام از خود و در شین و ریا و متقل که در تدریج آن عظام صدر و بویین است و در  
 و از آن صدر و عرض خود کم میگردد و همچنین استخوان ضلع هم متغیر میشود و عظم قفس پیشانی آید و قاعه و ظاهر و جانب  
 یا جانب بویین یا جانب بسیار مخفی میشوند و درین وقت از بران انگیزی منحنی بر پشت یکسر بای می موده و از روی  
 یا می شنای تختانی فتح چیم و کون و کسریای موده و کسریای موده و سکون یا می تختانی وین موده و یا می موده  
 بعضی سینه که بقره انسان و فقاظر گاهی قریب که بسوی قدام که وایل میشود و بسبب آن نخاع متغیر میشود و از آن  
 تهر خائی جلین یا ضعف حرکات نهایی میگردد و موافق انما رخاع و گاهی مقدار اس فی الحقیقت زیاده میشود  
 و گاهی زیاده بود لیکن زیاده دیده میشود بسبب آنکه استخوان پیشانی زیاده عرض میشود و پیشان درخشان زیاده میشود  
 و جز زیاده صغیر میگردد و پس بنسبت و چه چون مقدار بزرگ زیاده دیده میشود و آن حکم یکسره بودن سر کرده میشود و در  
 صاحب این مرض فاسطه آفلا نیم زیاده خارج میگردد و بسبب آن گاهی در شان این اطفال مرضی جبریدا میشود  
 با لکمه باید دانست که اینجا علامات مرض کامل نوشته شده اند لیکن گاهی مرض تا این حد نفیر رسیده که بعضی شکایات  
 پیدا شده از علاج دفع میشود مثل اینکه تفتح شکم سیاه و علاج صحت میشود و یا در عظام ساقین مقوس پیدا شده و فتح  
 میگردد و یا متوقف میشود و گاهی استخوان صدری شده و استخوان قفس برآمده باین حد میرسد که از آن در تنه شاق شوری  
 میشود و دل از جانب بسیار که در جانب بویین می آید و باز مرض متوقف میشود و این حد و بوی آن در عظام قوت می آید

مریض بر همین حیث باقی مانده تا مدت دراز زنده میماند و این نیک بخامی این مرض است و گاهی بیانی که شدن عظم  
اسهال بکثرت جاری میشود و نمیگیرد و هر روز شدت میکند و سر آب کثیر پیدا گردد و از آن بهیر و یا زنده زنده زود  
ضعف کمتری زیاد شود و لاغری بنفعل و بسبب آن بهیر و یا در اشکائی زیادتی ضعف که امراض شل برنگاشتن  
یا سبب پیدا میشود و از آن بهیر و این بد بخامی این مرض است العلاج اول زیادہ عتبات سومی غذائی طفل نمایند  
شل اینک شیر صالح در غذایش دارند و اگر طفل ضعیف باشد باید که تا ده ماه یا دو تا ده ماه شیر مادر یا دانه خود بنوشد و اگر شیر  
بیشتر نشود تا این مدت شیر مادہ فرساده یا شیر بر یا شیر گاؤ همراه آب ساده یا آب گاو بنوشاند و چون طفل یک ساله شود  
همراه شیر آرد و یا ساگو دانه یا شیشی کوک یا آب مطبوخ انگلش پرن یا کازنی یا کازنی غلاویشی میدہ جوار کلان که در امریکا  
ساخته میشود یا اینک شش نو و غیره همراه شیر یا تنها همراه آب و نبات درست کرده بنوشاند و شیر آب مطبوخ انگلش  
پرن یا کازنی هر دو با لذت خاصه نوشانیدن بهتر است و چون عمر طفل از پانزده ماه تا دو سال رسد گاه بانهوشانیدن  
شیر شور با کمی نمک و نمک یا با قاری نان گندم یا بونج خیمه بخوراند لیکن شیر و آب است که آنچه بخورد و آن شیر و آب است  
غذائی دیگر بخوراند و اگر بعد از آن مرض قدری باقیماند شیر تا ده سال زیادہ در غذای بنفشه دیگر نوشاند و زیاد  
شیر در غذای اطفال تا ده سال از آن خدیه دیگر بهتر است و بعد از آن که جلد بدن طفل را از مالیدن شستن صاف  
تا جلد خوبی کار شود و بعد از فصل سرما لباس جاد بنوشاند خصوصاً خاها را و با لاسق بدن بنوشانیدن بهتر است و در مکان  
یاسی هوادر شستن ضرور است و اگر گرمی مرضی تمام سفر یا اسهال پیش موجود بود علاجه بطوریکه برای هر یک شیر  
شد عمل آرد و خاص برای این مرض پاشش یک فنون و زده قطره تا دو سال و بعد از آن پنج قطره از آن بحال  
هر سال همراه آب ساده حل کرده بعد از غذا نوشانیدن بسیار مفید است و چون آتخوان هر دو راقوت میدہ و هر گاه شکم  
تشنه شود کاشیم میو یا س پیوزان پنج گرتا ده گرتا همراه آب ساده حل کرده نوشانیدن روزانه سه بار بهتر است و هم  
نوشانیدن غن جگر را ہی مقدار قلیل بعد از غذا برای طفل بسیار مفید است هر گاه اسهال فساد معده نباشد و مرکبات پیش  
نیکو شیل فیری سلفاس فیری ایست کنین یا شراس نمک یا یا کنین نوشانیدن مفید است و هر گاه ضرورت داند  
مسبل باین طفل شود و روبر با تفویج سنایار و غن بیا بنیم با حلقه مسبل گرم جنب است و ایند و از مسبلات بار و  
مثل سنگین شیا و غیره جنبان نمایند که آنرا از خون نیست را کشید و خون ضعف و کمتری پیدا میکنند و هم از زده  
مسبل یا غیر مسبل که در آن سیلاب باشد شل میشد راج مگر یثا از زده بند و اول آنرا حلیم و اندازد اگر اینست آتخوان  
را نرم میکنند و هر چه پیر از اشیا می ماکول یا فصد که طفل بخوابش خود طلب کند اگر آن چیز با فایده باشد شل شیر یا دانه  
و اگر زیادہ فایده نباشد لیکن آن قسم طعام بود آنرا هم قدری بدیند تا بسبب شوق و رغبت بی آنرا خوبی قبول و هم  
کند از خوردن ماکول مرغوب آن قوت یزد و هر آتخوان کج شد باشد بر آن کمافی موافق آتخوان مذکور بنشیند تا از آن

تا ده سال در غذای اطفال شیر زیاد باید داد



بسیار مفید است فصد که فصل چهارم در دوا می و آنرا بلفظ لاش و آن گیس و در زبان انگریزی و آنرا کویس و آنرا کویس می نامند  
یعنی خمدار و پیر که شدن و دیدنی الواقع این مرض وید است که در آن وید در طول و عرض خود زیاده میشود و شش  
آن بسبب قتل زاید که از داخل شدن خون کثیر در آن میشود زیاده میم و درین میگرد و تا خود را از انشقاق محفوظ دارد و در  
اینکه در طول خود وید زیاده میشود و انداختن مثل زقار را و پیر که شده طول خود را کم میکند در طول اساق و غیره میباشد  
باید دانست که در وید جسمی مدور و رقیق غشائی با جوهر از غشائی و خلی آن رسته در عرض وید میباشد این جسم در وید  
گاهی بعد یک یا پنج و گاهی بعد دو یا پنج و گاهی در فاصله یک یا پنج و دو و از آن اندرون وید میباشد آنرا نیز زبان  
انگریزی و آنرا فیتج و او و سکون الی لام و فاما مندرجی بنکند مجری و این جسم مدور رقیق از یک جانب متصل به  
وید میباشد و از جانب دیگر جدا بود و هرگاه خون در وید جدا شده بقلب میرود این جسم از مجری وید جدا شده  
و بر پوسته پدیدوار آن متصل میشود و چون دم بالا رود باز بر جای ماندن خود می افتد و از باز پس آمدن خون  
از اعلی با سفلی مانع میگردد و چون وید درین مرض وسیع و زیاده عریض میشود این بسبب کوچکی خود بسیار میگردد و  
پدیدارهای وید نیز پس از این سبب راه وید را که زیاده عریض شده بنده میکند و انداختن حکمت آنست که مقتضی شده درین  
وید خمدار مثل زقار را که در وید مانع و کبی آن کار و الی لام و مادام که این مرض زیاده نشود از آن نقصان اذیت نمیرساند  
هرگاه زیاده میشود پس از آن غشائی وید متورم میگردد و دو یا پنج خون در خم و کبی آن باشد بخیزد از آنهم و دم بسیار میشود  
پس از آنکه در دوران خون و دم از دم آب کثیر جدا شده در غشائی خانه و در مجمع میگردد و در آن در جلد و دم زیاده  
مقدار بسیار میشود و درین دم درخشندگی و در زیاده میباشد این دم شق میگردد و در آن خم پیدا میشود و گاهی  
بسبب آن وید شق میشود و خون کثیر از آن جاری میگردد و ممکن است که این مرض در هر وید یا از او بدین حادثه  
لیکن اکثر وید که در حلیین است و خون از اعلی بدن گرفته بقلب میرساند پدید میشود و همچنین وید که در کبیر و کبیر  
و در وید که در حلیین آمده و در او را ویکه در غشائی خانه و از زیر کوس میبرن معاشی میم که در وید و پیش درین  
معاشی مذکور در آخر آن هستند هم میشود و بواسطه حقیقی همین است السبب آنچه خون را از قفس میبوی قلب مانع  
گردد و سبب این مرض میشود مثل امراض جگر و امراض طحال و قفس و غیره که درین سبب آن و زیاده قفس شکم  
کثرت مشقت و خالی و زیاده قفس قیام چنانچه پیش ملوک میباشد که از آن هم خون کثیر در ریل می آید و گاهی استعداد و خانه  
هم سبب آن میشود و سبب آن حلیین در خلقت خود ضعیف میباشد و گاهی بخیف و کمزوری دیوار وید دیگر افتاد  
نشود چنانکه حال شخص طویل القامت کسی که اعضائی شان خلقی سترخ و ضعیف بوده و ضعیف یعنی نرا جان میباشد  
وید میشود و گاهی بسبب عمر هم پدید میآید و هر تا بیست سال گذشته از آن بعد از آن تا چهل یا پنجاه سال  
زیاده شود که در وید آن با کثرت امراض میشود زیرا که درین وقت خون کم پیدا میگردد و هم مشقت کم کرده میشود و در وید



اگرستان و هر جا که عوارض زیاد شدت میکنند عوارض را به نسبت مردان این مرض زیاد میشود و در هندوستان  
 خلافت آن دیده شده علامات در هر ورید که این مرض پیدا شود در طول و عرض آن زیادتی و کمی و خم محسوس میگردد  
 و در خارج اکثر رنگ رخوانی ظاهر بود و مثل عقود که باد و باشند در آنجا دیده میشوند و در هر هم معلوم میشود و بسبب سختی آن  
 و گاهی بسبب هم ورید و سختی آن زبان در غشائی خانه دار تمام محل قائم متورم میشوند و از آن محل فقیل ضعیف  
 گردد و بسبب آن راه رفتن دشوار باشد و اینحال گاهی تا مدت دراز میماند و گاهی بعد چندی جای که ورم و غشود و در  
 اندام متشنج یعنی ورم حاد پیدا میشود و از آن در جلد برآمدگی و توده و درخندگی در و شدید لمس پیدا میگردد و در آن  
 عقبه پیدا شده و از آن هم جاری گشته و هم میگرد و در این زخم خود را بیل میشود و از زیاد شدت زیاد راه رفتن یافده  
 و از سکون راحت کم میشود و گاهی بسبب سکاقت ورید خون کثیر از آن جاری میشود و العلاج اولی مخصوص بسبب سکاقت  
 باز آله آن کوشند مثلاً اگر زن حامله باشد و طبع آن قبض بود و سهل موافق داده دفع قبض سازند و با ارم مرض را  
 بر پانک آشتن هم مفید است لیکن چونکه این علاج بر مرد و زن و کم و بیهوده ممکن نیست لهذا باید که یا چرم و حی بر محل بنهد  
 و یا خف چرم و حی یعنی سوزن را بر پائی مرض پوشانند و اگر کند که همیشه از پوشیده باشد و اگر اندک هم سوزش و یا خف  
 طولی صاف بر پانند بخوبی که غمزه برش هر جا مساوی باشد چنانچه سوزش و جانی خف نباشد و الا از آن نقصان پیدا  
 نخواهد شد و اگر در وادیت زیاد بود درین وقت بتدایر جراحی تدارک نمایند و یکی از آن نیست که کار و بار یک روز در خانه  
 و خل کرده تا ورید متورم رسانند پس از سر کار و در ویر از وسط آن قطع کنند تا در جهت طولی خود جدا گردد و بعد از آن  
 چون خون از آن جاری گردد و بر پائی بند کردن آن بر جلد بدن بالائی ورید و قطوع شئی فقیل نهاده بر بندند تا بسبب  
 تخم آن ورم در پانند شود و بعد از آن هم پانند خواهد شد و از آن راه آمدن خون بند خواهد شد و هم آنکه قدری جلد را  
 کشاده و ورید را از جناره گرفته و پیچ داده کشید و قطع از آن از هر دو جانب جدا کرده و پانند تا سر پای ورید بکوت و قطوع و پیچ  
 شده چون در تخم بجائی خود روند از تخم هم پانند تا بند شوند و این عمل را بر اسل الحرق در عربی نامند و این هر دو تدبیر و نکات  
 قیوم اند و هم عمل سوزنی است که آنرا بالفعل و مستکاران انگلش میکنند و آن نیست که سوزن کلان را در جلد انداخته  
 از زیر ورید متورم گذرانند باز از جلد برآید بخوبی که در ورید برسد علامت سیدن آن ورید بر آمدن خون است پس اگر  
 بعد از آن کردن سوزن خون بند آید و سوزن را کشیده و در موضع دیگر که قدری بالائی موضع اول باشد و در جلد انداخته  
 از زیر ورید گذرانند از جلد بیرون آید بعد از آن چرم و حی بر جلد بپوشانند و از سوزن نهاده از شدت ششی با بر و  
 سوزن مضبوط بر بندند تا در چند روز راه آمدن خون مسدود شده و ورید بیکار گردد و خون از او را دیگر قلب و در چنان  
 کاشک پلاس و حقه که آنجا نباشد دیده سه جگه که فته در آن سپردن وین قدری بیایند تا مثل خمیر شود پس آنرا جابجا بپوشانند  
 و ورید متورم بر جلد بدن قدری از آن نهاده بر بندند که از آن بر محل نهاده آن در غشائی خانه و در ورم پیدا میشود

از آن خون که در ورید است بجهت دیگر در وریدش رسد بیکار میشود و پنجم آنکه هرگاه دوائی بمرقود و بود درین وقت و مقصود  
آن بدریغ ز راقه سوختنی در هر عقده سه قطره بچسبند و شش آنرا از آنکه از آن خون بجهت شده و رسم پیدا میشود و از آن  
و رسم راه آمدن خون بند میگردد و در وریدش رسد بیکار میشود و در هر جا که در ورید و قعر این مرض بود علاج آن در علاج  
بواسیر مذکور شده و هر جا که در ورید حبل الانشین بود و علاجش هم در مرض حبل الانشین نوشته شده و اگر در دوائی  
از هم در ساق پیدا شده باشد درین وقت مرعین را بر لنگ بچسبی و از آنکه پاهائی آن بلند باشند تا خون بسوی قلب  
بسهولت رود و ادویه قابضه که دهن عروق را تنگ کنند مثل مرهم لمبائی ایسیئاس یا مرهم اوکسائیث آف نیک  
بر آن نماده بر بندند و گاهی بلند ساختن پاها و بستن ساقها تنها کافی میشود و حاجت با ویتنر سزیر اگر از آنهم  
سبب میشود و چون خون از جهم جاری شود پاها بلند دارند و پاچه صاف خشک چند تا کرده بر آن نماده بر بندند و  
چون علاج شروع شود تا حصول صحت نماند باید که مرعین آبارام بر لنگ اند و همچو نه حرکت نکند و پیاده نرود و  
بعد حصول صحت علاج تندرستی نمایند بخور ایندین غذیه جیده و نوشانیدن دویه مقویه چنانکه کمتر نوشته شده و قند کر  
فصل پنجم در دوا الفیل و آنرا بران لاشن طیفان نامی اینز عجم کسره نمره و سکون یائی تخمائی و کسره سکون  
یائی تخمائی شناه و فتح فاو سکون الف و نون و فتح تائی هندی و سکون الف و کسره یائی شناه تخمائی فتح نمره و سکون  
یائی شناه تخمائی و کسره ای محمول و سکون زائی مجمائی و فتح عین و سکون رائی حمله و فتح یائی موحده و سکون هم  
یعنی فیل یائی عرب سزیر اگر اول این مرض در عربستان دیده شده و این مرض در ساکنین قریب بحر و چاه  
طوبت زیاده بود و اکثر پیدا شود و چون که اکثر در این مرض دیده میشود لهذا الفیل یا نام کرده شده و حد و شان  
در دیگر اعضا هم مثل جبهه و صدر و بطنین هم ممکن است بلکه در یک بگانه در بطنین زیاده میشود و چون این مرض کم  
فرمن شود یائی مرض زیاده ضخیم و غلیظ میشود و بالائی آن خشونت کثریا باشد یعنی در جایی از جلد ساق ارتفاع و  
جای انخفاض زیاده میباشد هم سیاهی و غلبه چنانکه بر پائی فیل میباشد و پائی این مرض هم باشد لهذا الفیل  
و فیل یا نام کرده شده و همیشه این مرض نیست که آنچه غده و موسوم در لغت انگلیزی به لم فاک گلا ناکر که سکون  
سیوم فتح فاو سکون الف و کسره ای هندی و سکون کاف کسره کاف فارسی فتح لام و سکون الف و نون و دال محمله و کسره  
در بدن اند و بر این عرب آنرا محوم غده نامند و ما و اینها زیر جلد و غشائی خانه واریا باشند و در بطن قریب  
این محسوس میشود و درین غده با مجاری آب بنده از اعضا و نسل میشوند و این مجاری هم در جمله بدن مثل او  
منتشر اند و کار اینها آنست که از جمیع اعضا بعد از آنکه هر یک غشائی خود از خون بگیرد و آنرا می کنند پس بعد از آن  
آنچه نیستند از این حاجت در اعضا میماند از آن اعضا که در میسرند و تا قریب ترقوه رسانیده این آب را در ورید  
قریب ترقوه است میریزند تا با جمل این مجاری در این غده داخل شده و گردش کرده از آنجا خارج شده بالا و

فصل پنجم در دوا الفیل

چون اینست که از تلبین گرفته بالا میرود اول آب در مجاری مذکوره درین غده باو حل شده باز در غده جاری  
موصوفه بالا میرود و چون درین غده با یکدیگر سبب چنین حالت پیدا شود که از جریان آب مانع شوند درین وقت آب غده  
در مجاری آب بریده جمع میماند پس از غشائی مجاری مذکوره آب رخنه در غشائی خانه در جمع میگرد و بسبب این غشائی  
خانه در غلیظ و قوی میشود و از آن مقدار اساق و قوام غلیظ و کثیر المقدار دیده میشود و التسبب اصل سبب آن حال  
محقق نشده لیکن از زیاده حادث شدن آن در کاب ملو و نباتت میشود که شاید بواسطه طب را هم در احداث آن اثر  
باشد تا در اکثر کتب این صاحب بزرگوار آورده بین در خون این مرض و هم یکسکه در بول آن کیلوس می آید و بعد گذشتن از  
بیشتر بل با در بول نیز میشود که کما کما شل شده موصوفه را دیده اند و این کرم در جسم انسان حیوان هم پیدا میشود و آنرا  
بخت لاشن غلیظ است که در کتب این صاحب گویا میگوید که در مشابیه غلیظ ابیض که در خون انسان پیدا میشود و شاید کرم هم  
در غده های موصوفه پیدا شود و از آن ورم متولد شده مجاری مذکوره را از برون آب مانع شود باشد العلماء  
حدوث آن بر دو قسم است یکی آنکه زیادتی مقدار اساق با ورم حار پیدا میشود و همراه آن تب هم میباشد گاهی حادث  
و گاهی یقیناً هم این ورم حار که در مجاری آب برنده غشائی آنرا بسیار شد و اثر این ورم تا برینه میرسد که آن محل  
غده های موصوفه است و گاهی این ورم حار که در او وارد یافته میشود و بعد دو سه روز همی دور و که بسبب ورم حار پیدا میشود  
زایل میشود اما مقدار اساق پائین قدری سابق کم شده بر حال خود میماند و بعد چند روز باز ورم حار و در دو سه  
میکن و شل سابق بعد دو سه روز بطرف شد و زیادتی مقدار اساق قدری از سابق زیاده شده باقی میماند و چنین هر دو  
قدری مقدار زیاده میشود و تا آنکه مقدار اساق پائین فیصل میسر گردد و اگر در کتب صمدیه این مرض پیدا شود پس سبب آن  
مقدار زیادتی آن تا یک نیم من میرسد و هم آنست که در آن جی ورم حار و در دو سه روز و بلکه آهسته آهسته مقدار زیاده  
میگردد و تا که بسی غلیظ شل پائین فیصل میشود و گاهی با ورم و کثیر المقدار شده بر مقدار زیاد خود متوقف میشوند و از آن  
زیاده نگردد و همیشه درین مقدار میماند و این امر خاصه بجای میشود که جلد باهاش شده از آن آب جاری شود و گاهی  
درین مرض وانه با می خورد و بزرگ بر اساق ظاهر میشوند و گاهی بر جلد اساق جابجا ارتفاع و انخفاض قلسه پدید میآید  
و در میان ارتفاع و انخفاض جلد زخم پیدا میگرد و درین مرض مادام که مقدار پائین زیاده غلیظ نباشد و هم در ورمی  
در آن نبوده چنانکه قوی میباشد که در بعضی از آن شکایت نماید اما چون جی ورم و در پیدا شوند از آن برود و ضعیف میگردد  
و همچنین چون زخم پیدا شده از آن خون ورم جاری شود و از آن در خون کثوری پیدا میشود و درین مرض بسیار  
تفاوت است که در آن جی بسبب ورم میباشد یا از آن ورم پیدا میشود لیکن آنست که جی بسبب ورم حار میشود  
و از زایل شدن آن زایل میگردد و نه اینکه ورم بسبب جی میشود و زیرا که ورم و زیادتی مقدار در آن اکثر میباشد اما جی خود  
پس جی غیر مرض نیست العلل هر گاه جی موجود باشد مسلماً بار که در خون آب بود و نشانه مرض را با کرم بالایی

و از آنجمله که پاهای آن بلند ماند و بر ساق متوم آن در سر که آب حله کرده یا تنها آب سرد یا در آبیکه ایونیا میگویند  
 و آن محال است که پاره پاره صاف تر کرده بر ساق نهاده بر نبندد و چون ورم حار زایل شود و زیاده ای مقدار باقی ماند قابل  
 عروق حلی بروم نبندش کنند و اگر چه مومی بر آن نهاده نبندش کنند بهتر بود چه بسبب غمزه برش مذکور مقدار ساق  
 میشود و از ادویه مالیده میوریتان ایونیا و کالشی میوریا س پوراز هر واحد جدا جدا آب ساده حله کرده مقدار این  
 از آن بنوشانند و آنچه نفع آن ظاهر شود بر بنوشانیدن آن اصرار و مداومت نمایند اعمال جراحی وقت ضرورت بعمل آید  
 مثل اینکه شریان کبیر از شکم پائیده در جلین خون از قلب حلی رد و قریب شکم سر آنرا بر نبندند تا خون در جلین کم آید و از  
 نرسیدن غذا مقدار آن کم شود و گاهی شریان مذکور را نبندند بیکند لیکن از خارج بر آن کمافی نهاده می بندند که بسبب  
 متغیر شدن شریان خون در پا کم آید لیکن هر دو تدبیر موزنی اند مرض تحمل آن نمیشود اما چون بحسب تجربه ظاهر شود  
 هرگاه در آن جلد ساق شق شده از آن آب جاری میشود مرض متوقف میگردد و اندک آن خود جلد ساق شق نشود از سر  
 کار و نازک جدا جدا در طول جلد ساق را قدری قدری شق کرده و بنبندند تا از آن آب جاری شده زیاده ای مرض متوقف  
 شود و از تبدیل هوای بلند و مسکن هم درین مرض منفعت حاصل میشود چه در آنهم از آنکه سبب است موافق مشابه  
 و اکثر گوشت صاحب راسی بنای شتاد علامه نیست که دو سه هفته این طریض را سا شو تا این مقدار خلیل شل نسیم  
 گرین روزانه سه بار یک بر هفته بنوشانند تا که کم مذکور که در خون است میرسد و بعد از این وقت شپاس یا کالشی میوریا  
 پیور چند روز بعد از آن بنوشانند تا غده پاهای مذکوره صاف شوند و آنچه خواهد در آن بوده باشد بفرستند این ادویه در خون  
 داخل نشود و ورم غده بطرف شده چنانکه آب در مجاری خود جاری میشود جاری گردد و قند که باب است  
 دوم در اوجاع اعضائی طریقه و انتم شامل است بر چند فصل فصل اول در رواییم هم  
 بنظم راسی هله و سکون و او قیوم سکون لاف و کثیری هندی و سکون یائی مثانه تحتانی و قیوم راسی هم سکون  
 میم و این اسم قدیم است که از لغت که یک گفته شده و معنی آن جریان آب است در بدن که از آن این مرض در فصل  
 پیدا میشود اما آنچه در تحقیق عالیه است شت است که چیزی و خون پیدا شده محدث این مرض میگردد و بسبب این خون  
 حال طبیعی خود متوقف شد و غیر طبیعی میگردد و در آن فاسدین زیاد پیدا میشود و در خون جوش و حدت زیاد میگردد  
 و بسبب این ورم اعضا پیدا میشود و خصوصاً غشائی ریشه دارد که بالائی عضلات بالائی مفصل و در زیر قلب است  
 ورم زیاد حادث میشود و سبب بیحد فساد خاص خون است که مذکور شد و سبب قریب آن اکثر سبب  
 سردی و تری بر بدن میباشد و گاهی بسبب کم خوردن غذا و نه پوشیدن لباس موافق فصل میباشد چنانکه در کم  
 یایگان و سردی و دینه میشود و گاهی بسبب اثر خاندان و گاهی بعد از آنکه هم حاضر میشود و این مرض بیشتر است  
 اکیوت یعنی حاد و سبب اکیوت یعنی حاد و مزمن که از آنیک یعنی مزمن و خفیف الاعراض و هم حاد این مرض در بنده وستان

باب بیست دوم در اوجاع اعضائی طریقه

فصل اول در رواییم

حالی

عارض میشود و در ملک بار و جانی که صدمی و بارش باران زیاد میشود و شل کوهستان زیاد حادث میشود و باطله  
 قسطی که آن نام کرده میشود و بر دماغ نیزم کیوت یا و انگشت قیوت و العلامات اکثر قبل از دیگر اعراض و بدن آفت  
 محسوس میشود پس جمعی می آید و بعد از ساعت و چهار ساعت در بعضی مفاصل یا در جمیع مفاصل بدن قاری در دست  
 محسوس میشود که از آن در حرکت دشواری راه یابد و بعد از آن جمعی قوی و دیگر که در دو در اعضا شدت راه با آنکه متعین  
 نمیشود که کسی مفصل انگشت ندارد یا چادر اندازد پس بعد مفاصل هم و سرخی ظاهر میشود و در حرکت آسان مطلقا دشوار گردد و دیگر  
 اگر کسی پلنگه ترا حرکت دهد آنهم ستاوی شده فریاد میکنند و بر چهره سفید پوستان سرخی نمودار شود چنانکه در تب سینه  
 می باشد و جلد بدن گرم و عرق آلوده و لیکن از آمدن عرق تب کم نمیشود و از عرق بوی حامض می آید زیرا که در وقت این  
 ترشی زیاد می باشد و بزبان سفیدی و در سفیدی رنگ شکستگی می بیند بود و طبع قبض باشد چون آنکه قبض  
 را در بغل بیمار زنده همچنان جوش خون کنند سیاه همیشه از صدر در جبهه زیاد می باشد و گاهی تا یک صد و پنج درجه میرسد  
 بیمار که سبب جوش خون در آن میرسد در آن سیاه از یک صد و نه درجه تا یک صد و ده درجه میرسد و چون باین حد رسید  
 باید که در مرض خواب در تشنگی درین مرض بسیار غالب می باشد بول قطعات می آید بعد از دشتن ببول و غیره  
 یا بول کثیف یا هر دو مجتمع شده نه نشین میشوند و این حالت تا ده و دوازده روز مانده بعد از آن در شریات اعراض خفت ظاهر  
 میشود و گاهی تا یک ماه برابر اعراض شدید می مانند و گاهی بعد از احوال شریات اعراض باز در آن شدت ظاهر میشود و گاهی  
 در دو روز مفصل میشود و بعد از چند روز آنرا که رفته در مفصل و دیگر ظاهر و شدید میگردد و گاهی از مفاصل غشای  
 میرسد و این خطرناک است الحلاج گاهی این مرض خود به زایل میشود و بدون علاج چنانکه جدی و دامیل اکثر مر  
 خود صحیح میشوند و اکثر اشخاص بر این اختلاف و عائی نفع درین مرض مینمایند چنانچه کسی میگوید که ازین تدبیر صحت شد  
 میدانند که این تدبیر نافع افتاد و ممکن است که خود مرض زایل شده باشد چنانکه در کتب عربیه بر فصد درین مرض اعتماد  
 زیاد است لیکن از فصد فایسرن در خون زیاد میشود پس چگونه تا بلی نفع آن باید شد و این تدبیر بر آن اعتماد نشاید  
 چه ممکن است که از گذشتن مدت یک یا دو روز صحیح شود چنانچه خطی حکیم کامل سوال کرد که کدام تدبیر برای روایتی مرام  
 همه نفع است حکیم بعد تا بلی فرمود که گذشتن شش هفته از همه نفع است اما آنچه قابل اعتماد اندر همان تدبیر نیست که  
 اکثر اشخاص نفع آن برابر ظاهر شده و از استعمال آنها در یک هفته یا دو هفته صحت میشود و محتاج بگذشتن شش هفته  
 نباشد و یکی از آنها نیست که قدری فرد و در مفصل در دمنده و چنین قدری بالا از آن پلاشته از مردم گشتن سوخته  
 درست ساخته اند و احتیاط نمایند که خاص مفصل این و آن رسد و بعد پیدایش آن باده نوزاد است و در دفع میشوند و نفع  
 میگردد و ویناس یا بی کار بناس از ریشته گریخته گریه هم را آب ساده حل کرده شب روز بعد سه یا چهار ساعت  
 موافق این مقدار نوشانی این دوا را چندان بپزند که از عرق بوی حامض بر طرف گردد و گاهی ازین تدبیر و چنانچه

صحت میشود و اعراض زایل میشوند بعضی اطمینانی خداوند میگوید که از نبوشانیدن پنجاه گوناگونی هم نبوشانیدن  
پنجاه گوناگونی کار بناس موافق درین سابق نبودی صحت میشود و فی الواقع پنجاه گوناگونی جوش خون را جلد میسوزاند  
و اکثر آن میگوید که پنجاه گوناگونی را از نیم آونش تا یک آونش گرفته همراه شجوی قوی حلقه بجا می آید هر قدر که طلب کند  
نبوشانند تا در وقت چهار ساعتین قدر دوا می نگیرد و بدن داخل شود از آن برای رفع جمعی درد بسیار نفع دیده شده  
ایضا که اول مسهل و بعد از آن یک لوله که در مقدار پنج گریه تا هشت گریه باشد از آب سفوف جلیپاده که پانزده گریه باشد  
یا همراه سفوف جلیپ که پانزده گریه تا یک گرم باشد آغشته همراه آب ساده نبوشانند و بعد از آن موافق این سخن  
هر روز اول صبح و خلاصی معده و نبوشانند تا یکبار بغیر عفت سه سال باشد صفت مشکینشیا سافاس کنیم  
درم مشکینشیا کار بناس نیم درم و نیم کاشیک نیم درم و نیم جله را آب پودینه که دو آونش بود حلقه نبوشانند و بعد از آن  
از سه سال و دو درم پودر اینچ گریه تا هشت گریه گرفته همراه پنجاه گریه که ده گریه باشد همراه آب ساده بجا می آید  
ساعت نبوشانند و عرض آن فیون ساده خالص و گریه آب حلقه صاف نموده بلا دوا و ناسو هم حلقه گریه محلول با  
ساده آن آغشته بعد چهار ساعت نبوشانند که از آنهم در دو درم کم خواهد شد ایضا که سو داسالی سلک از شب  
گریه تا چهل گریه همراه آب ساده حلقه بعد دو ساعت نبوشانند جوش خون و در و نبودی رفع گردد و اگر عرض  
سالی سلک ایستاده از ده گریه تا پانزده گریه و سو داکا کار بناس زده گریه تا شب گریه آن آغشته همراه آب ساده  
بعد چهار ساعت نبوشانند یا سالی سلک ایستاده موافق درین سابق و ایونیا کار بناس نصف زن سالی سلک  
گرفته هر دو را همراه آب ساده بعد چهار ساعت نبوشانند مفید خواهد بود و بر مفاصل متورم و پینه مخلوج نهاد  
برین دوا سو داکا کار بناس فیون خالص آب گرم حلقه فلافل در آن تر کرده فشرده بر مفصل متورم گذارند بالا  
آن دم جامه نهاده بنشیند و اگر از شدت درد خواب نیامده باشد رافیا و آب حلقه بنار ریخته راقه سوزنی اگر در یک  
مفصل بود و قریب مفصل متورم و جلد راستند که از آن شکین جمع مفصل مذکور حال میشود و چون در خون آغشته  
بدرام رسد خواب هم می آید اگر دم و مفاصل عام باشد درین وقت در هر جا که خوابند رافیا محلول با آب زرد حلقه  
راستند و برای شکین شدت عطش در این مرض کسی میگوید که بهتر از شجوی رقیق که در آن لیموی کاغذی بقدر نفع  
انداخته باشند و دوا نیست زیرا که از آن شکین عیش هم میشود و جو صفت لیمو جو صفت خون هم نفع میکند ایضا که کوش  
اغت پنجاه گریه و پنجاه گریه کار بناس و درم و یک ثمر آب چوی مقشر مطبوخ حلقه وقت شکلی از آن بجا می آید  
هر قدر که نبوشانند بر آن شکین عیش بسیار مفید است و غذای این مرض باید که سهل الانضام کثیر غذا باشد  
مثل اینکه شورانی نیم همراه آرزو یا شیره زده که همراه آب یک نبوشانند هر گاه جوش خون فتح گردد و آب بخنی گوشه که  
با گوشت بزرگ و زرد که فیه مرغ خوانند زیرا که در رفع شدن جمیع ضعف بر این مرض فایده میشود و چون مرض رفع شود

بجمله قوت که علاج از وی و محبت و قوت نمایندگی مثل بیهوشی کاریناس جزو قوت بزرگ یا کوچک سکون و بیهوشی است و گاهی این قسم  
بعکس قوت که اینک نشو و دو در این قوت تدریس آن بر آن چه بود که در علاج قسم که اینک نوشته خواهد شد انشاء الله تعالی قوت  
خود را بر اهل آن وقت که قسم دوم ردایس است که قوت است و در یک فصل یا یک عضله یا در عضو واحد  
و حتی تین قوتی نباشد آنرا سبب قوتی حاد و مزمن مانند السبب سبب آن به آنست که در قسم اول مذکور شد و گاهی  
سبب بیخیمی که استمرار آن در آن ترشی زیاد پیدا شود هم حادث میشود و ممکن است که این قسم در هر عضله یا در یک عضو  
ریشه دارد و قوت بدنی بر غیر ضامه و فصل عظام یافته باشد پس هرگاه این عشا و غیر عضوی که متوم شود مثل سرگردن و پلوی  
کو و ساقین و در کتبتین و دیدن و قیام آنرا ردایس هم آن عضو خواهد گفت لیکن برای ردایس هم بعضی اعضا هم خاص  
منفرد است چنانچه ردایس هم که در لبت انگلیز می گویند قوت لام و کون هم که برای موحده و سکون بای شانه تختانی  
و هم کاف فارسی و سکون و او ذهنی در و او ذیبت که شانه و چون در عضلات پلوی باشد بلغت انگلیزی پلوی و شانه انگلیز  
بای موحده فارسی و هم لام و سکون او قوت بای ضامه و سکون لبت کشال هندری و سکون بای شانه تختانی و سکون  
و سکون بای شانه تختانی و با قوت بای شانه تختانی و سکون لبت بقی در و پلوی مانند انگلیزی گوئیم گاهی در یک  
وزمانی در هر دو جانب باشد این اکثر است به صورت این در و لبتس میشود و چون کلید از آن نفوذ کرده میشود و اینکه هرگاه  
صاحب بای گو بارام تمام بر پانگست اندر و نشو و ساکن ماند و در و گرد و از سکون جسم آرام و سکون در و در و در و در  
بلکه هر حال یکسان میان فواید حرکت کند یا ساکن ماند و هم در گرد و تا خصیصه سر و قوت بای گویای خود ماند و هم  
صاحب در گرد و قوت بول اوتیت میباشد یورک لبت در بول دفع میشود در صاحب در و گرد بول قوت اوتیت نباشد  
و پلوی را و شینیا اوتات لبت میباشد و در آن نفوذ کرده میشود و اینکه در ذات لبت جمعی ضرورت و اینجاست از آن  
نیست و هم بعضی صاحب لبت لبت سر و قوت بول بول و رام حاره میباشد و بعضی پلوی را و شینیا بعضی سر و قوت بول  
بعضی اصحاب بود و هم هرگاه از قیاس القوت را بر پلوی نهاده باشند در ذات لبت جمعی ضرورت و اینجاست از آن  
میشود و آن صورت اصطکاک جسم غلیظ است چه هرگاه مواد از و هم بر غشا میریزد و بسبب آن غشا با  
چسبیده و قوت نفس در حرکت اصطکاک میکند از آن آواز پیدا میشود و در پلوی را و شینیا این آواز  
نیباشد و چون پلوی را و شینیا خفیف باشد اکثر سبب آن متلا می گردد از غشا و متلا می قولون از آن  
و ریا حید باشد و از خارج شدن این هر دو آرام حاصل میشود و بخلاف ذات لبت که در آن این  
تخفیف نمیشود و علاج هرگاه بدنه می بود یا مسده و کبد و گرد و بخوبی کار ندارد باشد و در پلوی را و شینیا  
ترشی و ریا حید زیاد پیدا شده باشند و آن نزار غش کنند و اگر در عرق پوی ترش باشد آنچه در قسم اول مذکور  
در گردن آن از او و قسم چهار نوشته شده اند بنوشانند و درین قسم هم نوشانند و کاشیکم همراه و او



مسئله که از قسم چهارم بر شل می کشند سلفاس با سلفیت آن سوخته نوشتانیدن بسیار مفید است و بعد از سه سال  
نوشتانیدن در دور رس پودر همراه چاس ناسراس ایونیا میور یا س مجوعای آنها نوشتانیدن ایونیا میور  
پانزده بست گرین همراه آب ساده مفید است و هرگاه بعد قطع شدن عمل دوا می مسهل مریض را در آب  
گرم نشاند غسل ده دور رس پودر خوراند بی مفید می شود و چون جگر در فعل خود قاصر باشد که صفرا  
را بخوبی پیدا نکند و بسبب آن قهقش شکم باشد درین وقت ناسراس میور پاک ایستاده لکوث نوشتانیدن و بر  
مفصل متورم خردل و زنجبیل مسوق خشک بمانند و هم نالاش کردن از اشیای رطبه مثل لبنینت کیمیا  
لبنینت کلار فام یا لبنینت که در آن کلار فام و اکونایت و افیون و کیمیا و چهار دوامع بودند بسیار مفید است  
و اگر ازین تمامیر هم در دفع نشود مار فیا در آب ملکه زده بذریعه زرقه سوزنی قریب مفصل متورم زیر چله  
رسانند و در لبی کو خاصه نهادن پلاستر بلادونا نافع است ایضا هرگاه وجع آن قوی بود آله آهنی را که  
از آن خطاطان و قصاران گرم کرده پارچه و لباس را صاف میکنند بگیرند و آنرا بر آتش گرم کنند و  
کاغذ و بنیر را بر محل درد بالای ظهر نهاده آله مذکور را بر آن بگردانند و آنچه در علاج قسم ثالث ادویه نوشته اند  
در وقت ضرورت آنها را هم ببل آرند اما قسم ثالث روایتیم که رانیک یعنی فرسن و این قسم گاهی از اکیوت حاصل شود  
و گاهی از اول فرسن باشد و در هنده و ستان همین قسم زیاد میشود و السبب سبب آن همان است که در اکیوت  
مذکور شد لیکن اکثر بسبب ماده آتشک و هم بعد سوزاک پیدا میشود و لهذا گاهی بلبت انگریزی آنرا روایتیم  
سفلیک یا روایتیم گوریل میگویند یعنی پیدا شده از آتشک یا پیدا شده از سوزاک العلکات  
هرگاه بسبب آتشک یا سوزاک بود در آن چون مریض بر لبان بخوابد و بدش گرم شود در زیاد میگردد  
بخلاف دیگر اقسام روایتیم که در آنها از گرم شدن بدن در درخفت میشود و روایتیم که رانیک  
اکثر کسانی عارض میشود که از چهل سال عمر تجاوز باشند و اکثر اصحاب این مرض قبل از باریدن باران  
خبر قریب بارش میدهند پس میگویند که در مفصل درد میشود یعنی باران قریب خواهد بود و العلکات علاج  
آن دشوار است اکثر آن ادویه نفع کمتر ظاهر میشود لهذا در علاج آن کوشش و قهقش در استعمال ادویه  
باید کرد پس هرگاه مریض رجوع برای علاج کند پس اول قهقش کنند که در کدام عضو مثل معده و کبد و غیره  
است باید اگر یافته شود اول آنرا دفع کنند با نخه لائق آن باشد من بعد اگر بسبب فساد آتشک باشد آن  
ادویه را که در بالا نوشته اند نوشتانید بعد آن ایونیا میور یا س مجوعای آنها نوشتانید و اگر بسبب سوزاک بود اول روغن  
کیس یا یا اسم که پیاده یا ترو قطره یا سفوف کباب چینی یا روغن گرجی یا ترو قطره یا روغن جنابل نوشتانیدن و بعد از  
خاص آن پروازند پس کاشیکیم همراه دوا می که در شل شپاکل ریواس سوخته کا ریواس نوشتانیدن و گاهی روغن تارپین از دوا

در دوا می خاص است

پانزده قطره یا بیست قطره اسپریت نایتر که تیر روزانه سه چهار بار نوشانیدن کمال مفید میشود زیرا که نیروی او را بر پول  
میکنند هر چه که در خون بود آنرا باور در دفع میکند ایضا سلف و سلفیت آن سوخته نیم آتش و نس با هم تخمیده در بوتل نساؤ  
یکت چمچ چای خوری از آن گرفته با شیر زده گاؤ و آب ساده حل کرده هر روز یکبار نه بار وقت صبح نوشانیده باشد که از آن بسیار  
فایده حاصل میشود و همیشه برای تسکین درد و آوردن خواب بسیار فایده افیون کلون بالیکریت موجود باشد و بر وقت صبح  
از آن بقدر مناسباده شود و همیشه از آب گرم که در آن دو آونس سلفر حل کرده باشد غسل کنند و چون در قیمن ساقین و  
وایت زیاد حسوس شود و روز سه سلفر با شیش بپوشد که سلفر را در آنکه در دین هم زیاد آتش در تجربه دیده شده و چون  
بپوشد تا بمرض نفع نشود و سوزن در محل رم اندرون جلد خلاصه تا غشای ریشه از رسائیده در آن ثقبه بگذرد و دست او را  
قدری خون خارج شده در غشای خانه و آید و بسبب آن هم غشای ریشه در نفع شود و ازین بسیار نفع حاصل میشود  
و صاحب رو ماییم را باید که همیشه لباس ابل بپوشد و از رسیدن سردی بدن خود را حفظ  
و از نفع که ایضا باید که در وجع مفصل فرس یعنی رو ماییم که انیک خاصه هر گاه و هم در مفصل رگبه باشد اکثر شبها  
در دو و هم مفصل پایا کمتر در آنکه در میشود و هم اکثر بسبب حصول راحت خود مریض ساقین با فنجین خود ملحق نموده  
و از نوبت رباط مفصل رگبه و تا عضلات ساق و فخذ بسبب آن مجتمع میمانند و از خفتن تسکین و از تار و رباط و عضلات  
که از انفل تشن و ماییم میزند اینها صلب غلیظ شده از حرکت باز مانده با عظام مفصل و هم با خود با حسیان فخذ  
میشوند و حرکت ندارند و میگردد و هم چون که تا عضلات و غشای آبدار که جاری آنهاست میمانند بسبب آن در عضلات  
حرکت میکنند بسبب خفتن فایسرن که مواد و هم است با غشای نکر و چسبند از حرکت باز میمانند و ایضا عضلات ساق  
و فخذ از عدم حرکت تشن غشای خود و قیق شده لایق حرکت نمیشوند باین اسباب بعد از و ال بریم رو ماییم هم چون  
علیل میخواهد که حرکت کند پاشی خود را در ساز و این ممکن نمیشود زیرا که آنجا از تار و رباط که عظام مفصل چسبیده اند  
اکنون اگر تشن در آن ساقین یا آنها ستادی میشوند و از آن در پیدا میگرد و بان سبب مریض پاشی خود را در تشن  
و چون تا تشن مفصل رگبه باین طبیعت مانند صورت شکل مفصل نگردد هم به خلاف طبیعتی مفصل میگردد زیرا که در  
مفصل اندر و است که عظام متصل و قریب قریب مانند و در بحالت بسبب انقباض جماع ساق با فخذ عظام مفصل  
کشاده و از خود با بیدار گشته صوت و یک پدید میآید که آن خلاف طبیعتی میباشد و ایضا کله مفصل که آن عظم در و ریا  
مفصل میباشد از محل مفصل بلند شد غلیظ میگردد و درین وقت مقصود از علاج همین است که مفصل بجای خود آید و بپوشد  
او تار و رباطات که چسبیده اند از عظام مفصل جدا شوند و باز چسبند تا بسبب آن حرکت مفصل رگبه بهتر گردد و باین  
باید که چند روز به عضلات ساق و فخذ و لک نمایند تا غشای لایق بعضی رسد و این رسد باین طریق که از آنجا که  
تقریر در عضلات و جلد آن کم شود و آنچه بپوشد و جلد و عضلات و غیره پیدا شده و دفع شایسته در آن پیدا شود

من بعد چنانکه در رسالت کرون پایی متخلص چنان در دشت پیدایش شود که مریض تابان نمی آید و لذت از خوردن و استراحت ندارد  
 کلام خام اگر مریض قوی باشد یا سلیفیکال تر اگر مریض ضعیف باشد چنان بویاند که بیوش شود من بعد و متعارف را باید  
 که از یک دست خود در ساق علیل را که قریب به ندرت است بگردد و از دست دیگر بر سر خنجر بیاورد از جانب تحت گرفته است به پیشینه  
 حرکت دهد تا او را رباط که چپ پیدانده اند و درین وقت آواز دقیق مثل آواز پاره کردن قرطاس از تحت جلد فصل  
 مسموع میشود پس اگر مرض زیاده من نباشد در تحریک است به این اعضا جدا شده پایی علیل راست میگردد پس  
 بعد است شدن پا چنانکه بعد از غنای پایی منکره ای بنشیند و در خنجر بعد از قطع از تیرین کور پایی علیل را در پایی  
 پدید آید و باید که بندش بر محل ساق و فخذ واقع کنند مفصل نهند و نیز که از راست کردن پادین صورت بر مفصل بکشد  
 و در کم کثیر و در دشت پیدایش شود با کلام هرگاه در دم و در پیدایش شود برای کین فیون خالص یک و گریز یا یا فیاض و در  
 بود و غیره مرکبات فیونی حسب سبب بعد سه یا چهار ساعت بنوشانند و وقت شب برای آوردن خواب مقدار  
 زاید از فیون مرکبات آن خوانند و بر محل دم آنچه تا بر از دم در علاج و دم عام و مانوشته خواهد شد از آن حسب سبب  
 بهل آنرا و بعد از دال دم است به است پایی بیمار را دستکار حرکت مریخی و در تار و رباط و عضلات بخوبی کار خود  
 و بند درین وقت مریض را هم امر به تحریر پایی با استیلا نماید و اگر دم رو یا نیز من من باشد درین وقت پایی علیل را  
 قدری است ساخته آرام دهند بعد از دال دم و در باز قدری است سازند و آرام دهند و پیرین منوال در دفعه  
 متعدد و پایی مریض بخوبی راست کرده بعد از آن آنچه تا بر از دم در استعمال آید لیکن باید دانست که در  
 استعمال این تدبیر نیز باید چنانکه رعایت شود و اگر عیال اول آنکه مرض یافته که نباشد مثل شکبه هفت سال یا ده  
 سال بر آن پیرین حال نگارشته باشد بلکه از شش تا ده تا دو سال حال این تدبیر است بر اگر بعد از مدت دراز عضلات  
 حال خود گذارنده مثل غشائی را شیهه دارند و اکنون از هیچ تدبیر در آن فایده ظاهر نشود و دم آنکه مریض سوائی این من  
 مرض دیگر مثل جی و غیره امراض نداشته باشد بلکه معتدل المزاج و القوه بود و قوت با ضمه آن قوی بود ضعیف و کفر  
 نبود زیرا که اگر ضعیف بود از رسیدن صدمه تدبیر زیاده ضعیف شد و پاک خواهد شد و دم آنکه این تدبیر وقت شد و از  
 فصل قوت و آفتاب چنانکه در ماه می و چون می باشد واقع نگردد و الا چنان جی قوی پیدا میشود که از جوش خون در پا  
 پاک میگردد و چهارم آنکه اگر مریض که هم مرض قلب داشته باشد تا این تدبیر را بعمل نیارند که هم دوائی بیوشی  
 درین حال با وند بویان و الا از آمدن غشی پاک خواهد شد و ایضا باید دانست که برای بعضی حکما نیست که مریض بیوش  
 کرد و نور پایی مریض را کشیده یکبار راست سازد لیکن ای جناب استاد نیست که نه از این مرتبانه و الا چونکه  
 درین صورت عضلات و اعشیه جلد متخلص میباشد پس خوف آنست که از کشیدن یکبار که هم شریک است شسته شود  
 و الا نور مریض پاک خواهد شد و فصل دوم در وجع قفس و آنرا نیز بان انگاشتن کوفت بفتح کاف فارسی

فصل دوم در وجع قفس

سکون و آوای نای بندری نامند و حتی قطره و این نام قدیم است و قریباً میماند است که چیزی از او قطره قطره کرده  
مفصل میگوید آن غلط است بلکه حقیقت فقرس هم خاص است مثل وایتسم که در غشائی ریشم دارد و مفصل پیدا  
میشود و فقرس را وایتسم بحسب علامات فرق توان کرد و اینکه روایتیم اکثر در مفصل بزرگ میشود و فقرس در مفصل  
و جمیع وایتسم عرق در بدن زیاد می آید و از آن جلد صاحب وایتسم اکثر طلب میماند و اکثر عرق در فقرس نمی آید و جلد  
صاحب فقرس اکثر خشک میماند و هم در فقرس جایگزین می پیدا میشود و در آن پور شاف سو واپید امیگو و معنی هرگاه از پور  
پورک ایست و سو واد و عضو تو هم میبزی و از آن پور شاف سو واپید امیگو و معنی هرگاه از پور  
از یختن آن در غشائی ریشم دارد و هم پیدا میشود و بعد ورم پور شاف سو واپید امیگو و معنی هرگاه از پور  
یعنی حاد و کراکس یعنی نمرن میشود و چون اکیوت بود بطور دوره می آید و در آن شدت و خفت ظاهر میشود و چون کراکس  
یعنی نمرن باشد در آن شدت و خفت بطور دوره نباشد بلکه مثل روایتیم میباشند که از پور شاف سو واد که بر مفصل  
درین مرض میباشند از آن جدا و ممتاز میشود و چه او بر مفصل این مرض چنان میباشند که او را ممکن بود که نام خود را از آن  
بر دیوار یا تخمه بنویسد و چنانکه از گل موسوم بطین قویا بنویسد و گاهی از زیاده و تقی متفصل مثل انگران دیده میشود و این  
مرض نسبت دیگر مفصل اکثر و مفصل انگشت ابهام قریب جایگزین متفصل بعظام مشط قریب است میشود و هم اکثر و یک قریب  
بود و گاهی در مرکز انگشت هر دو پدید میآید و بعد از آن در مرتبه کثرت و مفصل انگشتان که در وسط انامل دست پیدا میشود  
و گاهی در مفصل دیگر مثل مثل مثل قریب که مفصل عظام مشط قریب یا عظام نردی است یا در عقب که مفصل عظم  
عقب یا عظام مشط پاست یا در مفصل عظم ساق یا عظم کعب و عظام نردی است و هم در مفصل رگبتین یافته میشود و گاهی  
صاحب حساب حدوث آنرا با عقب اکثر و قلت عروض آن بحسب تجربه و که در پانصد و شانزده مرصیان این  
کرده بودند نوشته اند که این پانصد و شانزده مرصیان سه صد و چهارده کس فقرس در مفصل آخر ابهام خود که آنجا  
ابهام با عظام مشط قریب متصل است در یک قدم داشتند و از آن ظاهر میشود که همین جائز بود و میشود و در یک قدم  
زیاده میشود و نسبت و هفت تا نین مرضی فقرس در مفصل مذکور ابهام هر دو قدم داشتند و ازین دانسته میشود که  
عموم آن در هر دو قدم هم کمتر میباشد و یازده نفر ازین مرضی چنان دیده شد که در یک وقت در دو مفصل زند قریب  
آنجا استخوان ساق یا عظم کعب و عظام نردی و عظام مشط قریب موقوف است و مفصل ابهام بوده و در دو نفر در  
محل خنصر یا شروع شده و جهت خوشی قدم میماند و یکی نفر ازین مرضی چنان بودند که در فقرس در مفصل استخوان  
نردی قدم و عظام مشط قریب داشتند خواه در قدم واحد یا در هر دو قدم و هفت کس ازین مرضی فقرس در  
استخوان ساق یا عظم کعب که آن زند قدم است داشتند و بقیه ازین پانصد و شانزده آنچه مانده در آن مرضی در مفصل  
یا در عظام ساق خود بوده و در بعضی در مفصل تروصا ساق کثیر و بعضی ساق صغیر که این هر دو بر یک مرتبه و ملاطی میماند بوده و در



مثل روایتی از یک جابجایی دیگر منتقل میشود پس گاهی از فصل ایام در معده و گاهی در غشائی و ماغ و  
گاهی در گردن منتقل میشود و اکثر انتقال آن در ضعف است و پس هرگاه در معده منتقل میشود در معده تشنج آن زیاد میگردد  
و مقابل نقل عظیم یافته میشود و عینان وقتی و کمزوری عارض میشود و در حرکت دل مرق محسوس میشود یعنی گاهی  
واقع فی الوسط و گاهی حرکت آن متواتر و گاهی متفاوته میباشد و چون در ماغ منتقل شود خواب زیاده آید یا بیشتر  
طاری میشود یا سرسام پیدا گردد و چون بسوی گردن منتقل شود وقت بول کردن در و افیت زیاده میشود و گاهی علامت  
ورم کرده حار یافته میشود علامت نقرس که انیک است این از زمان گاهی بعد از کیوت میشود و گاهی از اول فرم میشود  
درین وقت نسبت سابق یعنی قبل از آن که کیوت است تلبیل میباشد تا مدت دراز میان و از یک فصل مفصل میگردد  
و تب و درین قسم نمیشود و در مفصل کشیده عارض میشود و اختصاص مفصل واحد ندارد و بخلاف کیوت که آن در یک  
مفصل بود فقط و گاهی این قسم که انیک در مفصل کبار مثل مفصل کتین هم عارض میشود و سوزی و سوزش در این  
کم بود اما درم گاهی نسبت کیوت زیاده میباشد و گاهی مفصل خرد و بسیار زیاده مقدار غشائی ریش و اگر بیشتر  
میشوند و در آن یوریت آن سو و آب باشد العلاج بروقت شدت و دوره آن چنان تدبیر کنند که صفا زیاده از  
خون خارج شود و بگونه که ممکن شود و چهاره طریق افراجه است که وقت شب بلوچ اینچ گریز تا ده گریز نوشتند  
و بعد از سه چهار ساعت یا وقت صبح نقوغ برگ سارمکی یا دکاشن بلوز یا سفوف ریائی کمپو یا سفوف جلیب کمپو  
تنها یا هر کیلو سفوف مذکور را خورند یا سفوف یائی ساده همراه کیل میل خورند و یا موافق این ترکیب که نسخ  
طبیعی کیل و از هر فصل است و دوا نوشتند و بنوشانند آن وقت صبح از روز اول دواست نمایند که کمال نافع است  
صفیه کیل و اکثر اکثر کاشیک کم بلوز یا پیکا کوانا از هر یک یک گریز همراه با هم بنوشند و بعد از وقت صبح  
نوشانند و بعد از چهار ساعت این دوا موافق همین مقدار در روز اول نوشانند تا اینکه دست رقیق یابد و بعد  
آمدن دست رقیق این حب را بعد از هشت ساعت نوشانند اگر بعد از آنهم دست رقیق آید بعد از دوازده و دوازده  
ساعت بنوشانند و اگر بعد از آنهم دست رقیق آید بعد از هشت ساعت بنوشانند با جمله بگونه که ممکن باشد بنوشانند آن  
ترک نکنند بکراتیکه مرض ارض کرده باشد پس درین وقت البته این دوا نه نوشانند که درین وقت استعمال آن  
قدری جوشش و هین پیدا میشود و از آن دندان تحریک گردد و خون کمزور شود و آن مورث اوتیت مولد ارض  
است و ایراد این دوا برای جوشش و هین در وقت ضعیف بودن کرده از نخبه میباشد که چون کیل و خوراند  
میشود و با خون مختلط میگردد و بعد از آن قدری از راه بزرخارج میشود و قدری برای رفع شدن بسوی کرده میرود  
و هرگاه که در ضعیف باشد از اخراج آن قاصر بود این که بسوی کرده نرفته بود و خون هین جوشش و هین  
پیدا میکند و قند که با جمله هرگاه دوا درین دوا ممکن نباشد و عرض آن ادویه مسهله مخمر و جعفر که بیشتر نکرده اند و با

علامت نقرس که انیک

مناسب و بنده و بعد از فراغ از عمل و اسهال آنرا در رات بول دهند و همواره آنها را کشیکم ضرر داده باشد که تمام تمام و  
این نفع و علاج این مرض بر آنست لیکن وقت نوشاندن آن بمقدار است و درین وقت خواهد همراه او و بنده بود  
مثل شپاش سیسماش شپاش بائی مارش اس آیو دایث شپاش اسپریت نایتریک تیر نوشانه نیم اختیار است که این او  
از بنده کور و راتنها یا با کشیکم نوشانه یا هر چهار او و تیر را مجموعا همراه آن نوشاند خواهد که کشیکم با او و تیر معطر نشا  
مثل لایکامیونیا اسپریت نایتریک تیر و دورس پودر و این او و تیر معطر نیم تمام دهند یا همراه او و تیر بنده بول  
نوشانه زیر که وقت گرم شدن بدن که وقت آمدن عرق گرم میشود او و تیر بنده هم که مذکور شدند معین بر تهرتی میشوند  
و بر این تسکین در وادیت نفوس بائی ساینس بنده که آن در بخا از افیون تهرست زیر که افیون مانع تولید افراج  
صنفر میشود و بائی ساینس مانع تولید افراج آن نیست لیکن درین وقت مقدار از یاد از آن مفید میشود و مثلاً از اکثر  
آن از هشت گریب تا ده گریب و از شکر آن از یک گرم تا سه گرم نوشاند و شربت واحد و از یک گرم کم نمیدهند و الا  
درین وقت موثر نخواهد شد ایضا که افیون خالص یک گریب از شکر کث با او و تیر گریب از شکر کث بکاف معنی شو که این  
گریب هر یک که کرده حسب بسته بعد سه یا چهار چهار ساعت نوشاند ایضا که لایکامیونیا باست قطره کلارک تیر نیم  
شکر گریب باست قطره سفوف شکر که آن که قسمی از صمغ است و آنرا بجرای کشید و بنده و بنده کثیر گویند  
چهار گریب اسپریت نایتریک تیر و جمل قطره بائیدر و سیانک است آیو دایث چهار قطره شکر بائی ساینس یک گرم  
آب ساده یک نیم آون منجم خوب حل کرده شب وقت خواب یکبار بجا این دو را بنوشند که از آن آرام خواب می آید  
یا بر و بائیدر شپاش زنی گریب چهل گریب بنوشاند یا کلورل بائیدریت زبست پنج گریب ناشی گریب بنوشاند یا هر  
بست بست گریب گرفته و با هم آمیخته همراه آب ساده بنوشاند تا خواب آید بعضی تا زمان وقت زیادتی در و دو  
قدیم ماؤف را و آب سرد میگذرانند و از آن راحت خوری یابند لیکن آن بسیار ضرر است چه اکثر بعد از آن نفوس بپاشم  
و غشائی قلب میرسد و آن اشد است از روی خرابی بسیار ازین فعل و بعضی را مانعست کرده و بنده بلکه عوض آن  
که امشی مارشل پنجه مخلوج خشک بر آبام نماده یا پویشش تخم کتان که در آن فیون محلول باب مخرج بود دست کرد  
بر آبام بر بندند یا کلورل بائیدریت باب حل کرده یا چه آن تر کرده بر آبام چیدموم جامه بالایی آن نماده بنده  
تا گرم ماند و پای ماؤف را همیشه بلند دارند و گاهی از نمادون پاشند که تهرتیس قدری زیر یا بالایی مخرج و دم و در و  
بر و شستن آب که هم فایده حاصل میشود و هرگاه این مرض فصل آبام را گذشته بعد و در و درین وقت ازیت در و بسیار  
میشود پس بهتر است که پویشش تخم کتان که چهار حصه بود و از خردل حقوق که یک حصه باشد درست کرده فصل آبام  
نمونه تا جذب کند چنان که این پویشش فصل بسته دارند که یا مرض معده بطرف شود یا دم ازین فعل سابق پیدا کرد  
و هرگاه در غصه بود دیگر شل کرده و غیره نقل شل باشد و از آن مرض پیدا شود پس هر مرض که حادث گردد علاج خاص آن

نوشان





مثل اینکه غیر متعارف در راه رفتن زیاد راه رود یا بسبب ثوب یا از آمدن دوشی در پایا از رسیدن صدره ضرب یا سقوط  
یا از شستن بجائی طرب پیدا میشود و علامات علامت می آید که در خطه میشود و آنرا بنیان انگاشش و شکران فقیه  
مالک و سکون را می گویند و کشتی مثلثه و سکون را می گویند و کشتی هندسی و سکون کاوش یعنی و در فصل  
اینست که اول در فصل درویش و تنگ خلق گردد خواه حاد یا لیتن موافق مقدار و در پایا ماوت تنگی و در تعاد پیدا  
میگردد و همراه آن درویش و تنگ و ضاقت شب و شدت بحری میرسد که اگر کسی پانگه آنرا حرکت دهد فریاد میکند  
و انداختن چادر بر صورت و در منکرش بود و بیمار پائی خود را که اف است از پائی صحیح بخوی جدا میسازد که بجانب پائی  
قدری پائل بسوی قدم و جانبی پائی بسوی خلف میشود و حرکت جل ناممکن باشد در و مخصوص محمل فصل بود  
بعد گذشتن چند روز و در مقابل فصل قریب رسیدن و همچنین در جانب خلف آن ظاهر میشود و از آن دانسته میشود  
که بسبب بر آب در خطه که در پیدایش و چون این آب در خطه زیاد شود و بسبب آن حرطه عظمی و فنی را غرق و  
کند بسوی خارج از آن پائل طولی پیدا میشود و چون این حالت نامدیت در آن زمان خطه که در بسبب اجتماع آب در  
شده فخر میشود و از آن آب خارج گشته در طم که می یزد خطه فانی و لاشی گردد در این وقت عظمی و فنی از عظمی و فنی  
طم و در کف نخل میشود و اختلاج مفصل عبارت از همین است و چون عظمی و فنی در عضلات زنده عظمی و فنی میرسد بسبب آن  
پائی پائل متعطل شد و فخر میگردد و در این قسم دل کمتر پیدا میشود و عظمی و فنی با عظمی و فنی متصل شده باقی ماند اما حرکت میکند  
و ممکن نباشد که بر این پائل بدن نماند و آن محمل با آن شود و در قمار ممکن نبود و هرگاه این در و در عظمی و فنی  
موسوم بحق الورک است و بلبغ انگاشش را از آنجا که پائل و کسین و کسین و سکون یا می شناسد تخافی و قمع پائی  
هندی و سکون الف و کسین پائی موحده و سکون یا می شناسد تخافی و قمع لاهم و سکون را می گویند یعنی پائین  
پیدا میشود و اکثر این قسم کسی عارض گردد که از بسبب سال عمر تجاوز شده باشد علامتش است که اول گردد فصل  
در فصل در کف فانی از پائل قدری در معلوم میشود و بعد چند روز از عمر کردن بر مفصل اذیت در محسوس میشود و از  
پائی در و در حرکت ممکن نبود و نقل بدن را متحمل نمیشود و طول هر دو پائین مساوی بود و لیکن عضلات خشک لاغر شوند  
و قریب مفصل دل پیدا میشود زیرا که در غرض و فنی حق الورک بسبب انقباض و کشش و در عظمی و فنی پدید می آید و پس  
اخراج عظمی و فنی که در طبیعت دل پیدا میکنند از آن هم جاری میگردد و این در دل گاهی زیر عظمی و فنی پدید می آید  
جانب خلف آن پیدا میشود و همراه این تل تنگی پیدا میگرد و گاهی از عظمی و فنی در استخوان هم پیدا میشود  
بسیبست و فنی استخوان جانکه نور و قیق و فاسد میگردد و در این وقت عظمی و فنی از اندرون حق الورک عانه میگرد و بسبب  
پائی طلیل که چپ میشود و گاهی اطراف کناره پائی حق الورک فته و فته بسبب فنی و فنی فانی میشوند و پائی اند  
استخوان فته در آن جا باقی ماند عظمی و فنی خلف عظمی و فنی در عضلات طم میرود و از آن پائی مرصع که چپ میگرد و فته

در فصل

وجع الورك که در عظم فخذی و اندر ان بان انگشت شتران کاک سال خیا نامند و مال بکسر و سکون بهم منفع رانی است  
و سکون ان و لام یعنی فخذ یعنی ران است و محصلش آنست که در مفصل و رک که در زائده استخوان فخذ میباشد این و فخذ  
هم با طفل ضعیف عارض میشود و اکثر بویگی در غصه و بالا ای سر استخوان فخذ میریزد و بسبب آن این ورم پیدا میشود  
علامت آن اول در ابتدای خود بسیار خفیف میباشد و در مفصل طفل پای خود را وقت فشار بر زمین  
میگذارد از زمین پای علیل را بر داشته بطور و ثوب را میبرد و برابر ایستاده نمیشود بلکه قدری بسبب کسبه فخذی شده و پای  
ماوف خود را کشیده و بر سر نائل قدم زور داده از سر نائل ایستاده میشود و بر وقت ایستادن نیست و چل و قدم بر زمین  
میباشد که عصب بطرف پای صحیح و قدم از زمین بلند و بر نائل بر زمین نهاده و چل و نائل بجانب وحشی ازین نیست  
و آنست که و در پای علیل قدری ضعیف شده که چون اندر ان ابتدای عظم عانه که آنجا زائده ضعیف شل خار است تا آخر تمام  
پایانش کشیده و پامساوی و طول باشد هرگاه طفل را چند روز آرام بر بلیک زنده و در حصول راحت خفت در  
برخ شود و پای علیل در محسوس گردد و زیرا که درین وقت بسبب زوال ورم قدری در عضلات این جهت متفرخ حاصل  
میشود و عانه بسوی آن نائل میگردد ازین سبب پای ماوف طول و دیده میشود لیکن در پایش هر دو برابر میباشد و در  
اول مرض طفل در در اثر مفصل مرکب ظاهر نمیکند بلکه مفصل را که با بر قدم خود اظهار مخرج میکنند و هم گاهی بر گرد آن  
بسبب مشارکت عصب قدری سرخی و ورم هم محسوس میشود لیکن فی الواقع سبب آن در مفصل و رک میباشد و  
درین وقت باید که صاحب ازین بیان در غلطی افتد و مرض را که با قدم و آنست که علاج روا نیست مضمحل نشود بلکه فقره کند  
با نیکه مفصل و رک غم کند یا که ارم صدمه دفع بسوی الا بر قدم رسانند و دریافت کنند که کجا در دیده شود اگر مفصل و رک  
ورم است همان جاد و معلوم خواهد شد اما هرگاه مرض زیاد شود و در شل مفصل ظاهر شود و ورم چون این مرض را  
ایستاده از جانب پشت بنشیند و هر دو سرین سرین بر جانب علیل قدری متفرقی و لا غرید و میشود و اگر مرض ضعیف بود  
کنار فخذ جانب علیل آن متفرقی و فواید و چون این مرض زیاد گردد و درون استخوان فخذ و شل پیدا میشود و بعد  
از خم زنده پای استخوان مرده اکثر بر می آیند و آنرا تصور میکنند زیرا که چون غصه و سر استخوان فخذ و ورم و رخی میشود بسبب  
استخوان فخذ هم فخذی شده فاسد رفته رفته فانی و لاشی گردد و بسبب فسادش زائده آن که در حق الورك میماند استخوان  
عانه برآمده در عضلات فخذ و شل شده و بالا رفته با عظم عانه متصل میشود و این یکسخت تمام این مرض است و انجامش فانی  
آن نیست که بسبب و تپش رفته رفته لاغر و ضعیف شده و پاک میشود و علاج در قسم اول باید که مفصل را آرام و بعد  
از حرکت باز دارند و تا بمرام رسانی مفصل متحرک و انگیختن است که مرض را آرام بر بلیک خوابانند و اگر  
فخذ و ساق پاکیه بماند و بهند تا حرکت نکند ورم آنکه با چوب طویل که بقدر چهار انگشت و نیم عرض بود آنرا در آب طوی  
برنج که غلیظ باشد تکر کرده از قدم تا مفصل رک پیچید بر بند لیکن در بندش این احتیاط ضروری دانند که از قدم تا مفصل

مساوی باشد جایی شد قوی و جایی دیگر ضعیف نباشد الا از آن نقصان خواهد شد پس هرگاه این  
 پارچه خشک گردد حرکت رجل موقوف میشود و سوم آنکه مریض را بر پلنگ بر پشت استلقا خواباند و یک کمر بند  
 بر کمرش بچند و یک سکر بند نکند و از پلنگ بندند تا بسبب آن عانه و کمر حرکت نکند یا چپ و دیگر که طولی بود از قوس بالا  
 گرفته بندند و یک سر آن تا پائین پلنگ ده بر سر آن شش ثقیل که ثقل آن موافق عمر و قوت مریض باشد و بهین تا بسبب آن  
 جذب شش ثقیل بر تمامی رجل مساوی باشد هم حرکت رجل موقوف شود و از آب بطبخ پوست خنک شش مفصل مکرر  
 نمیکند و از پس اگر در بسیار قوی بود تا مدت دراز و الا تا یک ساعت تک یک هر بار کافی خواهد بود و کیلول از یک نیم گرمین تا  
 دو گرمین همراه افیون خالص یک گرمین باشد و بخت بستره روزانه چهار بار هر بار موافق این مقدار نوشته اند تا ورم  
 در دفع شود یا تا بر خوشی زمین پیدا شوند از آن زمان موقوف کنند و برای آوردن خواب رفع شش و ارتفاع  
 پایی علیل وقت شب همراه کیلول که بر وزن سابق باشد افیون خالص مقدار از یک بقدر دو سه گرمین بخت نوشته اند  
 کسی را که خوردن این مقدار افیون موافق نبود شش اینکه از افیون در دسترس باشد یک کم شکایت دیگر پیدا شود  
 و خوش نیاید او را درین وقت ریاضی محلول یا یک بزرگه راقه سوزنی قریب مفصل در و مندر و جلد رسانند که مقدار  
 قلیل از افیون خورانیند و ریاضی تحت جلد رسانند بلغ خواهد بود و در قسم ثانی و ثالث آن هم اول تدبیر آرام رسانی  
 مفصل که در علاج قسم اول مذکور شد بعد از آن علاوه بر آن قدری از مفصل یا بالاتر از مفصل هر جا که در زیاده بود  
 باشد زخم پیدا کرده و بهین تا اذیت در جانب خلاف محل در باعث رفع اذیت باطنی مفصل گردد و این زخم بخت جلد پیدا  
 کرده میشود و یکی آنکه بر محل مذکور پلاستر کنند و پس زخم را بپیدا کرده آنرا بپزند تا زخم شود و دوم آنکه از آلهی که برای در  
 نهادن موضوع است دواغ کنند سوم آنکه کلوراید آف زنگ یک حصه و مسکه گندم یک حصه هر دو را همراه آب غلیظ شست  
 و بقوام غلیظ داشته از آن قرض بقدریکه بپای آردن زخم مناسب است ساخته بر جلد محل مذکور نهند که از آن زخم موافق  
 مقدار قرض پیدا خواهد شد چون زخم پیدا شود چندی آنرا جاری دارند به نهادن مرهم سیاه یا بلای آن تا اذیت  
 بر جلد باقی ماند و از آن اذیت باطنی بطرف شود و هرگاه این قسم بطلع صغیر عارض شد باشد او را باید راجع مکرر شک  
 گرمین سوؤا کار بناس و گرمین و بر ب سه گرمین و زانه دو بار صبح و شام بخوراند اگر نیم گرمین هم همراه آن شربت کنند  
 بهتر باشد هرگاه جوانان یا پیران این قسم عارض شود و سیکو رشاد هم حصه گرمین همراه نفوق عشب یا نفوق یا بطبخ بارک نشین  
 و چند این و را با ایشان و بهین که یا علامات حدت مرض بطرف شوند یا آثار جوشش زمین پیدا شوند از آن زمان این  
 ترک کنند هرگاه علامات مرض اکیوت رفع شوند اول یو دای پراس هر روز نفوق بارک چند روز نوشانی بعد آن سوؤا  
 فیری یو دای همراه روغن جگر یا هی نوشتان اغذیه مقویه بخوراند اگر تبیل بر او ممکن باشد ضرر بان مکرر و جواب  
 فریاد و اگر صاحب مقدار بخواهد اذیت کنند که چندی قریب کنار دهند قیام پذیرد و گوشتی آن بسیار و فی بسیار

ن دو اتمیک از کبریا می کنند

و چون این مرض در حق الورک که عظم خانه است بسیار شایع است و در آن هیچ علاج نفع حاصل نمیشود و بسیار پاک میگردد و علاج عام برای جمله اقسام آن نیست که چون در آن دمل مفصل ظاهر شود و استقامت ندارد آن از خود نمکند و اگر در آن زیادتی و شدت یابد و خوابش را بکاهد و معلوم شود که ریم در آن پدید آمده و اشتیاق کثرت ریم را جاری سازند و بر ریم روغن کاربوکات ایلوئث ننهد که از آن فساد و زخم نمیشود و در قسم اول گاهی خود مفصل شکر شده بعد آن صحت میشود و این نیک است بخامی این مرض است و گاهی بسبب علاج آرام رسانی مفصل سخت میشود و درین وقت خود حرکت نمیکند بلکه در حرکت مفصل فشار که در آن قدری تشرخی میشود پائینیل حرکت میکند و هرگاه دمل پدید آید و بسبب فساد عظم خانه عظم فنی را تخلیاع و فصل واقع شود و بعد آن عظم فنی در ریم و دو بسبب آن پائینیل صغیر گردد و درین وقت بعد رفع عظمی حصول صحت پائینیل صغیر را کشیده عظم فنی را بجای خود آرند و آنچه را پیر در تخلیاع مفصل دستکاران میکنند آنرا را حمل آرد تا بسبب آن عظم فنی در محل نخورد و یا بجای خود باقی ماند و از آن صخره پدید آید و در زمانه سولت شود و هرگاه ریم عظم بود و خواه در عظم خانه یا در عظم فنی و بسبب آن عظم میرود و فاسد شد و اشتیاق درین وقت را خارج شدن ریم و زنده بای اشتیاق نام آید در این مرض صغیر شکر پاک میشود پس بهتر است که برای حفظ جان مریض بالای مفصل شکر را کشد عظم مرده را بر آن باین نحو که اگر فساد و حق الورک باشد از سر کار داند و درون حق چاک کرده و تخوان مرده را بر آن داند و اگر عظم فنی باشد آنرا تراشد و دور کند از ریم تا ریم مریض از مردن محفوظ بماند و پیشتر در اینجا جمله پائینیل صغیر بریند یکبار از قوتی و اگر شکر صاحب بهادر حسن سبی و تجرید و روغن کاربوکات ایلوئث را برای صلاح ریم نفع یافته است شمار نفع آن فرموده برین پاترک کرده و عظمی آن ریم مفصل کرده بر آوردن تخوان مرده و نهادن رغن کاربوکات ایلوئث برای صلاح و اودال ریم بالای آن اختیار کرده شد و از آن نوا یا کشیده و پاشند و فساد ریم فصل چهارم و روجع العقاب و آتش و در پاشنا گویند آن اکثر بسبب ریم در میکند الا سباب اکثر بسبب آن شدن شی صلب در رغن زیر پاشنا یا خلیله خار و سوزن غیره در آن می باشد و گاهی از تنگی سوزن و زمانی بسبب پاشنا راه رغن نشود و گاهی از زیاد بلندی پاشنا آید که در سوزن بویت می باشد و هم در پاشنا در پید میشود و درین وقت مریض گاهی از شدت آذیت پاشنا می خورد از سوزن و زمین برداشته راه میرود و درین وقت زیاد اثر کشش بر وتر که بالای عقب است میرسد و از آنهم درد عقب پدید آید و در درایه و دم غده می پید میشود و علامات اول در پاشنا در محسوس میشود و من بعد تنگی و گرمی بر آن پدید میگردد و مریض پاشنا می خورد از زمین برداشته راه میرود و گاهی بسبب شدت آذیت و در تنگی هم می آید و مریض در آن می خورد و بیشتر و آن ریم می افتد و در ریم زیاد میگردد و از پاشنا که بسبب تنگی جلد از ریم پاشنا خارج میشود و علاج و ابتدای مرض هرگاه سبب معلوم و موجود بود مثل خار و سوزن غیره آنرا از پاشنا بر آورده و در سوزن و از آن صحت میشود و اگر بسبب ریم غشائی خانه دار یا ریشدار بود درین وقت گاهی از دشتن پاشنا و آب سرد و از ریم پاشنا پیر

فصل چهارم در حق العقاب

بر آن که اگر امصال عینه و اگر از آن شمع حاصل نشود در آب گرم که خوب گرم بود اما لایق غسل انسان باشد یا شستن آن  
 در و مندر را انداخته تا پخته و قهوه در آب گرم و از آن که از آن هم گرم حاصل میشود و اگر باز در و خود کند باز در آب گرم و از آن که از آن  
 و در آن آن ضربان پیدا شود درین وقت بلا انتظار تسخیر و انفجار آن از خود و از نشتر ثقیله در آن پیدا کرده و مندر را بدو چشم بند  
 پس این ثقیله خون بخیریم پیدا شدنی است بخوبی جاری خواهند شد و اگر در بعضی این تدبیر قبول نکند از بزرگ تشنگی  
 سیرت کتان مسخوف و قویون خالص پخته است که در بر پاچه آلوده بر پاشانند تا جلد را پاشانند اما هیچ ولایت انفجار شود  
 بعد از چاک از بر آمدن آن ثابت شود که اینجا منقبض خواهد شد از سر کار و قدری چاک کرده و مندر تا انفجار آسان شود  
 و حتی جابج کرد و فصل پنجم در اوجاع امصال و آن و این هم است که در اقسام سه گانه مذکور شد وقت ضرورت اینجا  
 ملاحظه کرده علاج کنند فصل ششم در عرق النساء و آن فی الحقیقت غیر اوجاع امصال است بلکه از اوجاع  
 و امراض عصب است و در نور الجلیا ذکر یافته شیخ اکرمین قانون اگر چه موافق اطباء فی یونین آنرا از جمله اوجاع امصال  
 ذکر کرده لیکن در بیان اسباب تصریح کرده و حیث قال مادة عرق النساء انما يكون في المفصل العصل ينجل منه  
 في العصبه العريضة وايضا قال قد يتفق ان لا يكون في المفصل العصل بل في العصبه العريضة  
 فاما في الجمله چون که آن در امراض امصال خلاف حقیقت بود پس در کتابها نوشته شد که فصل ششم است  
 شور و عروق به طبع هم و این شور بر ساق بسیار ظاهر و حاد میشود و فی الحقیقت آن در والی عروق منفر  
 است که عروق کباب خون میرسانند و چنانکه والی در عروق کباب حادث میشود و این در والی در عروق حصار پیدا  
 و اسباب و علامات و معالجات آن بعد از اسباب علامات و معالجات این مرض مذکور در فصل ششم و در حقیقت  
 و آن هم عارض است که بر دوزاخن اصابع است و یا خصوصاً از انگشت پا و دست و هم انگشت تنبیه زیاده می افتد  
 است سبب اسباب عروق که از ماده آتشک بود یا خناری یا از تشنگی بر سرست که پاشیده میشود و یا تشنگی  
 این را او تشنگی می نامند و هم حاکم بر دوزاخن پیاپی میشود و یا عند العلامات اول بر کناره ناخن قدری سرخ  
 مایل اسپیدی پیدا میشود و در و شدید بود و من بعد هم افتد جلد و تشنگی از آن هم منتخج خارج میگردد و چشم آبی می ماند  
 و بر آن نگر پیدا میشود و تشنگی متورم میگردد و بعد آن ناخن خشک و سیاه شده گشته ناخن ثانی پیدا شود که آن  
 نعل خورشید مرفوع میباشد که کسی فساد این هم تا عظم میرسد از آن در و شدید پیدا میشود و سخنان غاص گردد و گاهی  
 این هم بر تمام دست و شان تا نعل میرسد از آن جلد و دست متورم شود و آن یکم پیدا میشود و علاج جوش است  
 که بعضی را پیشکش کرده ناخن بر آرد و اگر بعضی آنرا قبول نکند تشنگی آن تشنگی در دست کرده بر آن بندند تا هم  
 رفع شود یا جایگزین هم باشد بر آن جل کاشک بشیر سلور کمال تشنگی دست گردانند که از آن تشنگی پیشه و ناگو می شود  
 و در هم نفع گردد بعد آن اگر سبب خناری باشد پاش پاش در آب سرد یا آبیک در آن افیون حل کرده باشد تر کرده و آن

فصل پنجم در معالجه عروق و فصل ششم در عرق النساء



پنجین و اگر از ماده اشک باشد در بالاک و ش که نام دو است که در آن کیلومل یک حصه باشد حصه یک مجتبه در آب  
 حل کرده دست میسازند پارچه تر کرده بروم چینی یا پیر هم او و فارم بر پارچه آلوده بر آن نهند هم اگر سبب اشک باشد  
 رسکوه همراه نفیج عشبیه یا نفیج بارک نوشانند و اگر از خناریر بود سر پخیری او و آید همراه روغن جگر یا سی نوشانند  
 و علاج اعاده قوت و صحت از خوراندن غذای بنیده و او و قوی نمائند فصل نهم در وجع الاظفار و آن سبب  
 میشود زیر که در آن خون منجمد شد و روپ ایسکند پس گاهی این خون در لحمی که زیر ناخن است از رسیدن ضربت مجتمع و در  
 میشود و بر ناخن نگه آن دیده میشود پس اگر خفیف است بعد چندی این خود مرده و خون و دخل شد از قوت رفع  
 میگردد و محتاج به علاج نمیشود و گاهی خون در میان ناخن و گوشت که زیر ناخن است مجتمع و مرده میگردد و در وقت  
 در وقت بد میشود و گاهی گوشت منظر نال که در ناخن است شود و میگردد و از زیاده قوت از قوت تب میاید و علاج  
 چون باین حد رسد که ناخن مرتفع شود و میکند که ناخن است شود و در وقت زیر ناخن فشرده ناخن را  
 بر آن و اگر خون یاده زیر ناخن نباشد بلکه سبب غمزدن جسم صلب ناخن است و در وقت باشد در وقت ناخن از  
 سر کار و حاک کرده و پند تا قیق و لیکن کرد که از آنهم در دفع میگردد و ایضا پارچه باب سر و یاد و لکیر لپاسی  
 و آیوٹ یا در آب فیون تر کرده بر آن بنده و چند دست را بخوی بالای سینه متعلق دارند که منظر نال بسوی فوق  
 بن باشد فصل دهم در انتفاخ الاظفار و آنرا علت انگش بائی شرفی آن پیلنس گویند درین مرض ناخن بلند  
 و بیش تر میشود و سبب گاهی از امراض جلده یا این مرض پیدا میشود گاهی هم خاص درین مرض زیر ناخن پیدا  
 میگردد و از او قوت آن ناخن غلیظ و متفخ میشود و علل آنست گاهی که ناخن در رنگ آن تغییر واقع میشود بعد آن که ناخن  
 غلیظ پیدا گردد و پیش شک شد و متفخت گشته تو بر تو دیده میشود و علاج اول سبب مرض دریافت سازند  
 و پندید که بر جلده ام مرض جلده است یا نه اگر یافته شود و علاج مرض مذکور مشغول شوند و اگر سبب  
 پیدا شدن تخم خاص باشد منظر نال است که در آن یک حصه منظر نال است و سه حصه آب ساده میباش در آن  
 پارچه تر کرده بر ناخن باندند و همیشه این پارچه را از آن تر دارند و هر روز یکبار سر کنند بر ناخن طلا کرده باشد تا که  
 بسبب آن ناخن نرم شود و ناظر گاه از فعال آن در روپ را شود طلا کردن سر که موقوف سازد و بستن پارچه مذکور  
 در ساقینوس ایستاد و کف کف اگر بعد آن مرض موجود بود و بعد چند روز باز طلا کردن سر کنند روزانه یکبار ناخن  
 کنند این بر چنان عمل آنند که مرض رفع شود و اگر سبب که این ضرورتستین پارچه بر انگشتان ممکن نباشد هر چه  
 که ریاسوت بر پارچه آلوده بر آن نهند و گاهی در مرض اشک ناخن بر حال و رنگ بعضی خودی مایل نیکی چندی را  
 بر شیت و رنگ طبیعی خود بود و چندی از آن خشک میگردد و علاجش دشوار است لیکن در وقت اگر هم که یکبار  
 مرهم که ریاسوت یا صافیه یا هم آنستین بر ناخن طلا سازند و منظر نال را در غلافه چرمی دارند و او و آید شاکس

فصل نهم در وجع الاظفار

فصل دهم در انتفاخ الاظفار



بأنقوع غشیه نو شانند و فید میباش فصل یازدهم در غوص الطفره فی اللحم یعنی در آمدن خن بسبب  
 در زخم این مرض خاص در زخم انگشت پایشود و از آن زخم انگشت شود و میگرد و این را بلبنت نگاشتن آن زخم و انگشت  
 نیلش نماند یعنی در آمدن خن در زخم انگشت السبب سبب آن پوشیدن زوره بود که بر آن خیش باشد که  
 تنگی و غمزه آن زخم زخم انگشت میخور میشود و بسبب نفخ از ناخن زخم داخل میشود و زخم و ورم پیدا میگرد و از آن آب قوی  
 و بد بو جاری میشود و چندین درد شدید میباش که بیمار بر پای خود و قیام عتقاد کند و پا را حرکت نمیدهد العلاج  
 علاجش آنست که زوره وسیع و عرض آن رس را پوشند و اگر در زوره بود و مرض را بر پانگ خوابانند یا بلبنت دارند  
 و پوشش زخم کتان است ساخته بندند تا ناخن زخم و ورم کم شود پس ناخن را که در زخم آمده که مال حقیقا ببردیده بر آرد  
 بر زخم آن که باقی مانده نایسر سلور و آب حله که بر آن طلا سازند تا بروی خشک شود و قدری پنبه محلول ج صفا  
 در میان ناخن و گوشت نهند تا زخم از ناخن جدا مانده بروی بشود و ایضا له قدری پنبه محلول ج زیر ناخن نهند  
 تا بسبب آن ناخن بلند گشته از زخم جدا گردد و همیشه ناخن را بریده باشد تا از گوشت محاس نشود و گاهی  
 ازین تدبیر صحت نمیشود و در این وقت مریض را از کلار فام پوشش کرده ناخن را بیرون رند و بعد آن مریض را فیلون  
 بر زخم طلا کنند و چون زخم مندرل شود قدری موم بالای زخم چسبانند تا از آن ملاقات جسام صلبه محفوظ  
 ماند و زخم ناخن بهت پیاپی شود که از چسبانیدن موم ناخن است پس میباش وقت ذکر



2357  
12

710

This book may be kept

**FOURTEEN DAYS**

A fine of one anna will be charged for each day the book is kept over time.

PL 9A

